

Beitrag zur Verbreitung von *Schalifrontia furcifer* HAMPSON, 1901¹

(Lepidoptera, Noctuoidea, Agaristidae)

von

HUBERT THÖNY

eingegangen am 30.V.2024

Zusammenfassung: Neue Daten zur Gesamtverbreitung von *Schalifrontia furcifer* HAMPSON, 1901.

Abstract: New records of the distribution of *Schalifrontia furcifer* HAMPSON, 1901.

Resumo: Uma resenha das especies de mariposas neotropicas *Schalifrontia furcifer* HAMPSON, 1901, esta presentado.

Einleitung: Die Gattung *Schalifrontia* HAMPSON, 1901, ist monotypisch. Über die Jahre meiner Sammeltätigkeit und durch Einsicht in verschiedene Sammlungen sowie durch neuere eigene, und auch Fremdaufsammlungen, konnte ich eine kleine Anzahl von Exemplaren zusammentragen bzw. studieren. Die dabei gemachten Erkenntnisse sind Gegenstand dieser Arbeit. Allgemein muß gesagt werden, daß die Art sehr selten in den Sammlungen vertreten ist. Das liegt zweifelsfrei an der Tatsache, daß diese Art ein Tagflieger ist, und die wenigen Funde am Licht daher nur Zufallsfunde sind. In allen bearbeiteten Sammlungen konnte ich nur insgesamt 11 Exemplare feststellen. TODD (1966) schreibt daß sich im United States Natural Museum, Washington, 1 ♀, 5 ♂♂ befinden sollten. KIRIAKOFF macht keine Angaben über die Anzahl der von ihm untersuchten Exemplare.

Wie die unten abgebildeten Exemplare zeigen, ist die Art relativ variabel. Die Färbung kann, wie TODD (1966) schon bemerkte, von einem intensiven Schwefelgelb, wie beim Typus, bis zu einem hellen, blassen Gelb bei den ♀♀ reichen. Die Ausbildung der gelben Flecken ist auch recht unterschiedlich. Bei den ♂♂ ist die Ausbildung der weißen Flecken auch sehr variabel. Bei dem Exemplar aus der Sammlung BECKER, Minas Gerais, ist der weiße Querfleck am Apex ziemlich breit angelegt, der weiße Bereich im Hinterflügel ist hingegen nicht zusammenhängend wie bei dem Exemplar aus Rio de Janeiro, bei dem der weiße Querfleck am Vorderflügel nur noch sehr klein ausgebildet ist.

Schalifrontia furcifer HAMPSON, 1901

Cat. Lep. Phal. B. M. 3: 654 (*Schalifrontia*) (HT ♀: Brasilien, Santa Catarina, BMNH, London). (Abb. 1).

Gattungstypus von *Schalifrontia* HAMPSON, 1901.

Untersuchtes Material:

In der Sammlung H. THÖNY, Camacan, jetzt V. O. BECKER, Camacan: 1 ♂, Brasilien, Rio de Janeiro, Boca da Mato, Cach do Macacu, 11.-21.10.1998, leg. THÖNY H., Gen. 3094 THÖNY H. (Abb. 6, 7); 2 ♂♂, Brasilien, Rio de Janeiro, Boca da Mato, Cach do Macacu, 15. 10. 1996, 100 m, leg. N. TANGERINI.

In der Sammlung V. O. BECKER, Camacan: 2 ♂♂, Brasilien, Minas Gerais, Unai, 3. XI. 1983, Slgsnr. 49653, 49643; 2 ♀♀, Brasilien, Rio de Janeiro, Cachoeira do Macacu, 600 m, 13.X.1985, Slgsnr. 65504.

In der Sammlung A. MOSER, Sao Leopoldo: 1 ♂, Brasil, RS, Morro Reuter, 600 m, Faz. Padre Eterno, 5/6.10.2007, Slgsnr. 1872, A. MOSER leg.

In der Sammlung Curitiba: 1♂, Corcovado Rio, L. T. Col. X. 932[1932], Col. D'ALMEIDA; 1 ♂, X.1996, Mocambinho Ceiba, Minas Gerais, leg. TANGERINI I.; 1 ♂, Cerro Azul, PR, 28. IX. 1985, 600 m, O. MIELKE leg. Gen. 3093, THÖNY H. (Abb. 4, 6).

Verbreitung der Art: Bisher nur aus Brasilien gemeldet. Alle Verbreitungsdaten stammen aus der unveröffentlichten Datenbank BEHOUNEK & THÖNY (2024).

Dank: Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei den Herren, ALFRED MOSER, Sao Leopoldo, Brasilien und VITOR O. BECKER, Camacan, Brasilien sowie bei Herrn EDUARDO CARNEIRO Kurator des Museums an der Universität Curitiba, für die Möglichkeit Ihre Sammlungsdaten hier benutzen zu dürfen.

Literatur

DRAUDT, M. (1919-1944): In SEITZ, A., Die Gross-Schmetterlinge des Amerikanischen Faunengebietesb 7: 1-508, Taf.1-96. Die eulenartigen Nachtfalter. - Alfred Kernen-Verlag, Stuttgart.

DRUCE, H. (1881-1900): In GODMAN, F. D. & O. SALVIN, Biologia Centrali-Americana, Lepidoptera-Heterocera 1 und 2. - Porter, London. HAMPSON, G. F. (1901): Catalogue of the Lepidoptera in the British Museum 3: 1-744. - London.

POOLE, R. (1989): Lepidopterorum catalogus (New Series): 118. - London. SPECHT, A., SILVA, E. & D. LINK (2004): Owllet moth (Lepidoptera, Noctuidae) of Museo Entomológico Ceslau Biezanko, Departamento de Fitossanidade de Agronomia Eliseu Maciel Universidade Federal de Pelotas, RS. - Revista Brasileira de Zoologia, Agrociencia 10 (4): 389-409, Sao Paulo.

TODD, E. L. (1966): Notes and Descriptions of some american Agaristine Moths. - Proceedings of the United States National Museum 120 (3560): 1-15, Washington.

Anschrift des Verfassers

HUBERT THÖNY

Reserva Serra Bonita P.O.Box 1

Cep. 45.880-000 Camacan, Bahia Brasilien

E-Mail: Hubert_Thony@Yahoo.de

¹ 43. Beitrag zur Heterocera Fauna Brasiliens



Abb. 1-7: *Schalifrontia furcifer* HAMPSON, 1901.

Abb. 1, 1a: HT ♀: Brasilien, Santa Catarina, BMNH, London mit Originaletiketten. Coll et Foto British Museum (N. H.)®, London





Abb. 2, 3: Brasilien, Rio de Janeiro, Cachoeira do Macacu, 600 m, 13. X. 1985, Slgsnr. 65504 Abb. 3, Brasilien, Minas Gerais, Unai, 3. XI. 1983, Slgsnr. 49653, V.O.Becker, Camacan. Fotos: H. THÖNY.






Abb. 4, 5: ♀ mit Gen. 3093. Cerro Azul, PR, 28. IX. 1985, 600 m, O. MIELKE leg. Fotos: H. THÖNY.

Abb. 6, 7: ♂, Brasilien, Rio de Janeiro, Boca da Mato, Cach do Macacu, 11.-21. 10. 1998, leg. Thöny H. Gen. 3094 ♂. Fotos: H. THÖNY.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Atalanta](#)

Jahr/Year: 2024

Band/Volume: [55_1-2](#)

Autor(en)/Author(s): Thöny Hubert

Artikel/Article: [Beitrag zur Verbreitung von Schalifrontia furcifer Hampson, 1901 \(Lepidoptera, Noctuoidea, Agaristidae\) 260-261](#)