

Ber. nat.-med. Verein Innsbruck	Band 99	S. 91 - 102	Innsbruck, Dez. 2014
---------------------------------	---------	-------------	----------------------

Zum Vorkommen von Pflanzenwespen in Osttirol 5. Teil (Hymenoptera: Symphyta: Tenthredinidae: Nematinae)

von

Alois KOFLER & Wolfgang SCHEDL *)

On the occurrence of sawflies in the district of Lienz (East Tyrol, Austria) part 5.

Synopsis: For the District of Lienz (East Tyrol) 88 species of sawflies (Hymenoptera: Symphyta: Tenthredinidae: Nematinae), for the country Carinthia 16 species are listed. *Pachynematus clibrichellus* (CAMERON, 1878), *Pristiphora confusa* LINDQUIST 1955 are new for Austria.

Keywords: Symphyta, Nematinae, Osttirol, Austria

1. Einleitung:

Die Blattwespen für den Bezirk Lienz (Osttirol) und das Bundesland Kärnten wurden bisher in 4 Teilen bei KOFLER & SCHEDL (1982, 2010, 2012, 2013) mitgeteilt. Nomenklatur und Reihung der Unterfamilien jeweils nach SCHEDL (2009, 2012). Vereinzelt werden auch Funde aus anderen Bundesländern mitgeteilt und neuere Nomenklatur verwendet.

Die Reihung der Funde in Osttirol folgt alphabetisch nach den 33 Gemeinden gemäß BEZIRKSKUNDE OSTTIROL (2001), jeweils durch ; getrennt, die fallweise zitierten xylobionten Pilze nach BREITENBACH & KRÄNZLIN (1986).

Alle Belege det. W. Schedl, abschließend 2012 und 2013, leg. et in coll. A. Kofler, wenn nicht anders zitiert. Reihung und Nomenklatur nach SCHEDL (2009, ergänzt 2012 2013).

Abkürzung: Gen. Pr. fec. Schedl = Genitalpräparat präpariert (fecit) von W. Schedl,
e. l.: aus der Larve gezüchtet

*) Anschrift der Verfasser: Mag. Dr. A. Kofler, Meranerstraße 3, 9900 Lienz, Osttirol, Österreich. Univ.-Prof. Dr. W. Schedl, Institut für Ökologie, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Technikerstraße 25, 6020 Innsbruck, Österreich.

2. Ergebnisse:

Amauronematus stenogaster (FÖRSTER, 1854) (= *Amauronematus fallax* (SERVILLE, 1823)).
Amlach: Lienzer Dolomiten unterhalb Kerschbaumer Törl 12.7.1970 (1♀) 2100-2200 m
det. Schedl mit ? (Ex. ohne Antennen).

Amauronematus sp.: Kals: Wasserweg Lana 1320 m (1♀) 29.8.2011, nicht determinierbar.

Anoplonyx apicalis (BRISCHKE, 1883) (= *Anoplonyx duplex* (LEPELETIER, 1823) auct.,
(= *Anoplonyx carinthiacus* ZADDACH in BRISCHKE 1883, 1 Ex. in Kärnten).

Amlach: Alter See 30.5.1974 (1♀); Virgen: Mitteldorf Heckenfluren 22.6.1991 (1♀, cf.
Anoplonyx duplex).

Anoplonyx destructor BENSON, 1952

Kartitsch: Tannwiese (Kartitscher Sattel) 1.6.1998 (1♀, det. Schedl : A. cf. *destructor*) 1530 m.

Anoplonyx ovatus (ZADDACH, 1883)

Ainet: Ort 16.5.1968 (1♀), 30.6.1992 (1♂); Matrei: Gruben 15.6.1978 (1♂); Gen.Pr. auf
Karton fec.det. et in coll. Schedl; Nikolsdorf: Drau-Auen beim Bahnhof 2.7.1983 (1♀);
St. Jakob: Ochsenlacke 14.7.1971 (3♂♂2♀♀) 2400 m, (1♂1♀) in coll. Schedl; Tristach:
Kreithof 26.5.1992 (1♀) 1050 m.

Cladius pectinicornis (GEOFFROY, 1785) (= *Cladius pectinicornis* var. *comari* STEIN, 1886)

Lavant: Golfplatz 22.5.2009 (1♀) am Drauweg, Ort 7.5.2008 (1♂) leg. H. Deutsch im
Garten, 30.6.1992 (1♀); Leisach: Lienzer Klause 24.5.1993 (1♀); Lienz-Stadt:
Franziskanerkloster 21.8.2010 (1♂); Matrei: Gruben 15.6.1978 (1♂); Nikolsdorf: Drau-
Auen beim Bahnhof 2.7.1983 (1♀), Schloss Lengberg 17.8.2008 (1♂); St. Johann: Oblas
18.8.1987 (1♂) 1050 m Lichtfang; Tristach: Kreithof 26.5.1989 (1♀) 1050 m. – Kärnten:
Lavanttal St. Paul: Ruine Rabenstein Mai 1991 (1♀) 600 m Lichtfalle leg. Wieser coll.
Kofler; Magdalensberg: Lassendorf 450 m Juni 1993 (1♀) Lichtfang leg. Wieser coll.
Kofler.

Craesus alniastri (SCHARFENBERG, 1805) (= *Craesus varus* (VILLARET, 1832))

Nikolsdorf: Nörsacher Weiher 652 m 2.9.1981-2.4.1982 e.l (1♀ samt Kokon) leg. Schedl
in coll. Kofler. – Kärnten: Magdalensberg: Lassendorf Juni 1994 (1♀) Lichtfalle leg.
Wieser coll. Kofler.

Craesus latipes (VILLARET, 1832)

Kärnten: Feldkirchen: Gut Dietrichstein VIII.1977 (1♂) leg.Kofler, det. et in coll. Schedl
1978.

Euura atra (JURINE, 1807)

Osttirol: Amlach: Stadtweg 10.5.2010 (1♂ und 1♀) e.l. an dünnem Weidenzweig (*Salix* sp.)
e.l.: Galle von *Rhabdophaga salicicola* (mit 2 Schlupflöchern); Assling: Kristeinertal
Fahbrücke 13.6.2008 (1♀) 1600 m det. Schedl 2013; Lavant: Ort 20.5.1968 (1♀), 1.5.2009

(1♂) Auwald an *Salix* sp., det. Schedl 2013; Nikolsdorf: Nörsach 27.4.1968 (1♀), Lengberg 31.-3.2009 e.l. in *Salix* (1♀) leg. et in coll. Kofler, det. Schedl 2013, und Mai 2008 (1♀) an *Salix* sp.; St. Johann 17.4.2009 (1♀) Iselweg, 2 Triebgallen an dünnen Weiden-Zweigen; Strassen: Tassenbach Stausee 21.5.1983 (1♀), 24.4.1993 (1♀) e.l. in 3 Triebgallen von *Salix* sp. cf. *purpurea*. – Kärnten: Drautal Oberdrauburg 14.4.2009 (3mm1♀) an verdickten Triebgallen leg. Deutsch, 21.9.2008 (1♀) von Purpurweide (*Salix purpurea*). Kärnten: Drautal: Oberdrauburg (1♀4♂♂) Weidengallen e.l. 14.4.2009 leg. Deutsch, in coll. Kofler, det. Schedl 2013.

Euura mucronata (HARTIG, 1877)

Matrei: Gruben im Tauerntal 15.6.1978 (1♀), Kienburg 24.5.1986 (1♀); Oberlienz: Glanzer Brücke 29.4.1967 (1♀); St. Johann: rechte Isel-Au 16.6.1999 (1♀).

Euura testaceipes (BRISCHKE, 1883)

Oberlienz: Oberdrum 22.12.1974-27.1.1975 (1♀) e. l. in Weide (*Salix* sp.).

Euura venusta (BRISCHKE, 1883)

Lavant: Ortsgebiet 28.5.1982 (1♀).

Hemichroa crocea (GEOFFROY, 1785)

Nikolsdorf: Nörsach 3.9.1970 (1♀). – Kärnten: Magdalensberg Lassendorf August 1998 (1♀) Lichtfang leg. Wieser coll. Kofler.

Hoplocampa brevis (KLUG, 1816)

Tristach: Kreithof 20.5.2005 (1♀) 1050 m.

Hoplocampa crataegi (KLUG, 1816)

Leisach: Lienzer Klause 22.5.1970 (4♂♂1♀); Tristach: Kreithof 16.5.1967 (1♂1♀) 1050 m.

Hoplocampa flava (LINNAEUS, 1761)

Lienz-Stadt: Patriasdorf 13.6.1984 (9 Ex. davon (1♂) Gen.Pr. fec. et in coll. Schedl auf Plastikblatt, e.l. an Obstköder leg. Ackerer coll. Kofler, Pfarrsiedlung: Heinricher-Garten 14.5.1969 (1♂, tot in Tulpenblüte); Nikolsdorf: Lengberg 4.5.1988 (1♂2♀♀) in Schlehdorn-Früchten (*Prunus spinosa*) leg. Deutsch coll. Kofler; Tristach: Kreithof 16.5.1967 (1♂) 1050 m.

Hoplocampa minuta (CHRIST, 1791)

Thurn: Tschule Alm 16.6.2005 (1 Ex.) 1400 m.

Hoplocampa plagiata (KLUG, 1816)

Leisach: Lienzer Klause Wacholder-, Föhrenwald 14.5.2004 (3 mm 1♀); – Tristach: Kreithof 16.5.1967 (1♂) 1050 m:

Nematus bergmanni DAHLBOM, 1835 det.Schedl: ? *Platycampus luridiventris* (FALLEN)
Nikolsdorf: Nörsach 14.6.1982 (1♂): Gen.Pr. fec. det. et in coll. Schedl.

Nematus sp.: Amlach: Rodelweg Auwald 2.8.2011 (1♀), nicht determinierbar.

Nematus bipartitus SERVILLE, 1823

Nikolsdorf: Auwald im Bereich der TAL (Pipeline) 22.7.1978 (1♀) leg. Kofler, in coll.
Schedl; St. Jakob: 10.7.1970 (1♀).

Nematus brevis C. G. THOMSON, 1871

fehlt bei SCHEDL (2009: 30) – TAEGER & BLANK (1998: 96) an *Betula pendula*.
Dölsach: Aguntum 31.5.1969 (1♂) Gen.Pr. fec. Schedl.

Nematus clitellatus (SERVILLE, 1823)

Dölsach: Lindsberg 21.4.1989 (1♂) Gen. Pr. fec. auf Karton, det. et in coll. Schedl.

Nematus coeruleocarpus HARTIG, 1837

Lavant 3.5.1977 (1♀).

Nematus flavescens STEPHENS, 1835

Nikolsdorf: Nörsach 13.5.1966 (1♀).

Nematus frenalis THOMSON 1888

Nikolsdorf: Nörsach 23.8.1984 (1♂) Gen. Pr. fec. Schedl auf Karton.

Nematus sp.: Amlach: Rodelweg Auwald 2.8.2011 (1♀).

Nematinus fuscipennis (SERVILLE, 1823) (= *Nematinus abdominalis* (PANZER, 1799))

Aassling: Mittewald 9.6.1982 (2♀♀), Thal 16.8.2002 (1♀); Iselsberg: Ort 5.7.1987 (1♂);
1200 m; Kals: Staniska 24.6.1990 (1♀); Lavant: Ort 26.7.1978 und 8.6.1979 (je 1♀);
Nikolsdorf: Lengberg 7.6.1983 (1♀), Nörsach 21.5.1983 (1♂), 9.6.1988 (1♀), Plone
9.6.1990 (1♀) 1400 m, Weg nach Plone 20.6.1989 (1♀) 990 m, Drau-Auen beim Bahnhof
28.5.2005 (1♀); Thurn: Ort 16.6.2005 (1♂), Tschule Alm 16.6.2005 (1♂) 1400 m; Strassen:
Tassenbach Stausee 20.7.1987 (1♀) und am Gailbach-Ufer 9.6.2005 (1♀).

Nematinus luteus (PANZER, 1804) (= *Pristiphora pallens* (ENSLIN, 1916))

Nikolsdorf: Drau-Auen beim Bahnhof 28.5.2005 (1♀); St. Johann: Lorenzenhof 31.5.1986,
Gen. Pr. fec. W. Schedl, 2013: Strassen: Tassenbach Gailbach 9.6.2005 (1♀) 1070 m. –
Kärnten: Magdalensberg Lassendorf Juni 1998 (1♂) Lichtfalle leg. Wieser coll. Kofler,
Gen. Pr. fec. Schedl auf Karton.

Nematus bergmanni DAHLBOM, 1835 (= *Pristiphora pallens* (ENSLIN, 1916))

Nikolsdorf: Nörsach 27.2.-5.3.2002 e.l. (1♀, det. Schedl mit ?) in Weidenzweigen mit
Weidenruten-Gallmücke (*Rabdophaga salicis*, Diptera: Cecidomyiidae) 1.7.1988 (1♀) und

14.6.1982 (1♂) Gen. Pr. fec. det. et in coll. Schedl. – Kärnten: Drautal St. Peter i.H.: Kapellerteich (1♀) 1990 leg. W. Egger coll. Kofler. – KOFLER & KRAINER (1998).

Nematus bipartitus SERVILLE, 1823

Nikolsdorf: Auwald bei der TAL-Pipeline 22.7.1978 (1♀) det. et in coll. Schedl 1982.

Nematus clitellatus SERVILLE, 1823

Dölsach: Lindsberg 21.4.1889 (1♂) Gen.Pr. auf Karton fec. Schedl, det. et in coll. Schedl.

Nematus coeruleocarpus HARTIG, 1837

Osttirol: Lavant: 3.5.1977 (1♀) leg. Kofler, det. et in coll. Schedl, 1977.

Nematus cf. *fagi* ZADDACH, 1876 (= *Nematus minimus* KONOW, 1904)

Kärnten: Magdalensberg; Lassendorf Juli 1998 (1♀, det. Schedl mit ?) Lichtfalle leg. Wieser coll. Kofler.

Nematus incompletus FÖRSTER, 1854

Lienz-Stadt: Maria Trost 11.6.2009 (1 Ex.); Tristach: Kreithof 24.5.2007 (1♂) 1050 m. – beide Ex. Gen. Pr. fec. Schedl auf Karton.

Nematus insignis HARTIG, 1840

(= *Nematus superbus* GRADL, 1881, *Holcocneme insignis* (HARTIG, 1840), *Pachynematus insignis* (HARTIG, 1840), *Pristiphora insignis* (HARTIG, 1840), *Pikonema insigne* (HARTIG 1840)). Siehe SCHEDL (2009): nur oT, NÖ, St. – Amlach: Kerschbaumtal (Lienzer Dolomien) 25.5.1983 bei 1200 m (1♀, in coll. Schedl). – Neufund für West-Österreich, det. 2005.

Nematus melanaspis HARTIG, 1840

Nikolsdorf: Drau-Auen beim Bahnhof 28.5.2008(1♂). – Kärnten: Gailtal Hermagor: Obermöschach Mai 1998 (1♂) 670 m leg. Wieser coll. Kofler, det. Schedl: *Nematus* cf. *melanaspis*: Gen. Pr. fec. Schedl auf Karton); Feldkirchen: Roggbach Mai 1996 leg. Wieser (1♂, det. et in coll. Schedl).

Nematus miliaris (PANZER, 1797) (= *Nematus capreae* LINNAEUS, 1758)

Iselsberg: Stronach-Lacke 7.7.2010 (1♂) 1460 m, Gen. Pr. fec. Schedl.

Kärnten: Obermöschach August 1989 Lichtfalle (1♂) leg. Wieser coll. Kofler, Gen. Pr. fec. Schedl.

Nematus monticola THOMSON, 1871 (= *Nematus pschornwalcheri* MUCHE, 1972)

Schedl det. 2012: *Nematus* cf. *monticola*. – SCHEDL (2009:30): bisher nur Steiermark.

Kartitsch: Winkeltal 27.7.1983 (1♀) 1700 m.

Nematus myosotidis FABRICIUS, 1804

Abfaltersbach: Draufener beim Klärwerk 23.6.2004 (1♀); Ainet: Unter-Alkus 29.6.1990 (1♀); Amlach: Galitzenklamm 6.6.1966 (1♀); Franz-Lerch-Weg zum Klammbrückl 28.6.1995 (1♀) 1050 m; Kartitsch: Tannwiese 1.6.1998 (1♂) 1530 m; Lavant: Ort 5.7.1988 (1♀). 9.6.1992 (1♀) leg. et in coll. Kofler, det. Schedl 2014 und 30.6.1992 (1♀), Auwald im Bereich der TAL (Pipeline) 13.8.1987 (1♀); Leisach: Burgfrieden 5.6.1992 (2♂♂1♀), Angerlehauser 12.7.2006 (1♀), Lienzer Klause 20.5.2009 (1♂), Ortsgebiet 19.5.1967 (1♂); Lienz-Stadt: Maria Trost 2.7.1988 (1♂); Nikolsdorf: Lengberg 1.6.1986 (1m), Nörsach oberhalb Steinbruch 2.6.2004 (1♀), Plone 9.6.1990 (1♂), 10.6.1990 (3♂♂) 1400 m; Matrei: Brühl 31.5.1986 (1♂), Zedlacher Paradies 28.7.1987 (1♀) 1450 m; Nikolsdorf: Nörsach: 23.8.1984 (1♀); Nußdorf-Debant: Nußdorf 3.7.1992 (1♀), Ober-Nußdorf beim „Zainer“ 23.6.2001 (1♀) 1350 m; Obertilliach: Niedermoor Schwalen bei Leiten 27.6.1992 (1♀) 1450 m; St. Johann: Ort 20.7./30.7.1990 (je 1♀), Oblass Stausee 7.6.2003 (1♀) 1070 m; Tristach: Kreithof 14.6.2009 (1♂) 1050 m und 11.6.2010 (1♂), Jungbrunn 9.6.1966 (1♂); Virgen: Mitteldorf Feldfluren 13.8.1991 (1♀) Nr.159 Gen.Pr. fec. Schedl auf Karton, Obermauern 16.7.1988 (1♂). – Kärnten: Gailtal: Hermagor: Obermöschach August 1998 (1♀) 670 m Lichtfalle-Beifang leg. Wieser coll. Kofler; Drautal Berg i.D.: Ochsen Schlucht 23.6.2009 (1♂) leg. Kofler.

Nematus oligospilus FÖRSTER, 1854

Anras: Mittewald 17.6.1994 (1♀) leg. et in coll. Kofler, det. W. Schedl 2014; Kartitsch: Hollbruckertal 30.6.1978 (1♀) bei 1500 m; Lienz-Stadt: Grafenbachl 21.5.1966 (1♀); Nikolsdorf: Nörsach 3.8.1966 (1♀) und 23.8.1984 (1♀); Tristach: Ortsgebiet 17.6.1982 (1♀). – Kärnten: Lassendorf August 1989 Lichtfalle (1♀) leg. Wieser, coll. Kofler.

Nematus spireae ZADDACH, 1883

Innervillgraten: Ahrntal Sinkensee 10.7.2002 (1♀) 1650 m, det. Schedl: *Nematus* cf. *spireae*.

Nematus tibialis NEWMAN, 1837

Kärnten: Magdalensberg: Lassendorf 9.9.1997 (1♀) 450 m Lichtfallen-Beifang leg. Wieser coll. Kofler. – Neozoon aus Nordamerika. In Österreich an Blättern von Robinie (*Robinia pseudoacacia*, Fabaceae) weit verbreitet.

Nematus umbratus THOMSON, 1871

SCHEDL (2009:31) nur Nordtirol

Kals: Dabaklamm 4.6.1974 (1♀), det. Schedl 2012: *Nematus ?umbratus*.

Nematus viridis STEPHENS, 1835

Nematus cf. *viridis*: Lienz-Stadt: Friedenssiedlung Meranerstraße 3 (1♀) am Fenster innen 24.8.2012 det. Schedl; *Nematus* cf. *viridis*; Nikolsdorf: Nörsach 31.7.2002 (1♂), Gen. Pr. fec. Schedl auf Karton.

Pachynematus annulatus (GIMMERTHAL, 1834) (= *Pachynematus ravidus* KONOW, 1903 sensu BENSON, 1960) (= *Pachynematus rumicis* (LINNAEUS, 1758) sensu FALLÉN, 1808)
St. Veit i. D.: 20.5.1982 (1♀) 1520 m, an *Rumex* sp. mit *Gastroidea* sp. (Col. Chrysomelidae).

Pachynematus clitellatus (SERVILLE, 1823) (= *Pachynematus trisignatus* FÖRSTER, 1854):
TAEGER & BLANK (1998: 31 und 263).

Lavant: Ort 5.8.2008 (1♂) Auwälder Draufufer; Lienz-Stadt: Patriasdorf Riedlhof 19.8.2008 (1♂, in coll. Schedl); Matrei: Zedlacher Paradies 28.7.1986 (1♂) 1450 m; Virgen: Mitteldorf Feldfluren 18.7.1991 Schilfhang (1♀).

Pachynematus clibrichellus (CAMERON 1878)

Kals: Dabaklamm 4.6.1974 (1♂), Gen. Pr. auf Karton fec. et in coll. Schedl. - Neu für Österreich.

Pachynematus fallax (SERVILLE, 1823) (= *P. xanthocarpus* (HARTIG, 1840, = *Pachynematus sulcatus* BENSON, 1948, = *P. chambersi* BENSON, 1948, = *P. chymersi* BENSON, 1948).

St. Johann: Niedristteich 8.5.2002 (1♂) 1100 m.

Pachynematus imperfectus (ZADDACH, 1876)

Nikolsdorf: Lindsberg 21.4.1989 (1♂) Gen. Pr. fec. auf Karton et in coll. Schedl.

Pachynematus obductus (HARTIG, 1837)

Lavant: Ort 9.6.1992 (1♀, mit rotem Abdomen ab 3. Tergit). – Kärnten: Nockalm Karlbad 11.8.1990 (1♀) leg. Kofler, in coll. Schedl.

Pachynematus pallescens (HARTIG, 1837)

Lavant: Ort 31.5.1999 (1♀); Obertilliach: Leitnertal 29.6.2000 (1♀) 1400 m, det. et in coll. Schedl.

Pachynematus scutellatus (HARTIG, 1837)

Iselsberg: Roaner Alm 3.7.1983 (1♂) 1850 m, Gen. Pr. auf Karton fec. Schedl; Kals: Lesach-Riegel 31.7.1878 (1♀) 2000 m; Tristach: Kreithof 7.6.1994 (1♀) 1050 m.

Pachynematus vagus (FABRICIUS, 1781)

Assling: Kristein 26.6.2010 (2♂♂) 1600 m und Pfleger Alm 6.7.1983 (1♀) 1600 m; Lienz-Stadt: Maria Trost 23.5.1989 (1♀).

Platycampus luridiventris (FALLÉN, 1808)

Matrei: Gruben 15.6.1978 (1♀).

Phyllocolpa leucaspis (TISCHBEIN, 1846)

Lavant: Ort 30.4.1987 (1♂); Nikolsdorf: Nörsach 20.5.1987 (1♂2♀♀, 1♀ in coll. Schedl).

Phyllocolpa spirappendiculata KOPELKE, 2007

SCHEDL (2009:32): Holotypus ♀ nT (Erlsbach, Defereggental): nT, S. – KOPELKE (2007 a/b/c): Holotypus (♀) nT : Erlsbach: liegt in Osttirol: St. Jakob i.D.: BEZIRKSKUNDE OSTTIROL (2001: 353): St. Jakob: Oberrotte: Erlsbach; fehlt bei PFAUNDLER (1983: 355-356): St. Jakob a. A., St. Jakob i. D., St. Jakob i. H.

Platycampus luridiventris (FÄLLEN, 1808)

Lavant: Ortsgebiet 9.6.1978 (1♀).

Pontania crassipes (THOMSON, 1871)

Kals: Lucknerhaus 20.9.1998 (1♀) 2050 m ex Galle an *Salix* sp., det. Schedl: *Pontania crassipes*-Gruppe.

Pontania dolichura (THOMON, 1871)

In coll. Kofler keine Images, nur Gallen, cf. Kopelke (1994), Gallen als Nachweis fraglich, Abfaltersbach: Drauweg beim Klärwerk 23.6.2004 (2 Ex.), 5.6.2006 (4 Ex.) an *Salix* cf. *purpurea*.

Pontania pedunculi (HARTIG, 1837)

In coll. Kofler keine Images: nur Gallen: (als Nachweis fraglich)
Assling: Thal Luggauer Brücke 15.8.1990 mehrfach an *Salix* cf. *purpurea*; Oberlienz: Weg zur Ranach Alm 26.10.2004 (1 Ex.).

Pontania vesicator (BREMI-WOLF, 1849)

Prägraten: Isplitzer Alm 28.8.2010 1500 m: 5 Gallen an Weide (*Salix* sp.) und (1♀), Artzuordnung nicht sicher.

Pontania viminalis (LINNAEUS, 1758)

Kals: Wasserweg (bei Lana) rechtes Ufer 21.9.2001 (1♀) in Galle an *Salix purpurea* (Purpurweide).

Priophorus brullei (DAHLBOM, 1835) (= *Priophorus morio* (SERVILLE, 1823))

Lavant: Auwälder Drauweg beim Golfplatz 17.3.2002 (2♀♀) ; Nikolsdorf: Nörsach 27.3.-21.5.1978 (1♀) e.l. in Pilz an Grauerle (*Alnus incana*); Lavant: Ort 30.6.1992 (1♀) und Drauweg beim Golfplatz 17.3.2012 (1♀); Tristach: Au beim Sportplatz 26.5.1988 (1♀). – Kärnten: Liebenfels: Metschach 4.8.1998 (1♂) Lichtfalle Nr.3 leg. Wieser coll. Kofler.

Priophorus pallipes (SERVILLE, 1823)

Kärnten: Magdalensberg: Lassendorf August 1994 (1♂1♀) Lichtfalle leg. Wieser coll. Kofler; St. Paul i.L.: Ruine Rabenstein August 1994 (1♂) Lichtfalle leg. Wieser coll. Kofler.

Priophorus rufipes (SERVILLE, 1823) (= *Priophorus ulmi* auct. nec LINNAEUS, 1758)

Ainet: Ortsgebiet 18.7.1984 (1♀); Lavant; Auwälder Drauweg 30.5.2012 (1♀); Leisach: Ort 1.3.-25.3.1978 (1♀) e.l. in Hasel (*Corylus avellana*), det. Schedl mit (?) *Priophorus* cf. *laevifrons* BENSON, 1936. St. Johann rechtes Iselufer 20.7.2004 (1♀); Tristach: rechtes Draufufer 16.8.2002 (1♀).

Pristiphora abietina (CHRIST, 1791) (= *Lygaeonematus pini* RETZIUS, 1783, *Lygaeonematus abietinus* (CHRIST, 1791)

Lienz-Stadt: Grafenanger Gärtnerei Seeber 22.4.1993 (1♂); Nikolsdorf: Lengberg 17.5.1980 (1♂) Gen. Pr. fec. Schedl auf Karton und Lindsberg 12.7.1984 (1♂); St. Johann: Ortsgebiet 8.5.1993 (1♂) Gen. Pr. fec. Schedl auf Karton.

Pristiphora albitibia (THOMSON, 1859) (= *Pristiphora puncticeps* THOMSON, 1862)

St. Johann: Ort 24.8.1990 (1♂, det. mit ? in coll. Schedl), Ortsbereich 24.8.1993 (1♂).

Pristiphora alpestris (KONOW, 1903)

Nikolsdorf: Weg nach Plone 17.6.1990 (1♀) 1020 m, det. Schedl: *Pristiphora* cf. *alpestris*.

Pristiphora aphantoneura (FÖRSTER, 1854) (= *Pristiphora fulvipes* (FALLÉN, 1808)

Kärnten: Drautal Ebental: Pfäffendorf 16.7.1990 leg. Kofler (1♀) det. et in coll. Schedl.

Pristiphora appendiculata (HARTIG, 1837) (= *Pristiphora rufipes* SERVILLE, 1823, = *Pristiphora pallipes* LEPELETIER, 1823)

Lienz-Stadt: Maria Trost 23.5.1969 (1♀); Nikolsdorf: Nörsach Drauweg 30.5.2009 (1♀ det. et in coll. Schedl); St. Johann: rechtes Iselufer 20.7.2004 (1♀); Tristach: Draufufer 16.8.2002 (1♀); Virgen: Mitteldorf 23.5.1992 (1f). – Kärnten: St. Paul i.L. Ruine Rabenstein August 1994 (1♂) Lichtfalle leg. Wieser coll. Kofler; Magdalensberg Lassendorf August 1994 (1♀) Lichtfalle leg. Wieser coll. Kofler.

Pristiphora bifida (HELLÉN, 1947)

Kärnten: Klagenfurt Wölfnitz August 1999 (1♀) Lichtfalle leg. Wieser det. et coll. Schedl; Völkermarkt: Biotop Neudenstein 2.7.1994 (1♂, det. et in coll. Schedl, Gen. Pr. fec. auf Karton, Lichtfalle Nr. 1 leg. Wieser coll. Kofler.

Pristiphora breadalbanensis (CAMERON, 1882)

Amlach: Lienzer Dolomiten Kerschbaumer Alm 12.6.1968 (1♂) 1900 - 2200 m, Gen. Pr. auf Karton fec. Schedl. – Bei SCHEDL (2009: 33): bisher bekannt von Nordtirol, Niederösterreich und Kärnten.

Pristiphora carinata (HARTIG, 1837)

Matrei: Zedlach 26.5.2005 (1♀) 1300 m und Brühl 13.5.1986 (1♀).

Kärnten: Heiligenblut Glocknerstraße Hochtor 22.7.1987 (1♀) 2500 m.

Pristiphora compressa (HARTIG, 1837)

Ainet: 15.5.1967 (1♀); Amlach: Alter See 17.7.1978 (1♀); Anras: Asch 3.6.1987 (1♀); Dölsach: Eichholz 9.4.-17.4.1993 (1♀) ex pupa im Mulm von Strunk der Stieleiche (*Quercus robur*); Nikolsdorf: Nörsach 22.6.1990 (1♀); Thurn: Tschule Alm 1.6.1999 (1♀) 1400 m.

Pristiphora confusa LINDQUIST, 1955

Tristach: Kreithof 8.6.1986 1050 m (1♂) Gen. Pr. auf Karton, fec., det. et in coll. Schedl: Neu für Österreich.

Pristiphora friesei (KONOW, 1904)

Kärnten: Nockgebiet Zunderwand 5.7.-19.7.1990 (1♂) Bodenfalle Nr. 3 leg. Graf & Wieser, Gen. Pr. fec. et in coll. Schedl.

Pristiphora glauca BENSON, 1954

Kals: Rubisoi 1.7.1984 (1♀) 1650 m.

Pristiphora laricis (HARTIG, 1837)

Assling: Thal 2.6.1993 (1♀); Leisach: Lienzer Klause 24.5.1993 (1♀); Nikolsdorf: Nörsach 12.7.1984 (1♀); St. Jakob: Ort, beim Hotel Jesacher 31.7.1997 (1♀).

Pristiphora lativentris (THOMSON, 1871)

Nußdorf-Debant: Ober-Nußdorf Kerschbaumer Alm am Zettersfeld 3.5.1995 1550 m (1♂) Gen. Pr. fec. Schedl auf Karton. – Kärnten: Heiligenblut Glocknerstraße Hochtor 22.7.1987 (1♀) 2500 m, leg. et coll. Kofler.

Pristiphora leucopodia (HARTIG, 1837)

(= *Pachynematus sagulatus* KONOW, 1904, *Pachynematus leucopodius* HARTIG, 1837)

Ainet: 15.5.1967 (1♂) Gen. Pr. auf Karton fec. det. et in coll. Schedl; Kartitsch: Tannwiese 1.6.1998 (1♂) 1530 m; Matrei: Ranboden beim Strumerhof 28.6.1999 (1♀), det. et in coll. Schedl, bei 1600 m.

Pristiphora maesta (ZADDACH, 1876), (= *Pristiphora moesta* ZADDACH 1876)

Matrei: Kienburg 28.6.1987 (1♀).

Pristiphora melanocarpa (HARTIG, 1840)

Matrei: Gruben im Tauerntal 15.6.1978 (1♀) und Huben im Iseltal 9.8.1987 (1♀).

Pristiphora mollis (HARTIG, 1837)

Nußdorf-Debant: Nußdorf Kerschbaumer Alm am Zettersfeld 3.5.1995 (1♂) 1550 m, Gen. Pr. fec. Schedl auf Karton; Kartitsch: Tannwiese 23.5.1999 (1♀) 1530 m.

Pristiphora nigriceps (HARTIG, 1840), (= *Pachynematus nigriceps* HARTIG, 1840)
Tristach: Kreithof 3.5.1999 (1♀) 1050 m.

Pristiphora pallidiventrīs (FALLÉN, 1808)

Dölsach: Gödnach 15.7.1986 (1♀); Lavant 23.5.1966 (1♀); Strassen: Tassenbach beim Stausee 20.7.1970 (1♀) 1050 m; Tristach: Kreithof 21.7.1982 (1♀) 1050 m. – Kärnten: Ferlach August 1997 (1♀) Lichtfalle leg. Wieser coll. Kofler.

Pristiphora pseudocoactula (LINDQUIST, 1952)

Nußdorf-Debant: Nußdorf Kerschbaumer Alm am Zetttersfeld 3.5.1995 (1♀) 1550 m, det. Schedl: *Pristiphora* aff. *pseudocoactula* (LINDQUIST) – „aber ohne ♂ unklar“. Wäre neu für Österreich (Überprüfung !).

Pristiphora quercus (HARTIG, 1837)...s. *Pristiphora cincta* NEWMAN, 1837 (= *Pr. quercus* (HARTIG, 1837): bei SCHEDL (2009:33) und TAEGER & BLANK (1998:111) auf *Betula*, *Salix*, *Vaccinium*, *Spiraea*, *Lonicera*, *Vaccinium* scheint bevorzugte Futterpflanze zu sein. – Matrei: Zunig Alm 27.7.1986 (1♀) 1800 m.

Pristiphora ruficornis (OLIVIER, 1811)

Dölsach: Kapaun/Eichholz 9.8.1985 (1♀) det. Schedl: *Pristiphora* cf. *ruficornis*.

Pristiphora rufipes (SERVILLE, 1823), (= *Pristiphora alnivora*, HARTIG, 1840, *Pristiphora aquilegiae* (VOLLENHOVEN, 1866))

Amlach: Goggsteig 12.8.1966 (1♀); St. Johann: rechtes Iselufer 20.7.2004 (1♀); Tristach: Drauufer 16.9.2002 (1♀).

Pristiphora saxeseni (HARTIG, 1837)

Oberlienz: Ranach Alm 29.5.1996 (1♀) 1400 m.

Pristiphora thalictri (KRIECHBAUMER, 1884)

Kals: Unter-Peischlach Iselufer 27.5.2004 (1♀).

Pristiphora wesmaeli (TISCHBEIN, 1853)

Iselsberg: Raner Alm 3.7.1983 (1♀) 1850 m: „Lärchentier“.

Pseudodineura clematidis (HERING, 1924)

Osttirol: Prägraten: mehrere Minen in Blättern von *Clematis alpina* (Alpen-Waldrebe, Ranunculaceae), zwischen Umbalfällen und Reichenbergerhütte, erste Julihälfte, leg. E. Altenhofer, in litt. 4.4.2003 H. Pschorn-Walcher (W.Schedl).

3. Zusammenfassung:

Für den Bezirk Lienz (Osttirol) werden 88 Arten von Blattwespen Symphyta: Tenthredinidae: Unterfamilie: Nematinae samt ihren Fundorten aufgelistet. Für das Bundesland Kärnten werden 15 Arten erwähnt. *Pachynematus clibrichellus* (CAMERON, 1878), *Pristiphora confusa* LINDQUIST, 1955 sind neu für Österreich.

4. Literatur:

- BEZIRKSKUNDE OSTTIROL, 2001: Katholischer Tiroler Lehrerverein (Hrsg.), Verl. Löwenzahn Innsbruck, 415 pp.
- BREITENBACH J., KRÄNZLIN F. (Hrsg.), 1986: Pilze der Schweiz, Band 2: Heterobasidiomycetes, Aphyllophorales, Gastromycetes. Verl. Mykologia Luzern, 416 pp.
- FISCHER M. A., ADLER W., OSWALD K., 2005: Exkursionsflora, Österreich, Liechtenstein, Südtirol. Land Oberösterreich (Hrsg.), Landesmuseen Linz, 1373 pp.
- KOFLER A., KRAINER K., 1998: Zur Kleintierwelt am Kapellerteich bei Spittal. Kärntner Naturschutzberichte 3: 102-110.
- KOFLER A., SCHEDL W., 1982: Zum Vorkommen von Pflanzenwespen in Osttirol (Österreich). (Insecta: Hymenoptera, Symphyta). Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 69: 87-93.
- KOFLER A., SCHEDL W., 2010: Zum Vorkommen von Pflanzenwespen in Osttirol (Österreich): 2. Teil (Hymenoptera: Symphyta). Beiträge zur Entomofaunistik 11: 57-65.
- KOFLER A., SCHEDL W., 2012: Zum Vorkommen von Pflanzenwespen in Osttirol (Österreich): 3. Teil (Symphyta: Tenthredinidae: Selandriinae, Allantinae, Heterarthrinae, Blennocampinae). Beiträge zur Entomofaunistik 13: 15-27.
- KOFLER A., SCHEDL W., 2013: Zum Vorkommen von Pflanzenwespen in Osttirol (Österreich): 4. Teil (Insecta: Symphyta, Tenthredinidae: Tenthredininae). Carinthia II, Klagenfurt, 203/123: 481-494.
- PFAUNDLER G., 1983: Tirol Lexikon. Ein Nachschlagewerk über Menschen und Orte des Bundeslandes Tirol. Verl. Rauchdruck, 496 pp.
- SCHEDL W., 2009: Symphyta (Insecta), in: Checklisten der Fauna Österreichs, No. 4:8-40. (SCHUSTER R., Hrsg.), Verl. Österr. Akademie Wissenschaften (ÖAW): 8-40.
- SCHEDL W., 2009: Zur Morphologie, Biologie und Verbreitung der seltenen Fichtenblattwespe *Nematus insignis* HARTIG, 1840 (Insecta: Hymenoptera, Tenthredinidae). Contributions to Natural History, Bern 12: 1151-1163.
- SCHEDL W., 2012: Ergänzungen zur Checkliste der Symphyta (Insecta, Hymenoptera) Österreichs. Beiträge zur Entomofaunistik 13: 116-120.
- TAEGER A., BLANK ST., 1998 (Hrsg): Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. Deutsches Entomologisches Institut, Verl. Goecke & Evers, Keltern.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte des naturwissenschaftlichen-medizinischen Verein Innsbruck](#)

Jahr/Year: 2014

Band/Volume: [99](#)

Autor(en)/Author(s): Kofler Alois, Schedl Wolfgang

Artikel/Article: [Zum Vorkommen von Pflanzenwespen in Osttirol 5.Teil \(Hymenoptera: Symphyta: Tenthredinidae: Nematinae\) 91-102](#)