

Oberösterreichisches
Landesmuseum

I 12065 / 2

Beiträge zur Insekten-Fauna Böhmens.

II.

Fundorte böhmischer Wanzenarten,

nach der vom † MUDr. Ottokar Nickerl jun. hinterlassenen
Hemipterensammlung zusammengestellt

von

Med. Dr. Ottokar Nickerl sen.



Herausgegeben von der

Gesellschaft für Physiokratie

in Böhmen.



PRAG.

Verlag der Gesellschaft für Physiokratie in Böhmen.

1905.

3

Beiträge zur Insekten-Fauna Böhmens.

II.

Fundorte böhmischer Wanzenarten,

nach der vom † MUDr. Ottokar Nickerl jun. hinterlassenen
Hemipterensammlung zusammengestellt

Med. Dr. Ottokar Nickerl sen.



PRAG.

Verlag der Gesellschaft für Physiokratie in Böhmen.

1905.

O. Ö. Landesmuseum
Linz a. D.
Naturhistorische Abteilung.

X

Angeregt durch meinen verewigten Freund Prof. Ladislav Duda habe ich mich schon vor Jahren mit meinen beiden Söhnen, die damals noch im jugendlichen Alter standen, ebenfalls mit dem Studium der Schnabelkerfe beschäftigt und mit besonderer Vorliebe diese von unseren Entomologen ziemlich unbeachtete Ordnung gesammelt. Unsere Exkursionen beschränkten sich hauptsächlich auf die nächste Umgebung von Prag, die bekannten Ausflugsorte: Krtsch, Kundratitz, Kuchelbad, St. Prokop, Zawist und Wran, dann Pelz und Dablitz u. a. O. m. und in den Ferialmonaten auf die Gegend unseres mehrjährigen Sommeraufenthaltes (1883—1890) in Neuhütten (Schloss Nischburg) an der Beraun.

Während der Sommermonate mehrerer Jahre (bis 1896) wurde ausserdem die entomologisch noch wenig bekannte Gegend von Breitenbach (bei Platten) und Schmiedeberg im böhmischen Erzgebirge durchforscht, wobei neben einer namhaften Zahl für die Fauna Böhmens noch neuer Lepidopteren und Trichopteren auch manche interessante Art von Rhynchoten konstatiert werden konnte.

Nachdem mein älterer Sohn Franz schon als Mediziner am 28. Feber 1891 einer tückischen Krankheit erlag und mir das Schicksal am 27. Mai 1904 auch meinen zweiten Sohn MUDr. Ottokar Nickerl, 1. Assistenten an der deutschen Universitäts-Augenklinik, entrissen hat, mithin unseren gemeinsamen Bestrebungen ein vorzeitiges Ziel gesetzt wurde, so glaubte ich, die Resultate unserer Forschungen, soweit diese die wanzenartigen Insekten betreffen, hier mitteilen zu sollen, um dieselben der Vergessenheit zu entreissen, bevor noch das gesammelte Material in andere Hände übergeht.

IV

Weder Fieber noch Duda haben in ihren Publikationen Genaueres über Fundorte mitgeteilt, so dass die hier vorliegenden Angaben einem künftigen Sammler beim Aufsuchen gewisser Arten, speziell in der nächsten Umgebung von Prag, einen willkommenen Fingerzeig bieten dürften.

Auch die Angaben über das Vorkommen einiger Arten in unserem Erzgebirge, wenngleich das durchforschte Gebiet verhältnismässig nur klein ist, dürften zu der gegenwärtig noch mangelhaften Kenntnis der dortigen Hemipterenfauna beitragen und vielleicht von Interesse sein.

Jenen Arten, die uns von anderer Seite zukamen und unzweifelhaft aus Böhmen stammen, ist der Name des Sammlers beigefügt; alle übrigen Arten aber, bei denen dies nicht der Fall ist, sind ausschliesslich von meinem † Sohne MUDr. Ottokar Nickerl jun. selbst beobachtet und gesammelt worden, zuletzt in den Sommermonaten des Jahres 1903 während seines Aufenthaltes in Zawist bei Königsaal.

Andere in der hinterlassenen Sammlung vorfindliche Arten aus Böhmen, die jedoch einer genaueren Fundortsangabe entbehren, sind in diesem Verzeichnisse nicht aufgenommen, weshalb dasselbe nicht etwa als eine Aufzählung sämtlicher in Böhmen vorkommenden Arten zu betrachten ist.

PRAG am 31. Mai 1905.

MDr. Ottokar Nickerl sen.

I. Geocorisae Latr.

- Coptosoma globus* F. Pg. Immer einzeln auf Schlehenbüschen. Zlichow, Juni; Pelz, Juni;
Nh. Wuznicetal, Aug.;
- Corimelaena scarabacoides* L. Pg. Krtsch, 17. Apr.; Zlichow, 13. Sept.; Košíř, 15. Sept.; Zawist, 16. Sept.; unter Birkenestrüpp in lockerer Erde in Menge, zur Überwinterung versammelt.
Gross-Tschernitz (bei Saaz) Aug.;
- Odontoscelis fuliginosa* L. Pg. Zlichow, am Bahndamm der Buschtährader Eisenbahn, einzeln, 26. Mai und 26. Juni;
Nh. Hradiště, Aug.;
- dorsalis* F. Nh. Hradiště, Aug., mehrfach, zumeist in schon toten Exemplaren.
Karlsbad (Maloch).
- Odontotarsus grammicus* L. Pg. Berglehnen bei Pelz, einzeln im Grase, 15. Mai, 15. Juli, und wieder im Sept.; St. Prokop, unterhalb der Kirche, Sept.; zahlreicher in Zawist auf Blüten der *Inula conyza* sitzend, 18. Sept.
- Eurygaster maurus* L. Pg. überall gemein.
Diese Art wurde im Jahre 1878 mehrmals an den milchigen Körnern von Roggenähren saugend beobachtet und als Getreideschädling eingeschickt; so von Wickwitz, von Chlum (b. Rakonitz),

- Ryšín, Pustověd und Lašovic (Pürglitzer Bezirk), Ostrau (bei Mies) u. a. O.
- Eurygaster maurus var. pictus* F. Nh. im Aug. u. Sept. an den Blüten von Lappa mit der Stammart, aber seltener.
- hottentotus* H. S. Pg. auf den Anhöhen bei Košíř, 15. Aug. und St. Prokop, unter trockenem Laub und Gerölle. Nh. Aug., Neudau bei Karlsbad, Aug. (Schindler).
- var. niger* F. Pg. in prächtigen, tiefschwarzen Stücken bei Košíř 15. Sept.; St. Prokop, bei der Kirche, unter Loniceregebüsch im dürrn Laub 14. Sept., 18. Sept., 1. Okt., nebst verschiedenen Farbenübergängen zur Stammart.
- Graphosoma lineatum* L. Nh. an Umbelliferen im Wuznicetal am Bache, Aug. und Sept.; ziemlich häufig.
- Aethus nigrita* F. Nh. Schnarrowa an Feldrainen zwischen Graswurzeln einzeln, Aug.; von Liboch wurde uns diese Wanze im Aug. 1877 als angeblicher Schädling des Kartoffelkrautes eingeschickt.
- Cydnius aterrimus* Focrst. Pg. einzeln und selten; Krtsch 4. Juli; Nh. Schnarrowa am Waldrande, im Aug.;
- Schirus morio* L. Pg. im April; Zawist, Anfangs Aug. in einem Baumschlag; Nh. in der Anschwemmung, im Aug.
- luctuosus* M. & R. Pg. Zawist, 16. Sept.; Nh. Aug.; Neudau (Schindler). Schmiedeberg im Erzgebirge, Aug.;
- sexmaculatus* Ramb. Pg. Pelz; die im Sept. von Schlehenbüschen geklopfen Larven entwickelten sich im Okt.;

Sehrus bicolor L.

Pg. Stern, Juni; St. Prokop und Zawist, Sept.
Nh. Schnarrowa, Aug.;
Neudau (Schindler).

lubius Scop.

Pg. Radotín, an Thesium.

biguttatus L.

Pg. Kundratitzer Wald,
30. Sept. unter Steinen.
Bb. auf Berglehnen unter
grossen Steinen zwischen
Vaccinium myrtillus, oft
gesellschaftlich; Juli.

var. concolor O. Nick. jun.

Stett. F. Z. 1892 pag. 62 Bb. (typ!) wie die Stammart und mit dieser zugleich, Ende Juli 1889. Ziemlich häufig. Eingesammelte Larven, mit Schwarzbeeren gefüttert, entwickelten sich in einer Blechbüchse schon nach 3 Wochen.

Nh. Sept., nur ein einziges Stück.

Gnathonecus limbosus Geoffr.

Pg. Pelz, an Schlehen
20. Mai; Belvédère,
im ersten Frühling überall im Sonnenschein auf Wegen herumlaufend, in Menge;

picipes Fall.

Pg. Wran, 3. Mai;
Nh. auf Feldrainen zwischen Gras nicht selten, Aug.;

Sciocoris terreus Schrk.

Pg. in lockerer Erde und unter trockenem Laub.

Aelia acuminata L.

Pg. Krtsch, an Waldrändern 2. Mai, 27. Mai;
St. Prokop 2. Juli;
Zawist u. a. O. im Juli und Aug.;

Lužna 29. Juli;

- Aelia Klugii* Hahn Pg. St. Prokop 19. Jun. einzeln und selten; desgleichen in einem Waldschlag der Bahnstation Lužna-Lišan.
- rostrata* Boh. Pg. vom Apr. bis in den Spätherbst überall an Waldrändern und auf Wiesen, namentlich gern auf den Blüten von *Achillea millefolium*, Pelz 29. Apr., 27. Mai, 24. Jun.; Zlichow 13. Jun.; St. Prokop 19. Jun.;
Lužna 29. Juli;
Diese Art wurde zu wiederholtenmalen als Getreideschädling an jungen Kornähren gleichzeitig mit *Eurygaster maurus* beobachtet: bei Mies 10. Jun. 1878, ferner im Pürglitzer und Rakonitzer Bezirke.
- Neotiglossa pusilla* Gmel. Nh. Aug.;
- Stagonomus pusillus* H. S. Nh. beim Forsthausc „Grüne Baude“ in einem Waldschlag zwischen *Fragaria vesca*, im Aug., nicht häufig.
- Eusarcoris acneus* Scop. Pg. Zawist auf Wiesen an *Achillea* Jul. bis Sept.; die Larven lassen sich leicht erziehen; Sept.; überwintert.
Nh. Jul. u. Aug. von Wiesenblumen gekötschert.
- venustissimus* Schr.
(*melanocephalus* F.) Pg. Zawist bei der Nickerltafel und im zweiten Tal an *Urtica dioica*. Aug.
Nh. Wuznice an Nesseln am Bache recht häufig, Aug. u. Sept.; bei längerer Aufbewahrung in Alkohol erhalten die Tiere durch Entfettung ihre lebhaft schöne Färbung.
- Rubiconia intermedia* Wolff. Pg. Zawist 16. Sept., immer nur einzeln.
Nh. Aug.;
- Staria lunata* Hahn Pg. Pelz, beim Felsenschlösschen an *Syringa* in Menge, 22. Mai; Kuchelbad 18. Sept.;

- Zawist an felsigen Lehnen an der Moldauseite im Sept.;
Nh. Aug.;
- Peribalus vernalis* Wolff. Pg. Pelz 22. Mai; Kuchelbad 2. Sept. häufig.
Nh. an *Verbascum thapsiforme* und *Lappa* im Aug.;
- sphacelatus* F. Pg. immer einzeln und selten;
Pelz 15. Mai und im Sept.; St. Prokop 2. Juli; Zawist 16. Sept.; Larven vom Sept. entwickelten sich im Okt.; überwintert.
Nh. Aug.;
- Carpocoris fuscispinus* Boh. Pg. an Disteln, Kletten, Königskerzen und anderen Pflanzen überall gemein.
- nigricornis* F.
(*cryngii* Hahn) Nh. beim Forsthaus „Grüne Baude“ in einem Waldschlag an *Atropa belladonna* mit der vorigen Art. Aug.;
- lunulatus* Goeze
(*lynx* F.) Pg. auf *Euphorbia cyparissias*, Zlicheh am Bahndamm der Buschtährader Bahn 11. Juni; St. Prokop an der Berglehne unterhalb der Kirche. Aug. u. Sept., ziemlich häufig.
- varius* F. Pg. viel seltener als die vorigen Arten. 18. Apr. 8. Juni;
- baccarum* L.
(*verbasci* De Geer) Pg. die gemeinste Art dieser Gattung, überall;
Nh. an und unter *Verbascum*arten Aug. u. Sept.;
- Bb. an Wiesenblumen, Aug.;
- Palomena prasina* L. Pg. überall sehr häufig, auf Eichen, Birken, Haseln und anderem Gesträuch, besonders an *Urtica dioica*.
- var. subrubescens* Gorski Pg. Kuchelbad 29. Mrz., Košić 4. Apr., St. Prokop Apr., (nach der Überwinterung). Kuchelbad Sept., Zawist 15. Sept. und 5. Okt. (im Winterkleid).

- P. subrubescens* ist keine Varietät, sondern die im Herbst lederbraun sich verfärbende grüne Stammart, die unter Moos und trockenem Laub überwintert und im Frühjahr wieder erscheint, aber nicht mehr die grüne Färbung annimmt. Grüne Individuen überwintern nicht! Zahlreiche Versuche mit mehreren Hunderten von Individuen!
(siehe: Tätigkeitsbericht der Ges. f. Physiokratie 1892—96 pag. 6; Vortrag des Med. Cand. Ot. Nickerl „über winterliche Farbenänderung (Anpassung) der Arten aus der Wanzengattung *Palomena* und deren vermeinten Farbvarietäten *P. subrubescens* Gorski und *P. simulans* Put. als blosses Winterkleid“.)
- Palomena viridissima* Pod. Pg. gleichzeitig mit der vorigen Art, aber nicht so häufig.
var. simulans Put. (Winterfärbung) Sept.;
- Pitedia juniperina* L. Nh. am Lisek an Wachholderbüschen im Aug. d. J. 1887 und 1888 ziemlich häufig; seither nicht wiedergefunden.
pinicola M. & R. Nh. am Lisek mit der vorigen Art, aber viel seltener, Aug.;
- Piczodorus lituratus* F. Pg. Kuchelbad 11. Sept., Zowitz 5. Okt. und Krtsch 17. Apr. u. 2. Mai nach der Überwinterung, auf allerlei Gebüsch.
Nh. auf Kleefeldern, häufig. Aug.
var. alliaceus Gom. Pg. Krtsch 2. Mai;
- Raphigaster sagittifer* Goeze Pg. St. Prokop, vor Jahren einmal im Herbst zu vielen Hunderten an den Wänden der Kirche emporkriechend beobachtet, seither nicht wieder. Diese von Duda als gemein bezeichnete Art scheint in der Umgebung von Prag zu den selteneren zu gehören.

- Pentatoma rufipes* L. Pg. in Waldschlägen an Birkenbüschen
Krtsch, Stern u. a. O. im Jun.;
Zawist Aug.;
Nh. Jul. u. Aug.;
- Eurydema Fieberi* Schum. Pg. Pelz, an *Isatis tinctoria* in Menge
22. Jun.; Jarow-Homole, an den
Blüten von *Alyssum saxatile* 3. Mai;
Nh. bei Zbečno an felsigen Abhän-
gen, an derselben Pflanze 6. Juni;
die Larven lassen sich sehr leicht
erziehen.
- festivum* Fieb. Nh. Wuznicetal an *Verbascum*
thapsiforme, und auf Umbelliferen am
Bache, Aug., sehr häufig;
- ornatum* L. Pg. Krtsch an *Hypericum*, im Aug.
(Gürtler);
- oleraceum* L. Pg. überall auf Wiesen und in Gärten,
Apr. bis Okt.; an Gemüse zuweilen
als Schädling.
- Picromerus bidens* L. Pg. Pelz 19. Jun.; Zawist (im Bre-
žaner Tale) am Bache an *Polygonum*
hydropiper, Sept., sehr häufig.
Nh. am Lisek auf Haselbüschen,
Aug. ;
Bb. einzeln von Weiden geklopft, Jul.
u. Sept.;
- Arma custos* F. Pg. Krtsch 2. Mai; Pelz 19. Jun.;
Kuchelbad und Zawist an
Eichen, Sept. u. Okt. häufig.
Nh. am Lisek, an Haselbüschen,
Eichen, Birken u. a., Aug.;
- Troilus luridus* F. Pg. Krtsch 14. Apr.; Kuchelbad
2. Sept.; Zawist Aug. und 5. Okt. ;
Nh. am Lisek an Haseln, Aug. ;
Lissa a. E. 7. Jul. an Weiden.
Bb. Jul., an Weiden.
- Rhacognathus punctatus* L. Pg. Zawist-Jarow an Weiden, Ende
Aug., immer einzeln und selten.
Nh. an niederem Weidengebüsch. Aug.,
(ex larva).
Schmiedeberg, an *Salix cinerea*
Aug. ;

- Jalla dumosa* L. Pg. Košfř 15. Sept.; Pelz im Sept.; Zawist an Eichen, Sept.; Scharka an Haselbüschen Aug.;
Nh. Schnarrowa unter Erdbeeren im Aug. (ex larva), eine seltene Art!
- Zicrona coerulea* L. Pg. unter Büschen von *Rosa canina*, in lockerer Erde, nicht selten. Zlichow Jun.; Pelz 14. Mai; Zawist 25. Aug.;
Nh. Aug.;
Lužna-Lišan 29. Juli;
- Acanthosoma haemorrhoidale* L. Pg. Kuchelbad im Aug.; Zawist an Eichenbüschen, Aug. u. Sept.;
Nh. Nischburg am Schlossberg, Sept., überall ziemlich selten.
- Elasmostethus dentatus* De G. Pg. Kuchelbad von Eichen geklopft 11. Sept.;
Nh. auf Birken, im Aug.;
- Elasmucha ferrugata* F. Nh. am Lisek auf Schwarzbeeren in grosser Zahl, im Sept.;
- interstincta* L. Pg. eine allenthalben häufige Art. Wran, an Birken 11. Apr.; Krtsch 2. Mai; Stern 20. Jun.; Kuchelbad an Eichen 2. Sept.; Zawist 1. Sept, an Erlen u. 5. Okt. an Birken; St. Prokop u. a. O.
Nh. im Aug.;
- Bb. Zwittermühl an Birken, Juli;
- Cyphostethus tristriatus* F. Nh. Lisek u. Forsthaus „Grüne Baude“ an Wachholderbüschen im Sept., sehr selten.
- Spathocera laticornis* Schill. Pg. Pelz 8. Jun., 19. Jun. und wieder im Sept.;
- Nh. in lockerer Erde zwischen Graswurzeln und Steinen, Aug. u. Sept.; auf Rainen der Schnarrowa, nicht häufig.

- Spathocera Dalmani Schill.* Nh. ebenda wie die vorige Art, aber recht selten; Aug. u. Sept.;
- Corcus scapha F.* Pg. Zawist, am Hradiště unter vertrockneten Blättern von Verbascumarten, in grösserer Zahl, im Sept.; Radotín, auf Rainen. Ende Aug.;
- Nh. In Waldschlägen auf blühender *Atropa belladonna* in Menge, Aug. Eine wohlriechende Wanzenart!
- Mesocerus marginatus L.* Pg. an verschiedenen Gebüschen, vom Juli bis Oktob., überall sehr gemein.;
- Syromastes quadratus F.* Pg. Unter trockenem Laub und zwischen Geröll. Košíř 4. Apr.; Pelz Sept.; St. Prokop, bei der Kirche, Sept.; Zawist; unter Verbascumarten, 15. Aug., 16. Sept.;
- Nh. Schnarrowa u. a. O.
- Gonocerus acutangulus Goeze* Pg. Pelz 19. Juni; Košíř im Sept.; Zawist, an Eichen 5. Okt.; Jarow, an wilden Rosen, in Menge 25. Aug.; die Larven entwickelten sich im Sept.;
- Pseudophloeus Falleni Schill.* Pg. in lockerer Erde und unter dürrer Laub, St. Prokop bei der Kirche 18. Sept.; Pelz, im Sept.;
- Nh. auf der Schnarrowa an Rainen, nicht selten, Aug. und Sept.;
- Bathysolen nubilus Fall.* Pg. Košíř 15. Sept., St. Prokop 18. Sept. zugleich mit der vorigen Art;
- Nh. Hradiště, Schnarrowa an Rainen zwischen Graswurzeln, Aug. und Sept.;
- Arenocoris spinipes Fall.* Nh. Ein einzigesmal in einer Fichtenanpflanzung unter Verbascum, Ende Aug.;
- Dasycoris denticulatus Scop.* häufig zwischen niedern Pflanzen, an Rainen und zwischen Geröll.

- Pg. Pelz 14. Mai, 24. Juni;
 Kuchelbad 22. Mai; Mal-
 wazinka 15. Juni; St. Pro-
 kop 2. Juli; Zawist Anf.
 Aug.;
 Einzeln an trockenen sonnigen
 Anhöhen und zwischen Gestein;
 Pg. St. Prokop 2. Juli, 29. Aug.;
 Pelz 7. Aug., 4. Sept; Ku-
 cheibad Aug.; Zawist
 Aug.;
 Nh. im Aug.
Alydus calcaratus L. an Disteln und zwischen Heide-
 kraut.
 Pg. in den Steinbrüchen am weis-
 sen Berg 30. Mrz., 31. Mai;
 Kuchelbad 17. Apr.; Ko-
 šíř 15. Sept.; St. Prokop
 29. Aug., 14. Sept., 1. Okt.
 an *Centaurea paniculata*.
 Gross-Tschernitz. Sept.;
 Bb. im Sept.;
Stenocephalus agilis Scop. Pg. Zawist im Aug.;
 Nh. an blühendem *Verbascum*,
 Kletten, Disteln, *Echium* u. a.
 häufig;
 Bb. im Aug., seltener.
 Schmiedeberg Aug.
Corizus hysciami L. Nh. Aug.;
 Lužna, Station der Buschtě-
 hrader-Eisenbahn, 22. Juli;
 Bb. in Waldschlägen an *Epilo-
 bium angustifolium*, im Juli;
Rhopalus abutilon Rossi Lužna 22. Juli;
 Nh. überall häufig Aug.;
 Bb. Juli;
crassicornis L. Pg. Zawist Juli;
 Nh. an Kletten, Aug.;
subrufus Gmel. auf verschiedenen blühenden Pflan-
 zen, überall häufig.
purumpunctatus Schill. Pg. Zawist 28. Apr.; Krtsch
 2. Mai; Košíř 15. Sept.; St.
 Prokop 17. Sept.;
 Nh. Wuznice 6. Juni;

- Rhopalus rufus Schill.* Nh. auf blühenden Kletten in der Wuznice, im Aug.;
- tigrinus Schill.* Pg. Žižkow 30. Mai;
Nh. in Waldschlägen, im Aug.;
- Myrmus miriformis Fall.* Pg. Zawist, an Waldrändern, Aug. ;
Nh. Aug. ;
Lužna 22. Juli ;
Bb. an Wiesenblumen, Juli u. Aug. ;
Schmiedeberg, im Aug. ;
- Chorosoma Schillingi Schml.* Pg. Pelz, ein einziges Exemplar gekötschert, 4. Sept. ;
Nh. In Strassengräben an Gräsern (Bromus), einzeln im Aug. ;
- Berytus tipularius L.* Pg. St. Prokop 30. Aug., 1. Okt. ;
Zawist unter dürren Blättern von Verbascumarten, im Aug. u. Sept. ;
Nh. zwischen trockenem Laub und Steinen, Aug. ;
Lužna auf Waldblößen. 29. Juli ;
- Neides clavipes F.* Nh. an Rainen, zwischen Graswurzeln ziemlich häufig, Aug. ;
- minor H. S.* Nh. Mit der vorigen Art, im Aug. ;
Bb. in einem Stoppelfelde in Menge. Ende Juli ;
- Signoreti Fieb.* Pg. Zawist 18. Sept. ;
Nh. Schnarrowa, an trockenen Rainen, ziemlich selten, Aug. ;
- crassipes H. S.* Pg. am Bohdalec bei Michle, an Feldrainen unter Steinen, nicht häufig. 10. Apr. ;
Nh. Aug. ;
- Metacanthus elegans Curt.* Pg. Pelz, unter Galeopsis in Mehrzahl. 4. Sept. ; Zawist, Aug. ;
Nh. an Ononis repens, nicht häufig; Aug. ;
- Lygaeus equestris L.* Pg. Zawist, häufig an Vincetoxicum officinale, Juli u. Aug., im Herbst (Ende Sept. und Okt.) in den Mauerritzen des l. Altans daselbst zur Überwinterung versammelt, in Menge. St. Prokop 20. Apr.,

1. Okt. und später an der Kirchenmauer; Pelz, Juni;
Nh. auf blühenden Kletten, Juli u. Aug.;
- Lygaeus saxitilis* Scop. Nh. auf Blüten von Tanacetum, zahlreich, im Aug.
- albomaculatus* Goeze Pg. St. Prokop, mehrere Stücke unmittelbar bei der Kirche, 1. Okt.; an der Fahrstrasse nach Točna oberhalb Zawist, 3 Exempl., Aug. 1903;
Nh. Auf der Schnarrowa, zwischen Steingeröll, im Juni, nicht häufig.
- superbus* Poll. Pg. Zawist, am Bahndamm bei Jarow, im Aug., selten.
- Arocatus Roeselii* Schum. Nh. nur ein einziges Exempl., im Okt.; (Illing.)
- Nysius jacobaeae* Schill. an Senecio jacobaeae.
Nh. Aug. (in cop.)
Bb. Pechöfen und am Plattener Berg im Juli u. Aug., recht häufig, immer brachypter.
- thymi* Wolff. an Thymus serpyllum,
Pg. Pelz, im Sept.;
Nh. im Aug.;
- senecionis* Schill. an Senecio silvaticus.
Pg. Zawist Aug.; Pelz Sept.; St. Prokop 1. Okt.;
Nh. sehr häufig, Aug. (in cop.);
Lužna 29. Juli;
- ericae* Schill. Pg. Pelz, Sept.; Zawist, Aug;
Nh. in Heidekraut, Aug.;
- punctipennis* H. S. Nh. an Thymus, häufig im Aug. (in cop.);
- Cymus glandicolor* Hahn Nh. Oupořtal, 30. Juli;
Schmiedeberg, zahlreiche Larven am Moor von Scirpus gekötschert und erzogen, Aug.;
- clavicolus* Fall. Pg. Krtsch, zwischen Heidekraut 27. März; Žižkow an Ruderal-

- pflanzen 30. Mai; Zawist 16. Sept.; **Wran**, in trockenem Laub unter Eichenbüschen 31. Aug.;
- Ischnorhynchus resedae* Panz. Pg. Michler Wald, aus trockenem Eichenlaub massenhaft geklopft 27. März; Krtsch 2. Mai; Pelz 20. Mai; Kuchelbad 22. Mai; Zawist 18. Sept.;
- Bb. Junghengst, an Birken, Juli;
- var. *flavicornis* Duda. häufig unter der Stammart in trockenem Eichenlaub, Krtsch 27. März.
- Geocoris grylloides* L. Nh. Otročin, an begrasten, steinigen Hügeln, 17. Aug.; Hradiště, an Rainen und Feldrändern, ziemlich häufig, (auch in cop.) im Aug.; Färbungsvarietäten seltener. Ein schön entwickeltes geflügeltes Exemplar von ebendasselbst.
- dispar* Waga Nh. Hradiště, an derselben Stelle mit der vorigen Art, aber sehr selten. Aug.;
- Heterogaster artemisiae* Schill. Nh. an *Artemisia campestris* selten, im Aug.;
- urticae* F. Pg. St. Prokop 18. Sept.;
- Nh. an *Urtica dioica*, Aug. u. Sept., sehr häufig;
- Platyplax salviae* Schill. Karlstein, 28. Mai (Sekera).
- Oxycarenus modestus* Fall. Pg. Zawist, im Aug., sehr selten.
- Nh. von Erlen geklopft, Sept. u. Okt.;
- Plociomerus fracticollis* Schill. Schmiedeberg, am Moor von *Scirpus gekötscheri*, 1 Exemplar, im Aug.;
- luridus* Hahn Bb. im Juli;
- Rhyparochromus antennatus* Schill. Nh. Aug.;

- Rhyparochromus hirsutus* Fieb. Pg. St. Prokop, unter abgefallenen Mörtel bei der Kirche, 21. Aug., 1. Sept., 21. Sept.; nicht selten.
- praetextatus* H. S. Nh. an Rainen zwischen Graswurzeln, im Aug;
- chiragra* F. Pg. Krt sch 17. Apr.; Pelz 19. Juni; St. Prokop, mit *R. hirsutus* häufig 30. Aug., 1. Sept.;
Nh. an trockenen Rainen, im Aug.;
- Tropistethus holosericeus* Schltz. Pg. Wran in trockenem Laub unter Birkenbüschen, 28. Apr. immer nur einzeln; Zlichow am Bahndamme 10. Juni; Košíř 15. Sept.; Zawist 18. Sept.;
Nh. beim Forsthause „Grüne Baude“ in Waldschlägen unter abgefallenem Laub, Sept.;
- Pterotmetus staphilinoides* Burm. Pg. Krt sch, unter Heidekraut, Anfang Apr.;
Nh. Hradiště, auf einem Felde in den hohlen Stengeln von aufgehäuften trockenem Kartoffelkraut, in Menge. Sept. (macropt. und brachypt.);
- Ischnocoris angustulus* Boh. Pg. Krt sch, zwischen Heidekraut 27. März; Wran, unter Eichenbüschen (in copula) 31. Aug.;
Nh. in Waldschlägen in trockenem Laub unter Birken, Sept.;
- punctulatus* Fieb. Nh. Mit der vorigen Art, nur 1 Stück. Sept.;
- Macrodema micropterum* Curt. Pg. Krt sch, aus dürrem Eichenlaub geklopft 27. März;
Wran, unter Eichenbüschen 31. Aug.;

- Plinthisus brevipennis* Latr.
(*brachypt.*) Pg. K r t s c h, unter Heidekraut
17. März;
= *bidentulus* H. S.
(*maropt.*) Z a w i s t, im Juli;
Nh. auf der Schnarrowa, an Rai-
nen zwischen Graswurzeln, Aug. u.
Sept.;
- Acompus rutipes* Wolff. Nh. Aug.;
- Stygnocoris rusticus* Fall. Pg. Kuchelbad, unter trockenem
Laub zwischen Steinen bei der
Bahn 28. Apr.; Troja, von Wei-
den geklopft 28. Aug.;
- Nh. in Waldschlägen beim Forsthause
„Grüne Baude“, unter Birkenbü-
schen. Sept., auf der Schnar-
rowa im Rasen der Feldraine,
im Aug.;
- pedestris* Fall. Pg. Z a w i s t, an freien sonnigen
Stellen unterhalb des l. Altans zwi-
schen Grasbüscheln und im Sande,
selten. 18. Sept.; W r a n 8. Juli;
Nh. im Sept.;
- fuliginus* Geoffr. Pg. Pelz, im Sept.;
- Nh. an denselben Stellen wie Stygn.
rusticus und mit diesem zugleich.
- pygmaeus* F. G r o s s - T s c h e r n i t z, an Waldrän-
dern zwischen Heidekraut, Ende
Aug.;
- Peritrechus geniculatus* Hahn Nh. an Rainen, spärlich, im Aug.;
- Microtoma atrata* Goeze Pg. Zlichow, am Bahndamme unter
Echium und zwischen Thymus, Po-
tentilla und andern niedern Pflan-
zen im Juni; St. P r o k o p, in dür-
rem Laub unter Lonicerabüschen,
immer einzeln 21. Aug., 14. Sept.;
- Kuchelbad, an sonnigen Fels-
lehnen im Sept.;
- Nh. Schnarrowa, in Geröll und
zwischen Steinen, im Aug.;
- Trapezonotus anorus* Flor. Nh. an trockenen Feldrainen, sehr
selten, Aug.;

- Trapezonotus agrestis Fall.* Pg. Krtsch 27. März; Zawist 28. Juli; Zlichow 13. Sept.; St. Prokop 18. Sept.; Pelz im Sept.;
Nh. an Feldrainen zwischen Gestein und Gras ziemlich häufig, im Sept., (macropt. und brachypt.);
- Sphragisticus nebulosus Fall.* Pg. Zawist, auf der Wiese bei Jarow, ziemlich häufig, 25. Aug.;
- Calyptonotus Rolandri L.* immer einzeln und selten.
Pg. Stern 10. Apr.; Krtsch unter Heidekraut, 17. Apr.; Zawist (Hradiště) zwischen Thymus, Potentilla und andern niedern Pflanzen, im Sept.;
Nh. auf der Schnarrowsa, an den Rändern von Steinhalden zwischen dürrem Laub, Aug. u. Sept.;
- Pachymerus lynceus I'.* Pg. St. Prokop, an sonnigen Anhöhen; Zawist 28. Juli;
Nh. überall auf Rainen Aug. u. Sept.; Lissa a. E. 7. Juli;
- Aphanus pedestris Panz.*
(= *bardanae Preyssl*) Pg. Krtsch, zwischen Steingeröll 17. Apr.; St. Prokop 20. Apr.; Zawist im Aug.;
- vulgaris Schill.* Nh. Aug. u. Sept.;
- pini L.* Tschachwitz bei Saaz; aus den Hopfengärten am 25. Novb. 1900 in grosser Menge (irrtümlich für einen Hopfenschädling) erhalten. Das Tier überwintert unter den aufgeschichteten Hopfenstangen und erscheint in den ersten sonnigen Frühlingstagen.
- phoeniceus Rossi.* Nh. in Kiefernwäldern, häufig im Aug. u. Sept.;
- Unter niedern Pflanzen und zwischen Geröll, verbreitet, aber immer einzeln.

- Pg. St. Prokop 20. Apr.; Zlichow am Bahndamm 26. Mai, 10. Juni; Zawist 3. Mai;
Nh. Wuznice 6. Jun.;
- Beosus luscus F.* Pg. Kuchelbad, an der Bahn beim Kreuz, unter trockenem Laub 17. Apr.; Pelz 27. Mai, 22. Jun., und wieder im Sept.; St. Prokop, bei der Kirche 18. Sept.;
- Nh. Otročin, unter Steinen 17. Aug.;
- Emblethis verbasci F.* Pg. Zlichow, am Buschtährader Bahndamm 10. Juni; St. Prokop im Sept.; Zawist, unter trockenen Blättern von *Verbascum*, im Sept.;
- Nh. Schnarrowsa auf trockenen Rainen nicht selten, im Aug. u. Sept.
- griseus Wolff* Pg. St. Prokop, bei der Kirche in Mehrzahl 14. Sept. und nicht mehr wieder.
- Eremocoris plebejus Fall.* an Waldrändern unter trockenem Laub
Pg. Krtsch, zwischen Heidekraut 17. Apr.; Stern 20. Juni; Zawist 16. Sept.;
- Nh. an Rainen, im Aug.;
- podagricus F.* Pg. Zawist, an Waldrändern bei der Eisenbahn, unter Laub und Steinen, ziemlich häufig 3. Mai u. 16. Sept.;
- erraticus F.* Nh. Otročin, auf einem freien Hügel, unter Steinen ziemlich selten 17. Aug.;
- Drymus pilicornis M. & R.* Pg. St. Prokop 1. Sept.;
- Nh. an Rainen, selten, im Aug.;
- sylvaticus F.* Pg. St. Prokop 20. Apr., 18. Sept
Pelz im Sept.;
- Nh. unter abgefallenem Laub in Gebüsch, Sept.;
- brunneus Sahlb.* Pg. 18. Apr.; St. Prokop 1. Sept.;
- Zawist an Feldrainen, im Juli 1903.
- Nh. Grüne Baude, unter Birkenbüschen, immer selten, im Sept.;

- Scolopostethus pictus* Schill. Pg. Zawist, im Břežaner Tale aus einer hohlen Erle in Menge ausgeraucht, 28. Apr.;
- decoratus* Hahn Pg. Zawist, auf der Felslehne unterhalb des 1. Altans, zwischen Gras und Steinen, selten. 18. Sept.;
- affinis* Schill. Pg. im ehemal. botan. Garten in Smichow unter trockenem Laub überwintert 1. Dez.;
- Nh. Wuznice, am Bache auf *Urtica dioica*, alljährig zahlreich (in cop.) gleichzeitig mit *Eusarcoris venustissimus*, im Aug. u. Sept.;
- Notochilus contractus* H. S. Pg. Krtsch, von Eichenbüschen geklopft, nicht häufig 28. März, 17. Apr.; Stern 30. Juni; Wran, in abgefallenem Laub unter Eichen, 1 Expl. 31. Aug.;
- Gastrodes abictis* L. Unterbautzen, aus Tannenzapfen zahlreich, (Fierlinger); Rentsch (Schindler);
- Pyrrhocoris apterus* L. Gemein und in grossen Gesellschaften an alten Lindenstämmen und Mauern während des ganzen Jahres. Pg. Baumgarten, Linden-Allee. Vollkommen geflügelte Exemplare in manchen Jahren häufiger; so in St. Prokop 14. Sept. 1888 und 26. Aug. 1893; Eine bisher nicht erwähnte Varietät, wo der kleine schwarze Punkt am Grunde im Corium fehlt, selten. St. Prokop 26. Aug.;
- Picsma variabilis* Fieb. an *Herniaria glabra*. Pg. Zawist-Jarow am Flussufer, Aug.;
- Nh. an sandigen Stellen auf der Insel. Aug.;
- Tschachwitz bei Saaz, an Rainen zwischen Hopfengärten 26. Okt.;
- capitata* Wolff Pg. Michle, an Ruderalpflanzen, *Atriplex*, (*Chenopodium* (macropter) 22. Juli;

- Piesma maculata* Lap. Pg. Krt sch von trockenem Eichenlaub geklopft 27. März; St. Prokop 20. April, 17. Sept.; Pelz und Zawist im Sept.; Wran, unter Eichenlaub 31. Aug. Nh. an *Hieracium pilosella*, im Sept.
- Serenthia lacta* Fall. Nh. Otročín auf sandigen, etwas feuchten Stellen, an *Juncus bufonius* in Mehrzahl, im Juli; Schnarrowa an Rainen unter Thymus, Aug.;
- ruficornis* Germ. Nh. mit der vorigen Art, doch bedeutend seltener, im Juli;
- Campylostira verna* L. Pg. In den Steinbrüchen am weissen Berg, unter Steinen, ziemlich selten, 20. März, 31. Mai;
- Acalypta musci* Schrk. Nh. Otročín, im Moos, nicht häufig, im Aug.;
- nigrina* Fall. Nh. an Rainen im Aug.;
- macrophthalma* Fieb. Pg. Zlichow, von Gras gekötschert 11. Juni; Nh. Schnarrowa, an Rainen, Aug. Gross-Tschernitz bei Saaz, Aug. Bb. von Gras und Wiesenblumen gekötschert, 8. Jul.;
- gracilis* Fieb. Nh. an sonnigen Abhängen, unter Thymus; nicht häufig, Aug.; Gross-Tschernitz, Aug.;
- parvula* Fall. Nh. Otročín, im Tannenwald aus Moos gesiebt, in zahlreicher Menge; Aug.;
- Dictyonota tricornis* Schrk. Pg. Zlichow am Bahndamm von Gras gekötschert, 10. Juni; Wran 8. Juli; Nh. Schnarrowa unter Steinen 16. Aug., auf der Insel an *Silene inflata* 18. Juli; Bb. An Wiesenblumen, Ende Juli;
- var. erythro-*
phthalma Fieb. Pg. Zlichow mit der Stammart 10. Juni; Nh. Aug.;

- Dictyonota strichmocera* Fieb. Pg. Pelz, an sonnigen felsigen Lehnen 19. Juni;
- Derephysia foliacea* Fall. Pg. Zlichow, immer einzeln, 13. Juni; 23. Juni;
Nh. an Rainen, zwischen Gras, im Aug.; Lissa a./E. auf Wiesen gekötschert 7. Juli; Schmiedeberg; im Aug.;
- Galvatus maculatus* H. S. (*macropt.*) Pg. auf Anhöhen bei Pelz, vom Grase gekötschert 8. Juni und nur diesmal in Mehrzahl beobachtet;
- var. subglobosus* H. S. (*brachypt.*) Pg. Zlichow, an Bahndämmen im Grase 23. Juni; Pelz, mit der *macropt.* Form 19. Juni;
Nh. Otročin, Schnarrowa an Rainen zwischen Graswurzeln unter Steinen, einzeln und in Gesellschaften von über hundert Individuen beisammen (immer nur *brach.*) Aug.;
- Eurycera cornuta* Thunbg. Pg. Kuchelbad, am Abhang unter der Kirche an *Teucrium chamaedrys* 22. Mai; Pelz 24. Juni.;
- Monanthia ampliata* Fieb. Nh. in einem Waldschlag beim Forsthause „Grüne Baude“ von Disteln geklopft, selten u. nur wenige Stücke, 30. Aug.;
- cardui* L. Pg. überall an Disteln (*Carduus acanthoides* und *nutans*) gemein, Žižkow 2. Aug.; Smichow im ehem. botan. Garten, Zawist im Aug.; St. Prokop 1. Sept.; u. a. O.
- ciliata* Fieb. Nh. Schnarrowa, an der Unterseite der frischen Blätter von *Verbascum lychnitis* einzeln sitzend. Juli u. Aug.
- grisca* Germ. Pg. St. Prokop, bei der Kirche an *Centaurea panicu-*

- lata, häufig im Aug.; Pelz an derselben Pflanze in verschiedenen Entwicklungsstadien 24. Juni, 7. Aug.;
- Monanthia capucina* Germ. Pg. Košič, an sonnigen kahlen Abhängen unter *Thymus serpyllum*, ziemlich selten 15. Sept.; Zawist beim 1. Altan 28. Apr. und Ende Aug. 1903;
Nh. an und unter *Thymus* häufiger, Jul. bis Sept.;
- carthusiana* Gorze
(*eryngii* Latr.) Pg. bei Straschnitz, an den Blättern von *Eryngium*, häufig 2. Juni; Pelz 27. Mai und 22. Juni; Hlubočep und St. Prokop 29. Aug.;
- melanocephala* Panz. Pg. Pelz vom Grase gekötschert, einzeln und selten 20. Mai, 24. Juni;
- quadrimaculata* Wolff Pg. Kundratitz 23. Mai; Zawist, im Brežaner Tal an Brombeeren in Mehrzahl, am 8. Okt.;
- Nh. Wuznice, von Erlen geklopft. Aug. u. Sept.;
- dumetorum* H. S. Nh. beim Schlosse Nischburg an der Strasse beim Schafstall, von Schlehen geklopft. Aug.;
- Zákolan, am Budeč, auf *Prunus insititia*, ziemlich häufig, 5. Okt.;
- echii* Schrk. bei uns die gemeinste Art dieser Gattung, an *Echium vulgare*, überall in Menge.
Pg. Pelz 22. Mai; St. Prokop 2. Juli; Zawist-Jarrow, Aug.;
- Nh. Juli bis Sept.
- humuli* F. Nh. an *Myosotis palustris*, Imagines und Larven, im Aug.;

- Phymata crassipes* F. Pg. Pelz, von blühenden Crataegus-
büschen geklopft, fast alljährig aber
nicht häufig; 13. u. 22. Mai, 5. Juli;
- Aradus cinnamomeus* Wolff Pg. Krtsch, von jungen Kiefern ge-
klopft 2. Mai (brachypter); Wran,
desgleichen 15. Aug. 1903;
- depressus* F. Pg. Stern, an Birkenstöcken, ziemlich
häufig 20. Juni; Zawist im Bře-
žaner Tale aus hohlen Erlen heraus-
geraucht, 28. Apr.;
Nh. an alten, borkigen Birkenstöcken
im Aug.;
- truncatus* Fieber. Nh. Wuznice, unter losen Baum-
rioden Jul.
- erosus* Fall. Salmtal im Erzgebirge, mit der fol-
genden Art, selten Juli;
- betulinus* Fall. Salmtal, an einem alten Fichten-
stumpf an der Strasse nach Bärri-
ngen im Juli 1887, und seither all-
jährig, (bis Juli 1896) an dersel-
ben Stelle in Anzahl (nebst Larven
in verschiedenen Entwicklungssta-
dien) immer wieder vorgefunden. Die
in einer Blechbüchse über den Win-
ter verwahrt gehaltenen Larven lies-
sen sich sehr gut erziehen und lie-
ferten im Juli des nächsten Jahres
die vollkommenen Insekten;
- dilatatus* Duf. Nh. Wuznice, an modernden Stümpfen
alter Hainbuchen und unter deren
Rinde, nicht selten Aug. u. Sept.;
- betulae* L. Nh. an Schichtholz einmal in grösserer
Zahl. Aug.;
- Aneurus laevis* F. Pg. Stern, unter morscher Baum-
rinde, einzeln. 10. Apr.;
- Nh. im Wuznicetal unter vermo-
deter Rinde gefällter Erlen in Mehr-
zahl. Aug.;
- Hydrometra stagnorum* L. Pg. an den Ufern eines Tümpels auf
der Malwazinka 4. Juni; Pelz

- im Schlamme des ausgetrockneten
Moldauarmes.
Nh. an alten Wehren, im Aug.
Lissa a./E. 29. Mai;
- Microvelia Schneideri Schltz.* Nh. an der Wehre beim ehem. Bohrwerk, zwischen Algen, ziemlich häufig, im Aug.;
- Velia currens F.* Pg. Branik, in Wiesengraben Aug.;
Nh. zwischen überflutetem Gras im Bache in der Wuznice. Aug.;
Bb. stellenweise im Schwarzwassertale, Sept.
- Gerris rufoscutellata Latr.* Pg. Smichow, in Wassertümpeln der ehemaligen Kaiserwiese, 21. Juni; Běchowitz in Gräben und Tümpeln nächst der Bahnstrecke 30. Sept.; Čelakowitz 6. Juni;
Nh. Aug.;
Bb. in Wassertümpeln bei der Breitfeld'schen Fabrik, Juli.
- paludum F.* Pg. Běchowitz, in Wiesengraben 30. Sept.;
- thoracica Schum.* Pg. Kaiserwiese 21. Juni; Malwazinka 4. Juni;
Nh. im Wassertümpel beim Forsthouse Dřevič, Aug.;
- gibbifera Schum.* Pg. St. Prokop, im Bache 24. Apr.;
Nh. sehr häufig, Aug.;
Bb. im Juli;
- lacustris L.* Pg. Smichow, Kaiserwiese 21. Juni;
St. Prokop, im Bache 20. Apr.;
Nh. Aug.;
- odontogastra Zett.* Nh. im Aug.;
- argentata Schum.* Nh. beim Forsthouse Dřevič, mit den vorhergehenden Arten, ziemlich häufig, Aug.;
- Ploiariola vagabunda L.* Nh. an Lindenstämmen im „Park“, einzeln, Aug.;
- culiciformis Deg.* Pg. Smichow an den Fensterverkleidungen in der vormals Portheim'schen Fabrik in Menge. Sept. Neudau bei Karlsbad (Schindler).

- Pygolampis bidentata* Goeze Nh. unter Steinen auf der Insel, noch im Larvenzustande, im Sept. ;
- Reduvius personatus* L. Pg. S m i c h o w, im Herbariumgebäude des ehem. botan. Gartens während des Sommers alljährig vorgefunden;
Zawist, in alten Gebäuden, zur Nachtzeit auf Raub ausgehend, Juli und Aug. ;
Nh. desgleichen, immer einzeln, Aug. und Sept. ;
Reichenau a. d. K. Larven anfangs Aug. ;
- Peirates hybridus* Scop. Pg. W r a n, ein Expl. (Nosalek) ;
- Harpactor annulatus* L. Nh. an Verbascumblüten, zumeist aber zwischen Steingeröll und an Rainen, einzeln und nicht häufig, Juli und Aug. ;
- iracundus* Poda Pg. Z a w i s t, an Blüten verschiedener Pflanzen, namentlich Verbascum, Echium, Vincetoxicum, Juni und Juli ;
Pelz, zwischen Geröll, 22. Mai, 5. Juni ;
Karlstein, Juni (Prof. Bílek) ;
Nh. im Juli ;
- Coranus subapterus* De Geer. An sonnigen, steinigen Anhöhen zwischen Gras und niederen Pflanzen, einzeln ; mehrmals auch macropt. Individuen ;
Pg. St. Prokop 30. Aug., 14. Sept. ;
Kuchelbad 13. Aug. ;
Nh. Aug. ;
Gross-Tschernitz Aug. ;
Schmiedeberg, im Aug. ;
- Prostemma guttula* F. Pg. St. Prokop, an Berglehnen unter Steinen, 30. Aug. ;
Nh. Hradiště, einzeln ; zuweilen auch macroptere Exemplare. Aug. und Sept. ;
- aeneicolle* Stein Nh. mit der vorigen Art, aber sehr selten. Aug. und Sept. ;

- Prostemma sanguineum* Rossi Pg. Zawist, Aug.;
Nh. Hradiště u. Schnarrowa,
unter Steinen, ziemlich selten,
Aug. und Sept.;
- Alloeorhynchus flavipes* Fieb. Pg. Krtsch, aus trockenem Eichen-
laub geklopft 27. März;
St. Prokop, unter abgefallenem
Laub von Loniceren unterhalb der
Kirche, 29. Aug.;
- Nh. im Aug.;
- Nabis apterus* F. Pg. Zawist Aug., Sept.;
- Nh. Schnarrowa, an Juniperus-
büschen und verschiedenem Ge-
sträuch, Aug. (in cop.) und Sept.;
- auch macropter, aber selten;
Schmiedeberg. Aug.;
- lativentris* Boh. überall gemein;
- Pg. Pelz 15. Mai; Radlitz 13.
Juni; St. Prokop 19. Juni;
Kuchelbad 13. Aug.; Košič
15. Sept.;
- Nh. Aug.;
- flavomarginatus* Schltz. Bb. allenthalben auf Wiesenblumen,
alljährig sehr häufig; Juli und
Aug. (in cop.);
- limbatus* Dahlb. Nh. ziemlich häufig, im Aug.;
- Neudau (Schindler);
- ferus* L. Pg. Krtsch zwischen Heidekraut
17. April, 10. Dez.; Kaiser-
wiese 16. Juni; Zlichow 13.
Sept.; am Bohdalec b. Michle
in Stoppelfeldern massenhaft Ende
Sept.;
- Nh. an verschiedenen Pflanzen, über-
all häufig. Juli, Aug.;
- Bb. Juli;
- rugosus* L. Überall gemein.
- Pg. St. Prokop 18. Sept.;
- Lužna-Lišan 29. Juli;
- Nh. Aug.;
- Neudau (Schindler);
- Bb. Juli;

- Nabis ericetorum* Schltz. Nh. unter Heidekraut, Juli u. Aug.;
brevis Schltz. überall sehr häufig;
Pg. Radlitz 13. Juni; Košič 15. Sept.;
St. Prokop 18. Sept.;
Gross-Tschernitz, Aug.;
Nh. Aug. und Sept.;
- Acanthia (Salda) saltatoria* L. Pg. Krtsch 21. April; Smichow, im ehem. botan. Garten, 17. Sept.;
Hetzinsel, an Flussufern, 29. Aug.; Kundratitz, 30. Sept.;
Wran, 31. Aug.;
Gross-Tschernitz an einem Tümpel, Aug.
Nh. Aug.;
- pallipes* F. Pg. am Ufer des Moldauarmes bei Pelz, 19. Juni;
Nh. Ufer des Beraunflusses, Aug.;
- C. album* Fieb. Nh. mit der vorigen Art, im Aug.;
Bb. Ziegenschacht, in einem Waldgraben, häufig, Aug.;
- scoticu* Curt. Pg. Hetzinsel, am Moldauufer unter Steinen, in manchen Jahren ziemlich häufig. Juli, Aug.;
Bb. an seichten, sandigen Stellen des Schwarzwasserbaches, 19. Juli, Aug.; Spindelmühl im Riesengebirge (Skalitzky).
- Leptopus marmoratus* Goeze Nh. Schnarrowa, auf der Unterseite von grösseren Schieferfragmenten in einem Kartoffelfelde, selten, Aug.;
- Cryptostemma alienum* H. S. Nh. auf Sandinseln in der Beraun, Juli und Aug.;
- Lycocoris campestris* F. Pg. im Wohnhause, auf der Terrasse, unter toten Schmetterlingspuppen, mehrere Stücke lebend vorgefunden, 14. Sept.;
- Piezostethus cursitans* Fall. Nh. unter vermoderter Fichtenrinde, mehrfach; auch in Lana, Aug.;

- Ectemnus reduvinus* H. S. Nh. an einem morschen Strassengeländer, nur ein einziges Stück, Aug.;
- Anthocoris confusus*, Reut. Pg. Krtsch, aus trockenem Eichenlaub geklopft, 27. März, 17. April;
- Minki Dohrn* Pg. Smichow, an Pappelstämmen auf der Kaiserwiese, nicht selten. 30. Okt.;
- gallarum ulmi* De G. Nh. an *Populus pyramidalis*; Aug.;
- sylvestris* L. an allerlei Bäumen und Sträuchern, überall häufig. Pg. Krtsch 27. März; Nh. Juli und Aug.; Bb. Juli;
- Tetraphleps vittata* Fieb. Nh. von Lärchen geklopft, Juli, Aug.;
- Triphleps nigra* Wolff Nh. von *Crataegusbüscheln* in Menge, Aug.;
- minuta* L. Nh. mit der vorigen Art, aber seltener, im Aug.;
- Microphysa pselaphiformis* Curt. Nh. beim Forsthause „Grüne Baude“ im faulenden Holze einer morschen Bank, nur ein einziges Stück, Aug.;
- Pithanus Maerkeli* H. S. Bb. Pechöfen, an einem Wiesenrain zwischen Steinen und unter Farrnkraut (*Polypodium dryopteris*), nur wenige Stücke. Juli; Schmiedeberg. In hohem Graswuchs bei der Bahnstation, von *Athyrium filix femina* in Mehrzahl gekötschert, Aug.;
- Acetropis carinata* H. S. Pelz, an sonnigen, grasreichen Abhängen, gekötschert. 24. Juni.
- Stenodema virens* L. Pg. Pelz, auf Disteln und allerlei blühenden Pflanzen gemein, 15. Mai; Zawist. Aug.

- Lužna in Holzschlägen, 29. Juli;
Nh. überall auf Wiesen, Aug.;
- Stenodema virens* var.
fulvum Fieb. mit der Stammart, aber seltener.
Pg. St. Prokop, 17. Sept.; Zawist 5. Okt.;
Nh. Aug. und Sept.;
- laevigatum* L. Pg. am Bohdalec bei Michle,
auf Triften und un bebauten Plätzen
gemein, Juli. Aug.;
- holsatum* F. Neudau (Schindler).
Bb. alljährig aber nicht häufig, Juli.
- Notostira erratica* L. Pg. Zawist, auf Wiesen, häufig
im Aug. (in cop.), Běchowitz,
Sept.;
- Bb. Juli.
Schmiedeberg. Aug.;
- Megaloceraea recticornis* Geoffr. Pg. Zawist, in einem Waldhau
an der neuen Strasse nach Toč-
na, an allerlei Blüten und Grä-
sern. Aug. 1903;
- Nh. nicht häufig, im Aug.;
- Bb. auf Wiesen, Aug.;
- Trigonotylus ruficornis* Geoffr. an allerlei Schuttpflanzen.
Pg. Žižkow 30. Mai, 2. Aug.;
- Zlichow 13. Juni; Běcho-
witz beim Počernitzer Teich,
auf Wiesen im Sept.;
- Miris ferrugatus* Fall. an Blumen und Gräsern überall
häufig.
- Pg. Zlichow, 11. Juni; Pelz,
24. Juni;
- Bb. von Wiesen gekötschert, (ma-
cropt. und brachypt.) Juli;
- dolabratus* L. Pg. Zlichow 13. Juli; Zawist,
auf Wiesen ziemlich häufig, Aug.
- Nh. Aug. (in cop.);
- Bb. mit *M. ferrugatus* gleichzeitig,
Juli;
- Monalocoris flicis* L. Bb. Zwittermühl, in Wäldern
auf *Athyrium filix femina*, ziem-
lich häufig, Juli und Sept.;

- Bryocoris pteridis* Full.
 Neudau (Schindler);
 Bb. in Gemeinschaft mit der
 vorigen Art und noch häufiger
 als diese, (macropt. und
 brachypt.), Juli und Sept.;
 Neudau (Schindler);
- Pantilius tunicatus* F'.
 Pg. Zawist, im Brežaner Tale
 an Haselbüschen ziemlich
 häufig, sowohl rot als auch
 grün gefärbte Individuen,
 Sept., 5. Okt.;
 Nh. am Schlossberg (Nisch-
 burg) in Menge, Sept.;
- Lopus cingulatus* F'.
 Pg. Pelz, an Schlehen und an-
 derem Gebüsch, sehr gemein,
 5. Juni, 24. Juni;
 Nh. Wuznice 6 Juni;
- gothicus* L.
 Pg. Radlitz, mit der vori-
 gen Art, häufig, 13. Juni;
 Pelz, 19. Juni;
 Nh. an Galium und anderen blü-
 henden Wiesenpflanzen, Juli;
- var. superciliosus* L.
 Pg. Pelz, unter der Stamm-
 art, aber bedeutend seltener,
 8. Juni;
 Zawist, Aug.;
- Phytocoris populi* L.
 Pg. in der Stadt des Abends
 an die Lampe angefliegen,
 28. Aug.; Hetzinsel an
 Weidenbüschen, 29. Ag.;
- tiliae* F'.
 Nh. im Aug;
 Bb. Aug.;
- dimidiatus* Kirschb.
 Pg. Zawist, an Waldrändern
 von Eichen und anderen
 Gebüsch geklopft, Aug.;
- pini* Kirschb.
 Všenor, 5. Aug.; Kund-
 ratitz 8. Sept.;
- Pg. Zawist, ein einziges Stück
 von Eichengebüsch geklopft,
 Aug. 1903;
- Pg. Wran, an jungen Kiefern,
 8. Juli;

- Phytocoris ulmi* L. Nh. Am Lisek, in Kiefernplantagen, nicht selten, Aug.;
 Pg. am Bohdalec bei Michle, an wilden Rosen und Schlehdorn auf Rainen, häufig, 29. Juni;
 Nh. von Schlehenbüschen geklopft, Juli;
 Neudau (Schindler);
 Bb. an Himbeersträuchern, Juli;
- varipes* Boh. Nh. Wuznice, an Schlehen, nicht häufig, 3. Aug.;
- Calocoris ochromelas* Gmel. Pg. Kuchelbad, an Waldrändern von Eichen geklopft, 22. Mai; Zawist im Aug. 1903;
- sexguttatus* F. Neudau, in mehreren Exemplaren eingeschickt erhalten (Schindler);
- biclavatus* H. S. Pg. Pelz an Brombeersträuchern, 8. Juni;
 Rentsch (Schindler);
 Bb. Jungenhengst, Zwittermühl in Waldschlägen und auf Blössen, an *Epilobium angustifolium* sehr häufig, im Juli;
 Schmiedeberg, Aug.;
- fulvomaculatus* De G. Nh. auf allerlei Gebüsch, Juli;
 Rentsch 29. Juli 1891 (an Hopfen); in den Jahren 1899 und 1900 bei Tschächwitz und in der ganzen Umgebung von Saaz in den Hopfengärten als bedeutender Schädling aufgetreten, Mai bis Juli;
 Bb. auf Wiesen, im Juli;
- salviae* Hahn
 (*affinis* H. S.) Nh. an Weidengebüsch auf Wiesen, Juli und Aug.;
 Bb. auf Waldwiesen, alljährig nicht selten. Juli;
- norvegicus* Gmel. Pg. auf grasigen Abhängen am Bohdalec, 29. Juni; Pelz, Juli;
 Saaz, in Hopfengärten, Juni (Remisch);

- Calocoris lineolatus* Goeze
Überall auf Wiesen, Rainen und Bahndämmen.
Pg. Zlichow, 10. Juni; Pelz, Juli und Sept.; Zawist, Aug. und Sept.;
Nh. Juli, Aug.;
Bb. Juli;
- vandalicus* Rossi
Pg. Zawist an blühenden Disteln, 28. Juli; in Lichtungen und an Waldrändern im Aug.; selten.
- seticornis* F.
An allerlei blühenden Wiesenpflanzen, zumeist auf Galium, Geranium, Achillea u. a. sehr häufig;
Pg. Kaiserwiese 16. Juni; Zawist im Aug.; Běchowitz 29. Aug.;
Nh. auf Wiesen bei Althütten sehr gemein, Aug.;
- roseomaculatus* De G.
Pg. Hetzinsel unter Weidenbüschen im Sande, 7. Juni;
Zawist, bei der Ziegelei 7;
Nh. an verschiedenen Wiesenblumen, besonders Achillea, 8. Juli;
- Megacoelum infusum* H. S.
Pg. In der Stadt zugeflogen, 1. Aug.;
Zawist, einzeln an Eichen, 25. Aug., 3. Sept.; Kuchelbad von Eichen geklopft, ziemlich häufig 2. Sept., 11. Sept.;
Nh. Schnarrowa, an Juniperusbüschen, Juli;
- Pycnoptera striata* L.
Nh. ein Stück im Aug.; wohl selten!
Rentsch, Aug. ebenfalls nur ein einzelnes Stück (Schindler);
- Brachycoleus scriptus* F.
Pg. Smichow 15. Juni; Zlichow an Bahndämmen 16. Juli; Wrschowitz, an grasigen Abhängen und Böschungen 1. Juli, zahlreiche Nymphen auf Achillea millefolium, welche mit

- Sedum gefüttert sich im Aug.
sämtlich entwickelten.
Nh. Hradiště auf Feldrainen an
Achillea, Aug.;
- Stenotus binotatus F.* Nh. auf Waldwiesen, Aug.;
- Dichroscytus rufipennis Fall.* Nh. an Waldrändern von jungen
Kiefern und Fichten abgeklopft,
Juli;
Bb. Juli.
- intermedius Reut.* Bb. auf Waldwiesen gekötschert,
im Juli;
Schmiedeberg, Aug.;
- Plesiocoris rugicollis Fall.* Bb. alljährig von Weiden geklopft,
Juli;
Schmiedeberg, Aug.;
- Lygus pratensis L.* Überall auf Wiesen und in Gärten,
sehr gemein;
Pg. Krtsch 2. Mai;
Nh. an Umbelliferen (Heracleum),
Juli und Aug.;
- campestris Fall.* mit der vorigen Art überall häufig;
Pg. Žižkow, 30. Mai;
Lužna, 29. Juli;
Nh. Juli und Aug.;
- rubricatus Fall.* Pg. Scharka, auf Fichten, 1. Aug. ;
Bb. von Fichten und Tannen geklopft
ziemlich häufig, Juli und Aug. ;
Schmiedeberg, auf Torfmooren
von *Calluna vulgaris* gekötschert,
Aug. ;
- lucorum Mey.* Pg. H e t z i n s e l, auf Weiden,
28. Juni; H o l e s c h o w i t z e r
I l e i d e an unbebauten Stellen, von
Ononis spinosa gekötschert, häu-
fig. 15. Aug. ;
- pabulinus L.* Nh. an Ruderalpflanzen (*Cheno-
podium*), Juli und Aug. ;
- Orthops montanus Schill.* Nh. auf Wiesen, Juli und Aug. ;
Bb. im Juli ;

- Orthops pastinacae* Fall. Nh. Juli;
Bb. von Wiesen gekötschert, Juli;
- Kalmii* L. ziemlich häufig, an verschiedenen
Wiesenblumen, zumeist an Um-
belliferen;
Pg. Smichow, im ehem. botan.
Garten, 6. Aug.; Zawist,
überall auf Wiesen, Juli und
Aug.;
- var. flavovarius* F. Bb. im Juli;
- Zyginus pinastri* Fall. Nh. Juli;
Nh. von jungen Kiefern geklopft,
Aug.;
- Charagochilus Gyllenhali* Fall. Gross-Tschernitz, Aug.;
- Nh. Wuznice an Schlehen,
6. Aug.;
- Bb. Pechöfen und Ziegen-
schacht an Waldrändern, all-
jährig und immer in Anzahl von
Fichten geklopft, Juli;
- Poeciloscytus unifasciatus* F. Pg. Kaiserwiese, 16. Juni;
Zawist-Jarow auf Wiesen-
blumen, namentlich Achillea und
Galium (mit *Calocoris seticornis*)
sehr häufig, Aug.; Pelz Sept.;
- Nh. in der Wuznice auf Wiesen,
häufig, 6. Juni, im Juli und Aug.;
- vulneratus* Wolff Pg. Žižkow, auf der Wohrada
an *Achillea millefolium*, einzeln,
30. Mai;
- Polymerus holosericeus* Hahn Nh. in einem Waldschlag beim
Forsthause „Grüne Baude“ zwi-
schen Erdbeeren (mit *Stagono-
nomus pusillus*), nur ein einziges
Stück! 12. Sept.;
- Camptobrochis lutescens* Schill. Pg. Krtsch, 2. Mai; Kuchel-
bad von Eichen geklopft, 11.
Sept.;
- Nh. im Aug.;
- Liocoris tripustulatus* F. Pg. Zawist, an Wiesenblumen
häufig, Aug.;

- Smichow, im ehem. bot. Garten mehrere Stücke in lockerer Erde eingegraben, unter abgefallenem Laub, 1. Dez. (überwintert!);
 Nh. Wuznice, an *Urtica dioica* in Menge, Juli und Aug.;
 S a a z, in Hopfengärten, Aug. (Remisch);
- Deraeocoris trifasciatus* L. Pg. S m i c h o w. Ein Exemplar dieser seltenen Art an einer Bahnböschung von Gras gekötschert und nicht wieder beobachtet, 9. Juni;
- annulipes* H. S. Nh. an Lärchen, mehrfach, aber immer selten, im Aug.;
 R e n t s c h (Schindler);
- seguinus* Müll. Pg. auf allerlei Gebüsch häufig; Radlitz, 13. Juni; Pelz an Schlehen und Brombeeren, 19. Juni; Kuchelbad von Eichen geklopft 8. Aug.; Zawist Aug. (in cop.);
 Nh. an Nesselhäufig, Aug.;
- Alloetomus gothicus* Fall. Pg. Zawist, an Kiefern, Juli und Aug.;
- Capsus ater* L. Nh. auf Wiesen, 6. Juni;
 Bb. Ziegenschacht, 8. Juli;
 Seifen, auf Wiesenblumen überall häufig, Juli;
- var. tyrannus* F. Bb. Seifen, 25. Juli häufig;
- var. semiflavus* L. Nh. Wuznice, 6. Juni;
 Bb. mit der Stammart aber seltener, im Juli;
- Pilophorus cinnamopterus* Kbm. Nh. von jungen Kiefern geklopft, Juli und Aug.;
- perplexus* Scott. Nh. an Eichenbüschen, ziemlich häufig, Juli und Aug.;
- clavatus* L. Pg. Zawist an Eichen, im Juli;
 Nh. auf der Insel auf Weiden und im Grase gekötschert, 16. Aug.;
 Bb. von Weiden geklopft, Juli;

- Pilophorus confusus* *Kbm.* Pg. Kaiserwiese, 16. Juni; Hetzinsel an Weiden, nicht selten, 28. Juni; Lissa a. E. von Weidenbüschen geklopft, 7. Juli;
- Cremnocephalus albolineatus* *Reut.* Pg. Zawist, Ende Juli; Nh. auf Nadelholz, Aug.; Bb. von Fichten geklopft, Juli und Aug. alljährig aber nicht häufig;
- Systemonotus triguttatus* *L.* Pg. Zlichow, am Bahndamm der Buschtährader Eisenbahn, zwischen niederen Pflanzen, selten, 11. Juni; Kaiserwiese, von Wiesenblumen in Mehrzahl gekötschert, auch ♀ 16. Juni; in den Steinbrüchen am Weissen Berg zwischen Steinen, in beiden Geschlechtern 31. Mai; Zawist, zwischen Heidekraut im Aug.; Nh. an Rainen, Aug.;
- Eroticoris rufescens* *Burm.* Pg. Zlichow, an Bahndämmen zwischen Gras, 11. u. 13. Juni 1888 (neu für die böhmische Fauna!); Wran, auf einer Waldwiese von Gras gekötschert, 8. Juli; Pelz, zwischen niederen Pflanzen 19. Juni (immer nur brachypter); Nh. Schnarowa an Rainen, im Juli (brachypter); Bb. bei der „Halde“ unter Steinen auch macroptere Exemplare, aber selten, Ende Juli;
- Halticus luteicollis* *Panz.* Pg. Zawist, im Břežaner Tale an Brombeeren, nicht selten 30. Juli;
- apterus* *L.* Pg. Kaiserinsel bei Troja auf *Achillea millefol.* und verschiedenen Umbelliferen, häufig, Sept.; Zawist, Aug.; Nh. Wuznice, von Wiesenpflanzen zahlreich gekötschert, Aug.;
- Strongylocoris leucocephalus* *L.* Pg. Zlichow an Bahndämmen, zwischen Gras, 9. Juni;

- Wran 9. Juni;
 Nh. an Galium, im Aug.;
- Bb. auf Wiesen gekötschert, nicht selten,
 8. Juli, 3. Aug.;
- Labops saltator* Hahn Pg. Zlichow, an Bahndämmen im
 Grase 9. Juni, 18. Juni; Zawist,
 Aug.;
- Nh. an trockenen Rainen, Aug.;
- coriaceus* F. Nh. mit der vorigen Art, aber seltener,
 Aug.;
- vittipennis* H. S. Pg. Smichow, an einer Bahnbüschung
 vom Grase gekötschert, im Mehrzahl
 9. Juni;
- parallelus* Meyer Bb. im Schwarzwassertal im hohen
 Grase der Strassengräben und an
 Waldrändern, gleichzeitig mit Me-
 comma ambulans, im Aug.;
- Schmiedeberg, Aug.;
- Euryopicoris nitidus* Meyer Pg. Pelz in verschiedenen Jahren auf
 sonnigen Anhöhen von Gras gekötschert,
 ziemlich häufig 19. Juni; 1. Juli;
- Nh. Juli;
- Dicyphus pallidus* H. S. Nh. Wuznice, am Bache im tiefen
 Schatten, an *Stachys sylvatica*, nur
 in wenigen Stücken, Sept.;
- Neudau (Schindler);
- errans* Wolff Pg. Zawist, im Břežaner Tale an
Verbascum phlomoides in Mehrzahl,
 18. Sept.;
- Nh. Aug.;
- „ *geniculatus* Fieb. Nh. selten, Aug.
- Cyllocoris histrionicus* L. Pg. Kuchelbad, an sonnigen Wald-
 rändern von Eichen geklopft, ziemlich
 häufig, 22. Mai; Zawist, an Eichen-
 büschen, in Mehrzahl, Ende Juli;
- flavoquadrinaculatus* Pg. Kundratitz, an Eichen, selten,
 De G. 23. Mai;
- Zawist, 1 Stück an Eichen, 28. Mai;
- Aëtorhinus angulatus* Fall. Pg. Kuchelbad, an Eichenbüschen,
 Sept.;
- Scharka, an Erlen zahlreich, 1. Aug.;

- Nh. an Erlen überall häufig,
Aug. ;
Bb. von Erlen geklopft, im Aug. ;
- Globiceps sphegiformis Rossi* Pg. P e l z, 8. Juni; K r t s c h,
2. Juli; Z a w i s t, an niederen
Eichenbüschen, im Juli;
Nh. in Waldschlägen, einzeln und
immer selten, Juli;
- flavomaculatus F.* Pg. Z a w i s t, Aug. ;
Nh. an sonnigen Waldrändern von
Eichen geklopft, Aug. ;
Bb. Juli ;
- Mecomma ambulans Fall.* Bb. an feuchten, schattigen Wald-
rändern 7. Juli; im Schwarz-
wassertal in Strassengraben
von hohem Grase gekötschert,
nicht häufig, Aug. ;
- Orthotylus marginalis Reut.* Pg. H e t z i n s e l, an Weiden,
7. Juni; Z l i c h o w, 9. Juni;
Nh. 9. Juli;
Bb. an Weiden, Juli ;
- nassatus F.* Bb. auf der „Halde“ von *Salix ci-
nerea* geklopft, 3. Aug. ;
- prasinus Fall.* Pg. in der Stadt zugeflogen, Juli ;
- diaphanus Kbm.* Nh. Juli ;
- flavosparsus Sahlb.* Pg. M i c h l e, an *Chenopodium*,
Atriplex und anderen Schutt-
pflanzen, 22. Juli; Ž i ž k o w, bei
der Wohrada, 2. Aug. ;
- ericetorum Fall.* Pg. zwischen Heidekraut; Z a w i s t,
Aug, und 18. Sept. ;
G r o s s - T s c h e r n i t z, 10. Sept. ;
Bb. am Plattener Berg überall
auf *Calluna vulgaris*, 30. Aug. ;
S c h m i e d e b e r g, am Moor in Heide-
kraut, Aug. ;
- Heterotoma meriopterum Scop.* Pg. Z a w i s t, im Břežaner Tale an
Schlehengebüsch, ziemlich häufig,
30. Juli und 10. Aug. ;
Nh. W u z n i c e, an Schlehen, Juli ;

- Heterocordylus tumidicornis* H. S. Pg. Pelz, an *Prunus spinosa*, 19. Juni; am Bohdalec bei Michle, häufig, 29. Juni; Nh. Wuznice, Juli;
- Hoplomachus Thunbergi* Fall. Pg. Pelz, an sonnigen Anhöhen von Grasblüten gekötschert, in Mehrzahl, 20. Juni; Čerčan, 21. Juni; Nh. Juli;
- Tinicephalus hortulanus* Meyer Bb. auf der „Halde“ von *Salix cinerea* geklopft, 3. Aug.; Schmiedeberg, am Moor, an Weiden, Aug.;
- Macrocoleus molliculus* Fall. Pg. Michle (am Bohdalec) auf wilden Rosen, häufig, 29. Juni; Zawist, auf Wiesen an *Galium*, *Achillea* und anderen Pflanzen; Nh. Juli;
- Macrotylus Herrichii* Reut. Nh. von Erlen geklopft, selten, Aug.;
- Paykuli* Fall. Pg. Zlichow, 10. Juni; Holeschowitzer Heide an *Ononis spinosa*, ziemlich häufig, 15. Aug.; desgleichen in Zawist, auf der Wiese bei Jarow, Aug.;
- Nh. Juli;
- Harpocera thoracica* Fall. Pg. Kundratitz, von Hainbuchen geklopft, selten, 23. Mai;
- Byrsoptera rufifrons* Fall. Pg. Smichow, im ehem. botan. Garten, Juli; Nh. Wuznice, an Schlehen, 10. Aug.;
- Thylus melanocephalus* L. Pg. Zawist, von Eichen geklopft, im Juli;
- coryli* L. Pg. Zawist, an Haselbüschen, Aug.;
- Nh. Juli;
- Psallus ambiguus* Fall. Bb. an Waldrändern, stets von Fichten geklopft; alljährig, aber nicht häufig, im Juli;

- Psallus betuleti* Fall. Pg. Knchelbad, 22. Mai;
Fallenii Reut. Nh. auf Weiden, Aug.;
 Bb. von Weiden geklopft, nicht selten,
 Juli und Aug.;
- roseus* F. Bb. alljährig mit der vorigen Art,
 Juli und Aug.;
- vitellinus* Schltz. Nh. im Juli;
 Bb. an Fichten, Juli;
- Atractotomus parvulus* Reut. Bb. mit der vorigen Art von Fichten
 geklopft, Juli;
- Criocoris crassicornis* Hahn Nh. Wuznice, in Schlehenhecken,
 auf Galium Mollugo, 10. Aug.;
- Plagiognathus chrysanthemi* auf Wiesen und in Gärten, überall
 Wolff häufig.
 Pg. Hetzinsel, 28. Juni; St.
 Prokop, von dürren Grashängen
 gekötschert, 30. Juni; Michle,
 auf Schuttpflanzen, 22. Juli; Za-
 wist, auf Wiesen, 18. Sept.;
- Nh. Aug.;
- fulvipennis* Kbm. Pg. Smichow, im ehem. botan.
 Garten, Juli;
 Schmiedeberg, an Heidekraut,
 Aug.;
- arbustorum* F. Pg. Zawist, Juli;
 Nh. Wuznice, an verschiedenen
 Pflanzen (besonders Nesseln), häu-
 fig; am Bahndamm an Echium,
 sehr gemein, Aug.;
- Neudau (Schindler);
 Bb. Juli;
- Chlamydatum pulicarius* Fall. Pg. Zlichow, an Bahndämmen,
 26. Mai, 9. Juni; Zawist, auf
 versandeten Wiesen bei Jarow,
 häufig, im Mai;
 Nh. von Schlehen geklopft, 10. Aug.;
- Bb. überall von Wiesen gekötschert,
 Juli;
- pullus* Reut. Pg. Žižkow, an Ruderalpflanzen,
 30. Mai;
 Kaiserwiese, 16. Juni; Zawist,
 Juli;

- Nh. an trockenen Rainen auf der Schnarrowa, Aug.;
Gross-Tschernitz, Aug.;
- Chlamydatus saltitans* Fall. Pg. am Exerzierplatz in Dejwitz auf festgetretenem Boden zwischen *Polygonum aviculare*, in Mehrzahl, 17. Juli;
- evanescens* Boh. Pg. Zawist, unterhalb des I. Altans (Flusseite) auf felsigen Abhängen, im Sande zwischen Grasbüscheln, einzeln und selten, 18. Sept.;
- Neocoris Bohemani* Fall. Pg. Hetzinsel, an Weidenbüschen ziemlich häufig, 7. Juni u. 28. Juni;
- Campylomma verbasci* H. S. Pg. Žižkow, an Schuttpflanzen, 30. Mai; Zawist, an blühendem *Verbascum phlomoides*, Aug.;
Nh. an *Verbascum*, zuweilen in Menge, Aug. und Sept.;
- Sthenarus Roseri* H. S. Pg. Hetzinsel, an Weiden, nicht häufig; 7. Juni.

II. Hydrocorisae Latr.

- Naucoris cimicoides* L. Pg. in Wassertümpeln, auf der Kaiserwiese, im Juni; Dablitze, Sept. und Okt.;
Lissa a. E., 29. Mai; Čelakowitz im Juni; Neratowitz, in Tümpeln und Wassergräben, Sept.;
Nh. beim Forsthause „Dřevič“, häufig im Aug.; Lana, in einem Tümpel als Larven; im Sept.;
- Nepa cinerea* L. Pg. in den ehemaligen Schanzgräben hinter den Stadttoren, überall sehr häufig, schon im April; Dablitze, in einem Tümpel, tief im Schlamm zwischen Graswurzeln und Binsen überwintert, in Menge, 29. Okt.;

- Ranatra linearis* L. Libuschabad, im Quellwasser, während des ganzen Jahres; Zawist, im Juli;
Pg. an überschwemmten Stellen der Kaiserwiese, im Larvenzustande, 21. Juni; Michle und Wrschowitz, in schlammigen Tümpeln zwischen faulenden Blättern, Sept.;
- Notonecta glauca* L. Pg. überall häufig; Libuschabad; St. Prokop, im Bache;
Nh. am „Dřevíč“ häufig, im Sept.;
Lissa a. E.; Neratowitz, Sept.;
Elbogen, Sept. und Okt.;
Bb. Pechöfen, in Pfützen und Lacken auf Waldwegen, Juli;
- var. marmorea* F. Pg. mit der Stammart allenthalben vermischt; im Dablitzer Tümpel sehr häufig, Sept.;
- furcata* F. Elbogen, in einem Tümpel nächst dem Bahnhofe, nicht häufig, Juni 1893 neu für Böhmen! (Prof. Dr. Gust. Nowak.)
- lutea* Müll. Nh. beim Forsthause „Dřevíč“, nur einige wenige Exemplare, Aug. und Sept.; Lana, in einem Tümpel an der Strasse, selten, Aug.;
Čelakowitz, in Elbetümpeln halberwachsene Larven, 6. Juni;
Elbogen, mit *var. furcata*. ziemlich selten, Larven im Mai und Juni. (Prof. Dr. Gust. Nowak.)

- Plea minutissima* F. Lissa a. E., 29. Mai;
Čelakowitz; in den Elbetümpeln,
zwischen Algen, recht häufig,
6. Juni;
- Corisa Geoffroyi* Leach. Pg. im Baumgarten, in Wasser-
gräben, im Juni; Malwazinka,
4. Juni; Dablit, 28. Okt.;
Nh. am „Dřevíč“, sehr häufig, Aug.;
- hieroglyphica* Duf. Pg. Kaiserwiese, an überfluteten
Stellen nach einer Überschwem-
mung, im Juni; Scharka, Juni;
- Linnei* Fieb. Nh. Aug.;
- limitata* Fieb. Pg. Kaiserwiese, mit der fol-
genden Art zugleich, Juni;
- semistriata* Fieb. Pg. ebenda, Juni;
Nh. Aug.;
- Fallenii* Fieb. Pg. Kaiserwiese, Juni; Schar-
ka;
Nh. am „Dřevíč“, Aug. und Sept.;
- distincta* Fieb. Pg. ebenda, Juni; Scharka;
- moesta* Fieb. Nh. in einer Pfütze am „Koryt“
29. Juli; nur in 3 Exemplaren.
- fossarum* Leach Pg. Kaiserwiese, Juni;
- Fabricii* Fieb. Pg. St. Prokop, im Bache, Juli;
Kundratitzer Mühlteich,
30. Sept.;
- Nh. am „Dřevíč“, sehr häufig, Aug.;
- Bb. an seichten, sandigen Stellen
des Schwarzwasserbaches, Juli;
- var. nigrolineata* Fieb. Pg. Libuschabad;
Bb. mit der Stammart, im Juli;
- praeusta* Fieb. Pg. Kaiserwiese, zahlreich,
Juni;
- Cymatia coleoprata* F. Neratowitz, in der Elbe, Okt.;
- Sigara minutissima* L. Pg. Hetzinsel, in der Moldau
zwischen Algen, 27. Mai;
Lissa a. E., in Elbetümpeln, 29.
Mai.



Erklärung der Abkürzungen.

Hauptsammelbezirke, bei welchen die näheren Fundorte angeführt erscheinen:

Pg.: Umgebung von Prag.

Nh.: Neuhütten (Schloss Nischburg an der Beraun).

Bb.: Breitenbach bei Platten, im böhmischen Erzgebirge.

Im Verlage der

Gesellschaft für Physiokratie in Böhmen

erschienen:

Catalogus insectorum faunae bohemicae.

Verzeichnis der Insekten Böhmens.


- I. Schnabelkerfe (Rhynchota)-Heteroptera, Cicadina, Psyllidae von Prof. Lad. Duda. Prag 1892.
- II. Fliegen (Diptera) von Ferdinand Kowarz. Prag 1894.
- III. Kleinschmetterlinge (Microlepidoptera) von MDr. Ottokar Nickerl. Prag 1894.
- IV. Pelz- und Netzflügler (Trichoptera et Neuroptera) von Prof. Fr. Klapalek. Prag 1895.
- V. Grossschmetterlinge (Macrolepidoptera) von Dr. Ot. Nickerl. Prag 1897.
- VI. Käfer (Coleoptera) von Dr. Ant. Klima. Prag 1902.

Beiträge zur Insektenfauna Böhmens.


- I. „Zur Käferfauna des Böhmerwaldes“ von Hofr. Franz Hennevojl von Ebenburg. Prag 1905.
- II. „Fundorte böhmischer Wanzenarten“ von Dr. Ot. Nickerl. Prag 1905.

Amerling Carl, MDr. Gesammelte Aufsätze aus dem Gebiete der Naturökonomie und Physiokratie. Mit 1 Tabelle u. 6 Tafeln. Prag 1868.

- Nickerl Ottokar, MDr. Bericht über die i. J. 1878 der Land- und Forstwirtschaft Böhmens schädlichen Insekten. Prag 1879.
Bericht über die i. J. 1879 der Land- und Forstwirtschaft Böhmens schädlichen Insekten. Prag 1880.
Bericht über die i. J. 1880 der Landwirtschaft Böhmens schädlichen Insekten. Prag 1881.
Bericht über die i. J. 1885 der Landwirtschaft Böhmens schädlichen Insekten. Prag 1886.
Bericht über die i. J. 1890 der Landwirtschaft Böhmens schädlichen Insekten. Prag 1891.
-



DRUCK VON CARL BELLMANN IN PRAG.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Beiträge zur Insekten-Fauna Böhmens](#)

Jahr/Year: 1905

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Nickerl Ottokar

Artikel/Article: [II. Fundorte böhmischer Wanzenarteil, nach der vom MUDr. Ottokar Nickerl jun. hinterlassenen Hemipterensammlung 1-42](#)