Buchrezension

Suomen Riista
Wildlife in Finland. – Band 54

Helsinki (2008)
ISSN 0355-0656

Einschließlich des gastweisen Leitartikels von V. Ruusila über Forschungs- und Managementziele beim Elchwild, zeichnet sich das jagdwissenschaftlich-wildbiologische Jahrbuch 2008 durch ein vor allem dem Haarwild, und dabei insbesondere dem Elchwild *(Alces alces)* gewidmetes Themenspektrum aus. Neben fünf Originalarbeiten zum Elch, je einem Beitrag zu Rehwild, Rentieren und zum Biber folgen nur zwei jagdornithologische Arbeiten zu Uhu und Samtente.

Im Einzelnen gingen S. Härkönen, K. Eerikäinen, R. Lähteenmäki & R. Heikkilä der Frage nach, inwieweit die Äsungsansprüche des Elchwildes (Äsen von Zweigen, Brechen von Stämmen, Rindenschäle) die Regeneration von Aspen-Beständen *(Populus tremula)* gefährden.

J. Aarnio, L. Petäjistö, A. Selby & R. Heikkilä untersuchten Wechselbeziehungen zwischen der Bestandsgröße der finnischen Elchpopulation und dem Engagement der finnischen Jäger zur Elchjagd, J. PELLIKA, S. Härkönen, J. Hiedanpää & J. Jaakkola hingegen jene zwischen den subjektiven Normen und den Strecken-Kontingenten in den finnischen Elchjagdklubs und A. Selby, L. Petajistö & T. Koskela die Meinung der Elchjäger zur Zukunft der 5.200 Elchjagdklubs in Finnland.

M. Laulumaa & V.-M. Väänänen berichten von einem Konflikt der Auswirkung der abgeschafften offiziellen Abschussvorgaben auf die Rehwild-Populationen *(Capreolus capreolus)* und deren Jagdstrecke in Finnland, J. Kumpula, A. Colpaert & A. Tanskanen jedoch über die selektive Nutzung von Weideland durch halbwilde Rene in der wechselnden Forst- und Landschaftsstruktur von Zentral-Lappland.

P. Nummi, T. Hyvönen & S. Kattainen studierten die Habitat-Dynamik des Kanadischen Bibers *(Castor canadensis)* im südlichen Finnland auf den Ebenen verlassener Staue und der Landschaft im Hinblick seines Einflusses auf die Veränderung der Baumartenzusammensetzung.

Die beiden jagdornithologischen Beiträge beinhalten Nahrungsanalysen des Uhus *(Bubo bubo)* während der Nistperioden in Häme (südliches Finnland) durch S. Sulkava, H. Lokki & J. Koivu sowie Untersuchungen zur Anti-Prädator-Strategie der Samtente *(Melanitta fusca)* in der nördlichen Baltischen See von M. Hario.

Die wildarten-spezifische Auswahl thematischer Schwerpunkte steht dieser interessanten Schriftenreihe gut zu Gesicht, was schon das Outfit erkennen lässt.

Walter Uloth, Seeba

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Beiträge zur Jagd- und Wildforschung

Jahr/Year: 2009

Band/Volume: 34

Autor(en)/Author(s): Uloth Walter

Artikel/Article: Buchrezension 268