Brinkmann (1933) nennt für weitere niedersächsischen Bezirke eine Abnahme oder ein Verschwinden des Storches zu Anfang dieses Jahrhunderts. Über die negative Bestandsentwicklung in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts berichtet aber vor allem Weigold (1937).

Literatur

Blasius, R. (1896): Die Vögel des Herzogthums Braunschweig. Ornis 8: 621-688.

Brinkmann, M. (1933): Die Vogelwelt Nordwestdeutschlands. Hildesheim.

Leverkühn, P.u. R. Blasius (1896): Ornithologische Beobachtungen aus dem Herzogthum Braunschweig. Ornis 8: 373-476.

Weigold, H. (1937): Der weiße Storch in der Provinz Hannover. Oldenburg i. O.

Anschrift des Verf.: Institut für Vogelforschung "Vogelwarte Helgoland", 294 Wilhelmshaven-Rüstersiel.

Silberreiher (Casmerodius albus) und Seidenreiher (Egretta garzetta) an der Northeimer Seenplatte

Am 1.9.1974 bemerkte ich gegen 19.00 Uhr unter einem Trupp von etwa 10 Graureihern (Ardea cinerea) einen etwa graureihergroßen, weißen Reiher mit schwarzer Schnabelspitze, ausgeprägtem gelben Schnabelgrund und schwarz wirkenden Beinen. Die Reiher flogen gemeinsam in ca. 50 m Höhe in südlicher Richtung über die Kiesseen. Sie gingen kurz darauf auf einer Wiese nahe der Leine bei Höckelheim nieder. Bereits seit einigen Wochen stellte ich abends regelmäßig Graureiherflüge von bis zu 20 Ex. fest, die auf den Leinewiesen zur Nachtruhe einfielen. Bedingt durch die schlechten Lichtverhältnisse, konnte ich am selben Abend kein Belegfoto mehr vom Silberreiher anfertigen. Eine Nachsuche in den folgenden Tagen blieb erfolglos.

Am 6.6.1975 konnte ich um die Mittagszeit einen Seidenreiher an einem kleinen Tümpel zwischen den Kiesseen ausgiebig beobachten. Der Vogel ließ mich im Auto bis auf ca. 60 m heranfahren, ohne argwöhnisch zu werden. Mit einem bis 60fach vergrößerten Spektiv konnten folgende Kennzeichen notiert werden: Knapp halb so groß wie ein anwesender Graureiher, schwarze Beine mit auffallenden gelblichen Füssen, schwarzer Schnabel, ausgeprägte Schmuckfedern an Nacken, Schultern sowie Brust. Der Vogel war mit Sicherheit unberingt. Ein weißer Kleinreiher wur-

de bereits am 2. 6. 1975 von P. Barthel, Hildesheim, an einem weiter nördlich gelegenen Kiessee von der Bahn aus gesehen. P. Barthel erblickte ein Ex. am 9. 6. 1975 an einem der Kiesseen. Da es sich wahrscheinlich bei allen drei Beobachtungen um denselben Vogel gehandelt hat, ergibt sich für ihn eine Mindestverweildauer von 8 Tagen an der Northeimer Seenplatte. Diese Feststellung stellt den Erstnachweis des Seidenreihers für den Kreis Northeim dar.

Anschrift des Verf.: Bernd Riedel, 3410 Northeim 1, Wilhelmstr. 114.

Ein weiterer Graubruststrandläufer Calidris melanotos (Vieill.) in Südniedersachsen

Vom 15. 8. bis 20. 8. 1974 wurde ein Graubruststrandläufer an den Zukkerfabriksteichen bei Clauen, Kr. Peine, 12 km nordöstlich von Hildesheim beobachtet. Als erster sah ihn H. Oosterwyk am 15. 8.. Unabhängig davon wurde derselbe Vogel an den folgenden Tagen von N. Krott, G. Ellwanger, C. Franz und H. Mittendorf festgestellt.. P. Becker konnte ihn am 20. 8. fangen und beringt wieder freilassen.

Da über das Verhalten und den Biotopanspruch dieser Art bereits einige Veröffentlichungen vorliegen, u. a. aus demselben Gebiet: 7. 10. bis 11. 10. 1972 - P. Becker u. A. May: Zum Durchzug des Graubruststrandläufers, Calidris melanotos (Vieill.), in Südniedersachsen, Beitr. Naturk. Nieders. 26: 12-14, 1973 - verzichten wir auf eine genauere Darstellung und beschränken uns auf die Untersuchungsergebnisse des Fänglings.

Fang des Strandläufers am schlammigen Ufersaum eines Klärbeckens mit einer Prielfalle. Flügel: 132 mm; nach Angaben in "Handbook of British Birds", H. F. Witherby u. a., 1958, Vol. IV., p. 262 handelt es sich um ein Weibchen. Schwanz: 56 mm, Schnabel: 26, 5 mm, Tarsus (außen): 30, 5 mm, Gewicht: 85 g, guter Ernährungszustand, Beine gelbgrün, Iris dunkelbraun. Mauserzustand: ad. Brutkleid, altes abgenutztes Gefieder, im gesamten Gefieder keine neue Federn zu finden.

Anschrift der Verf.: P. Becker, 32 Hildesheim, Dammstr. 25,
N. Krott, 32 Hildesheim, Twetje 17.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens

Jahr/Year: 1975

Band/Volume: 28

Autor(en)/Author(s): Riedel Bernd

Artikel/Article: Silberreiher (Casmerodius albus) und Seidenreiher (Egretta garzetta) an der Northeimer Seenplatte 63-64