

Der Schlangennadler (*Circaetus gallicus*) in Südniedersachsen

Circaetus gallicus (Gmel., 1788) ist heutzutage in Südniedersachsen nur noch (sehr seltener) unregelmäßiger Durchzügler. Die von Brinkmann (1933) zusammengefaßten Nachweise entstammen sämtlich dem 19. Jahrhundert. Seither gelangen nur wenige Beobachtungen während der Zugzeit (Niethammer u. a. 1964) ausnahmslos neueren Datums:

1. 15. 9.1963 1 Ex. ad., helle Phase, Feldmark bei Achtum (May),
2. 6.10.1963 1 Ex. ad., helle Phase, Leineniederung bei Laatzen (Becker),
3. 29.10.1963 1 Ex. Leineniederung bei Grasdorf (Brunner, Wendt, beide Hannover).

Hinsichtlich der relativ geringen Entfernung der Beobachtungsorte ist nicht auszuschließen, daß es sich bei den 3 Nachweisen um denselben Vogel handelte, zumal auch längere Aufenthalte im Beobachtungsgebiet durchaus möglich sind (Berndt u. Danker 1957, Dorge 1957).

Schrifttum

- Berndt, R. u. P. Danker (1957): Schlangennadler (*Circaetus gallicus*) bei Braunschweig. J. Orn. 98: 470.
- Brinkmann, M. (1933): Die Vogelwelt Nordwestdeutschlands. Hildesheim.
- Dorge, K. (1957): Schlangennadler (*Circaetus gallicus*) bei Braunschweig. J. Orn. 98: 470.
- Niethammer, Kramer, Wolters (1964): Die Vögel Deutschlands, Artenliste. Frankfurt/M.

Anschrift des Verf.: Peter Becker, 32 Hildesheim, Dammstr. 25.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens](#)

Jahr/Year: 1976

Band/Volume: [29](#)

Autor(en)/Author(s): Becker Peter

Artikel/Article: [Der Schlangennadler \(*Circaetus gallicus*\) in Südniedersachsen 64](#)