

Verletzter Fischadler (*Pandion haliaetus*) im Herbst 1974 bei Celle

Ende August 1974 fand ein Bekannter von mir in der Nähe von Beedenbostel bei Celle einen Fischadler in dem Fluß Lachte. Mein Bekannter holte ihn aus dem Wasser und stellte fest, daß der Vogel starke Flügelverletzungen aufwies: die Hand des rechten Flügels hing nur noch lose an einer Sehne. Verheilen der Wunde schien unmöglich. So wurde die Hand abgenommen und die Wunde nach gründlicher Desinfektion verbunden. Bei einem Aufenthalt in Beedenbostel Anfang September 1974 konnte ich das in einem Käfig gehaltene, täglich mit einem halben Karpfen versorgte Tier, das im übrigen in gutem Zustand und nicht sehr scheu war, begutachten. Es handelte sich wahrscheinlich um ein Jungtier: Scheitel und Nacken waren dunkel und ziemlich stark einheitlich gestreift. Die gebänderten Steuerfedern wiesen sehr starke weiße Spitzensäume auf (vgl. Glutz, U.N., K.M. Bauer u. E. Bezzel, Handbuch der Vögel Mitteleuropas, Bd. 4, Falconiformes, Frankfurt, 1971). Es ist anzunehmen, daß der Vogel der skandinavischen Population von *Pandion haliaetus* zuzurechnen ist, die von Mitte August bis Anfang September in breiter Front in SW- bis S-Richtung durch Mittel- und Westeuropa zieht.

Anschrift des Verf.: Dipl. Biol. Herbert Zucchi, Fachbereich Biologie
der Philipps-Universität, 355 Marburg, Ketz-
bach 63.

Vogelzugbeobachtungen zwischen Borkum und Langeoog

Im Frühjahr und Herbst 1975 verbrachte ich zusammen fünf Wochen auf sechs Ostfriesischen Inseln, um den Vogelzug zu beobachten. So besuchte ich vom 28. 4. - 16. 5. Borkum, Juist und Memmert, vom 6. - 18. 10. Norderney, Baltrum und Langeoog. Da ich vom alljährlich, wiederholenden Kleinvogel- und Strandläufer-Durchzug herkömmlicher Sichtung Abstand nehme, worüber ich aber in Einzelheiten der Vogelwarte Helgoland Bericht erstatte, verbinde ich meine Reise mit bemerkenswerten Feststellungen in Reihenfolge der Artbeachtung jeweils für die einzelnen Inseln.

Für Borkum 1 Wiedehopf und 1 Spornpieper in den Dünen am 29. 4. sowie Schlagschwirlgesang am 30. 4. 1 Wiesenweihen-Männchen am 4. 5. auf Juist, dort auch noch Brutvogel. Der Memmert bot mir ein durchziehendes Rohrweihenpaar am 8. 5. und noch bis 16. 5. nahrungssuchend bis zu 3 Säbelschnäbler und ca. 400 Ringelgänse auf der Vogelinsel. Später im Herbst nach einer leichten Sturmflut vor Norderney, 3 Schmarotzerraubmöwen und 1 Wellenläufer am 7. 10. und 2 Sturmschwalben am 8. 10. An dem Tag zo-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical
Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens](#)

Jahr/Year: 1977

Band/Volume: [30](#)

Autor(en)/Author(s): Zucchi Herbert

Artikel/Article: [Verletzter Fischadler \(*Pandion haliaetus*\) im
Herbst 1974 bei Celle 22](#)