

Kurze Ergänzung zur Ausbreitung des Eulenfalters *Cucullia fraudatrix* EVERSMAHN in Niedersachsen und einigen angrenzenden Gebieten (Lep., Noctuidae)

Wie mir Dr. H. Hohmann, Bremen, kürzlich mitteilte, ist die seit Jahrzehnten vordringende Noctuide *Cucullia fraudatrix* doch schon im niedersächsischen Flachland zwischen Ems und Weser nachgewiesen worden. G. Lakmann fand sie dort 36 km SW Bremen-Hbf in Kleinenkneten am 10. 8. 1971 in einem Exemplar. In der Bremer Museumssammlung konnten keine Stücke ausfindig gemacht werden. Solange keine weiteren Nachweise aus diesem Raum vorliegen, muß die Frage, ob es sich um ein neu gewonnenes Areal oder ob es sich bei dem Falter um einen einzelnen "Ausreißer" handelte, unbeantwortet bleiben. Von der bisherigen Verbreitungsgrenze liegt der Fundort etwa 125 km entfernt.

Weiter fanden sich in der Sammlung Bahr (Münster) einige Stücke, gefangen Ende der 1950er Jahre, leider alle unzureichend etikettiert, so daß nicht ersichtlich wird, ob sie wirklich aus der Umgebung Münsters stammen.

Anschrift des Verf.: Ulrich Lobenstein, Rodenberger Str. 13, 3 Hannover 91.

Beitr. Naturk. Niedersachsen 32 (1979) 15 – 20

Die Schöne Landdeckelschnecke (*Pomatias elegans* (Müll.)) im Gebiet der mittleren Leine

von Gerd Nottbohm

Die Schöne Landdeckelschnecke (*Pomatias elegans*(Müll.)) ist eine mediterran-westeuropäisch verbreitete Art, die die Ostgrenze ihres Vorkommens in Mitteleuropa etwa am 12. Längengrad erreicht (Seeland (DK, Jena). Ihre nördlichsten Standorte findet die Schnecke auf der Insel Aabelö im SW-Kattegat (55°25' N. Br.) und in Westmoreland (GB/54°25' N. Br.; Schlesch 1961/vgl. auch Kerney 1975). In Deutschland verläuft die Nordgrenze der Verbreitung entlang der Linie Rheine, Lengerich, Bad Eilsen, Hildesheim (Ant 1957). Über das Vorkommen der Art im Gebiet der mittleren Leine gibt Abb. 1 Aufschluß. Weitere Vorkommen in Südniedersachsen sind bei Moringen (Herbst 1915), Eschershausen und Osterode (Ant 1957) festgestellt worden.

Während in anderen Teilen Mitteleuropas, z. B. in England, immer mehr Standorte der Schnecke erlöschen - Kerney (1972) sieht als Gründe für diesen Rück-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens](#)

Jahr/Year: 1979

Band/Volume: [32](#)

Autor(en)/Author(s): Lobenstein Ulrich

Artikel/Article: [Kurze Ergänzung zur Ausbreitung des Eulenfalters *Cucullia fraudatrix* Eversmann in Niedersachsen und einigen angrenzenden Gebieten \(Lep., Noctuidae\) 15](#)