Grausnapper (*Muscicapa striata*) attackieren Fledermaus

Sudlich von Hannover gibt es in der Laatzener Masch noch einen alten Leinearm, dessen Ufer von alten Bumen und Buschwerk bewachsen sind, die Alte Leine. An mehreren Stellen fuhrt ein Wanderweg unmittelbar an dem Gewasser entlang.

Am 16. Mai 1978, 12.50 Uhr, entdeckte ich im hellen Mittagslicht eine kleine uber dem Wasser jagende Fledermaus, die von einem Grausnapper (*Muscicapa striata*) verfolgt wurde. Sehr bald aber setzte sich die Fledermaus zum Rasten an die grob-borkige Rinde einer Pappel, die in schrager Neigung zum Wasser hin am Ufer stand. Das Tier kroch am Stamm entlang, bis es eine Stelle in einer Rindenspalte fand, wo es sich kopfabwarts einhangen konnte. Die Anpassung an die Farbe der Rinde war so gut, da ich die Fledermaus nur noch mit Hilfe des Fernglases zu erkennen vermochte, obwohl ich aus einer Entfernung von etwa nur 10 m beobachtete und gunstige Lichtverhaltnisse gegeben waren. Wenig spater setzte die Fledermaus ihre Fluge fort, worauf sich eine Bachstelze (*Motacilla alba*) an der Verfolgungsjagd des Grausnappers beteiligte, sehr schnell aber wieder abflog, vermutlich weil die Fledermaus erneut den Stamm der Pappel zum Rasten anflug. Doch als sie ein drittes und viertes Mal abflog und ihre Insektenjagd fortsetzte, gesellte sich ein zweiter Grausnapper dazu und beteiligte sich an den Aggressionshandlungen. Auch ein Haussperlings- (*Passer domesticus*) flog hinzu, jedoch ohne aktiv einzugreifen. Flug- und Rastdauer, die die Fledermaus einhielt, waren jeweils sehr kurz, etwa nur eine halbe Minute Flug, die Rast hochstens eine Minute. Ich hatte den Eindruck, da das Tier ermattet, wahrscheinlich sehr hungrig war. Uber dem stehenden Gewasser flogen wenige sehr kleine Insekten.

Das Verhalten der beiden Grausnapper lie erkennen, da jedesmal nur die fliegende Fledermaus Aggressionshandlungen ausloste. Wenn die Fledermaus sich an der Rinde des Baumes festhielt oder daran hochzog, verhielten sich die offensichtlich sehr erregten Vogel abwartend.

Als die Fledermaus ein funftes Mal ihren Rastplatz verlassen hatte, fiel sie ermattet ins Wasser und verharrte dort reglos einige Sekunden auf der Oberflache. Bald jedoch begann sie mit den Flugarmen zu rudern und schwamm gradlinig auf die Uferseite mit der bereits erwahnten Pappel zu. Auf dem etwa zweieinhalb Meter weiten Schwimmweg legte sie dreimal eine kurze Ruhepause ein. Am Ufer angekommen, kroch sie die ziemlich steile Schrage der Boschung uber kleine trockene Zweige und Wurzeln hinaus bis zum Fue der Pappel, auch hierbei kurze Rastpausen einlegend. Schlielich bewaltigte die Fledermaus den Weg stamm-aufwarts noch bis in eine Hohe von etwa zwei Metern, wo sie sich in einer Spalte verkriechen konnte.

Die ganze Zeit uber verblieben die beiden Grausnapper abwartend im Geast der Uferbusche sitzen.

Bei der Fledermaus durfte es sich mit groer Wahrscheinlichkeit um eine Wasserfledermaus (*Myotis daubentoni*) gehandelt haben (Ohren ziemlich klein, etwas rundlich, der Rucken von satt rotlichbrauner Farbung). Sie war deutlich kleiner als die Grausnapper.

Anschrift der Verf.: Annemarie Schramm, St. Ingbertweg 8, 3 Hannover-Kirchrode.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens](#)

Jahr/Year: 1979

Band/Volume: [32](#)

Autor(en)/Author(s): Schramm Annemarie

Artikel/Article: [Grauschnäpper \(*Muscicapa striata*\) attackieren Fledermaus
\[44\]\(#\)](#)