

Grasfrosch, *Rana temporaria*) entdeckte, ließ er sich im frisch gemähten Gras nieder, sammelte die Beute ein, wobei er bis zu vier Objekte in einem Fang halten konnte, und flog Richtung Horst davon, um alsbald wieder zu erscheinen.

Schrifttum

Garve, E. (1977): Die Vögel der Südheide und der Aller-Niederung I. Teil, Non-Passeriformes, 2. Auflage, Celler Ber. Vogelk. 3.

Anschrift des Verf.: Dr. Gottfried Vauk, Inselstation der Vogelwarte Helgoland, Postfach 1220, 2192 Helgoland.

Beitr. Naturk. Niedersachsens 33 (1980): 56–57

Vogelbeobachtungen auf Baltrum

von Dietrich Meyer

Vom 10. 8. -20. 8. 78 verbrachten meine Familie und ich einen kurzen Urlaub auf Baltrum. Da von der Insel Baltrum kaum Veröffentlichungen vorliegen, soll hier eine kurze Übersicht der wichtigsten Beobachtungen erfolgen. Die Insel ist etwa 7 km lang und 2 km breit und besteht fast nur aus Dünen. Die Westhälfte ist bewohnt, die Osthälfte ist unbewohnt und teilweise Naturschutzgebiet. Mehrere Dünenzüge durchziehen die Insel von West nach Ost. Sie sind bewachsen (Sanddorn, Holunder, Ebereschen, Brombeeren, Weiden in verschiedenen Arten u. a.). In der Mitte befindet sich ein flaches mooriges Wiesengebiet, das sich bis in den Ostteil hinzieht. An der Südseite sind Wattwiesen mit der üblichen Flora (u. a. flächenartig Strandwermut und Statice). Besonders wichtig ist der etwa 2 km lange Streifen von der Ost- bis zur Südküste mit einer je nach Fluthöhe breiten Flachwasserzone.

Brutarten

Zwergseeschwalbe (*Sterna albifrons*): Ein Paar zeigte an der Ostküste noch Revierverhalten (Sturzflüge), max. über 50 Ex. - Kuckuck (*Cuculus canorus*): 1 flügger Jungkuckuck wurde noch von einem Wiesenpieper gefüttert, bettelte einmal einen gleichzeitig anwesenden adulten Kuckuck um Futter an. - Mehlschwalbe (*Delichon urbica*): 6 Nester an Neubauten, alle einzeln. - Rabenkrähe (*Corvus corone*): Ein Trupp von 6 Ex. (ad. mit juv.) mehrfach gesehen. - Kohlmeise (*Parus major*): Noch 1 ad. mit 2 juv. im Ostdorf umherstreifend. - Zaunkönig (*Troglodytes troglodytes*): Max. 7 singende Ex. im Mittelteil. - Amsel (*Turdus merula*): 1 Paar mit flügenden, bettelnden Jungen im Ostdorf. - Fitis (*Phylloscopus trochilus*): An 19 Stellen singende F. (zwischen den Dünen und in Sanddornflächen). - Wiesenpieper (*Anthus pratensis*): 2 singende Ex. in den Wiesen an der Südküste. - Bachstelze (*Motacilla alba*): An 2 Stellen (Ostdorf) ad. mit juv. - Haussperling (*Passer domesticus*): Der Gesamtbestand der Insel dürfte bei etwa 50 Ex. liegen (30 im West- u. 20 im Ostdorf). -

Durchzügler

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*): 2 ad. überfliegen den Ostteil von W nach E. - Eiderente (*Somateria mollissima*): An der Westküste befanden sich max. 162 Ex. auf und zwischen den Bühnen, alle ♀-farben und in der Schwingenmauser; an der Nordostküste max. 173 in der Brandungszone; fast täglich aus E nach W ziehende vor der Nordküste in Trupps bis 24. - Rohrweihe (*Circus aeruginosus*): 1 ♀ über dem Ostteil. - Wiesenweihe (*Circus pygargus*): An drei Tagen ein ♂ über dem Ost- und Südabschnitt. - Austernfischer. (*Haematopus ostralegus*): Sehr wichtiger Rastplatz ist die Ostküste, hier max. 18.000; eine weitere Stelle ist die Südküste direkt vor dem Ostdorf, hier max. 3.000. Gesamtzahl bis 25.000. - Kiebitz (*Vanellus vanellus*): Nur 2 Ex. gesehen. - Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*): Max. 104 Ex. an der Ostküste auf Matten und in der Flachwasserzone. - Steinwälder (*Arenaria interpres*): An der gesamten Strandlinie, max. ein Trupp von über 150 Ex. - Brachvogel (*Numenius arquata*): Hauptsammelplatz war die Südküste, wo maximal über 700 Ex. in der Flachwasserzone ruhten. - Regenbrachvogel (*Numenius phaeopus*): Bemerkenswert 1 Ex., das auf den Bühnen an der Westküste in den auf- und ablaufenden Wellen und in den Miesmuscheln nach Nahrung suchte. - Pfuhschnepfe (*Limosa lapponica*): Hauptrastplatz ist die Ost- bis Südküste, hier max. ein Trupp von 70 Ex., sonst nur einzelne. - Grünschenkel (*Tringa nebularia*): Bevorzugt sind die kurzgrasigen Wiesen vor dem Ostdorf, hier max. in einem Trupp über 200 Ex. - Knutt (*Calidris canutus*): Max. über 150 Ex., noch im Brutkleid vor der Südküste. - Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*): Vorkommen nur im Verlauf der Ost- bis zur Südküste, max. über 5.000 Ex. - Sanderling (*Crocethia alba*): Max. 15 ziehend und auf Sandbänken, alle im Ruhekleid, Nordküste. - Schmarotzerraubmöwe (*Stercorarius parasiticus*): am 12. 8. zieht um 16.55 h 1 Ex. der dunklen Phase im Ruhekleid durch, beide Schwanzspieße tadellos erhalten. - Mantelmöwe (*Larus marinus*): Max. 60 ad. auf einer Sandbank an der NE-Küste. - Heringsmöwe (*Larus fuscus*): Max. 26 ad. unter ad. Mantel- und Silbermöwe (*Larus argentatus*), Sandbank, NE-Küste. - Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*): Max. 10 unter Brandseeschwalben an der Ostküste. - Flußseeschwalbe (*Sterna hirundo*): Täglich vor allem an der Nordküste. Bemerkenswert ist ein Durchzug von 282 Ex. in 1,5 Std. vor der SE-Küste. - Brandseeschwalbe (*Sterna sandvicensis*): Täglich vor allem vor der Nordküste; ein Durchzug von 89 Ex. vor der West- und ein ruhender Schwarm von 300 Ex. an der Ostküste. - Taube (spez. ?): Max. 30 Ex. im Ostabschnitt. Die Tauben zeigten Merkmale von Hohltauben (*Columba oenas*); die schwärzlichen Flügelbinden waren nicht eindeutig zu erkennen. - Elster (*Pica pica*): Dreimal je 1 Ex. gesehen, kein Hinweis (Nest z. B.) auf mögliche Brut. - Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*): Zweimal je 2 Ex. an Vogelbeeren im Mittelabschnitt. - Feldschwirl (*Locustella naevia*): Ein singendes Ex. in einem Dünenatal. - Neuntöter (*Lanius collurio*): 1 durchziehendes ♂ in den Dünen. - Star (*Sturnus vulgaris*): Ein Schlafplatz für etwa 750 Ex. im Ostteil der Insel in den nur 1 m hohen Sanddornflächen; Nahrungssuche auf der Insel. - Feldsperling (*Passer montanus*): Zweimal je 3 Ex. auf einem Dünenzug.

Anschrift des Verf.: Dietrich Meyer, Amselstraße 13, 2200 Elmshorn.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens](#)

Jahr/Year: 1980

Band/Volume: [33](#)

Autor(en)/Author(s): Meyer Dietrich

Artikel/Article: [Vogelbeobachtungen auf Baitrum 56-57](#)