

124: 21-26. - S l a t e r , P.J.B., S.A. I n c e & P.W. C o l g a n (1980): Chaffinch song types: their frequencies in the population and distribution between repertoires of different individuals. Behaviour 75: 207-218. - T h i e l c k e , G. (1987): Langjährige Dialektkonstanz beim Gartenbaumläufer (*Certhia brachydactyla*). J. Orn. 128: 171-180. - T h o r p e , W.H. (1958): The learning of song patterns by birds with special reference to the song of the chaffinch *Fringilla coelebs*. Ibis 100: 535-570. - W i c k l e r , W. (1986): Dialekte im Tierreich - ihre Ursachen und Konsequenzen. Schriftenreihe d. Westf. Wilhelms-Univ. Münster, neue Folge, Heft 6, Münster.

Anschrift des Verfassers: Dr. h.c. Klaus Conrads,  
Am Tiefen Weg 15, D-4800 Bielefeld 1.

Beitr. Naturk. Niedersachsens 41(1988): 114

### **Übersicht über den Brutерfolg des Weißstorches (*Ciconia ciconia*) im Regierungsbezirk Braunschweig 1987**

In folgenden Orten wurden Storchenpaare festgestellt (mit Anzahl der ausgeflogenen Jungen):

- |  |  |
|--|--|
| <p>a) <u>Landkreis Gifhorn:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Altendorf 3</li> <li>Bergfeld 2</li> <li>Betzhorn Hi 2</li> <li>Eischott Bo 1</li> <li>Jembke 1</li> <li>Kaiserwinkel 2</li> <li>Knesebeck 1</li> <li>Leiferde 3</li> <li>Lüben 4</li> <li>Radenbeck 3</li> <li>Rühen 3</li> <li>Schönewörde 0</li> <li>Wahrenholz 4</li> <li>13 Paare, davon 12 mit 29<br/>ausfliegenden Jungen</li> </ul> | <p>c) <u>Stadt Wolfsburg:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vorsfelde 3</li> <li>Warmenau Pr 1</li> <li>2 Paare mit 4<br/>ausfliegenden Jungen</li> </ul> <p>d) <u>Landkreis Peine:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Abbensen 2</li> <li>1 Paar mit 2<br/>ausfliegenden Jungen</li> </ul> <p>e) <u>Stadt Braunschweig:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hondelage 0</li> <li>1 Paar mit 0<br/>ausfliegenden Jungen</li> </ul> |
| <p>b) <u>Landkreis Helmstedt:</u><br/>kein Storchenpaar</p>  |  |

Auswertung für den gesamten Regierungsbezirk (in Klammern die Zahlen von 1986)

|   | Veränderung gegenüber 1986 |
|---|----------------------------|
| Horstpaare allgemein : 17 (22)  | Abnahme 22,7 %             |
| Horstpaare mit ausfliegenden Jungen: 15 (11)  | Zunahme 36,4 %             |
| Gesamtzahl der ausfliegenden Jungen: 35 (22)  | Zunahme 59,0 %             |
| Durchschnittliche Anzahl der ausfliegenden Jungen<br>je Horstpaar allgemein: 2,06 (1,00)                | Zunahme 106,0 %            |
| Durchschnittliche Anzahl der ausfliegenden Jungen<br>je Horstpaar mit ausfliegenden Jungen: 2,33 (2,00) | Zunahme 16,5 %             |

Anschrift des Verfassers: Hans Reither, Wullenweberstraße 12,  
3340 Wolfenbüttel

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens](#)

Jahr/Year: 1988

Band/Volume: [41](#)

Autor(en)/Author(s): Reither Hans

Artikel/Article: [Übersicht über den Bruterfolg des Weißstorches \( \*Ciconia ciconia\*\) im Regierungsbezirk Braunschweig 1987 114](#)