among European owls. Ornis Scand. 7: 29-41. - MÖLLER, B. (1986): Hohe Horstkonzentration der Rohrweihe *(Circus aeruginosus)* in Getreidefeldern. Mitt. orn. Ver. Hildesheim 10: 5-6. - SCHÖNN, S., W. SCHERZINGER, K.-M. EXO u. R. ILLE (1991): Der Steinkauz. Die neue Brehm-Bücherei. Wittenberg. - ULLRICH, B. (1980): Zur Populationsdynamik des Steinkauzes *(Athene noctua)*. Vogelwarte 30: 179-198.

Anschrift des Verfassers: Bernhard Möller, Küchenthalstraße 8,
31139 Hildesheim

Beitr. Naturk. Niedersachsens 46 (1993): 81

Beobachtung eines C-Falters *(Polygonia C-Album L.)* bei Cloppenburg

Am 17.5.1993 gegen 18:00 h MESZ beobachtete ich bei vollem Sonnenschein im sog. Krattholz bei Molbergen/Landkreis Cloppenburg - MTB 3113/Übersichtskarte von Niedersachsen - einen C-Falter *(Polygonia C-Album* L.). Der Falter saß mit ausgebreiteten Flügeln am Hauptweg des Waldgeländes in etwa 2,20 m Höhe an einem Eichenblatt und war dort bis zum Abflug etwa 2 Minuten. Meines Erachtens handelte es sich bei dem von mir beobachteten C-Falter um 1 ♂ der 1. Generation, für das die Bezeichnung *f. hutchinsoni* (Form) zulässig ist (vgl. NOVAK & SEVERA 1980). Nach ALTMÜLLER, BÄTER & GREIN (1981) wurden für 1980 u.a. aus dem Kreis Cloppenburg keine C-Falter-Vorkommen gemeldet. RETTIG (1992) teilt Vorkommen des C-Falters für Ostfriesland zu MTB 2711 + 2712 (Übersichtskarte von Niedersachsen) mit. Da der C-Falter im Norden Europas wie auch Deutschlands seltener vorkommt (vgl. HIGGINS & RILEY 1978), halte ich meine Beobachtung für mitteilenswert.

In der Roten Liste der in Niedersachsen gefährdeten Großschmetterlinge (LOBENSTEIN 1987) ist der C-Falter mit dem Gefährdungsgrad 5 (= bei anhaltender Lebensraumzerstörung gefährdet) versehen, so daß seine Gefährdung fortbesteht.

Schrifttum

ALTMÜLLER, R., J. BÄTER & G. GREIN (1981): Zur Verbreitung von Libellen, Heuschrecken und Tagfaltern in Niedersachsen (Stand 1980). Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen - Beiheft, Heft 1. Hannover. - HIGGINS, L.G., & N.D. RILEY (1978): Die Tagfalter Europas und Nordwestafrikas. Hamburg, Berlin. - LOBENSTEIN, U. (1987): Rote Liste der in Niedersachsen gefährdeten Großschmetterlinge. Beitr. Naturk. Niedersachsens 40(1): 6. - NOVAK, I., & F. SEVERA (1980): Der Kosmos-Schmetterlingsführer. Stuttgart. - RETTIG, K. (1992): Die Tagfalter Ostfrieslands im Zeitraum 1962-1992 (Verbreitung, Flugzeit und Raupen). Beiträge zur Vogel- und Insektenwelt Ostfrieslands, 58. Bericht, S. 31.

Anschrift des Verfassers: Peter Diesing, Lupinenstraße 29,
49661 Cloppenburg

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens

Jahr/Year: 1993

Band/Volume: 46

Autor(en)/Author(s): Diesing Peter

Artikel/Article: Beobachtung eines C-Falters (Polygonia C-Album L.) bei Cloppenburg 81