

Literatur

ASSMANN, Th. (1983): Über die Bodenkäferfauna des Naturschutzgebietes "Lengener Meer" im Kreis Leer (Ostfriesland) (Coleoptera: Carabidae et Silphidae). Drosera 1: 9. - BORCHERT, W. (1951): Die Käferwelt des Magdeburger Raumes. - CHINERY, M. (1987): Pareys Buch der Insekten. - ERBELING, L. (1990): Die Histeridae, Sphaeritidae, Silphidae und Agrytidae (Coleoptera) des Niederweser- und Niederemsgebietes. Drosera 1/2: 116. - JACOBS, W., & M. RENNER (1988): Biologie und Ökologie der Insekten. - PLAISIERS, F. (1988): Zur Besiedlung junger Düneninseln durch Lauf- und Aaskäfer (Coleoptera: Carabidae, Silphidae). Drosera 1/2: 72 u.a. - RETTIG, K. (1993): Fauna und Flora des Landschaftsschutzgebietes "Restmoorfläche bei Ochtelbur" und des ehemaligen "Inhlower Moores". Beitr. Vogel- u. Insektenwelt Ostfr. H. 64: 17. - ROWOLD, W. (1987): Zur Aaskäferfauna des Peiner Moränen- und Lößgebietes. Beitr. Naturk. Niedersachsens 40: 36 u.a. - SCHNURRE, O., & R. MÄRZ (1963): Zur Ernährungsbiologie der Amrumer Waldohreulen. Beitr. Naturk. Niedersachsens 16: 73. - STRESEMANN, E. (1964): Exkursionsfauna von Deutschland. Wirbellose II/1: 247.

Anschrift des Verfassers: Dipl.-Biol. Thomas Carnier,
Middelreeg 32, D-26349 Jade

Beitr. Naturk. Niedersachsens 47 (1994): 125

Zum Ektoparasitenbefall des Buntspechts (*Dendrocopos*)

Wie in den Vorjahren (CARNIER 1993) erschienen ab 19.6.1994 wieder Buntspechte am Hausdach zur Nahrungssuche. Ein Jungvogel verflog sich am 8.7. um 16:30 h ins Haus. Nach Ergreifen mit einem Tuch und Freilassung umflog mich mehrfach eine langgeflügelte Lausfliege (Hippoboscidae) von hell braungelber Farbe, Gesamtlänge um 10 mm, die vom Vogel auf das Tuch übergestiegen sein mußte, wenn nicht abgestreift. Einer weiteren Bestimmung entzog sie sich durch Verschwinden. An dem Vogel selbst war mir vor dem Ergreifen nichts aufgefallen, er war in guter Kondition.

Die berücksichtigte Literatur (GLUTZ, div. BLUME u.a.) gibt keinerlei Auskunft. MENZEL (1968) führt bei Wendehals (*Jynx torquilla*, Picidae) Parasiten auf, jedoch keine Lausfliegen. Die unspezifische *Ornithomyia avicularia* ist beispielsweise genannt für Steinkauz (*Athene noctua*; EXO u.a. 1991) und Pirol (*Oriolus oriolus*; FEIGE 1986).

Literatur

CARNIER, T. (1993): Schilfdächer als Nahrungsreviere von Buntspechten *Picoides major*. Orn. Mitt. 45: 286. - EXO, M., R. ILLE, W. SCHERZINGER & S. SCHÖNN (1991): Der Steinkauz. Neue Brehm-Bücherei 606: 203. - FEIGE, K.D. (1986): Der Pirol. Neue Brehm-Bücherei 578: 89. - MENZEL, H. (1968): Der Wendehals. Neue Brehm-Bücherei 392: 79 ff.

Anschrift des Verfassers: Dipl.-Biol. Thomas Carnier, Middelreeg 32,
D-26349 Jade

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens](#)

Jahr/Year: 1994

Band/Volume: [47](#)

Autor(en)/Author(s): Carnier Thomas

Artikel/Article: [Zum Ektoparasitenbefall des Buntspechts \(*Dendrocopos*\)
\[125\]\(#\)](#)