

Schedler, K. (1994): **Handbuch Umwelt, Technik, Recht.** Luftreinhaltung, Abfallwirtschaft, Gewässerschutz, Lärmschutz, Umweltschutzbeauftragte, EG-Umweltrecht. 680 S., 316 Abb., 843 Literaturstellen. 3., Neubearb. Aufl. Expert-Verlag. ISBN 3-8169-147, DM 139,-.
Die immense, komplexe Fülle der Rechtsmöglichkeiten und Rechtsgrundlagen ist in zahlreichen, zusätzlichen Normen, Kriterien, Richtlinien angesprochen. Die konkreten Gesetzestexte müssen zusätzlich beschafft werden. Außen vor bleibt die Naturschutzgesetzgebung.

Weber, H. E. (1995): **Flora von Südwest-Niedersachsen und dem benachbarten Westfalen.** 770 S., mehr als 700 Detailzeichnungen in 118 Abb. Verlag H. Th. Wenner. Osnabrück. DM 78,00. ISBN 3-87898-340-9.

Eine klassische Flora, die mehr als 2000 Arten enthält. Sie führt über Bestimmungsschlüssel zu den einzelnen Arten. Sie werden systematisch, morphologisch charakterisiert. Zahlreiche einzelne Fundmeldungen schließen sich an. Abb. und Zeichnungen helfen zur Trennung kritischer Sippen/Arten: vgl. Salix-Blätter, Früchte von Brassicaceae, Blätter von *Primula*, *Lamium*, *Senecio*, *Taraxacum*, *Potamogeton*, Lippen von Orchis, Utriculi von Carices, Blätter von Getreidearten. Das Gebiet der Flora umfaßt insbesondere das Umfeld von Osnabrück bis Ibbenbüren, Bielefeld, Bramsche und teilweise bis zum Dümmer. Auch kritische Sippen werden mitberücksichtigt (s. *Hieracium*, *Rubus*, *Alchemilla*). Dadurch kann diese Flora mit Gewinn auch in den übrigen Gebieten von Niedersachsen eingesetzt werden.

Wiedersich, B. (1996): **Das Wetter.** Entstehung, Entwicklung, Vorhersage. Enke. Stuttgart. 208 S., 103 Abb. (Davon 66 farbig). DM 24,90. ISBN 3-432-27481-5.

Übersichtliche, verständliche, anschauliche Zusammenfassung, die auf besondere Wetterverhältnisse wie Föhn, Bora, Mistral, Scirocco, kleinräumige Windsysteme, Monsun, tropische Wirbelstürme mit eingeht.

Mitteilungen

Korrekturen zu A. Barkow (1996) diese Zeitschrift H. 3-4): „Untersuchungen zur Verteilung und Nahrungsökologie mausernder Brandgänse (*Tadorna tadorna*) im Nationalpark Wattenmeer (Scharhörn – Großer Knechsand):

- die Karten S. 162, S. 163, Abb. 5 bzw. 6 sind vertauscht: die Bildunterschriften gelten weiterhin.
- S. 168, Zeile 5, die Klammer ist zu streichen und der angefangene Satz: „Die Irrtumswahrscheinlichkeit für ein Chi-Quadrat von 200“ ist mit „FG-6 liegt bei $p < 0,001$ “ zu beenden.

Farbberingte Nilgänse

Um Brüssel lebten z.Zt. ca. 500 verwilderte Nilgänse. Aus dieser Population sind Vögel farbmarkiert worden: rechter oder linker Lauf mit Plastik(Darwin)-Ring (schwarz, weiß, rot, gelb, grün, blau), zusätzlich mit einer individuellen, dreifachen Zahlen- oder Zeichenkombination an einem Bein. Das andere Bein trägt einen Metallring.

Ringablesungen oder Wiederfunde werden mit Angabe des Ortes, des Datums, der Anschrift, der Farbringablesung erbeten an:

Didier Vangeluwe
IRSNB
29, rue Vautier
1000, Brüssel, Belgien
fax +32 2 649.48.25



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens](#)

Jahr/Year: 1997

Band/Volume: [50](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Mitteilungen 52](#)