

Die Anwesenheit eines Männchen im Mai 1999 läßt auf eine weitere Brut im Wendesser Moor hoffen.

### Literatur

BECKER, P. (1998): Zum Rallenbestand des Naturschutzgebietes "Wendesser Moor" im Jahre 1997. Beitr. Naturk. Niedersachsens 51: 149 154. FLADE, M., & J. JEGRAM (1995): Die Vögel des Wolfsburger Raumes. Wolfsburg. OELKE, H. (1961): Die Vogelwelt des Peiner Moränen- und Lößgebietes. Dissertation Georg-August-Universität Göttingen, hier S. 355 356. WAGNER, H. (1950): Ornithologische Notizen aus Südhannover Braunschweig. Orn. Mitt. 2: 91 92.

### Anschrift des Verfassers:

Peter Becker, Wilhelm-Rabe-Str. 36, 31199 Diekholzen.

Beitr. Naturk. Niedersachsens 52: 42(1999)

## Nachweise der Wespenspinne *Argiope bruennichi* (Arachnida: Araneae) im Landkreis Gifhorn (Ost-Niedersachsen)

von Robert Pudwill

Neue Fundnachweise der Wespenspinne (*Argiope bruennichi*) an der mittleren Elbe, Saale, aus dem Drömling und dem Landkreis Lüneburg deuten auf eine allgemeine Arealerweiterung nach Noren hin (KELMAIER 1998; SACXHERFD & BLISS 1989, ZUPPKE & KRUMMHAAR 1997). Seit 1996 habe ich im Landkreis Gifhorn in mehreren Gebieten die Wespenspinne in größerer Individuenzahl festgestellt. Im NSG Vogelmoor bei Ehra Lessien befandw sich 1996 zahlreiche Kokons an Gräsern und Stauden einer Naßweide (TK 3430.4/02). Auf einer Naßwiese mit Binsen , Rohrglanzgras, Seggen und Stauden , direkt an der Ise bei Gifhorn gelegen, fand ich 1996 mehrere Wespenspinnen in ihren Netzen (TK 3429.3/14). Ein weitere Fundort lag im Clausmoor auf einer brachgefallenen Wiese (Rohrglanzgras, Binsen, Stauden) mit einem Weiher (TK 3529.2/02). Hier fand ich 1997 und 1998 mehrere Spinnen in ihren Netzen. Alle drei Vorkommen habe ich zufällig bei Geländebegehungen gefunden , ohne systematisch nach der Wespenspinne zu suchen.

### Literatur

KEHLMAIER, C. (1998): Die Wespenspinne (*Argiope bruennichi*) (Scoop, 1772) an zwei Fundorten im Landkreis Lüneburg (Arachnida: Araneidae: Argiopinae). Beitr. Naturk. Niedersachsens 51: 169 170. SACHER, P., & P. BLISS (1989): Zum Vorkommen der Wespenspinne (*Argiope bruennichi*) im Bezirk Halle (Arachnida: Araneae). Hercynia N.F. Leipzig 26(4): 400 408. ZUPPKE, U. , & B. KRUMMHAAR (1997): Wespenspinne (*Argiope bruennichi*) auch im Drömling. Beitr. Naturk. Niedersachsens 50: 45

Anschrift des Verfassers: Robert Pudwill, Böttcherstr. 3, D-38518 Gifhorn.

BIO I 90.061/52,2

Inv. 1999/10.278

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens](#)

Jahr/Year: 1999

Band/Volume: [52](#)

Autor(en)/Author(s): Pudwill Robert

Artikel/Article: [Nachweise der Wespenspinne \*Argiope bruennichi\* \(Arachnida: Araneae\) im Landkreis Gifhorn \(Ost-Niedersachsen\) 42](#)