

Der Rallenbestand (Rallidae - AVES) in den Fuhsewiesen bei Kl. Ilsede, Kr. Peine 1999

Von Peter Becker

Seit 1998 erfasse ich die Brutvögel der Fuhsewiesen Kl. Ilsede, Kr. Peine (siehe Karte = TK-25 Nr. 3727, Quadrant 1, 52°18'12'' N, 10°18'33'' E). Inzwischen wurden mehrjährige Erfassungen durchgeführt, die demnächst zusammenfassend dargestellt werden können.

Vorab eine kurze Information zum Rallenbestand 1999:

Kerngebiet: Wiesen und Sumpfflächen westlich der Bahnlinie Gr. Ilsede - Peine (vgl. MTB).

<u>Gefangen und beringt :</u>	<u>Wasserralle</u> (<i>Rallus aquaticus</i>)	<u>Tüpfelralle</u> (<i>Porzana porzana</i>)
vorwiegend Rohrglanzgras, ca. 3,1 ha	144 Ex.	12 Ex.
Vorwiegend Rohrglanzgras, ca. 1,6 ha	21 Ex.	2 Ex.
Nur Wasserschwadenbestand, ca. 1,5 ha	19 Ex.	3 Ex.
Mischvegetation übrige Flächen, 1 ha	<u>15 Ex.</u>	<u>1 Ex.</u>
	199 Ex.	18 Ex.

Brutbestände der Rallen:

<u>Wasserralle:</u>	etwa 33 Paare mit mindestens 42 erfolgreichen Bruten
<u>Tüpfelralle:</u>	2 Paare mit mindestens 2 erfolgreichen Bruten
<u>Teichralle:</u>	ca. 20 Bruten
<u>Blessralle:</u>	ca. 15 Bruten

Ein diesjähriger Jungvogel vom Kleinen Sumpfhuhn (*Porzana parva*) wurde Ende Juli gefangen. Er muß in der Nähe - möglicherweise im Wendesser Moor (s. BECKER 1999), welches 1999 fast austrocknete, erbrütet worden sein und könnte nach Kl. Ilsede ausgewichen sein (Entfernung: ca. 5 km). Zwergsumpfhuhn (*Porzana pusilla*) und Wachtelkönig (*Crex crex*) wurden 1999 nicht in Kl. Ilsede festgestellt.

Kontrollen, Fangeinsätze, Fänge, Aufwand

Hörkontrollen (nachts): April 7, Mai 14, Juni 8, zusammen 29.

Fangeinsätze mit Prielfallen (tagsüber): Juli 8, August 15, September 6, Oktober 1, zusammen 26.

Weitere Beobachtungsgänge zwischen Januar und Dezember: 8.

Handfänge im Frühjahr: Wasserralle: 5, Tüpfelralle: 2.

Prielfallenfänge (Juli-September): Wasserralle : 194, Tüpfelralle: 16, Teichralle: 41, Blessralle: 1. Zusammen: 259 Ex. beringt. Hinzu kommen noch 2 entwichene Vögel, 1 Kl. Sumpfhuhn, 1

Wasserralle.

Dazu ebenfalls 2 Wiederfänge: 1 Wasserralle, 1 Tüpfelralle.

Zu den Wiederfängen: Die Wasserralle wurde 1997 von mir in der Gronauer Masch (Leinetal, ca. 50 km SW) beringt. Die Tüpfelralle beringte ich 1998 in Salzderhelden(Leinetal), ca. 120 km SSW.

68 Fänglinge (Wasserrallen und Tüpfelrallen) konnten ein oder mehrere Tage oder Wochen nach dem Fang im Gebiet wiedergefangen und kontrolliert werden.

Im Jahr 1998 beringte ich in den Fuhsewiesen bei Kl. Ilsede 57 Wasserrallen, 18 Tüpfelrallen und 4 Teichrallen. Keiner dieser Vögel konnte im Ilseder Gebiet 1999 kontrolliert werden!

Aufwand:

Für 331 gefangene Rallen wurden ca. 3500 Mehlwürmer verködert. Etwa jede 3. Larve wurde von Fröschen (*Rana sp.*) verspeist. Vom 19. Januar bis 28. Dezember besuchte ich das Gebiet 65mal, verbrachte hier 302 Stunden (An- und Abfahrzeiten nicht gerechnet!) und verfuhr dafür $63 \times 72 \text{ km} = 4536 \text{ km}$.

Literatur

BECKER, P. (1999): Brutnachweis des Kleinen Sumpfhuhns (*Porzana parva*) im Wendesser Moor, Kr. Peine. Beitr. Naturk. Niedersachsen 52: 41-42.

Anschrift des Verfassers:

Peter Becker, Wilhelm - Raabe - Str. 36, D - 31199 Diekhöfen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens](#)

Jahr/Year: 2002

Band/Volume: [55](#)

Autor(en)/Author(s): Becker Peter

Artikel/Article: [Der Rallenbestand \(Rallidae - AVES\) in den Fuhsewiesen bei Kl. Ilsede, Kr. Peine 1999 82-83](#)