Nachtrag zu:

Die Blatt-, Halm- und Holzwespen des Wutachgebietes

(Hym. Symph.)

Von Walter STRITT, Karlsruhe

Seit meiner Arbeit über die Blattwespenfauna des Wutachgebietes im Jahre 1952 habe ich dort weiterhin mehrfach gesammelt und eine Reihe von Arten festgestellt, die mir früher nicht zu Gesicht gekommen waren. Besondere Aufmerksamkeit wurde dem südlichen Talrand zwischen Gündelwangen und Münchingen geschenkt, wobei auch die anderen Hautflügler (Hymenopteren) Beachtung fanden. Es gelang mir, noch 29 für das Gebiet neue Blattwespenarten aufzufinden. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der dort angetroffenen Species auf 283. Eine der erbeuteten Arten ist für Deutschland neu: es ist der Paracharactus (Rhadinoceraea) hyalinus Knw., den ich im Feldberggebiet ebenfalls festgestellt habe. Bisher war er nur von der Schweiz und von Kärnten bekannt. Fünf weitere Arten sind neu für Baden.

Das folgende Verzeichnis enthält ferner eine Art, deren wissenschaftlicher Name sich geändert hat, und drei Arten, die bisher von anderen Sammlern, jetzt aber von mir selbst erbeutet wurden. Der Amauronematus leucolaenus Zadd. der ersten Veröffentlichung ist zu streichen, da er zu A. humeralis Lep. gehört.

Artenliste

Pamphilius Latr.

P. balteatus Kl. ♂ 6.

Urocerus Geoffr.

U. gigas L. ♀ 8.

Hartigia Schdte.

H. xanthostoma Ev. Larve 8 in Filipendula ulmaria (L.) Maxim.

Cephus Latr.

C. pygmaeus L. ♂ ♀ 6.
C. nigrinus Ths. ♂ 6.
C. brachycercus Ths. ♀ 6.

Blasticotoma Kl.

B. filiceti Kl. Larve 8 in Athyrium filix femina (L.) Roth.

Selandria Leach.

S. serva F. ♂ 8.

Dolerus Jur.

D. liogaster Ths. ♀ 5. Neu für Baden.

Heterarthrus Steph.

H. microcephalus Kl. Larven 8 in Minen an Salix aurita L.

Athalia Leach.

A. lugens Kl. ♂ 7—8.
A. rosae L. ♂ ♀ 6.

Ametastegia A. Costa

A. equiseti Fall. ♂ ♀ 6; 8.

Paracharactus Mc Gill.

P. hyalinus Knw. ♀ 6. Neu für Deutschland.

Ardis Knw.

A. sulcata Cam. Larven 8 in Rosa sp. Neu für Baden.

Metallus Forb.

M. gei Bri. Larven 8 in Minen an Geum urbanum L.

Messa Leach.

M. sp. Larven 5—6 in Minen an Salix caprea L.

Tenthredopsis O. Costa

T. fenestrata Knw. ♀ 6.
T. spreta Lep. ♂ 6.
T. flavomaculata Cam. ♀ 6.
Diese drei Arten werden von BENSON (1952) als Formen von T. nassata L. betrachtet und sind daher bei der Gesamtzahl nicht berücksichtigt.

Tenthredo L.

T. arcuata Forst. ssp. aegra Ensl. ♀ 6.
T. acerrima Bens. (sulphuripes Kriechb. Bens. nec. Kriechb.) ♂ ♀ 6—8.
T. maculata Geoffr. ♀ 6.

Rhogogaster Knw.

R. dryas Bens. ♀ 6. Neu für Baden.
R. genistae Bens. ♀ 5—6.
R. picta Kl. ♀ 6.

Pachyprotasis Htg.

P. antennata Kl. ♂ 6.

Macrophya Dahlb.

M. albipuncta Fall. ♀ 6.
M. teutona Pz. ♀ 6. Seltene Art

Priophorus Dahlb.

P. brullei Dahlb. ♀ 6.

Hoplocampa Htg.

H. crataegi Kl. ♂ ♀ 6. Zuvor nur als Larve in Früchten von Crataegus.

Pristiphora Latr.

P. geniculata Htg. Larven 8 an Sorbus aucuparia L.
P. laricis Htg. ♀ 6.
P. mollis Htg. ♀ 5.
P. ruficornis Ol. ♀ 6.

Amauronematus Knw.

A. humeralis Lep. ♀ 5. (det. Lindqvist).

Euura Newm.

E. testaceipes Kl. Larven in Gallen an Salix fragilis L.

Nematus Pz.

N. flavescens Steph. ♀ 6. Neu für Baden.

Pachynematus Knw.

P. gehrsi Knw. ♀ 6. Neu für Baden.

Schrifttum:

BENSON, R. B. 1952 und 1958: Handbooks for the identification of British insects. Hym. 2. Symph. Sect. (b); Section (c).

STRITT, W. 1952: Die Blatt-, Halm- und Holzwespen des Wutachgebietes. Beitr. nat. Forsch. Südwestdeutschl. 11. 37—44.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland

Jahr/Year: 1960

Band/Volume: 19

Autor(en)/Author(s): Stritt Walter

Artikel/Article: Nachtrag zu: Die Blatt-, Halm- und Holzwespen des Wutachgebietes 188-189