

Wasserläufer — neu für Baden-Württemberg

von KLAUS VOIGT

In den Tabellen über „Die geographische Verbreitung“ der deutschen Wanzen (STICHEL 1937) sind aus Baden bzw. Württemberg folgende Arten der Amphibicorisae noch nicht gemeldet:

Gerridae

+ ○ *Gerris costai* H. S.

7. 7. 69 Wildsee b. Kaltenbronn, 900 m, auf Entwässerungsgraben sw des Hochmoorses. — Da das Wildseemoor von der badisch-württembergischen Grenze durchschnitten wird, kann der Fund in beiden Landesteilen als neu verzeichnet werden.

○ *Gerris thoracicus* SCHUMM.

Aus Württemberg nicht gemeldet. 12. 4. 67 Tettngang, NSG Wasenmoor, Entwässerungsgraben, makropter; 11. 5. 67 Tettngang, Stadtweiher, makropter.

+ *Gerris lateralis* SCHUMM.

6. 6. 71 Rußheim, Kr. Karlsruhe, Altrheinarm, apter und makropter, nach STICHEL nur aus Hessen bekannt.

Gerris odontogaster ZETT.

Von SCHMID 1965 erstmals für Württemberg gemeldet. Aus dem Schwarzwald nur vom Hohlohsee bekannt (MEES 1900). Ist auch auf dem Mummelsee 1030 m (28. 7. 69) und auf dem Buhlbachsee 790 m (13. 9. 70) zu finden.

Veliidae

Microvelia reticulata BURM.

Aus Baden bisher nur von Nußdorf am Bodensee (HOCH 1956) gemeldet als *M. schneideri* SZ. Weitere Fundstellen sind: 11. 5. 68 Karlsruhe-Rappenwörth, in kleinem Tümpel; 12. 5. 69, 15. 5. 69 Karlsruhe-Daxlanden, am Rande eines Fischteiches; 27. 8. 70 Leopoldshafen, Pfinz-Entlastungskanal, zwischen Schilf; 6. 6. 71 Rußheim, Altrheinarm; 13. 9. 70 Buhlbachsee/Schw. 790 m, zwischen Binsen und Schilf, apter und makropter. — Die gefangenen Tiere gehören in der Mehrzahl zur *f. schneideri* SZ.

Velia caprai TAM.

Von dieser von KLESS 1961 erstmals aus Baden gemeldeten Art fand ich u. a. am 31. 7. 69 in Allerheiligen/Schw. in einer kl. Bucht unmittelbar am großen Wasserfall ein makropter Weibchen. Dieser Biotop bestätigt das Tier als „an inhabitant of small, fast-flowing streams“ (BRINKHURST 1960).

+ *Velia saulii* TAM.

Von WAGNER 1961 in den Bestimmungstabellen aus Baden gemeldet. Hier einige Fundorte: 16. 6. 65 Karlsruhe-Rüppurr, Albufer; 8. 4. 67 Bockschaft, Kr. Sinsheim, Dorfbach.

Hydrometridae

+ *Hydrometra gracilentata* HORV.

6. 6. 71 Rußheim, Altrheinarm, auf Schlamm, unter Styroporresten, apter.

Mesoveliidae

○+ *Mesovelia furcata* MLS.

27. 8. 70 Leopoldshafen, Pfinz-Entlastungskanal, zwischen Schilf; 27. 8. 70 Rußheim, Altrheinarm, auf und bei Nuphar-Blättern; 13. 9. 70 Buhlbachsee/Schw. 790 m, zwischen Schilf. Alle Tiere apter. Erster (württ.) Fund aus dem Schwarzwald.

Hebridae

+ *Hebrus ruficeps* THOMS.

15. 5. 1969 Karlsruhe-Daxlanden, am Rande eines Fischteiches, apter, zwischen *Hebrus pusillus* FALL. und *Microvelia reticulata* BURM.

Alle obengenannten Tiere habe ich selbst gefangen. Die faunistischen Neufunde habe ich so bezeichnet:

+ Neu für Baden

○ Neu für Württemberg

Bei einzelnen Arten habe ich nicht alle meine Fundorte und -daten erwähnt. Sie werden in einer späteren Arbeit zusammengefaßt erscheinen.

Literatur

- BRINKHURST, R. O.: 1960, The British distribution of the waterbug *Velia saulii* TAM., with some notes on alary polymorphism. Proc. R. ent. Soc. London (A), 35, 91–92
- HOCH, K.: 1956, Wasserkäfer des Bodensees und seiner Umgebung (Anhang: Wasserwanzen). Mitt. Bad. Landesver. Naturk. u. Naturschutz, Freiburg, NF 6, 241–250
- JORDAN, K. H. C.: 1935, Aquatile Rhynchoten — in GULDE, J.: Die Wanzen Mitteleuropas, — Frankfurt
- KLESS, J.: 1961, Die Käfer und Wanzen der Wutachschlucht. — Mitt. bad. Landesver. Naturk. u. Naturschutz, Freiburg, NF 8, 79–152
- MEESS, A.: 1900, Erster Beitrag zur Kenntnis der Hemipteren-Fauna Badens, — Mitt. Bad. Zool. Ver. Karlsruhe
- MEESS, A.: 1907, Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Hemipterenfauna Badens — Mitt. Bad. Zool. Ver. Karlsruhe, 130–151
- SCHMID, G.: 1965, Bemerkenswerte Käfer und Wanzen aus Baden-Württemberg — Veröff. Landesst. Natursch. u. Landschaftspf. Baden-Württ., Ludwigsburg, 33, 248–257
- STICHEL, W.: 1937, Die geographische Verbreitung in „Illustrierte Bestimmungstabellen der deutschen Wanzen“, Berlin 1925–38
- STICHEL, W.: 1955, Illustrierte Bestimmungstabellen der Wanzen II. Europa, Band I, Berlin
- WAGNER, E.: 1961, Ungleichflügler, Wanzen, Heteroptera (Hemiptera) in BROHMER, EHRMANN, ULMER „Tierwelt Mitteleuropas“ IV (3), Leipzig
- WAGNER, E., ZIMMERMANN, ST.: 1955, Beitrag zur Systematik der Gattung *Gerris* F. (Hem.-Het., Gerridae) — Zool. Anz. 155, 177–190

Anschrift des Verfassers: KLAUS VOIGT, 7501 Bruchhausen, Forlenweg 4

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland](#)

Jahr/Year: 1971

Band/Volume: [30](#)

Autor(en)/Author(s): Voigt Klaus

Artikel/Article: [Wasserläufer - neu für Baden-Württemberg 153-154](#)