©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

Phytopathologisches Institut
der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg

KARL-HEINZ MOHR

Ergebnisse der Albanien-Expedition 1961 des Deutschen Entomologischen Institutes

47. Beitrag

Coleoptera: Chrysomelidae II (exclusive Halticinae)[1]

Übersicht der Chrysomelidae (exclusive Halticinae) des südlichen Balkan

Zeichenerklärung:
* Erstmeldung aus Albanien
\+ Fundmeldung liegt vor
– Fundmeldung unbekannt
! (in Spalte Albanien) Aus „Albanien" gemeldet, Fundort liegt jedoch außerhalb der Grenzen der VR Albanien

	Jugoslawien						
	Bosnien-Herzegowina	Montenegro	Serbien	Mazedonien	Albanien	Bulgarien	Griechenland
Donaciinae							
Donacia clavipes FABRICIUS	+	–	–	–	–	+	–
Donacia crassipes FABRICIUS	+	–	–	–	–	–	–
Donacia dentata HOPPE	+	–	+	–	–	–	–
Donacia versicolorea (BRAHM)	–	–	+	–	–	–	–
Donacia polita KUNZE	+	–	–	–	+	–	+
Donacia semicuprea PANZER	+	–	+	–	–	–	–
Donacia aquatica (LINNÉ)	+	–	–	–	–	–	–
Donacia impressa PAYKULL	+	–	–	–	–	–	–
Donacia brevicornis AHRENS	+	–	+	–	–	–	–
Donacia marginata HOPPE	+	–	+	–	–	+	+
**Donacia bicolora* ZSCHACH	+	–	+	–	+	–	–
Donacia antiqua KUNZE	+	–	–	–	–	–	–
Donacia thalassina GERMAR	+	–	+	–	–	+	–
Donacia vulgaris ZSCHACH	+	–	+	–	–	–	–
Donacia simplex FABRICIUS	+	–	+	–	–	–	–
Donacia freyi GOECKE	–	–	–	–	+	–	–
Donacia tomentosa AHRENS	+	–	–	–	–	–	–
Donacia cinerea HERBST	+	–	–	–	–	–	–
Plateumaris discolor PANZER	+	–	–	–	–	+	–
Plateumaris sericea (LINNÉ)	+	–	–	–	–	+	–
Plateumaris braccata (SCOPOLI)	+	–	+	–	–	–	–
Plateumaris consimilis (SCHRANK)	+	–	–	–	–	+	–
Plateumaris affinis (KUNZE)	–	–	+	–	–	+	–
Plateumaris rustica (KUNZE)	+	–	–	–	–	–	–
Plateumaris tenuicornis BALTHASAR	+	–	–	–	–	–	–

[1] Chrysomelidae I (Halticinae) in: Beitr. Ent., **15**, 701–729; 1965.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.16.3-4.347-380

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

Tabelle (Fortsetzung)

	Jugoslawien						
	Bosnien-Herzegowina	Montenegro	Serbien	Mazedonien	Albanien	Bulgarien	Griechenland
Orsodacninae							
Orsodacne cerasi (Linné)	+	–	+	–	–	+	–
Orsodacne lineola (Panzer)	+	+	+	–	–	+	–
Zeugophora scutellaris Suffrian	+	–	–	–	–	–	–
Zeugophora subspinosa (Fabricius)	+	–	–	–	–	+	–
Zeugophora flavicollis (Marsham)	–	–	–	–	–	+	–
Criocerinae							
Lema erichsoni Suffrian	+	–	–	–	–	+	–
**Lema cyanella* (Linné)	+	–	+	–	+	+	–
Lema lichenis (Voet)	+	–	+	–	–	+	–
Lema tristis Herbst	+	–	+	–	–	–	–
Lema melanopus (Linné)	+	+	+	–	–	+	–
Crioceris asparagi (Linné)	–	–	–	–	–	+	–
Crioceris 12-punctata (Linné)	+	–	+	–	–	+	–
Crioceris 14-punctata (Scopoli)	–	–	+	–	–	+	–
Crioceris 5-punctata (Scopoli)	+	–	+	–	–	–	–
Crioceris paracenthesis (Linné)	+	+	–	–	+	–	+
* *Lilioceris lilii* (Scopoli)	+	+	+	–	+	+	–
Lilioceris merdigera (Linné)	+	–	+	–	–	+	–
Clytrinae							
Labidostomis propinqua(Faldermann)	–	–	–	–	–	+	+
Labidostomis rufa Waltl	–	–	–	–	–	–	+
Labidostomis tridentata (Linné)	+	–	–	–	–	+	–
Labidostomis humeralis (Schneider)	+	+	+	–	–	+	–
Labidostomis lucida (Germar)	+	–	+	–	–	+	–
Labidostomis longimana (Linné)	+	+	+	–	+	+	–
Labidostomis pallidipennis (Gebler)	+	+	+	–	+	+	–
ssp. *pilicollis* Lacordaire	–	–	–	–	+	–	–
Labidostomis cyanicornis (Germar)	+	+	+	–	+	+	–
* *Miopristis dentipes* (Olivier)	+	+	–	–	+	–	–
Lachnaea sexpunctata (Scopoli)	+	+	+	–	+	+	–
Antipa macropus (Illiger)	+	–	–	–	+	–	–
Clytra valerianae Ménetries	–	–	+	–	–	+	–
* *Clytra novempunctata* Olivier	–	–	+	–	+	+	–
Clytra quadripunctata (Linné)	+	+	+	–	–	+	–
Clytra appendicina Lacordaire	+	+	+	–	–	+	–
Clytra laeviuscula Ratzeburg	+	+	+	–	+	+	–
* *Clytra atraphaxidis* Pallas	–	–	–	–	+	+	+
Cyaniris chloris Lacordaire	–	–	+	–	–	+	–
Cyaniris limbata Stevens	–	–	–	–	–	+	+
* *Cyaniris tibialis* Brullé	–	–	–	–	+	+	+
Cyaniris hypocrita Lacordaire	–	–	–	–	–	+	–
Cyaniris cyanea (Fabricius)	+	+	+	–	+	+	–

DOI: 10.21248/contrib.entomol.16.3-4.347-380

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

Tabelle (Fortsetzung)

	Jugoslawien				Albanien	Bulgarien	Griechenland
	Bosnien-Herzegowina	Montenegro	Serbien	Mazedonien			
Cyaniris flavicollis CHARPENTIER	+	–	–	–	–	–	–
* *Cyaniris aurita* (LINNÉ)	+	+	+	–	+	+	–
* *Cyaniris affinis* (ILLIGER)	+	–	+	–	–	+	–
Cyaniris xanthaspis (GERMAR)	+	+	+	–	+	+	
Chilotoma musciformis (GOEZE)	+	–	+	–	–	+	–
Coptocephala chalybaea (GERMAR)	–	–	–	–	–	+	–
Coptocephala unifasciata (SCOPOLI)	–	–	+	–	+	+	–
Coptocephala scopolina (LINNÉ)	–	–	+	–	–	+	–
Coptocephala rubicunda (LAICHARTING)	–	–	–	–	+	–	–
Cryptocephalinae							
Stylosomus flavus MARSHAM	–	–	–	+	+	–	+
Stylosomus tamaricis HERRICH-SCHÄFFER	?	–	–	–	–	–	–
Stylosomus minutissimus GERMAR	–	+	–	–	–	–	–
Pachybrachys scriptidorsum MARSHAM	–	–	–	–	–	+	–
* *Pachybrachys hieroglyphicus* (LAICHARTING)	+	+	+	–	+	+	–
Pachybrachys suturalis WEISE	–	+	–	–	+	+	–
Pachybrachys flexuosus WEISE	–	–	–	–	+	+	–
* *Pachybrachys sinuatus* MULSANT et REY	+	–	+	–	+	+	–
Pachybrachys tesselatus OLIVIER	+	+	+	+	–	+	+
Pachybrachys picus WEISE	+	–	–	–	–	–	–
Pachybrachys limbatus MÉNÉTRIÉS	+	+	–	–	+	+	+
Pachybrachys fimbriolatus SUFFRIAN	+	–	+	–	+	+	–
Cryptocephalus informis SUFFRIAN	+	–	–	–	–	+	–
Cryptocephalus prusias SUFFRIAN	–	–	–	–	–	+	–
Cryptocephalus sinuatus HAROLD	–	–	–	–	–	+	–
Cryptocephalus coryli (LINNÉ)	+	–	+	–	–	+	–
Cryptocephalus cordiger (LINNÉ)	+	+	+	–	–	+	–
Cryptocephalus octopunctatus (SCOPOLI)	+	+	+	–	–	+	–
Cryptocephalus sexpunctatus (LINNÉ)	+	–	+	–	–	–	–
Cryptocephalus quinquepunctatus (SCOPOLI)	+	–	+	–	–	+	–
Cryptocephalus ilicis OLIVIER	–	–	–	–	+	–	+
Cryptocephalus imperialis LAICHARTING	+	+	+	–	+	+	+
Cryptocephalus trimaculatus ROSSI	+	+	–	–	+	+	–
Cryptocephalus bipunctatus (LINNÉ)	+	+	+	–	+	+	–
Cryptocephalus biguttatus (SCOPOLI)	+	–	+	–	–	+	–
Cryptocephalus 14-*maculatus* SCHNEIDER	–	–	+	–	–	+	–
Cryptocephalus reitteri WEISE	+	–	–	–	–	–	–

DOI: 10.21248/contrib.entomol.16.3-4.347-380

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

Tabelle (Fortsetzung)

	Jugoslawien				Albanien	Bulgarien	Griechenland
	Bosnien-Herzegowina	Montenegro	Serbien	Mazedonien			
Cryptocephalus gamma Herrich-Schäffer	–	–	–	–	–	+	–
Cryptocephalus apicalis Gebler	+	–	+	–	–	+	–
Cryptocephalus villosulus Suffrian	+	–	–	–	–	+	–
Cryptocephalus schaefferi Schrank	+	–	+	–	–	+	–
Cryptocephalus aureolus Suffrian	+	+	+	–	–	+	–
Cryptocephalus sericeus (Linné)	+	+	+	–	+	+	–
Cryptocephalus hypochoeridis transiens Franz	+	+	–	–	+	–	–
Cryptocephalus concolor Suffrian	–	–	–	–	–	+	–
Cryptocephalus violaceus Laicharting	+	+	+	+	+	+	–
Cryptocephalus gridellii Burlini	+	–	+	–	–	–	–
Cryptocephalus elongatus Germar	+	–	+	–	–	+	–
Cryptocephalus nitidus (Linné)	+	+	+	–	–	+	–
Cryptocephalus nitidulus Fabricius	+	–	–	–	–	–	–
Cryptocephalus punctiger Paykull	+	–	–	–	–	–	–
Cryptocephalus janthinus Germar	–	–	–	–	+	+	–
Cryptocephalus parvulus Mueller	+	–	+	–	–	+	–
Cryptocephalus bicolor Eschscholtz	+	–	–	–	–	–	–
Cryptocephalus marginatus Fabricius	+	–	–	–	–	+	–
Cryptocephalus pini (Linné)	+	–	+	–	+	–	–
Cryptocephalus frenatus Laicharting	+	–	+	–	+	+	–
Cryptocephalus moraei (Linné)	+	+	+	+	+	+	+
Cryptocephalus octacosmus Bedel	+	+	–	–	+	+	+
Cryptocephalus sexpustulatus Villers	–	+	–	–	+	–	–
Cryptocephalus quadriguttatus Richter	+	–	+	–	–	+	–
* *Cryptocephalus quadripustulatus* Gyllenhal	+	+	+	–	+	–	–
* *Cryptocephalus flavipes* Fabricius	+	+	+	–	+	+	–
Cryptocephalus signatifrons Suffrian	+	–	+	–	+	+	–
Cryptocephalus turcicus Suffrian	+	+	–	+	+	+	+
Cryptocephalus vittatus Fabricius	–	–	+	–	–	–	–
Cryptocephalus bilineatus (Linné)	+	–	+	–	–	+	–
Cryptocephalus elegantulus Gravenhorst	+	+	+	+	+	–	–
Cryptocephalus strigosus Germar	+	–	+	+	–	–	–
Cryptocephalus chrysopus Gmelin	+	+	+	–	–	+	–
Cryptocephalus frontalis Marsham	–	–	–	–	–	+	–
Cryptocephalus ocellatus Draparnaud	+	+	+	–	+	+	+
Cryptocephalus querceti Suffrian	+	+	–	–	–	–	–
Cryptocephalus labiatus (Linné)	+	+	+	–	+	+	–

DOI: 10.21248/contrib.entomol.16.3-4.347-380

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

Tabelle (Fortsetzung)

	Jugoslawien						
	Bosnien-Herzegowina	Montenegro	Serbien	Mazedonien	Albanien	Bulgarien	Griechenland
Cryptocephalus exiguus SCHNEIDER	—	—	—	—	—	+	—
Cryptocephalus pygmaeus FABRICIUS	+	+	+	—	—	+	—
Cryptocephalus vittula SUFFRIAN	—	—	+	—	+	—	—
* *Cryptocephalus connexus* OLIVIER	+	+	+	+	+	+	—
* *Cryptocephalus fulvus* GOEZE	+	+	—	—	+	—	—
Cryptocephalus macellus SUFFRIAN	+	+	—	—	+	—	+
Cryptocephalus planifrons WEISE	—	—	—	—	—	+	—
Cryptocephalus pusillus FABRICIUS	+	+	—	—	+	—	—
Cryptocephalus rufipes GOEZE	+	—	—	—	—	—	—
Lamprosominae							
Lamprosoma concolor STURM	+	—	+	—	—	—	—
Eumolpinae							
Eupales ulema (GERMAR)	+	+	+	—	+	+	+
Macrocoma balcanica APFELBEK	—	—	—	—	—	+	—
Adoxus obscurus (LINNÉ)	+	—	+	—	—	+	—
* *Pachnephorus pilosus* ROSSI	+	—	+	—	+	+	—
Pachnephorus tesselatus (DUFTSCHMID)	+	—	+	—	—	+	—
Pachnephorus villosus (DUFTSCHMID)	+	+	+	—	+	+	—
Pachnephorus canus WEISE	—	—	—	—	—	—	+
Pachnephorus cylindricus LUCAS	—	—	—	—	—	—	+
Pachnephorus graecus PIC	—	—	—	—	—	—	+
Colaspidea oblonga BLANCH	+	—	—	—	—	—	—
Chrysochus asclepiadeus PALLAS	+	—	+	—	—	+	—
Chrysomelinae							
Leptinotarsa 10-*lineata* SAY	?	?	?	?	—	—	—
Crosita salviae (GERMAR)	+	—	—	—	—	+	—
Chrysomela fimbrialis avulsa BECHYNÉ	+	—	—	—	—	—	—
Chrysomela cribrosa AHRENS	+	—	—	—	—	—	—
Chrysomela milleri WEISE	+	—	—	—	—	—	—
Chrysomela coerulea OLIVIER	+	+	+	—	+	+	—
Chrysomela rufa DUFTSCHMID	+	—	+	—	—	—	—
Chrysomela purpurascens GERMAR	+	+	—	—	—	+	—
Chrysomela crassimargo GERMAR	+	—	—	—	—	—	—
Chrysomela hemisphaerica GERMAR	+	—	—	—	—	—	—
Chrysomela marcasitica GERMAR	+	+	—	—	—	—	—
Chrysomela globosa PANZER s. str.	+	—	—	—	—	—	—
Chrysomela globosa reprehensa BECHYNÉ	—	—	—	—	—	+	—
Chrysomela crassicollis SUFFRIAN	+	—	—	—	—	+	—

DOI: 10.21248/contrib.entomol.16.3-4.347-380

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

Tabelle (Fortsetzung)

	Jugoslawien				Albanien	Bulgarien	Griechenland
	Bosnien-Herzegowina	Montenegro	Serbien	Mazedonien			
Chrysomela vernalis BRULLÉ	+	+	+	+	+	+	+
ssp. *heeri* HERRICH-SCHÄFFER	+	–	–	–	+	+	–
ssp. *muchei* MOHR	–	–	–	–	–	+	–
ssp. *ottomana* WEISE	–	–	–	–	+	+	+
Chrysomela minckwitzi APFELBEK	+	–	–	–	–	–	–
ssp. *pentheri* APFELBEK	–	+	–	–	–	–	–
ssp. *winneguthi* G. MUELLER	–	–	–	–	+	–	–
Chrysomela turca FAIRMAIRE	?	?	–	–	?	+	–
Chrysomela haemoptera LINNÉ	+	+	+	+	+	+	+
Chrysomela rossia ILLIGER	+	–	+	–	–	+	+
Chrysomela diversipes BEDEL	+	–	+		+	+	–
Chrysomela limbata FABRICIUS	+	+	+	+	+	+	–
Chrysomela orientalis thraeissa BECHYNE	–	–	–	–	–	–	+
Chrysomela lurida LINNÉ	+	–	+	+	+	+	–
Chrysomela banksi FABRICIUS	–	–	–	–	–	–	+
Chrysomela gypsophilae KUESTER	–	+	+	+	+	+	–
Chrysomela staphylea LINNÉ	+	–	+	+	–	+	–
Chrysomela sanguinolenta LINNÉ	+	+	+	–	–	+	–
Chrysomela marginalis DUFTSCHMID	+	–	+	–	–	+	–
Chrysomela marginata LINNÉ	+	+	+	–	–	+	–
Chrysomela orichalcia MUELLER	+	+	–	–	+	+	+
Chrysomela geminata PAYKULL	+	–	+	–	–	+	–
Chrysomela hyperici FORSTER	+	–	+	–	+	+	–
Chrysomela didymata SCRIBA	+	–	–	–	–	–	–
* *Chrysomela americana* LINNÉ	–	+	–	–	+	–	–
Chrysomela cerealis LINNÉ	+	+	+	–	+	+	–
Chrysomela coerulans SCRIBA	+	–	+	–	–	+	–
Chrysomela graminis LINNÉ	+	–	+	–	–	+	–
Chrysomela herbacea DUFTSCHMID	+	+	+	+	+	+	+
Chrysomela varians SCHALLER	+	–	+	+	–	+	–
Chrysomela polita LINNÉ	+	+	+	+	+	+	+
Chrysomela grossa FABRICIUS	+	+	–	–	–	–	–
Chrysomela lutea PETAGNA	+	–	–	–	+	–	–
Dlochrysa fastuosa (SCOPOLI)	+	+	+	+	+	+	+
Chrysochloa rugulosa ssp. *serbica* APFELBEK	+	–	+	–	–	+	–
Chrysochloa intricata (GERMAR) s. str.	–	–	+	–	–	+	–
ssp. *anderschi* (DUFTSCHMID)	+	+	–	+	+	–	–
Chrysochloa alpestris (SCHUMMEL)	–	–	+	–	–	+	–
Chrysochloa gloriosa prestiosa (SUFFRIAN)	+	–	–	–	–	–	–
Chrysochloa gloriosa bosnica APFELBEK	+	+	+	–	–	–	–
Chrysochloa variabilis (WEISE) s. str.	–	–	+	–	–	+	–

DOI: 10.21248/contrib.entomol.16.3-4.347-380

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

Tabelle (Fortsetzung)

	Jugoslawien				Albanien	Bulgarien	Griechenland
	Bosnien-Herzegowina	Montenegro	Serbien	Mazedonien			
Chrysochloa variabilis croatica (WEISE)	+	–	–	–	–	–	–
Chrysochloa variabilis imitatrix APFELBEK	+	–	+	+	–	–	–
Chrysochloa bifrons (FABRICIUS)	+	–	–	–	–	–	–
Chrysochloa viridis (DUFTSCHMID)	?	–	–	–	–	–	–
Chrysochloa retenta (WEISE)	?	–	?	–	–	–	–
Chrysochloa retenta herzegovinensis BECHYNÉ	+	–	–	–	–	–	–
Chrysochloa retenta schipkana JAKOB	–	–	–	–	–	+	–
Chrysochloa virgulata (GERMAR)	+	–	+	+	–	+	–
Chrysochloa virgulata ljubetensis APFELBEK	–	–	–	–	+	+	–
Chrysochloa cacaliae dinarica APFELBEK	+	–	+	+	–	+	–
Chrysochloa cacaliae albanica G. MUELLER	–	+	–	–	+	–	–
Chrysochloa speciosissima (SCOPOLI)	+	–	+	–	–	+	–
Colaphellus sophiae (SCHALLER)	–	–	+	–	–	+	–
Gastroidea polygoni (LINNÉ)	+	–	+	–	–	+	–
Gastroidea analis REITTER	+	–	–	–	–	–	–
Gastroidea viridula (DEGEER)	+	+	+	–	–	+	–
Phaedon laevigatus DUFTSCHMID	+	–	+	–	–	–	–
Phaedon cochleariae (FABRICIUS)	+	+	+	+	+	+	+
Phaedon armoraciae (LINNÉ)	+	+	+	–	–	+	+
Phaedon pyritosus (ROSSI)	+	–	+	–	–	–	+
Phaedon segnis WEISE	+	–	–	–	–	–	–
Sclerophaedon carniolicus (GERMAR)	+	–	–	–	–	–	–
Hydrothassa aucta (FABRICIUS)	+	–	–	–	–	–	–
Hydrothassa flavocincta BRULLÉ	+	+	–	–	+	–	+
Prasocuris phellandrii (LINNÉ)	+	–	+	–	–	–	+
Prasocuris junci (BRAHM)	+	–	+	–	–	+	+
Plagiodera versicolora LAICHARTING	+	+	+	+	+	+	+
Melasoma aenea (LINNÉ)	+	–	+	–	–	–	–
Melasoma cuprea (FABRICIUS)	+	–	+	–	–	+	–
Melasoma vigintipunctata (SCOPOLI)	+	+	+	+	+	+	+
Melasoma collaris (LINNÉ)	+	+	+	+	+	+	+
Melasoma populi (LINNÉ)	+	+	+	+	+	+	+
* *Melasoma tremulae* (FABRICIUS)	–	–	–	–	+	+	–
Melasoma saliceti WEISE	+	–	+	–	–	–	+
Phytodecta viminalis (LINNÉ)	+	–	+	–	–	–	–
Phytodecta rufipes (DEGEER)	+	–	–	–	–	+	–
Phytodecta linnaeanus (SCHRANK)	+	–	+	–	–	–	–
Phytodecta fornicatus BRUEGGEMANN	+	+	+	+	+	+	+
Phytodecta quinquepunctatus (FABRICIUS)	+	+	+	–	–	–	–

DOI: 10.21248/contrib.entomol.16.3-4.347-380

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

Tabelle (Fortsetzung)

	Jugoslawien						
	Bosnien-Herzegowina	Montenegro	Serbien	Mazedonien	Albanien	Bulgarien	Griechenland
Phytodecta pallidus (LINNÉ)	+	–	–	–	–	+	–
Phyllodecta vulgatissima (LINNÉ)	+	–	–	–	–	+	–
* *Phyllodecta tibialis* (SUFFRIAN)	+	–	+	–	+	–	–
Phyllodecta antennariae APFELBEK	–	–	–	+	–	–	+
Phyllodecta vitellinae (LINNÉ)	+	+	+	–	–	+	–
Phyllodecta laticollis (SUFFRIAN)	+	–	+	–	–	–	+
Phyllodecta atrovirens CORNELIUS	+	–	–	–	+	–	–
Timarcha tenebricosa (FABRICIUS)	+	+	+	+	+	+	–
Timarcha goettingensis (LINNÉ)	+	+	+	–	–	+	–
Timarcha pratensis (DUFTSCHMID)	+	+	–	–	–	+	–
Timarcha rugulosa HERRICH-SCHÄFFER	–	–	?	–	–	–	–
Timarcha corinthia FAIRMAIRE	+	+	–	–	+	–	+
Timarcha metallica (LAICHARTING)	+	–	+	–	–	–	–
Timarcha gibba HOPPE	+	–	–	–	–	–	–
Entomoscelis sacra (LINNÉ)	–	–	–	–	–	+	–
Entomoscelis adonidis (PALLAS)	–	–	+	–	–	+	–
Entomoscelis suturalis WEISE	–	–	–	–	–	+	–
Galerucinae							
Rhaphidopalpa foveicollis LUCAS	+	–	–	–	+	–	+
Galerucella nymphaeae (LINNÉ)	+	+	+	+	+	+	+
Galerucella lineola (FABRICIUS)	+	+	+	+	+	+	+
Galerucella luteola (MUELLER)	+	+	+	+	+	+	+
Galerucella calmariensis (LINNÉ)	+	+	+	+	+	+	+
Galerucella pusilla (DUFTSCHMID)	+	+	+	+	+	+	+
Galerucella tenella (LINNÉ)	+	–	+	–	–	+	–
Galeruca tanaceti (LINNÉ)	+	+	+	+	+	+	+
Galeruca interrupta var. *circumdata* DUFTSCHMID	+	–	+	–	–	+	+
Galeruca litoralis FABRICIUS	+	+	–	–	–	–	+
Galeruca obscura JOANNIS	+	+	–	–	–	–	–
Galeruca pomonae (SCOPOLI)	–	+	+	–	+	+	+
Galeruca rufa GERMAR	+	+	+	+	+	+	+
Diorhabda elongata (BRULLÉ)	+	–	–	–	+	–	+
Lochmaea capreae (LINNÉ)	+	+	+	–	+	–	–
Lochmaea crataegi (FORSTER)	+	+	+	+	+	+	+
Phyllobrotica quadrimaculata (LINNÉ)	+	–	+	–	–	+	–
Phyllobrotica adusta (CREUTZER)	+	–	+	–	+	+	+
* *Exosoma thoracica* (REDTENBACHER)	–	–	–	–	+	–	+
Luperus circumfusus (MARSHAM)	+	–	+	+	–	+	–
Luperus pinicola (DUFTSCHMID)	–	–	–	–	+	–	–
Luperus apollinis APFELBEK	–	–	–	–	–	–	+
Luperus lydius WEISE	–	–	–	–	–	+	–

DOI: 10.21248/contrib.entomol.16.3-4.347-380

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

Tabelle (Fortsetzung)

	Jugoslawien				Albanien	Bulgarien	Griechenland
	Bosnien-Herzegowina	Montenegro	Serbien	Mazedonien			
Luperus cyanipennis KUESTER	–	+	–	–	–	–	–
Luperus xanthopoda (SCHRANK)	+	+	+	–	+	+	–
Luperus balcanicus APFELBEK	–	–	+	+	+	+	+
Luperus rugifrons WEISE	–	–	+	–	+	+	+
Luperus longicornis (FABRICIUS)	+	–	+	–	+	+	+
Luperus aetolicus KIESEWETTER	+	–	+	+	+	+	+
Luperus graecus WEISE	–	–	–	–	–	–	+
Luperus lyperus SULZER	+	–	–	–	–	–	–
Luperus flavipes (LINNÉ)	+	+	+	+	+	+	+
Luperus viridipennis GERMAR	–	+	–	–	–	+	–
Luperus flaviceps APFELBEK	+	–	–	–	–	–	–
Luperus albanicus CSIKI	–	–	–	–	+	–	.
Agelastica alni (LINNÉ)	+	+	+	+	+	+	+
Sermylassa halensis (LINNÉ)	+	–	+	–	–	–	–
Euluperus cyaneus (JOANNIS)	+	–	–	+	+	–	–
Euluperus major WEISE	–	–	–	–	–	+	–
Hispinae							
Hispella atra (LINNÉ)	+	–	–	–	+	+	+
* *Hispa testacea* LINNÉ	–	–	–	–	+	–	–
Cassidinae							
Pilemostoma fastuosa SCHALLER	+	+	–	–	+	+	–
Hypocassida subferruginea SCHRANK	+	+	+	+	+	+	+
Cassida viridis LINNÉ	+	–	+	+	+	+	–
Cassida hemisphaerica HERBST	+	–	–	–	–	–	–
Cassida canaliculata LAICHARTING	–	–	+	–	–	+	
Cassida murraea LINNÉ	+	+	–	–	+	+	–
Cassida nebulosa LINNÉ	+	–	+	–	–	+	–
Cassida flaveola THUNBERG	+	–	+	–	+	+	–
Cassida berolinensis SUFFRIAN	–	–	–	–	–	+	–
Cassida lineola CREUTZER	–	–	–	–	–	+	–
Cassida atrata FABRICIUS	+	+	–	–	+	+	+
Cassida seladonia GYLLENHAL	+	–	–	–	–	–	–
Cassida vibex LINNÉ	+	+	+	+	+	+	+
Cassida pannonica SUFFRIAN	+	–	–	–	–	+	–
Cassida ferruginea GOEZE	+	–	–	–	–	–	–
Cassida rubiginosa MUELLER s. str.	+	+	–	+	–	+	–
Cassida rubiginosa ssp. *graeca* KRAATZ	–	–	–	–	+	–	+
Cassida stigmatica SUFFRIAN	+	–	+	–	–	–	–
Cassida inquinata BRULLÉ	–	–	–	–	+	+	–
Cassida sanguinosa SUFFRIAN	+	–	–	–	–	–	–
Cassida rufovirens rhilensis WEISE	–	–	–	–	–	+	–

DOI: 10.21248/contrib.entomol.16.3-4.347-380

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

Tabelle (Fortsetzung)

	Jugoslawien				Albanien	Bulgarien	Griechenland
	Bosnien-Herzegowina	Montenegro	Serbien	Mazedonien			
Cassida aurora WEISE	+	–	–	–	–	–	–
Cassida sanguinolenta MUELLER	+	–	+	–	+	+	–
Cassida subreticulata SUFFRIAN	+	–	–	+	+	–	–
Cassida prasina ILLIGER	+	+	+	–	+	+	–
Cassida margaritacea SCHALLER	+	–	+	–	+	+	–
Cassida nobilis LINNÉ	+	+	+	–	–	+	–
Cassida vittata VILLERS	+	–	–	–	–	+	+
Anzahl der Arten (incl. einiger Unterarten): 335 (339)	250 (254)	108 (109)	168 (171)	49 (50)	129 (130)	209	76

Verzeichnis der Chrysomelidae Albaniens (exclusive Halticinae)

Donacia polita KUNZE, 1818

Verbreitung: Mediterrangebiete Europas und Afrikas.

Literaturangaben: 1 Exemplar Star Karbunara bei Lushnja, nach SCHATZMAYR (1943).

Donacia bicolora ZSCHACH, 1788

Verbreitung: Europa, Kaukasus, Sibirien. Von der Balkanhalbinsel bisher aus Bosnien, Herzegowina und Serbien gemeldet. Erstnachweis für Albanien!

Untersuchtes Material: 1 Exemplar
Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 25.—29. VII. 1961, DEI.

Donacia freyi GOECKE, 1940

Verbreitung: Albanien.

Literaturangaben: Von GOECKE, H. (1960) für Albanien angegeben.

Lema cyanella (LINNÉ, 1758)
[= *puncticollis* CURTIS, 1830]

Verbreitung: Europa, Sibirien, Japan. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien und Serbien gemeldet. Erstnachweis für Albanien!

Untersuchtes Material: 1 Exemplar
Umg. Durres, 6. IX. 1959, leg. KLAUSNITZER.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.16.3-4.347-380

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

Crioceris paracenthesis (LINNÉ, 1767)

Verbreitung: Südeuropa. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Herzegowina, Albanien, Montenegro und Griechenland gemeldet.

Literaturangaben: Von APFELBEK (1916) aus Dulcigno, dem heutigen Ulcinj/Montenegro, und von CSIKI (1940) aus Kula Ljums [Kula e Lumës] 6. VII. 1918, gemeldet.

Lilioceris lilii (SCOPOLI, 1763)

Verbreitung: Europa. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Herzegowina, Montenegro, Serbien und Bulgarien gemeldet. Erstnachweis für Albanien!

Untersuchtes Material: 1 Exemplar
Tomor, Kloster Abbas Ali, 200 m, 8.—10. VI. 1961, DEI.

Labidostomis longimana (LINNÉ, 1761)

Verbreitung: Europa, Sibirien. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Herzegowina, Albanien, Montenegro, Serbien und Bulgarien bekannt.

Untersuchtes Material: 18 Exemplare
1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI.—2. VII. 1961, DEI;
9 Ex. Nordalbanische Alpen bei Thethi, Shalabach-Tal, 1.—4. VIII. 1961, DEI;
8 Ex. Bizë bei Shëngjergji, 10.—15. VIII. 1961, DEI.

Literaturangaben: Von CSIKI (1940) vom Korab, 26. VII. 1918 gemeldet.

Labidostomis pallidipennis (GEBLER, 1830)

Verbreitung: Österreich, Südeuropa, Sibirien. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Herzegowina, Montenegro, Serbien und Bulgarien bekannt. Die ssp. *pilicollis* LACORDAIRE wird für Albanien angegeben.

Untersuchtes Material: 4 Exemplare
Dajti, Südhang 900 m, 30. VI. 1961, DEI.

Literaturangaben: G. MUELLER (1949—53) meldet die ssp. *pilicollis* LACORDAIRE von Tirana.

Labidostomis cyanicornis GERMAR, 1817

Verbreitung: Mittel- bis Südeuropa. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Albanien, Montenegro, Serbien und Bulgarien bekannt.

Literaturangaben: Von CSIKI (1940) aus Kula Ljums [Kula e Lumës], 8. VII. 1918 gemeldet.

Miopristis dentipes (OLIVIER, 1808)

Verbreitung: Südeuropa, Afrika. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Herzegowina, Montenegro gemeldet. Erstnachweis für Albanien!

DOI: 10.21248/contrib.entomol.16.3-4.347-380

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

Untersuchtes Material: 3 Exemplare
1 Ex. Borshi südlich Vlora, Mali i Çorajt, 700—1100 m, 14.—27. V. 1961, DEI;
1 Ex. Uji Ftothe südl. Tepelena, 200 m, 29.—31. V. 1961, DEI;
1 Ex. Poliçan westlich Tomor, 500 m, 2.—12. VI. 1961, DEI.

Lachnaea sexpunctata (Scopoli, 1763)

Verbreitung: Mittel- und Südeuropa. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Herzegowina, Albanien, Montenegro, Serbien und Bulgarien bekannt.

Untersuchtes Material: 17 Exemplare
5 Ex. Borshi südl. Vlora, Flußufer des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI;
6 Ex. Lukova nördlich von Saranda, 250 m, 24. V. 1961, DEI;
1 Ex. Poliçan westl. Tomor, 500 m, 2.—12. VI. 1961, DEI;
2 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
3 Ex. Mali me Gropë, Livadhet e Selitës, 1000—1100 m, 3.—8. VII. 1961, DEI.

Literaturangaben: Von Csiki (1940) werden Kula Ljums [Kula e Lumës], 2. VII. 1918 und Stičen [Shtiqën], 9. VII. 1918 als albanische Fundorte aufgeführt.

Antipa macropus (Illiger, 1800)

Verbreitung: Südeuropa (nördlich bis Österreich), Rußland, Persien, Syrien. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien und Albanien gemeldet.

Literaturangaben: Von Csiki (1940) aus Kula Ljums [Kula e Lumës], 3. VIII. 1918 und Montes Djalica Ljums [Mali i Gjalicës] (1000—1500 m), 13. VII. 1918, angegeben.

Clytra novempunctata Olivier, 1808

Verbreitung: Mediterrangebiete Europas. Von der Balkanhalbinsel aus Serbien und Bulgarien bekannt. Erstnachweis für Albanien!

Untersuchtes Material: 1 Exemplar
Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI.—2. VII. 1961, DEI.

Clytra laeviuscula Ratzeburg, 1837

Verbreitung: Europa, Sibirien, Japan. Von der Balkanhalbinsel aus Herzegowina, Albanien, Montenegro, Serbien und Bulgarien gemeldet.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar
Nordalbanische Alpen, Thethi, Shalabach-Tal, 1100—1200 m, 1.—4. VIII. 1961, DEI.

Literaturangaben: Von Csiki (1940) für Kula Ljums [Kula e Lumës], 6. VII. 1918 angegeben.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.16.3-4.347-380

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

Clytra atraphaxidis PALLAS, 1773

Verbreitung: Südeuropa, Kleinasien. Von der Balkanhalbinsel aus Bulgarien und Griechenland bekannt. Erstnachweis für Albanien!

Untersuchtes Material: 2 Exemplare
Vlora, VII. 1958, leg. GREBENŠČIKOV, DEI.

Cyaniris tibialis (BRULLÉ, 1832)

Verbreitung: Griechenland, Bulgarien, Kleinasien. Erstnachweis für Albanien!

Untersuchtes Material: 4 Exemplare
Borshi südl. Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI.

Cyaniris cyanea (FABRICIUS, 1775)

Verbreitung: Europa, Sibirien, Japan.

Literaturangaben: 1 Exemplar Lushnja nach SCHATZMAYR (1943).

Cyaniris aurita (LINNÉ, 1766)

Verbreitung: Europa, Sibirien, Japan. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Herzegowina, Montenegro, Serbien und Bulgarien angegeben. Erstnachweis für Albanien!

Untersuchtes Material: 1 Exemplar
Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI.

Cyaniris xanthaspis (GERMAR, 1824)

Verbreitung: Mittel- und Südeuropa, Syrien. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Montenegro, Serbien und Bulgarien gemeldet. Erstnachweis für Albanien!

Untersuchtes Material: 5 Exemplare

1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;

1 Ex. Dajti, Südhang, Wiese, 900 m, 30. VI. 1961, DEI;

3 Ex. Mali me Gropë, Livadhet e Selitës, 1000—1100 m, 3.—8. VII. 1961, DEI.

Coptocephala unifasciata (SCOPOLI, 1766)

Verbreitung: Europa, Syrien. Von der Balkanhalbinsel aus Serbien, Bulgarien und Nordalbanien gemeldet.

Literaturangaben: Von APFELBEK (1916) aus Oroshi gemeldet. CSIKI (1940) meldet die Art von Ura i Lopez [Brücke südl. Bicaj] und von Djakova heute Südserbien.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.16.3-4.347-380

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

Coptocephala rubicunda (LAICHARTING, 1781)

Verbreitung: Mittleres Europa. Von der Balkanhalbinsel aus Albanien gemeldet.

Literaturangaben: Von CSIKI (1940) vom Korab (1600—1800 m), 22. VII. 1918, angegeben.

Stylosomus flavus MARSEUL, 1875

Verbreitung: Südosteuropa: Albanien, Mazedonien, Griechenland, europäischer Teil der UdSSR.

Literaturangaben: G. MUELLER (1948) gibt Durazzo [Durresi] als Fundstelle an.

Pachybrachys hieroglyphicus (LAICHARTING, 1781)

Verbreitung: Europa, Sibirien. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Montenegro, Serbien, Mazedonien, Bulgarien bekannt geworden. Erstnachweis für Albanien!

Untersuchtes Material: 2 Exemplare
Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25.—29. VII. 1961, DEI.

Literaturangaben: CSIKI (1940) meldet die Art von der gleichen Stelle: Kula Ljums [Kula e Lumës], 5. VII. 1918.

Pachybrachys suturalis WEISE, 1882

Verbreitung: Mitteleuropa. Von der Balkanhalbinsel aus Albanien, Montenegro und Bulgarien gemeldet.

Literaturangaben: CSIKI (1940) fand diese Art bei Kula Ljums [Kula e Lumës], 5. VII. 1918.

Pachybrachys flexuosus WEISE, 1882

Verbreitung: Südosteuropa, von der Balkanhalbinsel aus Albanien und Bulgarien bekannt geworden.

Literaturangaben: CSIKI (1940) meldet diese Art von Kula Ljums [Kula e Lumës], 4. VII. 1918.

Pachybrachys sinuatus MULSANT et REY, 1859
[= *haliciensis* MILLER, 1868]

Verbreitung: Mittel- bis Südeuropa. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Serbien und Bulgarien gemeldet. Erstnachweis für Albanien!

Untersuchtes Material: 2 Exemplare
Nordalbanische Alpen bei Thethi, Shalabachtal, 900—1200 m, 1.—4. VIII. 1961, DEI.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.16.3-4.347-380

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

Pachybrachys limbatus MÉNÉTRIÉS, 1838

Verbreitung: Südosteuropa. Von der Balkanhalbinsel aus Herzegowina, Albanien, Montenegro, Griechenland und Bulgarien gemeldet.

Untersuchtes Material: 3 Exemplare
2 Ex. Borshi südlich Vlora, Mali i Çorajt, 700—1100 m, 14.—27. V. 1961, DEI;
1 Ex. Poliçan westlich Tomor, 2.—12. VI. 1961, DEI.

Literaturangaben: Von APFELBEK (1916) aus Oroshi und von CSIKI (1940) von Kula Ljums [Kula e Lumës], 4. VII. 1918 angegeben.

Pachybrachys fimbriolatus SUFFRIAN, 1848

Verbreitung: Mitteleuropa. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Albanien, Serbien und Bulgarien gemeldet.

Untersuchtes Material: 4 Exemplare
Lurja östlich Kurbneshi, 19.—24. VII. 1961, DEI.

Literaturangaben: CSIKI (1940) fand diese Art im Korab, 1750 m, am 26. VII. 1917.

Cryptocephalus ilicis OLIVIER, 1808

Verbreitung: Südeuropa, von der Balkanhalbinsel aus Griechenland und Albanien gemeldet.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar
Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI, dieses Ex. gehört zur ab. *etruscus* WEISE.

Literaturangaben: BURLINI (1955) gibt diese Art aus Scutari [Shkodra] an, die ab. *etruscus* WEISE meldet er aus „Albanien".

Cryptocephalus imperialis LAICHARTING, 1781

Verbreitung: Mittel- und Südeuropa. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Herzegowina, Albanien, Montenegro, Bulgarien und Griechenland bekannt geworden.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare
Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse, 50—150 m, 14.—27. V. 1961, DEI.

Literaturangaben: CSIKI (1940) fand diese Art bei Kula Ljums [Kula e Lumës] am 4. VII. 1918.

Cryptocephalus trimaculatus ROSSI, 1790

Verbreitung: Europa, Sibirien. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Herzegowina, Albanien, Montenegro und Bulgarien gemeldet.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.16.3-4.347-380

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

Untersuchtes Material: 2 Exemplare
1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. V. 1961, DEI;
1 Ex. Poliçan westlich Tomor, 500 m, 2.—12. VI. 1961, DEI.

Literaturangaben: Von Csiki (1940) bei Kula Ljums [Kula e Lumës] am 6. VII. 1918 gesammelt.

Cryptocephalus bipunctatus (Linné, 1758)

Verbreitung: Europa, Sibirien. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Herzegowina, Albanien, Serbien, Montenegro und Bulgarien gemeldet.

Untersuchtes Material: 13 Exemplare
4 Ex. Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse, 50—150 m, 14.—27. V. 1961, DEI;
1 Ex. ebenda, SW-Hang, 200—400 m;
1 Ex. Uji Ftohte südlich Tepelena, 200 m, 29.—31. V. 1964, DEI;
4 Ex. Poliçan westlich Tomor, 500 m, 2.—12. VI. 1961, DEI;
3 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI.

Literaturangaben: Csiki (1940) sammelte diese Art im Korab, 1600—1800 m am 22. VIII. 1918, ebenda, 1750 m, am 26. VII. 1918 und bei Stičen [Shtiqën], 9. VII. 1917.

Cryptocephalus sericeus (Linné, 1758)

Verbreitung: Europa, Kleinasien, Sibirien. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Herzegowina, Albanien, Montenegro, Serbien und Bulgarien bekannt geworden.
Untersuchtes Material: 33 Exemplare
1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Dajti, Westhang, 1100 m, 29. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI.—2. VII. 1961, DEI;
5 Ex. Mali me Gropë, Livadhet e Selitës, 1000—1100 m, 3.—8. VII. 1961, DEI;
2 Ex. Mali me Gropë, Dolinengebiet, 1300 m, 6. VII. 1961, DEI;
16 Ex. Bizë bei Shëngjergji, 1400—1500 m, 10.—15. VII. 1961, DEI;
6 Ex. Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura, 1300 m, 19.—24. VII. 1961, DEI;
1 Ex. Nordalbanische Alpen, Thethi, Shalabachtal, 900—1200 m, 1. — 4. VIII. 1961, DEI.

Literaturangaben: Csiki (1940) gibt diese Art von Kula Ljums [Kula e Lumës], 2. und 11. VII. 1918 sowie von Tropaja, 3. VIII. 1917, an.

Cryptocephalus hypochoeridis (Linné, 1758)

Verbreitung: Europa, Sibirien. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Herzegowina, Albanien und Montenegro gemeldet.

Untersuchtes Material: 21 Exemplare
Alle Tiere der Ausbeute des Deutschen Entomologischen Institutes gehören nach angestellten Penisuntersuchungen der ssp. *transiens* Franz an.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.16.3-4.347-380

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

1 Ex. Poliçan westlich Tomor, 500 m, 2.—12. VI. 1961, DEI;
6 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI.—2. VII. 1961, DEI;
3 Ex. ebenda, Südhang, Wiese, 900 m, 30. VI. 1961, DEI;
8 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
2 Ex. Bizë bei Shëngjergji, 1400—1500 m, 10.—15. VII. 1961, DEI;
2 Ex. Nordalbanische Alpen, Thethi, Shalabachtal, 900—1200 m, 1.—4. VIII. 1961, DEI.

Literaturangaben: Csiki (1940) meldet die Art vom Korab, 1750 m, 26. VII. 1918. Von Schatzmayr (1943) aus Lushnja gemeldet.

Cryptocephalus violaceus Laicharting, 1781

Verbreitung: Europa. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Herzegowina, Albanien, Montenegro, Serbien und Bulgarien bekannt geworden.

Untersuchtes Material: 26 Exemplare
1 Ex. Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse, 50—150 m, 14.—27. V. 1961, DEI;
2 Ex. ebenda, 200—400 m;
1 Ex. Poliçan westlich Tomor, 500 m, 2.—12. VI. 1961, DEI;
4 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI.—2. VII. 1961, DEI;
4 Ex. ebenda, Südhang, 900 m, 30. VI. 1961, DEI;
3 Ex. Uji Ftohte südlich Tepelena, 200 m, 29.—31. V. 1961, DEI;
1 Ex. Mali me Gropë, Dolinengebiet, 1300 m, 6. VII. 1961, DEI;
1 Ex. ebenda, Livadhet et Selitës, 1000—1100 m, 3.—8. VII. 1961, DEI;
3 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
6 Ex. Bizë bei Shëngjergji, 1400—1500 m, 10.—15. VII. 1961, DEI.

Literaturangaben: Csiki (1940) gibt diese Art vom Korab, 1700 m, 26. VII. 1918 an.

Cryptocephalus janthinus Germar, 1824

Verbreitung: Mittel- und Südeuropa, Sibirien. Von der Balkanhalbinsel aus Albanien und Bulgarien gemeldet.

Untersuchtes Material: 10 Exemplare
Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25.—29. VII. 1961, DEI.

Literaturangaben: Burlini (1955) gibt diese Art aus „Albanien" an.

Cryptocephalus pini (Linné, 1758)

Verbreitung: Europa, Westsibirien. Von der Balkanhalbinsel aus der Herzegowina, Albanien und Jugoslawien gemeldet.

Literaturangaben: Apfelbek (1916) meldet diese Art aus Merdita [Mirdita] und Oroshi.

Cryptocephalus frenatus Laicharting, 1781

Verbreitung: Mittleres Europa. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Herzegowina, Albanien, Serbien und Bulgarien gemeldet.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.16.3-4.347-380

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

Literaturangaben: Csiki (1940) sammelte diese Art bei Kula Ljums [Kula e Lumës] am 5. VII. 1918.

Cryptocephalus moraei (Linné, 1758)

Verbreitung: Europa, Westsibirien. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Herzegowina, Albanien, Montenegro, Serbien, Bulgarien und Griechenland gemeldet.

Untersuchtes Material: 52 Exemplare
4 Ex. Borshi südlich Vlora, 200—400 m, 14.—27. V. 1961, DEI;
4 Ex. ebenda, litorale Terrasse, 50—150 m;
1 Ex. Lukova nördlich Saranda, 250 m, 24. V. 1961, DEI;
1 Ex. Saranda, 28. V. 1961, DEI;
1 Ex. Uji Ftohte südlich Tepelena, 200 m, 29.—31. V. 1961, DEI;
3 Ex. Poliçan westlich Tomor, 500 m, 2.—12. VI. 1961, DEI;
3 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI.—2. VII. 1961, DEI;
2 Ex. Mali me Gropë, Dolinengebiet, 1350 m, 6. VII. 1961, DEI;
1 Ex. Bizë bei Shëngjergji, 1400—1500 m, 10.—15. VII. 1961, DEI;
28 Ex. Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura, 1350 m, 19.—24. VII. 1961, DEI;
3 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25.—29. VII. 1961, DEI.

Literaturangaben: Csiki (1940) meldet die Art aus Kula Ljums [Kula e Lumës], 2. VII. 1918, Burlini (1955) nennt „Albanien" als Fundstelle.

Cryptocephalus octacosmus Bedel, 1891

Verbreitung: Mittel- und Südeuropa. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Herzegowina, Albanien, Montenegro, Bulgarien und Griechenland bekannt geworden.

Untersuchtes Material: 7 Exemplare
1 Ex. Borshi südlich Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI;
1 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Unterwuchs einer Apfelplantage, 25.—29. VII. 1961, DEI;
5 Ex. ebenda, Flußtal des Luma, 250—300 m.

Literaturangaben: Apfelbek (1916) meldet diese Art von Oroshi und Valona [Vlora], von Burlini (1955) für „Albanien" angegeben.

Cryptocephalus quadripustulatus Gyllenhal, 1913

Verbreitung: Mittel- und Nordeuropa. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Montenegro und Serbien gemeldet. Erstnachweis für Albanien!

Untersuchtes Material: 1 Exemplar
Tomor, Kloster Abbas Ali, 1800 m, 8.—10. VI. 1961, DEI.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.16.3-4.347-380

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

Cryptocephalus sexpustulatus VILLARD, 1789

Verbreitung: Nach dem WINKLER-Katalog für Südfrankreich und die Iberische Halbinsel angegeben. CSIKI (1940) meldet diese Art aus Albanien und Montenegro.

Literaturangaben: Von CSIKI (1940) von der Ura i Lopez [Brücke südl. Bicaj], 21. VII. 1918 gemeldet.

Cryptocephalus flavipes FABRICIUS, 1781

Verbreitung: Europa, Kleinasien, Sibirien. Aus der Balkanhalbinsel von Bosnien, Herzegowina, Montenegro, Serbien und Bulgarien gemeldet. Erstnachweis für Albanien!

Untersuchtes Material: 5 Exemplare
2 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Dajti, Südhang, Wiese, 900 m, 30. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Mali me Gropë, Livadhet e Selitës, 1000—1100 m, 3.—8. VII. 1961, DEI;
1 Ex. Bizë bei Shëngjergji, 1400—1500 m, 10.—15. VII. 1961, DEI.

Cryptocephalus signatifrons SUFFRIAN, 1847

Verbreitung: Mittel- und Südeuropa. Diese Art galt bisher als Aberration von *flavipes* FABRICIUS. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Herzegowina, Albanien, Serbien und Bulgarien gemeldet.

Literaturangaben: APFELBEK (1916) nennt den südalbanischen Fundort Kjore bei Valona [Vlora].

Cryptocephalus turcicus SUFFRIAN, 1847

Verbreitung: Süd- bis Südosteuropa. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Herzegowina, Albanien, Montenegro, Mazedonien und Bulgarien gemeldet.

Literaturangaben: APFELBEK (1916) und BURLINI (1955) melden diese Art aus Südalbanien bzw. „Albanien".

Cryptocephalus elegantulus GRAVENHORST, 1807

Verbreitung: Europa, Kleinasien, Sibirien. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Herzegowina, Albanien, Montenegro und Serbien gemeldet.

Untersuchtes Material: 11 Exemplare
Mali me Gropë, Livadhet e Selitës, 1000—1100 m, 3.—8. VII. 1961, DEI.

Literaturangaben: APFELBEK (1916) meldet diese Art aus dem Çukaligebirge und von Oroshi.

Cryptocephalus ocellatus DRAPARNAUD, 1819

Verbreitung: Mittel- und Südeuropa. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Herzegowina, Albanien, Montenegro, Serbien und Bulgarien angegeben.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.16.3-4.347-380

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

Literaturangaben: Csiki (1940) sammelte diese Art bei Kula Ljums [Kula e Lumës], 5.—6. VII. 1918.

Cryptocephalus labiatus (Linné, 1761)

Verbreitung: Europa, Sibirien, Mongolei. Von der Balkanhalbinsel aus Herzegowina, Albanien, Montenegro, Serbien und Bulgarien gemeldet.

Literaturangaben: Von Csiki (1940) aus Kula Ljums [Kula e Lumës], 4. VII. 1918 gemeldet.

Cryptocephalus pygmaeus Fabricius, 1792

Verbreitung: Südeuropa. Von der Balkanhalbinsel aus Herzegowina, Montenegro, Serbien und Bulgarien gemeldet.

Literaturangaben: Csiki (1940) meldet diese Art von Djakova, 29. VII. 1917, unweit der albanischen Grenze in Südserbien gelegen.

Cryptocephalus vittula Suffrian, 1848

Verbreitung: Südeuropa, Kleinasien, Syrien. Von der Balkanhalbinsel aus Jugoslawien und Albanien angegeben.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar
Umg. Durresi, 2. IX. 1959, leg. Klausnitzer.

Literaturangaben: Burlini (1955) meldet diese Art aus „Albanien".

Cryptocephalus connexus Olivier, 1807

Verbreitung: Südosteuropa. Von der Balkanhalbinsel aus Herzegowina, Montenegro, Serbien, Mazedonien und Bulgarien bekannt geworden. Erstnachweis für Albanien!

Untersuchtes Material: 14 Exemplare
3 Ex. Borshi südlich Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI, diese Tiere gehören zu der ab. *arenarius* Weise;
1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
5 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Unterwuchs einer Apfelplantage, 350 m, 25. bis 29. VII. 1961, DEI;
2 Ex. ebenda, Flußtal des Luma, 250—300 m;
1 Ex. ebenda, Luzernefeld;
1 Ex. Nordalbanische Alpen, Thethi, Shalabachtal, 900—1200 m, 1.—4. VIII. 1961, DEI;
1 Ex. Umg. Durresi, 9. IX. 1959, leg. Klausnitzer.

Cryptocephalus fulvus Goeze, 1777

Verbreitung: Europa, Westsibirien. Von der Balkanhalbinsel aus Montenegro und Bosnien bekannt. Erstnachweis für Albanien!

Untersuchtes Material: 15 Exemplare
4 Ex. Uji Ftohte südlich Tepelena, 200 m, 29.—31. V. 1961, DEI;
1 Ex. Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse, 50—150 m, 14.—27. VI. 1961, DEI;

DOI: 10.21248/contrib.entomol.16.3-4.347-380

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

6 Ex. ebenda, Flußtal des Lumi i Borshit;
4 Ex. Umg. Durresi, 2.—11. IX. 1959 leg. KLAUSNITZER.

Cryptocephalus macellus SUFFRIAN, 1860

Verbreitung: Mittel- und Südeuropa. Von der Balkanhalbinsel aus Herzegowina, Albanien, Mazedonien und Griechenland gemeldet.

Literaturangaben: APFELBEK (1916) meldet diese Art aus Südalbanien.

Cryptocephalus pusillus FABRICIUS, 1777

Verbreitung: Europa. Von der Balkanhalbinsel aus Herzegowina, Montenegro und Südalbanien bekannt geworden.

Literaturangaben: APFELBEK (1916) meldet diese Art aus Pašalimane [Pasha liman, Sumpfland in der innersten Bucht von Vlora].

Eupales ulema (GERMAR, 1813)

Verbreitung: Südosteuropa. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Herzegowina, Montenegro, Serbien, Bulgarien und Griechenland bekannt.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar
Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse, 50—150 m, 14.—27. V. 1961, DEI.

Literaturangaben: Von SCHATZMAYR (1943) für Terpan, 700 m [Ort ca. 20 km südlich Berati] angegeben.

Pachnephorus pilosus ROSSI, 1790

Verbreitung: Mittel- und Südeuropa, Kaukasus. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Herzegowina, Serbien und Bulgarien bekannt. Erstnachweis für Albanien!

Untersuchtes Material: 1 Exemplar
Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 25.—29. VII. 1961, DEI.

Pachnephorus villosus (DUFTSCHMID, 1825)

Verbreitung: Mittel- und Südeuropa, Kaukasus. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Herzegowina, Albanien, Montenegro, Griechenland und Bulgarien bekannt.

Untersuchtes Material: 3 Exemplare
Umg. Durresi, 2.—14. IX. 1959, leg. KLAUSNITZER.

Literaturangaben: APFELBEK (1916) meldet die Art aus Südalbanien.

Chrysomela coerulea OLIVIER, 1807

Verbreitung: Alpen und Karpathen. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Herzegowina, Albanien, Montenegro, Serbien und Bulgarien gemeldet.

Literaturangaben: APFELBEK (1916) meldet diese Art aus dem Munela-Gebirge bei Oroshi.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.16.3-4.347-380

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

Chrysomela vernalis Brullé, 1836

Verbreitung: Mittelmeergebiet. Nach Apfelbek (1916) über die ganze Balkanhalbinsel, nördlich bis Dalmatien verbreitet.

Untersuchtes Material: 6 Exemplare
1 ♀ Borshi südlich Vlora, SW-Hang, 200—400 m, 14.—27. V. 1961, DEI, ssp. *ottomana* Weise;
1 ♂ ebenda, Flußtal des Lumi i Borshit, ssp. *ottomana* Weise;
1 ♂, 1 ♀ Poliçan westlich Tomor, 500 m, Kulturland, 2.—12. VI. 1961, DEI, ssp. *ottomana* Weise;
1 ♂ Tomor, Kloster Abbas Ali, 1800 m, 8.—10. VI. 1961, DEI, ssp. *heeri* Herrich-Schaeffer;
1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI.—2. VII. 1961, DEI.

Literaturangaben: Bechyné (1950) gibt die ssp. *heeri* Herrich-Schaeffer für Albanien an. Schatzmayr (1943) meldet *Chrysomela vernalis* von Poggio Boschetto, 800 m, zwischen Vokpola und Bubesi.

Chrysomela minckwitzi Apfelbek, 1912

Verbreitung: Balkan. Die Rasse *minckwitzi* s. str. lebt in Bosnien, die Rasse *minckwitzi pentheri* Apfelbek wurde aus Montenegro beschrieben und die Rasse *minckwitzi winneguthi* G. Mueller aus Albanien.

Literaturangaben: G. Mueller (1948) beschreibt die ssp. *winneguthi* mit dem Fundort Mali Kolac.

Chrysomela turca Fairmaire, 1865

Diese Art, die im Südbalkan beheimatet ist, wird von Apfelbek (1916) für Dalmatien, Herzegowina, Albanien (bei Scutari [Shkodra] und Berat) sowie Montenegro aufgeführt. Nach Mueller (1948), handelt es sich hierbei um die Rasse *heeri* H.-S. von *Ch. vernalis* Brullé.

Chrysomela haemoptera Linné, 1758

Verbreitung: Europa. Nach Apfelbek (1916) Kosmopolit im ganzen Gebiet der Balkanhalbinsel.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare
1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 12.—22. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Nordalbanische Alpen bei Thethi, Shalabachtal, 900—1200 m, 1.—4. VIII. 1961, DEI.

Literaturangabe: Von Csiki (1940) aus Köztil und Plaštan [Ploshtan] angegeben.

Chrysomela diversipes Bedel, 1892
[= *violacea* Müller, 1776, sensu Weise = *goettingensis* auct.]

Verbreitung: Europa. Von der Balkanhalbinsel aus Jugoslawien, Bulgarien und Albanien gemeldet.

Literaturangabe: Von Csiki (1940) bei Kula Ljums [Kula e Lumës] gesammelt.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.16.3-4.347-380

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

Chrysomela limbata FABRICIUS, 1775

Verbreitung: Europa, Sibirien. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Herzegowina, Albanien, Montenegro, Serbien, Mazedonien und Bulgarien bekannt.

Literaturangaben: APFELBEK (1916) führt diese Art von Mal i Sheit [Mali i Shentit] bei Oroshi auf. CSIKI (1940) sammelte sie im Korab-Gebirge in 1600 bis 1800 m und in 2000 m am 22. und 23. VII. 1918.

Chrysomela lurida LINNÉ, 1767

Verbreitung: Europa, Kaukasus, Kleinasien. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Herzegowina, Albanien, Serbien, Mazedonien und Bulgarien bekannt.

Literaturangaben: Von CSIKI (1940) in Montes Skölsen [Shkelzeni], 1750 bis 2030 m, 2. VIII. 1917 gesammelt.

Chrysomela gypsophilae KUESTER, 1845

Verbreitung: Mittel- und Südeuropa. Von der Balkanhalbinsel aus Albanien, Serbien, Mazedonien und Bulgarien bekannt geworden.

Literaturangaben: APFELBEK (1916) meldet diese Art aus dem Munela-Gebirge bei Oroshi in Westalbanien. CSIKI (1940) sammelte sie bei Djakova, 10. XI. 1916 in Montenegro nahe der albanischen Grenze.

Chrysomela orichalcia MUELLER, 1776

Verbreitung: Europa, Sibirien. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Albanien, Montenegro, Bulgarien und Griechenland bekannt.

Literaturangaben: Von APFELBEK (1916) bei Oroshi gesammelt.

Chrysomela hyperici FORSTER, 1771

Verbreitung: Europa. Von der Balkanhalbinsel für Bosnien, Herzegowina, Albanien, Serbien und Bulgarien angegeben.

Literaturangaben: APFELBEK (1916) meldet diese Art für das Bojana [Buna]-Gebiet bei Oboti in Nordwestalbanien.

Chrysomela americana LINNÉ, 1758

Verbreitung: Mittelmeergebiet. Von der Balkanhalbinsel war die Art bisher nur aus Montenegro bekannt. Erstnachweis für Albanien!

Untersuchtes Material: 1 Exemplar
1 ♀ Lukova nördlich Saranda, 250 m, 24. V. 1961, DEI.

Chrysomela cerealis LINNÉ, 1767

Verbreitung: Europa. Von der Balkanhalbinsel aus Herzegowina, Serbien und Bulgarien gemeldet.

Literaturangabe: APFELBEK (1916) schreibt: „Die var. *mixta* KUESTER nach Süden bis Epirus" ohne jedoch Albanien namentlich zu erwähnen.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.16.3-4.347-380

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

Chrysomela herbacea DUFTSCHMID, 1825
[= *menthastri* SUFFRIAN, 1851]

Verbreitung: Europa, Sibirien. Über die ganze Balkanhalbinsel verbreitet.

Untersuchtes Material: 104 Exemplare
83 Ex. Borshi südlich Vlora, Flußtal Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI;
10 Ex. Uji Ftohte südlich Tepelena, 200 m, 24.—31. V. 1961, DEI;
10 Ex. Rehovica südlich Berat, 1. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Lurja östlich Kubneshi 19.—24. VII. 1961, DEI.

Literaturangabe: Terpan, 700 m [ca. 20 km südlich Berati] nach SCHATZMAYR (1943).

Chrysomela polita LINNÉ, 1758

Verbreitung: Europa, Sibirien, Kleinasien, Syrien, Mesopotamien. Von der Balkanhalbinsel aus allen Gebieten gemeldet.

Untersuchtes Material: 3 Exemplare
Borshi südlich Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI.
Literaturangaben: Von CSIKI (1940) bei Kula Ljums [Kula e Lumës], 6. VII. 1917 gesammelt.

Chrysomela lutea PETAGNA, 1819

Verbreitung: Süditalien, Sizilien, Bosnien, Albanien.

Literaturangaben: MUELLER, G. (1948) schreibt, daß diese Art von Dr. STOLFA im VII. 1939 am Llogara[-Paß] in Südalbanien gesammelt wurde.

Diochrysa fastuosa SCOPOLI, 1763

Verbreitung: Europa, Sibirien, Japan. Über die ganze Balkanhalbinsel verbreitet.

Chrysochloa intricata (GERMAR, 1824)

Verbreitung: Sudeten, Karpaten, Alpen, Balkan. Von der Balkanhalbinsel aus Serbien und Bulgarien gemeldet.

Literaturangaben: APFELBEK (1916) meldet die ssp. *anderschi* DUFTSCHMID von Bosnien bis südlich nach Metalka und Volujak. Auch BECHYNÉ (1958) gibt die Verbreitung dieser Rasse südlich bis Mazedonien und Albanien an.

Chrysochloa virgulata (GERMAR, 1824)

Verbreitung: Die einzelnen Rassen sind von den Pyrenäen über die Alpen, Sudeten, Karpaten bis in den Balkan verbreitet. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Serbien, Albanien, Mazedonien und Bulgarien gemeldet.

Literaturangaben: APFELBEK (1916) meldet eine eigene ssp. *ljubetensis* APFELBEK von Albanien.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.16.3-4.347-380

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

Chrysochloa cacaliae (SCHRANK, 1785)

Verbreitung: In einzelnen Rassen von den Alpen über die Sudeten und Karpathen bis in den Balkan verbreitet.

Literaturangaben: MUELLER, G. (1948) beschreibt aus der Waldzone der Nordalbanischen Alpen von Okol di Boga [Bogë, Dorf an der Straße westl. Thethi] und Okol di Theti [Okoli bei Thethi] eine ssp. *albanica*, die dort von Dr. STOLPA V.—VI. 1939 gesammelt wurde.

Phaedon cochleariae (FABRICIUS, 1792)

Verbreitung: Europa, Kleinasien. Über die ganze Balkanhalbinsel verbreitet.

Hydrothassa flavocincta BRULLÉ, 1832

Verbreitung: Von Dalmatien bis Griechenland verbreitet, aus Serbien und Bulgarien bisher nicht bekannt geworden.

Untersuchtes Material: 7 Exemplare
3 Ex. Borshi südlich Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI;
2 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI.—2. VII. 1961, DEI;
2 Ex. Umg. Durres, Lagune, unter Steinen, 5. IX. 1959, leg. KLAUSNITZER.

Literaturangabe: Fieri und Lushnja nach SCHATZMAYR (1943).

Plagiodera versicolora (LAICHARTING, 1781)

Verbreitung: Europa, Sibirien, Afrika. Auf der Balkanhalbinsel Kosmopolit, aus dem Hochgebirge bisher keine Meldungen.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare
Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25.—29. VII. 1961, DEI.

Melasoma vigintipunctata (SCOPOLI, 1763)

Verbreitung: Europa, Sibirien, Japan. Nach APFELBEK (1916) Kosmopolit im Gebiete.

Melasoma collaris (LINNÉ, 1758)

Verbreitung: Europa, Sibirien. Nach APFELBEK (1916) Kosmopolit im ganzen Gebiete, aus der Herzegowina bisher noch nicht bekannt geworden.

Melasoma populi (LINNÉ, 1758)

Verbreitung: Palaearktische Region. Über die ganze Balkanhalbinsel verbreitet.

Untersuchtes Material: 6 Exemplare
4 Ex. Borshi südlich Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI;
1 Ex. Mali me Gropë, Livadhet e Selitës, 1000—1100 m, 3.—8. VII. 1961, DEI;
1 Ex. Nordalbanische Alpen, Thethi, Shalabachtal, 900—1200 m, 1.—4. VIII. 1961, DEI.

Literaturangabe: Fieri, VI. 1941 nach SCHATZMAYR (1943).

DOI: 10.21248/contrib.entomol.16.3-4.347-380

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

Melasoma tremulae (Fabricius, 1787)

Verbreitung: Europa, Sibirien. Den verschiedenen Katalogen und Sammelaufzeichnungen konnten keine Angaben über die Verbreitung dieser Art über die Balkanhalbinsel entnommen werden. Erstnachweis für Albanien!

Untersuchtes Material: 3 Exemplare
Zallë Dardha am Drini i zi (nördliche Peshkopia), 24. VII. 1961, DEI.

Phytodecta fornicatus Brueggemann, 1873

Verbreitung: Mittel- und Südeuropa, über die ganze Balkanhalbinsel verbreitet.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare
1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI.—2. VII. 1961, DEI.

Literaturangaben: Karbunara bei Lushnja nach Schatzmayr (1943).

Phyllodecta tibialis (Suffrian, 1851)

Verbreitung: Mitteleuropa. Von der Balkanhalbinsel bisher aus Bosnien und Serbien bekannt. Erstnachweis für Albanien!

Untersuchtes Material: 6 Exemplare
1 Ex. Bizë bei Shëngjergji, 1400—1500 m, 10.—15. VII. 1961, DEI;
2 Ex. Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura Wiesen, 1300 m, 19.—24. VII. 1961, DEI;
3 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25.—29. VII. 1961, DEI.

Phyllodecta atrovirens Cornelius, 1857

Verbreitung: Mitteleuropa. Auf der Balkanhalbinsel von Bosnien und Albanien gemeldet.

Literaturangaben: Csiki (1940) sammelte diese Art bei Kula Ljums [Kula e Lumës] am 6. VII. 1918.

Timarcha tenebricosa Fabricius, 1775

Verbreitung: Mittel- und Südeuropa, Japan. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Albanien, Serbien, Mazedonien, Montenegro und Bulgarien bekannt.

Literaturangaben: Apfelbek (1916) gibt diese Art für das Munela-Gebirge und Mal i Sheit [Mali i Shentit] bei Oroshi an. Csiki (1940) sammelte sie im Korab bei 1750 m am 26. VII. 1918.

Timarcha corinthia Fairmaire, 1873

Verbreitung: Bosnien, Herzegowina, Albanien, Montenegro.

Literaturangaben: Apfelbek (1916) meldet die var. *albanica* Apfelbek aus Nordalbanien. Von Schatzmayr (1943) von Mali i Krujës, 1000 m, angegeben.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.16.3-4.347-380

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

Rhaphidopalpa foveicollis (LUCAS 1848)

Verbreitung: Mittelmeergebiet. Von der Balkanhalbinsel aus Dalmatien und Griechenland gemeldet. Erstnachweis für Albanien!

Untersuchtes Material: 1 Exemplar
1 ♂ Borshi südlich Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI.

Literaturangaben: APFELBEK (1916) schreibt: „Diese westmediterrane, in Griechenland häufige, auch auf Kreta vorkommende Art reicht im Westen der Balkanhalbinsel bis Dalmatien." Nach SCHATZMAYR (1943) bei Lushnja.

Galerucella nymphaeae (LINNÉ, 1758)

Verbreitung: Europa, Sibirien. Nach APFELBEK (1916) über die ganze Balkanhalbinsel verbreitet.

Galerucella lineola (FABRICIUS, 1781)

Verbreitung: Europa, Algerien. Nach APFELBEK (1916) im ganzen Gebiet der Balkanhalbinsel häufig.

Galerucella luteola (MUELLER, 1766)

Verbreitung: Europa, Sibirien. Über die ganze Balkanhalbinsel verbreitet.

Untersuchtes Material: 3 Exemplare
1 Ex. Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse, 50—150 m, 14.—27. V. 1961, DEI;
2 Ex. Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura Wiesen, 1300 m, 19.—24. VII. 1961, DEI.

Galerucella calmariensis (LINNÉ, 1767)

Verbreitung: Europa. Von APFELBEK (1916) als die gemeinste Art der Gattung auf der Balkanhalbinsel angegeben.

Galerucella pusilla (DUFTSCHMIDT, 1825)

Verbreitung: Europa. Über die ganze Balkanhalbinsel verbreitet.

Untersuchtes Material: 14 Exemplare
13 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25.—29. VII. 1961, DEI;
1 Ex. Umg. Durresi, 9. IX. 1959, leg. KLAUSNITZER.

Galeruca tanaceti (LINNÉ, 1758)

Verbreitung: Europa. Über die ganze Balkanhalbinsel verbreitet.

Untersuchtes Material: 5 Exemplare
2 Ex. Bizë bei Shëngjergji, 1400—1500 m, 10.—15. VII. 1961, DEI;
3 Ex. Dajti, Westhang, 1100 m, 29. VI. 1961, DEI.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.16.3-4.347-380

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

Galeruca littoralis FABRICIUS, 1787

Verbreitung: Mittelmeergebiet. APFELBEK (1916) vermerkt: Montenegro, Griechenland, nach Norden bis Herzegowina. Keine Ausdrückliche Erwähnung von Albanien.

Galeruca pomonae (SCOPOLI, 1763)

Verbreitung: Europa, Sibirien. Auf der Balkanhalbinsel über Bosnien, Albanien, Montenegro, Serbien, Bulgarien und Griechenland verbreitet.

Literaturangaben: APFELBEK (1916) gibt diese Art von Oroshi an.

Galeruca rufa GERMAR, 1824

Verbreitung: Mitteleuropa, Balkan, europäisches Rußland. Über die ganze Balkanhalbinsel verbreitet.

Untersuchtes Material: 7 Exemplare
1 ♂, 1 ♀ Pogradec, Ohrida-See, 700—1000 m, 8.—19. V. 1959, leg. G. FRIESE, coll. PEREIRA/Sao Paulo;
2 ♂♂, 3 ♀♀ Poliçan westlich Tomor, 500 m, 2.—12. VI. 1961, DEI.

Literaturangabe: Zwischen Berati und Këlcyra sowie bei Lushnja nach SCHATZMAYR (1943).

Diorhabda elongata (BRULLÉ, 1832)

Verbreitung: Mittelmeergebiet. Von der Balkanhalbinsel aus Herzegowina, Montenegro, Albanien und Griechenland bekannt geworden.

Literaturangaben: Nach APFELBEK (1916) in Albanien häufig.

Lochmaea capreae (LINNÉ, 1758)

Verbreitung: Europa, Sibirien, China, Japan. Nach APFELBEK (1916) im ganzen Gebiet häufig, nach Süden bis Üsküb [Skopje/Mazedonien] bekannt.

Lochmaea crataegi (FORST, 1771)

Verbreitung: Europa, Sibirien, Algerien. Nach APFELBEK (1916) über die ganze Balkanhalbinsel südlich bis Griechenland verbreitet.

Phyllobrotica adusta (CREUTZER, 1799)

Verbreitung: Mittel- und Südeuropa. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Herzegowina, Serbien, Albanien, Bulgarien und Griechenland bekannt.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare
1 Ex. Borshi südlich Vlora, SW-Hang, 200—400 m, 14.—27. V. 1961, DEI;
1 Ex. Lurja östlich Kurbneshi, Kunora e Lurës, 1400—2000 m, 19.—24. VII. 1961, DEI.

Literaturangaben: APFELBEK (1916) gibt diese Art aus der Merdita an.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.16.3-4.347-380

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

Exosoma thoracica (REDTENBACHER, 1893)

Verbreitung: Syrien, Griechenland. Erstnachweis für Albanien!

Untersuchtes Material: 5 Exemplare
1 ♂ Tomor, Kloster Abbas Ali, 1800 m, 8.—10. VI. 1961, DEI;
1 ♂, 1 ♀ Bizë bei Shëngjergji, 1400—1500 m, 10.—15. VII. 1961, DEI;
2 ♀ Dajti, Westhang, 1100 m, 29. VI. 1961, DEI.

Ich bin mir nicht sicher, ob es sich tatsächlich um die angegebene Art handelt. Dann würden die Tiere der var. *gaudioni* RHE angehören, welche sich durch schwarze Fld. auszeichnet. Sicherlich handelt es sich um eine neue Rasse, vielleicht um eine eigene Art.

Luperus pinicola (DUFTSCHMID, 1825)

Verbreitung: Nord- und Mitteleuropa. Auf der Balkanhalbinsel in den Gebirgen bis weit nach Süden verbreitet.

Literaturangaben: APFELBEK (1916) meldet diese Art aus Kjore bei Valona und Mal i Sheit [Mali i Shentit].

Luperus xanthopoda (SCHRANK, 1781)

Verbreitung: Europa, Sibirien. Im Nordteil der Balkanhalbinsel allgemein verbreitet, südlich bis Albanien, Serbien und Bulgarien.

Literaturangaben: Von APFELBEK (1916) aus der Merdita [Mirdita] angegeben.

Luperus balcanicus APFELBEK, 1912

Verbreitung: Südteil der Balkanhalbinsel: Bulgarien, Serbien, Mazedonien, Griechenland, nach WINKLER (1929—1930) auch in Albanien.

Luperus rugifrons WEISE, 1886

Verbreitung: Südliche Balkanhalbinsel. Nördlich bis Bulgarien, Serbien, Griechenland, Albanien.

Literaturangaben: Von APFELBEK (1916) vom Fandi [Fani] bei Oroshi in Westalbanien angegeben.

Luperus longicornis (FABRICIUS, 1781)

Verbreitung: Mitteleuropa, Südeuropa. Auf der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Albanien, Serbien, Bulgarien und Griechenland bekannt geworden.

Literaturangaben: APFELBEK (1916) gibt diese Art aus Oroshi an.

Luperus aetolicus KIESENWETTER, 1861

Verbreitung: Südliche Balkanhalbinsel, nördlich bis Herzegowina und Dalmatien. Keine ausdrückliche Benennung Albaniens.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.16.3-4.347-380

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

Luperus flavipes (Linné, 1767)

Verbreitung: Europa, Sibirien. Über die ganze Balkanhalbinsel verbreitet, jedoch keine ausdrückliche Erwähnung Albaniens.

Luperus albanicus Csiki, 1940

Verbreitung: Bisher nur aus Albanien bekannt.

Literaturangaben: Csiki (1940) beschreibt diese neue Art aus Kula Ljums [Kula e Lumës], wo sie am 4. VII. 1918 gesammelt wurde.

Agelastica alni (Linné, 1758)

Verbreitung: Europa, Sibirien. Über die ganze Balkanhalbinsel südlich bis nach Griechenland verbreitet.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar
Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25.—29. VII. 1961, DEI.

Euluperus cyaneus Joannis, 1866

Verbreitung: Balkan: Herzegowina, Albanien, Serbien, Mazedonien.

Literaturangaben: Von Apfelbek (1916) für das Bojana [Buna]-Gebiet in Nordalbanien angegeben.

Hispella atra (Linné, 1767)

Verbreitung: Europa, Turkestan. Auf der Balkanhalbinsel von Bosnien, Herzegowina, Albanien, Serbien und Griechenland gemeldet.

Untersuchtes Material: 4 Exemplare
1 Ex. Borshi südlich Vlora, SW-Hang, 200—400 m, 14.—27. V. 1961, DEI;
2 Ex. Poliçan westlich Tomor, 500 m, 2.—12. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI.

Literaturangaben: Apfelbek (1916) gibt diese Art aus Valona [Vlora], Csiki (1940) aus Stičen [Shtiqën], 9. VII. 1918 an. Nach Schatzmayr (1943) bei Mali i Krujës, 1000 m, gesammelt.

Hispa testacea Linné, 1767

Verbreitung: Mittelmeergebiet, Österreich, Frankreich. Von der Balkanhalbinsel bisher wohl nur aus Dalmatien gemeldet. Erstnachweis für Albanien!

Untersuchtes Material: 3 Exemplare
1 Ex. Lukova nördlich Saranda, 250 m, 24. V. 1961, DEI;
1 Ex. Poliçan westlich Tomor, 2.—12. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Umg. Durresi, Vorberg des Dajti, 7. IX. 1959, leg. Klausnitzer.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.16.3-4.347-380

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

Pilemostoma fastuosa (SCHALLER, 1783)

Verbreitung: Palaearktische Region, von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Herzegowina, Albanien, Montenegro bekannt.

Literaturangaben: Von APFELBEK (1916) wird diese Art für das mittlere und untere Bojana [Buna]-Gebiet gemeldet.

Hypocassida subferruginea (SCHRANK, 1776)

Verbreitung: Palaearktische Region. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Herzegowina, Albanien, Montenegro, Serbien, Mazedonien, Bulgarien und Griechenland bekannt geworden.

Untersuchtes Material: 3 Exemplare
1 Ex. Borshi südlich Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI;
1 Ex. Tirana, 5. VII. 1961, DEI;
1 Ex. Umg. Durresi, 9. IX. 1959 leg. KLAUSNITZER.

Literaturangaben: Von APFELBEK (1916) für Skutari [Shkodra] und Valona [Vlora] angegeben.

Cassida viridis LINNÉ, 1758

Verbreitung: Palaearktische Region, von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Herzegowina, Albanien, Serbien, Mazedonien und Bulgarien gemeldet.

Literaturangaben: APFELBEK (1916) gibt nur an „Albanien".

Cassida murraea LINNÉ, 1767

Verbreitung: Europa, Asien. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Albanien und Montenegro bekannt.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare
Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25.—29. VII. 1961, DEI.

Literaturangaben: CSIKI (1940) fand diese Art bei Kula Ljums [Kula e Lumës] am 6. VII. 1918 und bei Ura i Lopez [südl. Bicaj] am 21. VII. 1918.

Cassida flaveola THUNBERG, 1794

Verbreitung: Europa. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Albanien und Serbien gemeldet.

Literaturangaben: APFELBEK (1916) nennt als Fundstelle Oroshi.

Cassida atrata FABRICIUS, 1787

Verbreitung: Mittel- bis Osteuropa, Kleinasien. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Albanien, Montenegro, Bulgarien und Griechenland bekannt geworden.

Literaturangaben: CSIKI (1940) meldet diese Art aus Kula Ljums [Kula e Lumës], 2. VII. 1918.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.16.3-4.347-380

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

Cassida vibex Linné, 1767

Verbreitung: Palaearktische Region. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Herzegowina, Albanien, Montenegro, Serbien, Bulgarien und Griechenland bekannt.

Untersuchtes Material: 3 Exemplare
2 Ex. Tirana, 9.—12. V. 1961, DEI;
1 Ex. Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse 50—150 m, 14.—27. V. 1961, DEI.

Literaturangaben: Apfelbek (1916) meldet diese Art aus Oroshi und Valona [Vlora], Csiki (1940) sammelte sie bei Kula Ljums [Kula e Lumës] am 18. VII. 1918.

Cassida rubiginosa Mueller, 1776

Verbreitung: Palaearktische Region. Auf der Balkanhalbinsel ist diese Art in 2 Rassen vertreten, dabei tritt die f. typ. in Montenegro, Mazedonien und Bulgarien auf, während die ssp. *graeca* Kraatz in Albanien und Griechenland verbreitet ist.

Untersuchtes Material: 13 Exemplare
8 Ex. Tirana, 9.—12. V. 1961, DEI;
1 Ex. Borshi südlich Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI;
2 Ex. ebenda, litorale Terrasse;
2 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25.—29. VII. 1961, DEI.

Literaturangaben: Apfelbek (1916) gibt die ssp. typica vom Munela-Gebirge und die ssp. *graeca* Kraatz von Skutari [Shkodra] und Valona [Vlora] an.

Cassida inquinata Brullé, 1832

Verbreitung: Mittelmeergebiet, Österreich, Transsylvanien. Von der Balkanhalbinsel weiterhin aus Albanien und Bulgarien bekannt.

Untersuchtes Material: 3 Exemplare
1 Ex. Uji Ftohte südlich Tepelena, 200 m, 29.—31. V. 1961, DEI;
1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI.—2. VII. 1961, DEI.

Literaturangaben: Apfelbek (1916) meldet diese Art aus Skutari [Shkodra] und Janina.

Cassida sanguinolenta Mueller, 1776

Verbreitung: Palaearktische Region. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Herzegowina, Albanien, Serbien und Bulgarien gemeldet.

Literaturangaben: Apfelbek (1916) meldet diese Art von Fandi [Fani] bei Oroshi.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.16.3-4.347-380

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

Cassida subreticulata SUFFRIAN, 1844

Verbreitung: Mitteleuropa, Balkan, hier von Bosnien, Albanien und Mazedonien gemeldet.

Literaturangaben: APFELBEK (1916) meldet diese Art von Oroshi aus dem Merdita [Mirdita]-Gebiet und CSIKI (1940) von Kula Ljums [Kula e Lumës], 2. VIII. 1918.

Cassida prasina ILLIGER, 1798

Verbreitung: Palaearktische Region. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Herzegowina, Albanien, Serbien und Bulgarien bekannt.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar
Nordalbanische Alpen, Thethi, Shalabachtal. 900—1200 m, 1.—4. VII. 1961, DEI.

Literaturangaben: CSIKI (1940) sammelte diese Art bei Kula Ljums [Kula e Lumës], 2. VII. 1918.

Cassida margaritacea SCHALLER, 1783

Verbreitung: Europa, Kaukasus. Von der Balkanhalbinsel aus Bosnien, Herzegowina, Albanien, Serbien und Bulgarien bekannt.

Literaturangaben: APFELBEK (1916) meldet diese Art von Oroshi.

Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit werden die Chrysomelidae Albaniens besprochen, ausgenommen die Halticinae, die bereits im Band 15, p. 701—729; 1965 dieser Zeitschrift bearbeitet wurden. Das Material der Albanien-Expedition des Deutschen Entomologischen Institutes für diese Teilbearbeitung umfaßt 482 Exemplare in 57 Arten, darunter 19 für Albanien neue Arten. Daneben lagen 17 Exemplare aus den Ausbeuten von GREBENŠČIKOV 1958, FRIESE 1959 und KLAUSNITZER 1959 vor, woraus sich 2 weitere Erstnachweise ergaben. — Die Gesamtausbeute der Chrysomelidae der Albanien-Expedition umfaßt 1086 Exemplare in 106 Arten, darunter 43 Erstnachweise. Weitere 6 Erstnachweise ergaben sich aus zusätzlich bearbeiteten kleineren Albanien-Ausbeuten (zusammen 85 Exemplare). Damit sind jetzt insgesamt 217 Arten bzw. Unterarten der Familie Chrysomelidae aus dem Gebiet der Volksrepublik Albanien bekannt.

Summary

The present paper discusses the Chrysomelidae of Albania with the exception of the subfamily Halticinae, which was dealt with in volume 15, p. 701—729; 1965 of this journal. The material of the expedition to Albania by Deutsches Entomologisches Institut used for this partial study amounts to 482 individuals of 57 species, 19 species of which are new in Albania. In addition, 17 individuals from the collections of GREBENŠČIKOV 1958, FRIESE 1959 and KLAUSNITZER 1959 were available, which include 2 other first finds. — The total collection of Chrysomelidae made by the expedition to Albania numbers 1086 individuals of 106 species, including 43 first finds. The smaller collections from Albania (85 individuals in all), which were also evaluated, yielded 6 other first finds. Thus there are now 217 species or subspecies of the family Chrysomelidae known from the territory of the People's Republic of Albania.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.16.3-4.347-380

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

Резюме

В настоящей статье обсуждаются Chrysomelidae Албании с исключением Halticinae, которые уже обработаны раньше в этом журнале (том 15, стр. 701 до 729; 1965). Материал албанской экспедиции Немецкого Энтомологического Института для настоящей обработки содержал 482 экземпляров с 57 видами, 19 из них новы для Албании. Кроме этого имелись 17 экземпляров из добыч Гребенщикова 1958 г, Фризе 1959 г и Клаусницер 1959 г, 2 из этих тоже новы для Албании. — Полная добыча албанской экспедиции содержит 1086 экземпляров Chrysomelidae с 106 видами, 43 которых новы для фауны страны. Кроме этого имелись 6 новых для фауны видов из ещё обработанных добыч (вместе 85 экземпляров). Этим до сих пор из Народной Республики Албании знакомы 217 видов или подвидов фамилии Crysomelidae.

Literatur

Apfelbek, V., Fauna Insectorum Balcanica VI. 1. Beschreibung von 27 neuen Coleopteren der Balkanhalbinsel [p. 340—353]. 2. Die Komponenten der Balkanfauna aus der Familie der Chrysomelidae (Col.). Ein zoogeographischer Beitrag zur Fauna der Balkanhalbinsel. [p. 354—396]. Wiss. Mitt. Bosnien, **13**, 340—396; 1916.

Bechyne, J., 7e Contribution à la connaissance du Genre *Chrysolina* Motsch. Ent. Arb. Mus. Frey, **1**, 47—185; 1950.

—, Über die taxonomische Valenz der Namen von *Oreina* s. str. Mitt. schweiz. ent. Ges., **31**, 79—95; 1958.

Burlini, M., Revisione dei *Cryptocephalus* italiani e della maggior parte delle specie di Europa (Col. Chrysomelidae). Mem. Soc. ent. Ital., **34**, 5—287; 1955—1956.

Csiki, E., Bogarak. Coleopteren. In: Csiki Ernö, Állattani Kutatásai Albániában. Explorationes zoologicae ab E. Csiki in Albania peractae. (A Magyar Tudományos Akadémia Balkán-Kutatásainak Tudományos Eredmenyei. **1**, 2.) Budapest, p. 208—288; 1940.

Goecke, H., Monographie der Schilfkäfer III. Ent. Blätter, **56**, 1—19; 1960.

Mueller, G., I Coleotteri della Venezia Giulia. Publ. Centro sperimentale Agraria e Forestale, Nr. 4, 685 pp., Trieste; 1949—1953.

—, Contributio alla conoscenza dei Coleotteri fitofagi (Cerambycidae e Chrysomelidae). Atti Mus. Civico Stor nat., Trieste, **17**, 61—98; 1948.

Schatzmayr, A., Coleotteri raccolti dal Capitano Leonida Boldori in Albania. Atti Soc. Ital. Sci. nat., **82**, 93—140; 1943.

Winkler, A., Catalogus Coleopterorum regionis palaearcticae. Wien. Chrysomelidae: p. 1226—1359; 1929—1930.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.16.3-4.347-380

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Beiträge zur Entomologie = Contributions to Entomology

Jahr/Year: 1966

Band/Volume: 16

Autor(en)/Author(s): Mohr Karl-Heinz

Artikel/Article: Ergebnisse der Albanien-Expedition 1961 des Deutschen Entomologischen Institutes. 47. Beitrag. Coleoptera: Chrysomelidae II (exclusive Halticinae). 347-380