

Beitr. Ent. · Bd. 20 · 1970 · H. 1/2 · S. 145 – 172 · Berlin

Deutsches Entomologisches Institut
der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften
Eberswalde

GÜNTHER PETERSEN & HANNELORE GAEDIKE

Katalog der in den Sammlungen des Deutschen Entomologischen Institutes aufbewahrten Typen-II

Dermoptera, Mantodea, Blattariae, Isoptera, Phasmida, Saltatoria

DERMAPTERA

addita BURR, 1913 (*Anisolabis*)

(Ent. Mittl., 2, 66–67, Fig. 1, 2)

♂ Holotypus, Anping, Formosa, leg. SAUTER, im DEI.

boettcheri BORELLI, 1923 (*Labia*)

(Boll. Mus. Zool. Anat. comp. Univ. Torino, 38, Heft 13, 7)

1 ♂, 2 ♀♀, Syntypen, Nord-Palawan, Binaluan, 11.–12. 1913, leg. BOETTCHER, im DEI.

dubius MOREIRA, 1931 (*Spongostox*)

(Konowia, 10, 168–169, Fig. 1)

♂ Holotypus, Argentinien, Territorio de Missiones, Rio Parana, leg. LE MOULT, im DEI.

fulvochracea BORELLI, 1923 (*Chaetospania*)

(Boll. Mus. Zool. Anat. comp. Torino, 38, Heft 13, 8–10)

Syntypen: 2 ♂♂, 1 ♀, Surigao, isola Mindanao, leg. BAKER; 3 ♀♀, Nord-Palawan, Binaluan, leg. BOETTCHER, XI.–XII. 1913.

DEI: 2 ♀♀, Syntypen, N. Palawan, Binaluan, XI.–XII. 1913, leg. BOETTCHER.

infernalis BURR, 1913 (*Chaetospania*)

(Ent. Mittl., 2, 67–68, Fig. 3)

Syntypen: 1 ♂, 7 ♀♀, Taihorin, 1 ♀, Kosempo und verschiedene Larven.

DEI: 21 Syntypen, davon 4 Larven, heterogen, dringend revisionsbedürftig.

nodifex HEBARD, 1917 (*Labia*)

(Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, 69, 240–242)

Cacao, Trece Aguas, Alta Vera Paz, Guatemala, leg. BARBER & SCHWARZ, ♂ Holotypus, 26. IV. 1906, im U.S. National Museum; 6 ♂♂, 12 ♀♀, vom gleichen Fundort, 29. III./26. IV. 1906; 1 ♀, Fortin, Vera Cruz, Mexico, XI. 1887, leg. BRUNNER; 1 ♂, Cordoba, Vera Cruz, Mexico, III. 1908, leg. KNAB, Paratypen.

DEI: 2 Paratypen, Cacao Trece Aguas, 29. III., Alta V. Paz. Guatemala, leg. SCHWARZ & BARBER.

MANTODEA

affinis GIGLIO-TOS, 1917 (*Humbertiella*)

(Bull. Soc. Ent. Ital., 48 (1916), 83)

♀ Holotypus, Nalanda, Ceylon, 1899, leg. HORN, im DEI.

atra GIGLIO-TOS, 1913 (*Myrmecomantis*)

(Gen. Ins., **144**, 6, Taf., Fig. 1, 1a, 1b)

♀ Holotypus, Endeavour River, N.S. Wales, im DEI.

aurea GIGLIO-TOS, 1917 (*Calidomantis*)

(Bull. Soc. Ent. Ital., **48**, (1916), 48–49)

♀ Holotypus, Tabu, Elfenbeinküste, leg. NAGEL, im DEI.

camerunensis GIGLIO-TOS, 1917 (*Plistospilota*)

(Bull. Soc. Ent. Ital., **48** (1916), 62)

♀ Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI.

centralis GIGLIO-TOS, 1917 (*Uromantis*)

(Bull. Soc. Ent. Ital., **48** (1916), 57)

3 ♂♂, Syntypen, San Mateo, 400 m, Costa Rica, im DEI.

cinctipes GIGLIO-TOS, 1917 (*Auromantis*)

(Bull. Soc. Ent. Ital., **48** (1916), 56)

♂ Holotypus, San Mateo, 400 m, Costa Rica, leg. HEYNE, im DEI.

decipiens GIGLIO-TOS, 1915 (*Pseudomiopteryx*)

(Bull. Soc. Ent. Ital., **46** (1914), 184)

Syntypen: 1 ♂, Columbia, im Mus. Berlin; 4 ♀♀, Cañon del Tolima, Colomb., Central Cordill., 1700 m, im DEI.

horni WERNER, 1927 (*Amorphoscelis*)

(Ent. Mittl., **16**, 183)

♀ Holotypus, Bas Ogoué, Gabun, leg. LEMOULT, im DEI.

indica GIGLIO-TOS, 1914 (*Loxomantis*)

(Ann. Mus. Zool. Univ. Napoli, **4**, Nr. 15, 12)

♂ Holotypus, Madras, im DEI.

lata GIGLIO-TOS, 1915 (*Elmantis*)

(Bull. Soc. Ent. Ital., **46** (1914), 162–163)

Syntypen, mehrere ♂♂ und ♀♀ aus Ceylon im Museum Berlin und im DEI.

DEI: 1 ♂, 1 ♀, Anuradhapura, Ceylon, leg. HORN; 1 ♂, 2 ♀♀, Habrana, Ceylon, 1899, leg. HORN; 2 ♀♀, Kanthaley, Ceylon, leg. HORN.

taticollis BEIER, 1933 (*Odontomantis*)

(Mitt. zool. Mus. Berlin, **18** (1932), 334)

♀ Holotypus, China, Szetschwan, Tiji, 4. IX. 1930, leg. FRIEDRICH, im DEI.

limbata GIGLIO-TOS, 1915 (*Sibylla*)

(Bull. Soc. Ent. Ital., **46** (1914), 92)

Syntypen: 1 ♀, Dibongo, im DEI; 1 ♂, Bibianaha an der Costa d’Oro, im Museum London. DEI: Dibongo auf Sanag, Sd. Kann.

madecassa BEIER, 1935 (*Palaeophotina*)

(Arb. morph. taxon. Ent. Berlin, **2**, 50–51)

♂ Holotypus, Madagaskar, Forêt Analamazotra-Perinet, XII. 1930, leg. OLSUFIEW, im DEI.

punctata GIGLIO-TOS, 1915 (*Hyalomantis*)

(Bull. Soc. Ent. Ital., 46 (1914), 45)

Syntypen: 2 ♂♂, 1 ♀, Madagaskar.

DEI: 1 Ex. SC. Madagaskar, leg. HILDEBRANDT (schlecht erhalten).

rotunda GIGLIO-TOS, 1917 (*Hierodula*)

(Bull. Soc. Ent. Ital., 48 (1916), 65–66)

Syntypen: 1 ♂, 2 ♀♀, Kinabalu, Borneo, im Museum Sarawak; 1 ♂, Borneo, im DEI.

similis GIGLIO-TOS, 1917 (*Uromantis*)

(Bull. Soc. Ent. Ital., 48 (1916), 57)

Syntypen: 2 ♂♂, San Mateo, 400 m, Costa Rica, leg. HEYNE, im DEI.

thoracoides GIGLIO-TOS, 1915 (*Coptopteryx*)

(Bull. Soc. Ent. Ital., 46 (1914), 67)

Syntypen: 1 ♀, Asuncion, Paraguay, im Museum Torino; 1 ♂, Montevideo, im Museum Berlin [Dahlem].

DEI: 1 ♂, Montevideo.

trilobus GIGLIO-TOS, 1917 (*Galepsus*)

(Bull. Soc. Ent. Ital., 48 (1916), 102)

Syntypen: 2 ♂♂, Ruaha, Museum London; 1 ♂, Lindi, im DEI.

DEI: 1 ♂, Lindi, D. Ostafrika.

vitalisi WERNER, 1927 (*Amantis*)

(Ent. Mittl. 16, 183)

♀ Holotypus, Indochina, leg. VITALIS DE SALVAZA, im DEI.

vitripennis BEIER, 1933 (*Creobroter*)

(Mitt. zool. Mus. Berlin, 18, 335)

♀ Holotypus, China, Szetschwan, Bébé, Bez. Chungking, 7. VIII. 1930, leg. FRIEDRICH, im DEI.

wernerii KARNY, 1915 (*Phyllothelely*)

(Suppl. Ent., 4, 106–107)

Syntypen: 1 ♂, Kosempo, V. 1912; 1 ♀, Banshoryo-Distr., Sokutsu, VI. 1912.

DEI: 1 ♂, Kosempo, Formosa, V. 1912, leg. SAUTER.

BLATTARIAE**araucana** HEBARD, 1929 (*Lophoblatta*)

(Trans. Amer. Ent. Soc., 55, 350–353, Taf. XIII, Fig. 6, 7)

♂ Holotypus, Caparo, Trinidad, 10. 1913, leg. KLAGES, in Sammlung HEBARD, Typen-Nr. 1144.

Paratypen, 1 ♂, 1 ♀, River Estate, Diego Martin, Trinidad, leg. WOOD; 1 ♀, Port of Spain, Trinidad, leg. CARACCIOLA; 2 ♀♀, St. Augustin, Trinidad, 25. III. 1916, leg. WOOD; 27 ♂♂, 15 ♀♀, Caparo, Trinidad, VI.–VIII. 1913, leg. KLAGES; 1 ♂, 4 ♀♀, Trinidad, leg. CHIPMAN; 1 ♂, 1 ♀, Cariaquita, Venezuela, 1. 1911, leg. STEWARDSON BROWN; 3 ♂♂, 3 ♀♀, Kartabo, British Guiana, X. 1922, leg. HAVILAND; 1 ♀, Ongelyk, Para River, Surinam, 2. V. 1927, leg. BRADLEY.

DEI: 3 Paratypen, Caparo, Trinidad, VIII. 1913, leg. KLAGES.

argentina HEBARD, 1922 (*Ischnoptera*)

(Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, 73 (1921), 270–272, Taf. XI, Fig. 4–6)

♂ Holotypus, San Nicolas, Buenos Aires, Argentina, 5. XI. 1897, in Sammlung HEBARD, Typen-Nr. 671;

Paratypen, 3 ♂♂, 1 ♀, mit den gleichen Angaben; 1 ♂, 2 ♀♀, Carcaraña, Santa Fé, Argentina; 1 ♀, Teñío, Santiago del Estero; 1 ♂, Cordoba, Argentina, leg. SCHULZ; 1 ♂, Colonia, Florencia, Rio Japenaga, Chaco, Argentina; 1 ♂, Paraguay.

DEI: 1 Paratype, San Nicolas, Buenos Aires, Argentina.

atra SHELFORD, 1906 (*Paranauphoeta*)

(Trans. Ent. Soc. London, 1906, 275)

Eine große Serie, Kuching.

DEI: 1 Syntypus, N.W. Borneo, Kuching, Capt. 13. XI. 1899, leg. SHELFORD.

bicolor SHELFORD, 1908 (*Liosilpha*)

(Deutsch. Ent. Zeitschr., 1908, 120, Taf. II, Fig. 5)

♀ Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI.

bicolor SHELFORD, 1908 (*Nauphoeta*)

(Deutsch. Ent. Zeitschr., 1908, 125 – 126)

Syntypen: Kamerun, leg. CONRADT, 1 ♂, im DEI; 1 ♀, in Sammlung BOLIVAR.

bicolor SHELFORD, 1908 (*Periplaneta*)

(Deutsch. Ent. Zeitschr., 1908, 122 – 123)

♀ Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI.

cahita HEBARD, 1922 (*Panchlora*)

(Trans. Amer. Ent. Soc., 48, 174 – 175, Taf. VII, Fig. 1)

♂ Holotypus, Venvideo, Sinaloa, Mexico, 18. VIII. 1918, leg. KUSCHE, in Sammlung HEBARD, Typen-Nr. 761.

47 ♀♀, Paratypen vom gleichen Fundort, 28. VII. – 2. IX. 1918.

DEI: 2 Paratypen mit den Angaben der Beschreibung, 12. VIII. und 18. VIII. 1918.

chopardi HEBARD, 1922 (*Euphyllodromia*)

(Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, 73 (1921), 202 – 204, Taf. XV, Fig. 1, 2)

♂ Holotypus, Bartica, British Guiana, leg. PARISH, 19. XII. 1912, in der Sammlung der Acad. Nat. Sci. Philadelphia, Typen-Nr. 5369.

Paratypen: 11 ♂♂, 4 ♀♀, vom gleichen Fundort, 10. XII. – 12. VI. 1912 und 1913; 4 ♀♀, Demerara, British Guiana, 1901, leg. CREW; 1 ♂, Gourdonville, French Guiana, Oktober; 1 ♂, Charvein, French Guiana, November.

DEI: 1 ♂, Paratype, Bartica, British Guiana, 12. VI. 1912, leg. PARISH.

cinnamomea HEBARD, 1927 (*Epilampra*)

(Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, 78 (1926), 202 – 204, Taf. XVI, Fig. 4)

♂ Holotypus, St. Jean du Maroni, French Guiana, in Sammlung HEBARD, Typen Nr. 1021; Paratypen 25 ♂♂, 22 ♀♀, mit den gleichen Angaben; 2 ♀♀, Nouveau, Chantier, French Guiana, 2. und 12.; 1 ♀, St. Laurent du Maroni, French Guiana, Dezember.

DEI: 1 Paratype, Francese Guyana, St. Jean du Maroni, leg. LEMOULT.

conradti SHELFORD, 1908 (*Anaplecta*)

(Deutsch. Ent. Zeitschr., 1908, 115, Taf. II, Fig. 1)

♂ Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI.

conradti SHELFORD, 1908 (*Paraplecta*)

(Deutsch. Ent. Zeitschr., 1908, 129, Taf. II, Fig. 10)

♂ Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI (schlecht erhalten).

conradti SHELFORD, 1908 (*Phyllodromia*)

(Deutsch. Ent. Zeitschr., 1908, 117–118, Taf. II, Fig. 4)

♂ Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT, im DEL.

cruralis SHELFORD, 1908 (*Homalosilpha*)

(Deutsch. Ent. Zeitschr., 1908, 121, Taf. II, Fig. 8c)

♀ Holotypus, British Uganda, leg. GRAUER, im DEI.

dahomensis SHELFORD, 1906 (*Anaplecta*)

(Trans. Ent. Soc. London, 1906, 244, Taf. XVI Fig. 2)

Syntypen, eine große Serie, Athiéché, Dahomey, im Hope Museum Oxford.
DEI: 1 Syntypus mit den Angaben der Beschreibung.

elegans SHELFORD, 1908 (*Nauphoeta*)

(Deutsch. Ent. Zeitschr., 1908, 124)

♂ Holotypus Kamerun, leg. CONRADT, im DEI.

epilamproides SHELFORD, 1908 (*Nauphoeta*)

(Deutsch. Ent. Zeitschr., 1908, 123–124, Taf. II, Fig. 7)

Syntypen, 1 ♂, Kamerun, leg. CONRADT, im Museum Oxford; 1 ♀, im DEI.

erythronotata SHELFORD, 1908 (*Phyllodromia*)

(Deutsch. Ent. Zeitschr., 1908, 119)

♀ Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI.

formosana KARNY, 1915 (*Ischnoptera*)

(Suppl. Ent., 4, 102)

♀ Holotypus, Taihanroku, Formosa, 7. IX., leg. SAUTER, im DEI.

formosana KARNY, 1915 (*Periplaneta*)

(Suppl. Ent., 4, 96–97)

Syntypen: 2 ♂♂, 2 ♀♀, Fuhosho; 3 ♂♂, Taihorin, 1911; 2 ♂♂, Taihorinsho, VIII. 1909, leg. SAUTER.

DEI: ♀ Lectotypus, von PRINCIS 1961 festgelegt, Fuhosho, Formosa, VII. 1909, leg. SAUTER; ♂ Paralectotypus, Taihorin, Formosa, 7. V. 1911, leg. SAUTER; 3 weitere Typen, von PRINCIS nicht gesehen: 1 Ex. Fuhosho, Formosa, leg. SAUTER; 1 Ex. Taihorinsho, Formosa, VIII. 1909, leg. SAUTER; 1 Ex. Taihorin, Formosa, 7. V. 1911, leg. SAUTER.

formosana KARNY, 1915 (*Theganopteryx*)

(Suppl. Ent., 4, 103–104)

Syntypen: 4 ♂♂, 8 ♀♀, Taihanroku; 1 ♂, 5 ♀♀, Hoozan; 3 ♂♂, 3 ♀♀, Taihorin, 1911, leg. SAUTER.

DEI: 5 Ex. Taihanroku, Formosa, 7. IX. und 7. XI., leg. SAUTER; 1 ♂, 1 ♀, Hoozan, Formosa, 7. X. und 7. XI., leg. SAUTER; 2 Ex. Taihorin, Formosa, 7. XII., leg. SAUTER.

fossicauda HERARD, 1916 (*Cariblatta*)

(Trans. Amer. Ent. Soc., 42, 177–179, Taf. XI, Fig. 13–17; Taf. XII, Fig. 17, 18)

♂ Holotypus, Caparo, Trinidad, leg. KLAGES, 8. 1913, in Sammlung HERARD, Typen-Nr. 415; Paratypen, 24 ♂♂, 17 ♀♀, vom gleichen Fundort, VI./VIII. 1913.

DEI: 1 Paratypus, Caparo, Trinidad, VIII. 1913, leg. KLAGES.

funebris SHELFORD, 1908 (*Periplaneta*)

(Deutsch. Ent. Zeitschr., 1908, 122)

Syntypen: Kamerun, leg. CONRADT, 1 ♂, im DEI; 1 ♀, im Museum Oxford.

frieseanus PRINCIS, 1963 (*Ectobius*)

(Beitr. Ent., 18, 68–70, Fig. 1, 2)

♂ Holotypus, Albanien, Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse mit *Olea* und *Ficus*, 50 bis 150 m, 14.–27. V. 1961; Paratypen: 4 ♂♂, mit den gleichen Angaben (3 Ex. im DEI, 1 Ex. in Sammlung PRINCIS); 3 ♀♀, Albanien, Bizé bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400–1500 m, 10.–15. VII. 1961, (2 Ex. im DEI, 1 Ex. in Sammlung PRINCIS); 1 ♀, Mali me Gropë, Rotbuchenbestand mit angrenzender Wiese, 1200 m, 3.–8. VII. 1961, im DEI.

gaudens SHELFORD, 1910 (*Homalosilpha*)

(Gen. Ins., Fasc. 109, 19)

♂ Holotypus, Bac-quang, Tonking.

Entgegen der Originalbeschreibung „Type im Oxford Museum“, befindet sich der Holotypus im DEI.

hemiscotia HEBARD, 1920 (*Anaplecta*)

(Mem. Amer. Ent. Soc., 4, (1919), 20–23, Taf. II, Fig. 8)

♂ Holotypus, Corozal, Canal Zone, Panama, 17. XI. 1913, leg. HEBARD, in Sammlung HEBARD, Typen-Nr. 430; Paratypen: 1 ♀, Gold Hill, Canal Zone, Panama, 14. XI. 1913; 1 ♀, Porto Bello, Panama, 17. IV. 1912, leg. BUSCK; 1 ♂, Taboga Island, Panama, 11. VI. 1911, leg. BUSCK; 19 ♂♂, 13 ♀♀, Tabernilla, Canal Zone, Panama, 1. VI. bis 31. VII. 1907 und 1911, leg. BUSCK; 1 ♀, Empire, Canal Zone, Panama, 14. XI. 1913, leg. HEBARD; 1 ♂, Canal Zone, 5 Meilen westlich von Empire, Panama, 14. XI. 1913, leg. HEBARD; 1 ♂, 2 ♀♀, Paraíso, Canal Zone, Panama, 24. IV. bis 10. V. 1911, leg. SCHWARZ, BUSCK; 2 ♀♀, Cabima, Panama, 20./22. V. 1911, leg. BUSCK; Corozal, Canal Zone, 2 ♀♀, 14. XI. 1913, leg. HEBARD, 1 ♂, 6. IV. 1911 leg. BUSCK; 3 ♂♂, Chorrera, Panama, 10.–17. V. 1912, leg. BUSCK.

DEI: 5 Paratypen: 2 Ex. Paraíso, Canal Zone, Panama, 5./10. V. 1911, leg. SCHWARZ; 1 Ex. Cabima, Panama, 22. V. 1911, leg. BUSCK; 1 Ex. La Chorrera, Panama, 17. V. 1912, leg. BUSCK; 1 Ex. Tabernilla, Canal Zone, Panama, 16. V. 1907, leg. BUSCK.

landalei REHN & HEBARD, 1927 (*Cariblatta*)

(Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 54, Article I, 45–47, Taf. II, Fig. 10–14)

♂ Holotypus, Pleasant Hill, Blue Mountains, Jamaica, 3700–3800 Fuß, 28. VII. 1923, leg. REHN, in Sammlung der Acad. Nat. Sci. Philadelphia, Typen-Nr. 5404; Paratypen vom gleichen Fundort, 1 ♀, 24. VII. 1924; 2 ♂♂, 1 ♀, 21. VII.; 2 ♂♂, 3 ♀♀, 24. VII.; 1 ♂, 1 ♀, 25. VII.; 4 ♂♂, 2 ♀♀, 28. VII.

DEI: 1 Paratypus mit den Angaben der Beschreibung, 28. VII. 1923.

metae HEBARD, 1921 (*Hyporhiconoda*)

(Trans. Amer. Ent. Soc., 47, 138–139, Taf. X, Fig. 29, 30)

♀ Holotypus, Villavicencio, Intendencia del Meta, Colombia, Elevation, 1400 Fuß, XII. 1912, leg. MARIA, in Sammlung HEBARD, Typen-Nr. 667; 14 ♀♀, Paratypen, vom gleichen Fundort, 5. 1917–8. 1919.

DEI: 1 Paratypus mit den Angaben der Beschreibung.

minuta SHELFORD, 1908 (*Nauphoeta*)

(Deutsch. Ent. Zeitschr., 1908, 124–125)

♀ Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI.

mirabilis SHELFORD, 1908 (*Phyllodromia*)

(Deutsch. Ent. Zeitschr., 1908, 116–117, Taf. II, Fig. 3)

Syntypen: 5 ♂♂, 1 ♀, Kamerun, leg. CONRADT.

DEI: 4 ♂♂, 1 ♀, Kamerun, leg. CONRADT.

modestiformis KARNY, 1915 (*Ischnoptera*)

(Suppl. Ent., 4, 101)

Syntypen: 2 ♀♀, Taihanroku; 1 ♂, Taihorin, Formosa, 1912, leg. SAUTER.
 DEI: 1 ♀ Taihanroku, Formosa, 7. IX., leg. SAUTER; 1 ♂, Tainan, Formosa, 7. V. 1912, leg. SAUTER. Taihorin in der Originalbeschreibung wohl irrtümlich statt Tainan gesetzt.

natalensis REHN, 1922 (*Chorisoblatta*)

(Ann. Transv. Mus., 9, 11–13, Taf. 1, Fig. 3, 5)

♂ Holotypus, Pinetown, Natal., leg. LEIGH, in der Sammlung der Acad. Nat. Sci. Philadelphia, Typen-Nr. 5368; Paratypen: 2 ♂♂, 2 ♀♀, Pinetown, Natal., 16. II.–1. III. 1909, leg. LEIGH; Durban, Natal., leg. LEIGH, 3 ♂♂, 25. III., 5./6. VIII. 1909; 5 ♂♂, 6 ♀♀, 4. VII., IX., X. und XI. 1907, 24. XI. 1908.

DEI: 1 ♂ Paratype, Durban Natal, 25. III. 1909, leg. LEIGH.

neutra SHELFORD, 1908 (*Phyllodromia*)

(Deutsch. Ent. Zeitschr., 1908, 118, Taf. II, Fig. 6)

♂ Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI.

nigra SHELFORD, 1909 (*Pronauphoeta*)

(Deutsch. Ent. Zeitschr., 1909, 621)

♂ Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI.

pallida SHELFORD, 1908 (*Chorisoneura*)

(Deutsch. Ent. Zeitschr., 1908, 130, Taf. II Fig. 9)

♂, ♀, Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT.

DEI: 1 ♂, Kamerun, leg. CONRADT.

paradoxa KARNY, 1914 (*Ipolatta*)

(Ent. Mittl., 3, 250)

Holotypus, Khasia Hills, Assam, im DEI.

perspicillaris KARNY, 1915 (*Theganopteryx*)

(Suppl. Ent., 4, 103)

Syntypen: 4 ♂♂, 2 ♀♀, Hoozan, 1910, leg. SAUTER.

DEI: 4 Ex. Hoozan, Formosa 7. I. und 7. VII., leg. SAUTER.

perspicua SHELFORD, 1908 (*Oxyhaloa*)

(Deutsch. Ent. Zeitschr., 1908, 128)

Syntypen: 1 ♂, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI (schlecht erhalten); 1 ♀, Kamerun, in Sammlung BOLIVAR.

platystylata HEBARD, 1922 (*Neoblatella*)

(Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, 73 (1921), 229–232, Taf. IX, Fig. 21–23, Taf. X, Fig. 1)

♂ Holotypus, Tgarapé-Assú, Pará, Brazil, leg. PARISH, 17. I.–6. XI. 1912; in der Sammlung der Acad. Nat. Sci. Philadelphia, Typen-Nr. 5376; Paratypen: 10 ♂♂, 13 ♀♀, mit den gleichen Angaben; 5 ♂♂, 3 ♀♀, Bartica, British Guiana, 19. XII. 1912 bis 15. III. 1913, leg. PARISH; 2 ♂♂, 1 ♀, 1 juv., St. Jean du Maroni, French Guiana, IV./V.; 1 ♀, Charvein, French Guiana. DEI: 1 Paratype, Tgarapé-Assú, Sta. of Para, Brazil, 6. II. 1912, leg. PARISH.

pygmaeus KARNY, 1915 (*Perispheerus*)

(Suppl. Ent., 4, 92)

Syntypen: 1 ♂, Suisharyo, 1911; 1 ♀, Kosempo, VII. 1909.

DEI: 1 ♀, Kosempo, Formosa, VII. 1909, leg. SAUTER.

ruficollis KARNY, 1915 (*Theganopteryx*)

(Suppl. Ent., 4, 104)

♀ Holotypus, Fuhosho, VII. 1909, leg. SAUTER, im DEI.

sauteri KARNY, 1915 (*Ischnoptera*)

(Suppl. Ent., 4, 102)

Syntypen: 1 ♀, Anping, VII. 1912; 1 ♂ [recte ♀], Kankau (Koshun), IV. 1912; 1 ♀, Taihorin, 1911.

DEI: 1 ♀, Kankau (Koshun), Formosa, IV. 1912, leg. SAUTER.

schenklingi KARNY, 1915 (*Ischnoptera*)

(Suppl. Ent., 4, 101–102)

Syntypen: 2 ♂♂, 1 ♀, Taihorin; 1 ♀, Taihanroku; 1 ♀, Kankau (Koshun), VII. 1912, leg. SAUTER.

DEI: 1 ♂, 1 ♀, Taihorin, Formosa, 7. VII. 1911, leg. SAUTER; 1 ♀, Kankau (Koshun), Formosa, VII. 1912, leg. SAUTER; 1 ♀, Taihonroku, Formosa, 7. VIII., leg. SAUTER.

shelfordi KARNY, 1915 (*Paranauphoeta*)

(Suppl. Ent., 4, 94–95)

136 Syntypen, Hoozan; Polisha 1908; Teraso 1909; Fuhosho, 1909; Chip-Chip, 1909; Kosempo, 1908–1911.

DEI: 1 Ex. Polisha, Formosa, XI. 1908, leg. SAUTER; 4 Ex. Chip-Chip, Formosa, I./II. 1909; 13 Ex. Kosempo, Formosa, XI. 1908; 22. VI. 1910, 7. IX. 1911, 7. XI. 1911, leg. SAUTER; 16 Ex. Fuhosho, Formosa, II./VI./VII. 1909.

sumatrana SHELFORD, 1909 (*Areolaria*)

(Deutsch. Ent. Zeitschr., 1909, 621)

♀ Holotypus, Sumatra, im DEI (schlecht erhalten).

testacea SHELFORD, 1911 (*Hemithyrsocera*)

(Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 8, 1–2)

Mehrere Exemplare: Erythraea, Ghinda, Cheren; Typus im Oxford University Museum.

DEI: 2 Paratypen, Cheren, Erythraea (etikettiert als *Theganopteryx testacea* sp.n.).

translucida SHELFORD, 1908 (*Phyllodromia*)

(Deutsch. Ent. Zeitschr. 1908, 119)

♂ Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI.

ISOPTERA

albipes HOLMGREN, 1915 (*Calotermes*)

(Nowa Caledonia, A: Zool., 2, 89–90)

♂♀, Syntypen, Loyalty Inseln, Maré, 17. XI. 1911, im Basler Naturhistorischen Museum.
DEI: 1 Syntypus mit den Angaben der Beschreibung.

allocerus SILVESTRI, 1908 (*Psammotermes*)

(Denkschr. Med. Nat. Ges. Jena, 13, 73–75, Taf. VIII, Fig. 1–17)

Eine große Anzahl Soldaten, Namaland, Salsola-Dünen am Nordende der Lüderitzbucht, I. 1904, VII. 1903; 1 Soldat, Kamaggas, Klein-Namaland, VII. 1904; leg. SCHULTZE.

DEI: 9 Syntypen, Lüderitzbucht, S. W. Afrika, I. II. 1904, leg. SCHULTZE.

angusticeps EMERSON, 1925 (*Capritermes*)

(Zoologica, New York, 6, 447–449, Fig. 91)

Viele Soldaten und Imagines, Kartabo, British Guiana, leg. EMERSON; mehrere Soldaten von Dunoon, leg. GAIGE; Holotypus Soldat.

DEI: Zahlreiche Paratypen in Alkohol, Kartabo, Bartica District, British Guiana, 21. IV. 1919, leg. EMERSON.

bailyi EMERSON, 1925 (*Nasutitermes*)

(Zoologica, New York, 6, 398–399, Fig. 64 e–h)

Viele geflügelte Imagines, 1 König, 1 Königin und viele Soldaten, Holotypus geflügelte Imago, Kartabo, British Guiana, leg. EMERSON.

DEI: Zahlreiche Paratypen in Alkohol, Kartabo, British Guiana, 30. VIII. 1920, leg. EMERSON.

beebei EMERSON, 1925 (*Nasutitermes*)

(Zoologica, New York, 6, 415–416, Fig. 73)

1 geflügelte Imago, mehrere große und viele kleine Soldaten, Holotypus großer Soldat, Kartabo, British Guiana, leg. EMERSON.

DEI: Zahlreiche Paratypen in Alkohol, Kartabo, British Guiana, 23. VII. 1919, leg. EMERSON.

biformis WASMANN, 1902 (*Eutermes*)

(Zool. Jahrb. Syst. 17, 133–135, Taf. 4, Eig. 10, 10a)

Syntypen: große und kleine Soldaten, Arbeiter und Nymphen, Bandarawella, Ceylon, leg. HORN; Soldaten, Arbeiter, Larven, junge Imagines, Khandala, bei Bombay, leg. ASSMUTH.

DEI: Syntypen in Alkohol, Bandarawella, Ceylon, 1899, leg. HORN.

brevipilus EMERSON, 1925 (*Anoplotermes*)

(Zoologica, New York, 6, 424–425, Fig. 78)

Viele geflügelte Imagines, Könige und Königinnen, Holotypus geflügelte Imago, Kartabo, British Guiana, leg. EMERSON.

DEI: Zahlreiche Paratypen in Alkohol, Kartabo, Bartica District, British Guiana, 21.VII. 1919, leg. EMERSON.

brevipilus EMERSON, 1925 (*Nasutitermes*)

(Zoologica, New York, 6, 395–397, Fig. 63)

Viele geflügelte Imagines und Soldaten, Holotypus Imago, Kartabo, British Guiana, leg. EMERSON.

DEI: Paratypen in Alkohol, Kartabo, British Guiana, 1919, leg. EMERSON

ceylonicus WASMANN, 1902 (*Termes*)

(Zool. Jahrb. Syst., 17, 112–113)

Syntypen, eine größere Anzahl Soldaten und Arbeiter, Nalanda; Bentotta; Bandarawella; Ceylon 1899, leg. HORN.

DEI: 2 Syntypen in Alkohol, Nalanda, Ceylon, 1899, leg. HORN; zahlreiche Exemplare in Alkohol, Bentotta, Ceylon, 1899, leg. HORN.

comstockae EMERSON, 1925 (*Nasutitermes*)

(Zoologica, New York, 6, 390–391, Eig. 57 e, f)

Viele Soldaten, Holotypus Soldat, Kartabo, British Guiana, leg. EMERSON.

DEI: 5 Paratypen in Alkohol, Kartabo, British Guiana, 11. VIII. 1920, leg. EMERSON.

globicola WASMANN, 1902 (*Microtermes*)

(Zool. Jahrb. Syst., 17, 116–117)

Syntypen, Soldaten, Arbeiter, Anurhadapura, Ceylon, 1899, leg. HORN.

DEI: Zahlreiche Exemplare in Alkohol Anurhadapura, Ceylon, 1899, leg. HORN.

grandis HOLMGREN, 1912 (*Porotermes*)

(Ent. Mitt., 1, 281)

2 Syntypen, Soldaten, Cape Otnay, Viktoria, leg. FOREST.
DEI: 1 Syntypus mit den Angaben der Beschreibung.

horni WASMANN, 1902 (*Termes*)

(Zool. Jahrb. Syst., 17, 111–112)

Syntypen, Soldaten und Arbeiter, Nalanda; Soldaten und Arbeiter, Pankulam; Soldaten und Arbeiter Bandarawella, Ceylon, 1899, leg. HORN.

DEI: 7 Ex. in Alkohol Bandarawella, Ceylon; 1 Ex. in Alkohol, Nalanda, Ceylon, 1899, leg. HORN.

inanis horni WASMANN, 1902 (*Eutermes*)

(Zool. Jahrb. Syst., 17, 137)

Syntypen in Alkohol, Bandarawella, Ceylon, leg. HORN, im DEI.

inquilinus EMERSON, 1925 (*Mirotermes*)

(Zoologica, New York, 6, 440–442, Fig. 87)

Zahlreiche geflügelte Imagines, Könige und Königinnen, viele Soldaten, Holotypus geflügelte Imago, Kartabo, British Guiana, leg. EMERSON.

DEI: Zahlreiche Paratypen in Alkohol, Kartabo, British Guiana, 23. VIII. 1920, leg. EMERSON.

longicornis WASMANN, 1902 (*Capritermes*)

(Zool. Jahrb. Syst., 17, 126–128, Taf. 4, Fig. 7)

Syntypen, mehrere geflügelte Imagines, 1 Soldat, einige Arbeiter, Anuradhapura; Soldaten und Arbeiter, Bandarawella, Ceylon, 1899, leg. HORN.

DEI: 12 Ex. in Alkohol, Bandarawella, Ceylon, 1899, leg. HORN.

manni EMERSON, 1925 (*Nasutitermes*)

(Zoologica, New York, 6, 412–414, Fig. 72)

Viele Soldaten und geflügelte Imagines, Holotypus Soldat, Kartabo, British Guiana, leg. EMERSON.

DEI: Zahlreiche Paratypen in Alkohol, Kartabo, British Guiana, 24. VI. 1920, leg. EMERSON.

marijanus HOLMGREN, 1912 (*Calotermes*)

(Ent. Mitt., 1, 281–282)

Holotypus, Imago, Marianen, im DEI.

mazaruniensis EMERSON, 1925 (*Nasutitermes*)

(Zoologica, New York, 6, 411–412, Fig. 71)

Einige geflügelte Imagines, Soldaten, 1 König, 1 Königin, Holotypus geflügelte Imago, Kartabo, British Guiana, leg. EMERSON.

DEI: Paratypen in Alkohol, Kartabo, British Guiana, 3. V. 1924, 20. VII. 1920, leg. EMERSON.

minutus EMERSON, 1925 (*Armitermes*)

(Zoologica, New York, 6, 374–375, Fig. 53)

1 König und viele Soldaten, viele Königinnen der 2. Form und 1 König der 2. Form, Holotypus Soldat, Kartabo, British Guiana, leg. EMERSON.

DEI: Zahlreiche Paratypen in Alkohol, Kartabo, British Guiana, 23. VI. 1919, leg. EMERSON.

nervosus HILL, 1927 (*Microcerotermes*)

(Mem. Nat. Mus. Melbourne, Nr. 7, 73–78, Taf. III, Fig. 77–81; Taf. VI, Fig. 188; Taf. IX, Fig. 189; Taf. VII, Fig. 218)

Australien, Northern Territory: Holotypus, Darwin; Stapleton; Broock's Creek; Melville Island; Daly River District; leg. HILL; Groote Eylandt; Maria Island?; Connexion Island?; leg. TINDALE; im National Museum Victoria.

DEI: 6 Paratypen, N. Territory, Daly River District, 12. X. 1914, leg. HILL.

obscuriceps WASMANN, 1902 (*Termes*)

(Zool. Jahrb. Syst., 17, 113–115)

Syntypen, Trincomali, Ceylon, 1899, leg. HORN; Soldaten und Arbeiter, Bandarawella, 1899, leg. HORN.

DEI: Zahlreiche Exemplare in Alkohol, Bandarawella, Ceylon, 1899, leg. HORN.

palmquisti SJÖSTEDT, 1907 (*Termes*)

(Wiss. Ergeb. Schwed. Zool. Exp. Kilimandjaro Meru, Nr. 15, 16–18, Taf. 4, Fig. A)

Syntypen, Kilimandjaro, Kibonoto, 35 geflügelte Imagines, 20. II. 1906, 130 geflügelte Imagines, 13. III. 1906; 8 geflügelte Imagines, 7. V. 1906, im Museum Stockholm.

DEI: 1 Syntypus, Kilimandjaro, Kibonoto, III, 1906.

perparvus EMERSON, 1925 (*Kalotermes*)

(Zoologica, New York, 6, 332–334, Fig. 32)

Viele Exemplare aller Kasten, Holotypus geflügelte Imago, Kartabo, British Guiana, leg. EMERSON.

DEI: Paratypen in Alkohol, aus der Kolonie der Holotype, Kartabo, British Guiana, 27. VII. 1919, leg. EMERSON.

planiceps EMERSON, 1925 (*Capritermes*)

(Zoologica, New York, 6, 449–450, Fig. 92)

Zahlreiche Soldaten, Holotypus Soldat, Kartabo, British Guiana, leg. EMERSON.

DEI: 7 Paratypen in Alkohol, Kartabo, British Guiana, 27. VIII. 1920, leg. EMERSON.

queenslandicus MJÖBERG, 1920 (*Stolotermes*)

(Arkiv. Zoolog., 12, Nr. 15, 6–9)

Syntypen, Cedar Creek, April; Malanda, Februar, Juni; Herberton, Januar.

DEI: 1 Syntypus in Alkohol, Cedar Creek. N. Queensland, IV. 1913, leg. MJÖBERG.

samoanus HOLMGREN, 1912 (*Calotermes*)

(Ent. Mitt., 1, 282)

Syntypen, Imagines (flügellos), Apia Samoa, im DEI.

silvestrii EMERSON, 1925 (*Anoplotermes*)

(Zoologica, New York, 6, 421–423, Fig. 76)

Viele geflügelte Imagines, Könige und Königinnen, Holotypus, geflügelte Imago, Kartabo, British Guiana, leg. EMERSON.

DEI: Zahlreiche Paratypen in Alkohol, Kartabo, Bartica District, British Guiana, 25. VI. 1919, leg. EMERSON.

snyderi EMERSON, 1925 (*Nasutitermes*)

(Zoologica, New York, 6, 405–407, Fig. 68)

Viele geflügelte Imagines und Soldaten, Holotypus geflügelte Imago, Kartabo, British Guiana, leg. EMERSON; zahlreiche Soldaten, Trinidad, leg. EMERSON.

DEI: Paratypen in Alkohol, Kartabo, British Guiana, 12. VIII. 1920, leg. EMERSON.

snyderi EMERSON, 1925 (*Syntermes*)

(Zoologica, New York, 358–359, Fig. 44)

2 geflügelte Imagines und viele Soldaten, Holotypus Soldat, Kartabo, British Guiana, leg. EMERSON.

DEI: 2 Paratypen in Alkohol, Kartabo, British Guiana, 29. VII. 1920, leg. EMERSON.

subfusciceps EMERSON, 1925 (*Rhinotermes*)

(Zoologica, New York, 6, 356–357, Fig. 43)

Holotypus Königin, viele kleine Soldaten, Kartabo, British Guiana, leg. EMERSON.

DEI: Zahlreiche Paratypen in Alkohol, aus der Kolonie der Holotype, Kartabo, British Guiana, 28. IX. 1920, leg. EMERSON.

teevani EMERSON, 1925 (*Armitermes*)

(Zoologica, New York, 6, 371–372, Fig. 51)

Mehrere geflügelte Imagines und Soldaten, Holotypus geflügelte Imago, Kartabo, leg. TEE-VAN; viele Soldaten, Kartabo, leg. EMERSON; Soldaten bei Onderneeming, leg. BODKIN.

DEI: 3 Paratypen in Alkohol, Kartabo, Bartica District, British Guiana, 1919.

tenebrosus EMERSON, 1925 (*Rhinotermes*)

(Zoologica, New York, 6, 354–356, Fig. 42)

Viele Exemplare aller Kasten, Holotypus großer Soldat, Kartabo, British Guiana, leg. EMERSON.

DEI: 2 Paratypen in Alkohol aus der Kolonie der Holotype, Kartabo, British Guiana, 16. VI. 1920, leg. EMERSON.

territus EMERSON, 1925 (*Syntermes*)

(Zoologica, New York, 6, 359–361, Fig. 45)

Zahlreiche Exemplare, Holotypus Soldat, Kartabo, British Guiana, leg. EMERSON.

DEI: 1 Paratypus in Alkohol, Kartabo, British Guiana, 1919, leg. EMERSON.

tuberosus EMERSON, 1925 (*Mirotermes*)

(Zoologica, New York, 6, 442–444, Fig. 88)

1 Königin, viele Soldaten, Holotypus Soldat, Barakara; 1 König, 1 Königin und zahlreiche Soldaten, Cow Island; 2 Soldaten Trinidad, leg. EMERSON.

DEI: Zahlreiche Paratypen in Alkohol, aus der Kolonie des Holotypus, Barakara, British Guiana, 15. V. 1920, leg. EMERSON.

verruculosus EMERSON, 1925 (*Mirotermes*)

(Zoologica, New York, 6, 433–435, Fig. 84)

2 Königinnen, viele geflügelte Imagines, zahlreiche Soldaten, Holotypus Königin, Kartabo, British Guiana, leg. EMERSON.

DEI: Zahlreiche Paratypen in Alkohol, Kartabo, British Guiana, 7. VI. 1919, leg. EMERSON.

wheeleri EMERSON, 1925 (*Nasutitermes*)

(Zoologica, New York, 6, 391–392, Fig. 60)

Viele Soldaten und geflügelte Nymphen, Holotypus Soldat, Kartabo, British Guiana, leg. EMERSON.

DEI: 7 Paratypen in Alkohol, aus der Kolonie des Holotypus, Kartabo, British Guiana, 11. VIII. 1920, leg. EMERSON.

PHASMIDA

doederleini GÜNTHER, 1929 (*Graeffea*)

(Mittl. Zool. Mus. Berlin, 14 (1928), 684–686, Taf. III, Fig. 1, 2)

♂ Holotypus, 67 ♂♂, 16 ♀♀, adult, Schraderberg, 2100 m, 22.–31. V. 1913, leg. BÜRGER, im Museum Berlin.

DEI: 1 Paratypus mit den Angaben der Beschreibung.

flavidum HEBARD, 1938 (*Pseudophasma*)

(Trans. Amer. Ent. Soc., 59, 33–34, Taf. II, Fig. 9)

Guaicaramo, Intendencia del Meta, Columbien, leg. MARIA, 1 ♀ Holotypus, 1926, in Sammlung HEBARD, Typen-Nr. 1218; 3 ♂♂, 1 ♀, VI. 1925 und 1930 vom gleichen Fundort; 1 ♂, Muzo, Boyaca, 1921, leg. MARIA; 6 ♂♂, Villavicencio, Intendencia del Meta, 1921, leg. MARIA, Paratypen.

DEI: 1 Paratypus, Villavicencio, Meta, Colombia, 1921, leg. MARIA.

injucundus GÜNTHER, 1937 (*Neopromachus*)

(Vierteljahrsschr. Naturforsch. Ges. Zürich, 82, 93–94)

24 ♂♂, 18 ♀♀, Syntypen, Torricelli-Gebirge, 120–780 m.

DEI: 3 Exemplare, Kaiser Wilhelmsland, Torricelli-Gebirge, 1. 1910, leg. SCHLAGINHAUEN.

SALTATORIA

Grylloidea

affinis REHN, 1914 (*Phaeophilacris*)

(Wiss. Ergebni. Zentr. Afr. Exp., 5, 1, 216–219)

♀ Holotypus, Bukoba, Westküste des Victoria-Nyanza, 13.–15. VI. 1907, im Museum Berlin; 5 ♂♂, 17 ♀♀, 5 Larven, Paratypen, mit den selben Angaben.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

angustifrons CHOPARD, 1937 (*Gryllulus*)

(Arb. morph. tax. Ent., 4, 136–137)

♀ Holotypus, Ferghana, Skobelev, 8. V. 1910, leg. SHESTOPOEROV, im DEI.

annulatum HEBARD, 1928 (*Cycloptilum*)

(Trans. Amer. Ent. Soc., 54, 114–116, Taf. XVI, Fig. 5, 6)

♂ Holotypus, Aracataca, Magdalena, Colombia, 11. VIII. 1920, leg. HEBARD, in Sammlung HEBARD, Typen Nr. 1117; 5 ♂♂, 6 ♀♀, Paratypen vom selben Fundort, 4.–13. VIII. 1920; 1 ♀, Puerto Colombia, Atlantico, 12. VII. 1920, leg. HEBARD.

DEI: 1 Paratypus, Aracataca, Magdalena, Colombia, 4. VIII. 1920, leg. HEBARD.

bicolor CHOPARD, 1937 (*Larandeicus*)

(Arb. morph. tax. Ent., 4, 145–146, Fig. 6)

♂ Holotypus, N. Transvaal, Waterpoort, leg. LINGNAU, im DEI.

bidens HEBARD, 1931 (*Cycloptilum*)

(Trans. Amer. Soc., 57, 147–150, Taf. XXIII, Fig. 7–11)

♀ Holotypus, St. Simon's Island, Georgia, 30. VIII. 1911, leg. REHN & HEBARD, in Sammlung HEBARD, Typen Nr. 1175; 52 ♂♂, 53 ♀♀, 16 Larven, Paratypen, aus verschiedenen Staaten der U.S.A., genaue Funddaten siehe Originalbeschreibung.

DEI: 2 Paratypen, St. Simon's Island, Glynn Co. Georgia, 30. VIII. 1911, leg. REHN & HEBARD.

brevispes CHOPARD, 1937 (*Duolandrevus*)

(Arb. morph. tax. Ent., 4, 138–139)

♂ Holotypus, Nord Palawan, Binaluan, XI./XII. 1913, leg. BOETTCHER, im DEI.

castaneus CHOPARD, 1937 (*Loxoblemmus*)

(Arb. morph. tax. Ent., 4, 137–138, Fig. 1)

♂ Holotypus, Nord Palawan, Bacuit, XII. 1913, leg. BOETTCHER, im DEI.

curtipennis CHOPARD, 1937 (*Duolandrevus*)

(Arb. morph. tax. Ent., 4, 139–140)

♂ Holotypus, ♀ Paratypus, Nord Palawan, Binaluan, XI./XII., 1913, leg. BOETTCHER, im DEI.

duplicovenatus CHOPARD, 1937 (*Aphonomorphus*)

(Arb. morph. tax. Ent., 4, 149)

♀ Holotypus, Peru, Chanchamayo, leg. HEYNE, im DEI.

formosanus KARNY, 1915 (*Pentacentrus*)

(Suppl. Ent., 4, 70)

♂ Holotypus, Suisharyo, Formosa, X. 1911, leg. SAUTER, im DEI.

fraterculus CHOPARD, 1937 (*Heterotrypus*)

(Arb. morph. tax. Ent., 4, 148, Fig. 9)

♂ Holotypus, Nord Palawan, Binaluan, XI./XII. 1913, leg. BOETTCHER, im DEI.

ingens KARNY, 1915 (*Diestrammena*)

(Suppl. Ent., 4, 66–67)

♂ Holotypus, Taihorin, 7. VIII. 1911, leg. SAUTER, im DEI.

integer ANDER, 1933 (*Cratomelus*)

(Ent. Tidskr., 54, 138–139, Fig. 1, 2)

♂ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, Santiago, Chile, XII. 1925, leg. FAZ, im DEI.

maculifrons CHOPARD, 1937 (*Anaxipha*)

(Arb. morph. tax. Ent., 4, 141–142, Fig. 4)

♂ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, Costa-Rica, Turrialba, leg. P. & H. SCHILD, im DEI.

majusculum KARNY, 1915 (*Paratrigonidium*)

(Suppl. Ent., 4, 69)

♀ Holotypus, Akau, Formosa, XI. 1909, leg. SAUTER, im DEI.

multivenosa CHOPARD, 1937 (*Aclia*)

(Arb. morph. tax. Ent., 4, 142–144, Fig. 5, 7)

♂ Holotypus, Costa Rica, Turrialba, leg. P. & H. SCHILD, im DEI.

oya TINDALE, 1928 (*Gryllotalpa*)

(Rec. S. Aust. Mus., 4, 7–9, Fig. 2, 3)

♂ Holotypus, viele Paratypen, South Australia, Glenelg, leg. EDQUIST & TINDALE; Henley Beach, leg. REID & TINDALE; Port Elliott, Kangaroo Island, leg. LEA; im South Australian Museum.

DEI: 1 Paratypus, S. Australien, Henley Beach, 4. 1926, leg. TINDALE.

pulchella HEBARD, 1928 (*Tairona*)

(Trans. Amer. Ent. Soc., 54, 27–29, Taf. IV, Fig. 3, 4; Taf. V, Fig. 4; Taf. VI, Fig. 3)

♂ Holotypus, Hacienda Cincinnati, Sierra San Lorenzo, Magdalena, Colombia, 5000 Fuß, 10. VII. 1913, leg. CARRIKER Jr., in Sammlung HEBARD, Typen Nr. 1089; 3 ♀♀, Paratypen,

vom selben Fundort; 3 ♂♂, 24 ♀♀, vom gleichen Fundort, 4000 Fuß, 16.—25. VII. 1920; 2 ♂♂, 3 ♀♀, Minca, Magdalena, Colombia, 2500 Fuß, 24. VII. 1920, leg. REHN & HEBARD; 1 ♂, Hacienda Victoria, Sierra San Lorenzo, Magdalena, Colombia, 4100 Fuß, 31. VII. 1920, leg. HEBARD; 1 ♂, 1 ♀, Eisenbahnlinie zwischen Hacienda Cincinnati und Hacienda Vista Nieve, Sierra San Lorenzo, Magdalena, Colombia, 4500—4700 Fuß, 21. VII. 1920, leg. REHN. DEI: 1 Paratypus, Minca, Magdalena, Sierra San Lorenzo, Colombia, 2500 Fuß, 24. VII. 1920, leg. HEBARD; 1 Paratypus, Hacienda Cincinnati, Sierra San Lorenzo, Magdalena, Colombia, 4500 Fuß, 16.—25. VII. 1920, leg. REHN & HEBARD.

unipartitus KARNY, 1915 (*Heterotrypus*)

(Suppl. Ent., 4, 67—68)

♀ Holotypus, Takao, Formosa, XI. 1907, leg. SAUTER, im DEI.

varians HEBARD, 1932 (*Sympyloxiplus*)

(Trans. Amer. Ent. Soc., 58, 360—362, Taf. XX, Fig. 7, 8)

♂ Holotypus, Punta Gorda, British Honduras, II. 1931, leg. WHITE, in Sammlung HEBARD, Typen Nr. 1208; 17 ♂♂, 4 ♀♀, mit den selben Angaben; 3 ♂♂, 1 ♀, Lancetilla Atlantida, Honduras, 26. VIII. 1930, leg. REHN; 1 ♂, Valles, San Luis Potosi, Mexico, 26. I. 1906, leg. HEBARD; 4 ♂♂, 2 ♀♀, San Rafael, Vera Cruz, Mexico, leg. HEBARD; 2 ♂♂, 1 ♀, Medellin, Vera Cruz, Mexico, IX. 1895, leg. HEBARD; 1 ♀, Cordoba, Vera Cruz, Mexico, XI. 1887, leg. BRUNNER; 1 juv. ♀, Vera Cruz, Mexico, 14. I. 1927, leg. HEBARD.
DEI: 1 Paratypus, Punta Gorda, British Honduras, III. 1931, leg. WHITE.

vittatum CHOPARD, 1937 (*Aclodes*)

(Arb. morph. tax. Ent., 4, 144—145)

♀ Holotypus, Costa Rica, Turrialba, 900 m, 23. XI. 1923, leg. P. & H. SCHILD, im DEI.

Tettigonoidea

abbreviata ebneri UVAROV, 1921 (*Gampsocleis*)

(Ent. Rec., 33, 159)

♀ Holotypus, 49 ♂♂, 63 ♀♀, Paratypen, Umgebung Saloniki.
DEI: 1 ♂, 3 ♀♀, Paratypen, V./VI. 1916, leg. BURR.

confusus FINOT, 1897 (*Ephippiger*)

(Ann. Soc. Ent. France, 65, 542—543)

Mehrere ♂♂ und ♀♀, Syntypen, Algerien, Chabet-et-Ameur, 6.—9., leg. FINOT; Bordj-Ménaïel, 7.—8., 6. Larven, leg. FINOT; Tunesien, Tebaurouk, 8., leg. SICARD.
DEI: 1 Syntypus, Chabet el Ameur.

furcata sinaloa HEBARD, 1932 (*Scudderia*)

(Trans. Amer. Ent. Soc., 58, 306—307)

♂ Holotypus, Venvidio, Sinaloa, Mexico, 18. VIII. 1918, leg. KUSCHE, in Sammlung HEBARD, Typen Nr. 1201; 7 ♂♂, 9 ♀♀, 1 juv., vom selben Fundort, 11. VIII.—2. IX. 1918; 3 ♀♀, Los Mochis, Sinaloa, 2.—10. XII. 1917, leg. KUSCHE; 1 ♂, Villa Union, Sinaloa, 27. IX. 1918, leg. KUSCHE.
DEI: 1 Paratypus, Villa Union, Sinaloa, Mexico, 27. IX. 1918, leg. KUSCHE; 1 Paratypus, Venvidio Sinaloa, Mexico, 15. VIII. 1918, leg. KUSCHE.

hoozanensis KARNY, 1915 (*Elimaea*)

(Suppl. Ent., 4, 76)

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Hoozan, Formosa, IX. 1910, leg. SAUTER.
DEI: 1 ♀, mit den Angaben der Beschreibung.

karnya WILLEMSSE, 1933 (*Tarphe*)

(Naturh. Maandbl., 22, 18)

♀ Holotypus, China, Kreis Nanchuan, Cinfu-Shan, 1929—31, leg. FRIEDRICH, im DEI.

micropora HEBARD, 1926 (*Canlopsis*)

(Trans. Amer. Ent. Soc., 52, 333—335, Taf. XXI, Fig. 12)

♂ Holotypus, Aracataca, Magdalena, Colombia, 8. VIII. 1920, leg. HEBARD, in Sammlung HEBARD, Typen Nr. 1066; 10 ♂♂, 1 ♀, Paratypen, mit den selben Angaben; 1 ♂, Cordoba, El Valle, Colombia, 23. V. 1918, leg. CARRIKER Jr.; 1 ♀, Medellin, Vera Cruz, Mexico, leg. HYDE; 1 ♂, 1 ♀, Eden, Nicaragua, 13. IV./4. VI. 1922, leg. HUBER, in der Sammlung A.N.S.P.; 1 ♂, San Ramon, Rio Wanks, Nicaragua, Cape Gracias, 375 Fuß, V./VI. 1905, leg. PALMER, in der Sammlung A.N.S.P.; 1 ♀, Gatun, Canal Zone, Panama, 22. VIII. 1916, leg. HARROWER; 1 ♂, Barro Colorado Island, Gatun Lake, Canal Zone, Panama, 19. VII. 1924, leg. BANKS, im Mus. Comp. Zool.; 3 ♀♀, Limon Plantation, Rio Chagres, Panama, 14. VII. 1918, leg. DIETZ & ZETEK, im U.S.N.M.; 1 ♂ Pinogana, Darien, Panama, XII. 1915, leg. MUÑOZ; 1 ♂, Boca, Murindo, Intendencia del Choco, Colombia, 9. II. 1918, leg. CARRIKER Jr.

DEI: 1 Paratypus, Aracataca, Magdalena, Colombia, 8. VIII. 1920, leg. HEBARD.

schenklingi KARNY, 1915 (*Elimaea*)

(Suppl. Ent., 4, 75—76)

2 ♂♂, 1 ♀, Syntypen, Kankau (Koshun), Formosa, V. 1912, leg. SAUTER.

DEI: 1 ♂, 1 ♀, Kankau, Formosa, V. 1912, leg. SAUTER.

simplex HEBARD, 1932 (*Microcentrum*)

(Trans. Amer. Ent. Soc., 58, 317—319, Taf. XX, Fig. 1; Taf. XXI, Fig. 9, 10)

♂ Holotypus, Morales, Izabal, Guatemala, VIII. 1929, leg. WHITE, in Sammlung HEBARD, Typen Nr. 1197; 15 ♂♂, 3 ♀♀, Paratypen vom selben Fundort, VII.—IX. 1929; 1 ♀, France, Field, Canal Zone, Panama, 7. VII. 1920, leg. HEBARD; 1 ♀, Red Tank, Canal Zone, Panama, 1. VII. 1924, leg. BANKS, im Mus. Comp. Zool.; 1 ♂, San Rafael, Vera Cruz, Mexico, leg. TOWNSEND; 1 ♂, Teocelo, Vera Cruz, Mexico, IX., leg. BARRETT, im A.N.S.P.; 1 ♀, Tehuacan, Puebla, Mexico, 1903, leg. DIGUET, in Sammlung HEBARD; 1 ♂, Patrerillos, Cortes, Honduras, 800 Fuß, 20. VIII. 1930, leg. REHN, im A.N.S.P.

DEI: 1 Paratypus, Morales, Guatemala, XI. 1929, leg. WHITE.

sinaloae HEBARD, 1925 (*Insara*)

(Trans. Amer. Ent. Soc., 51, 293—295, Taf. VII, Fig. 8)

♂ Holotypus, Venividio, Sinaloa, Mexico, 2. IX. 1918, leg. KUSCHE, in Sammlung HEBARD, Typen Nr. 1038; 17 ♂♂, 9 ♀♀, Paratypen, vom selben Fundort, 8. VIII.—2. IX. 1918.

DEI: 1 ♂, 1 ♀, Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

sinaloae HEBARD, 1925 (*Montezumina*)

(Trans. Amer. Ent. Soc., 51, 297—299, Taf. VII, Fig. 10—12)

♂ Holotypus, Venividio, Sinaloa, Mexico, 2. IX. 1918, leg. KUSCHE, in Sammlung HEBARD, Typen Nr. 984; 30 ♂♂, 7 ♀♀, 7 juv. Paratypen, vom selben Fundort, 8. VIII.—2. IX. 1918; 1 ♀, Villa Union Sinaloa, 27. IX. 1918.

DEI: 1 Paratypus, Venividio, Sinaloa, Mexico, VIII. 1918, leg. KUSCHE.

tridactyla REHN & HEBARD, 1914 (*Dichopetala*)

(Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, 66, 149—155, Fig. 50, 51, 53, 55, 57, 59)

♂ Holotypus, Camacho, Zacatecas, Mexico, XI. 1887, leg. BRUNER, in Sammlung HEBARD; 4 ♂♂, 14 ♀♀, Paratypen, mit den selben Angaben; 2 ♀♀, Jimulco, Couhuila, Mexico, XI., leg. BRUNER, in Sammlung HEBARD.

DEI: 1 ♀, Paratypus, Comancho, Mexico, XI. 1887.

trigonia RAGGE, 1957 (*Phaneroptera*)

(Proc. Ent. Soc. London, Ser. B, 26, 124–126, Fig. 1–4)

♂ Holotypus, Takao, Formosa, 11. VIII. 1907, leg. SAUTER, im Museum Wien; 8 ♀♀, mit den selben Angaben; 2 ♂♂, 2 ♀♀, Kankau, Formosa, IV./V./VI. 1912, leg. SAUTER, im DEL DEI; 3 Paratypen, Kankau (Koshun), Formosa, V./VII. 1912, leg. SAUTER.

Wahrscheinlich nicht beschrieben:

similis DOHRN (*Casigneta*)

1 Ex. Sumatra, Soekaranda, DOHRN, als Typus ausgezeichnet.

Acriidoidea***aberrans*** WILLEMS, 1932 (*Oedipodacris*)

(Ann. Soc. Ent. France, 101, 289, Taf. XI, Fig. 3, 4)

♀ Holotypus, Khasia Hills, Assam, im DEI.

aberrans WILLEMS, 1937 (*Phlaeoba*)

(Natuurh. Maandbl., 26, 48, Fig. 1)

♀ Holotypus, Borneo, Nord-Palawan, Binaluan, XI./XII. 1913, leg. BOETTCHER, im DEI.

adetogyrus HUBBELL, 1932 (*Melanoplus*)

(Misc. Publ. Mus. Zool. Univ. Michigan, 28, 36–41, Taf. III, Fig. 31)

♂ Holotypus, Florida, De Leon Springs, 8.–9. IX. 1917, leg. REHN & HEBARD, in Sammlung HEBARD; 84 Paratypen, Florida, nähere Angaben siehe Originalbeschreibung.
DEI: 2 Paratypen, mit den Angaben des Holotypus.

africana chinensis WILLEMS, 1933 (*Gastrimargus*)

(Natuurh. Maandbl., 22, 15–16, Fig. 1)

31 ♂♂, 55 ♀♀, Syntypen, China, Dsachi Bezirk, Tatsienlu, VIII.–IX. 1930, im DEI.
DEI: 1 ♂, 1 ♀, mit den Angaben der Beschreibung.

amphinotoides GÜNTHER, 1939 (*Bolivarilettix*)

(Abh. u. Berichte d. Staatl. Mus. f. Tier.- u. Völkerk. Dresden, 20, Reihe A, 50–81, Fig. 46, 47)

♀ Holotypus, Philippinen, Isla de Siargao, leg. BOETTCHER, im DEI.

apalachicolae HUBBELL, 1932 (*Melanoplus*)

(Misc. Publ. Mus. Zool. Univ. Michigan, 28, 41–46, Taf. I, Fig. 1, 3.; Taf. II Fig. 20)

♂ Holotypus, Camp. Torreya, Liberty County, Florida, 29. VII. 1925, leg. HUBBELL, im Museum of Zoology, University of Michigan; 41 ♂♂, 30 ♀♀, Paratypen, Florida, nähere Angaben siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 Paratypus, Liberty Co., Florida, Camp Torreya, 30. VIII. 1925, leg. HUBBELL.

arabicus UVAROV, 1936 (*Stenohippus*)

(Journ. Linn. Soc. Zool., 39, 540–541)

♂ Holotypus, Hedjaz, Mecca, 20. X. 1931; 6 ♂♂, 9 ♀♀, vom selben Fundort, 8. III.–9. X.; 1 ♀, Jidda, 28. III. 1930; 1 ♂, 1 ♀, Medina, 17. VI. 1931; 2 ♂♂, 2 ♀♀, Hafair, 10. VIII. 1934; leg. PHILBY.

DEI: 1 Paratypus, Hedjaz, Mecca, 6. X. 1931; 1 Paratypus, Medina, 17. VI. 1931; leg. PHILBY.

armillatus KARNY, 1915 (*Parapleurus*)

(Suppl. Ent., 4, 83–84)

Syntypen, 1 ♂, Taihorinsho; 1 ♀, Hoozan.

DEI: 1 ♀, Hoozan, Formosa, 1910, leg. SAUTER.

boettcheri GÜNTHER, 1938 (*Scelimena*)

(Mitt. Zool. Mus. Berlin, 28, 389–391)

11 ♂♂, 7 ♀♀, Syntypen, Nord-Palawan, Binaluan, XI./XII. 1913, leg. BOETTCHER, im DEI.

DEI: 12 Syntypen mit den Angaben der Beschreibung.

boettcheri GÜNTHER, 1938 (*Syzygoptetrix*)

(Stett. Ent. Ztg., 99, 198–199, Fig. 90–92)

7 ♂♂, 6 ♀♀, Syntypen, Nord-Palawan, Binaluan, XI./XII. 1913, leg. BOETTCHER.

DEI: 9 Syntypen mit den Angaben der Beschreibung.

bürgersi RAMME, 1941 (*Desmopterella*)

(Mitt. Zool. Mus. Berlin, 25, 64–65, Taf. IX, Fig. 4, Textfig. 30)

♂ Holotypus, 3 ♀♀, Paratypen, Regenberg, 550 m, 8.–15. V.; weitere Paratypen, 13 ♂♂, 2 ♀♀, Lager am Töpferfluß, 4. u. 5.; 5 ♂♂, 14 ♀♀, Hauptlager bei Malu, 1. u. 2.; 7 ♂♂, 4 ♀♀, Lager am Lehmfluß, 4. u. 5.; 3 ♂♂, 7 ♀♀, Lager am Rosensee, 2.; 2 ♂♂, Hundsteinspitz, 3.; 3 ♀♀, Schraderberg, 5.; sämtlich von der Deutschen Kaiserin Augusta Fluß-Expedition, 1912–13, leg. BÜRGERS; 2 ♂♂, 3 ♀♀, Neu Guinea, 7. 1896; 2 ♀♀, Oertzengebirge, 5. 1898, leg. LAUTERBACH; 5 ♀♀, Simpsonhafen, 5. 1909; 2 ♀♀, Berlinhafen, leg. SCHOEDE; 1 ♀, Satelberg, leg. NEUHAUSS; 1 ♀, Wasior, Wandammen, 7. 1928, leg. MAYER; 3 ♀♀, Neupommern, Karlei, Weite Bucht, 1929, leg. SCHNEIDER; im Museum Berlin.

DEI: 2 Paratypen, D. N. Guinea, Lager am Töpferfluss, 16./19. IV. 1913, leg. BÜRGERS.

bugoiensis REHN, 1914 (*Paralobopoma*)

(Wiss. Ergeb. Dtsch. Zentr. Afr. Exped., 5, III, 73–75)

♀ Holotypus, 2 ♀♀, Paratypen, Bugoie-Wald, nordwestlich Ruanda, 2500 m, im Museum Berlin; 21 ♂♂, 76 ♀♀, 4 Larven in Alkohol, vom gleichen Fundort, II.–XI. 1908, leg. STEGMANN-STEIN; 1 ♂, Rugege-Wald, südwestlich Ruanda, 1800 m, 20. VIII. 1907, leg. SCHUBOTZ.

DEI: 1 Paratypus, Bugoie Forest. Ruanda, C. Afrika, II.–XI. 1908, leg. STEGMANN-STEIN.

burri UVAROV, 1953 (*Cophohippus*)

(Publ. Cult. Comp. Diamant Angola, 21, 180–181, Fig. 239–241)

Angola, Moxico district, ♂ Holotypus, 1 ♂, 1 ♀, Upper Mu-Simoj river, 27. IX. 1927; 1 ♀, Upper Luena river, 26.–28. V. 1927; 4 ♂♂, 9 ♀♀, Villa Luso, 1.–9. VI. 1927; 2 ♂♂, Busaco, 23. VI. 1927; 6 ♀♀, r. Chimbumba, tributary of r. Lumeji, 6. VII. 1927; 1 ♂ Munhangao, Lungue Bungu road, 24. X. 1927; 1 ♂, 5 ♀♀, valley of r. Mu-Simoj, 25. X. 1927; Bihé district, 1 ♀, Cohemba, 29.–31. VIII. 1927; 1 ♂, 2 ♀♀, 1.–4. IX. 1927; Luchase district, 1 ♀, r. Makontole, 11. X. 1927; 3 ♂♂, 1 ♀, r. Quangu, 15. X. 1927; Belgian Congo, Katanga province, 1 ♀, r. Lubudi, 12. XI. 1927; alle leg. BURR; Northern Rhodesia, 1 ♀, Abercorn, 25. VIII. 1950, leg. BREDO.

DEI: 2 Paratypen, Angola, Moxico Distr., Villa Luso, 1.–9. VI. 1927, leg. BURR.

ceraseus UVAROV, 1922 (*Rhachitopis*)

(Trans. Ent. Soc. London, 1922, 145–146, Taf. I, Fig. 4)

♂ Holotypus, Herbert, Cape Province, 15. V. 1917, leg. LOUNSBURY; 1 ♀, Stydenburg, Cape Province, 26. II. 1917, leg. LOUNSBURY; 4 ♂♂, 1 ♀, Orange Free State, Bloemfontein distr., Bethulie, Dealesville to Bloemfontein, Petrusburg, leg. LOUNSBURY; 8 ♂♂, 23 ♀♀, Orange River Colony, leg. HAMILTON, alle im British Museum.

DEI: 2 Paratypen, Orange R. Colony, 1903–19, leg. HAMILTON.

ceratiola HUBBELL & WALKER, 1928 (*Schistocerca*)

(Occ. Pap. Mus. zool. Univ. Mich., Nr. 197, 2–10)

♂ Holotypus, Orlando, Orange County, Florida, 28. VIII. 1924, leg. WALKER; 371 ♂♂, 603 ♀♀, vom selben Fundort, 28. VIII.–20. IX. 1924, leg. WALKER & HUBBELL; 2 ♂♂,

3 ♀♀, vom selben Fundort, 5. IX. 1925, leg. HUBBELL; 3 ♀♀, Apopka, Orange Co., Fla., 19. – 21. IX. 1924, leg. WALKER & HUBBELL; 1 ♂, 4 ♀♀, Tavares, Lake Co., Fla., 19. IX. 1924, leg. WALKER & HUBBELL; 1 ♀, Altamonte Springs, Siminole Co., Fla., VIII. 1924, leg. WALKER, im Museum of Zoology, University of Michigan.

DEI: 6 Paratypen, Orange Co., Fla., Orlando, 19. IX. 1924, leg. WALKER.

chinensis WILLEMS, 1933 (*Conophymacris*)

(Natuurh. Maandbl., 22, 17, Fig. 2)

22 ♂♂, 36 ♀♀, China, Dsaschi Bezirk, Patsienlu, 7. VIII., Type im DEI.

DEI: 1 ♂, Tjiji, 6. IX. 1830, hiermit als Lectotypus festgelegt; 9 ♂♂, 7 ♀♀, Kiulung; 1 ♂, 6 ♀♀, Dsaschi, leg. FRIEDRICH.

chinensis WILLEMS, 1932 (*Gelastorrhinus*)

(Ann. Soc. Ent. France, 101, 285 – 286, Taf. XI, Fig. 2)

♀ Holotypus, Hongkong, X. 1913, im DEI.

conradti GÜNTHER, 1939 (*Dinotettix*)

(Abh. u. Berichte d. Staatl. Mus. f. Tier- u. Völkerk. Dresden, 20, Reihe A, 202 – 203, Fig. 136)

♀ Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI.

crassipes HANCOCK, 1912 (*Euparatettix*)

(Mem. Dept. Agricult. Ind. Ent., 4, 153 – 154)

♂♂ ♀♀, Bihar, Pusa; Chapra; Pupri, Muzaffarpur; Bengal, Dacca, in Sammlung Pusa.

DEI: 2 Paratypen, Pusa, Bengal, 28. IX. 1910.

crassipes KARNY, 1915 (*Hedotettix*)

(Suppl. Ent., 4, 80 – 81)

Syntypen, 1 ♂, Chikutoki; 1 ♂, Kosempo, V. 1909, leg. SAUTER.

DEI: 1 ♂, Chikutoki, Formosa, leg. SAUTER.

cristatus KARNY, 1915 (*Hedotettix*)

(Suppl. Ent., 4, 81 – 82)

♂ Holotypus, Sokutsu, Formosa, 1912, leg. SAUTER, im DEI.

davisi HEBARD, 1918 (*Eotettix*)

(Trans. Amer. Ent. Soc., 44, 153 – 156, Taf. VIII, Fig. 13)

♂ Holotypus, De Funiak Springs, Walton County, Florida, 30. VIII. 1915, leg. REHN & HEBARD, in Sammlung HEBARD, Typen Nr. 478; 89 ♂♂, 31 ♀♀, vom selben Fundort, 29./30. VIII. 1915, Paratypen.

DEI: 1 Paratypus mit den Angaben der Beschreibung.

digitifera HEBARD, 1923 (*Chibchacris*)

(Trans. Amer. Ent. Soc., 49, 289 – 291, Taf. XVI, Fig. 5 – 7)

♂ Holotypus, La Pica, Santander, Colombia, 9000 Fuß, 10. – 15. II. 1917, leg. CARRIKER Jr., in Sammlung HEBARD, Typen Nr. 900; 17 ♂♂, 24 ♀♀, vom selben Fundort, Paratypen.

DEI: 3 Paratypen mit den Angaben der Beschreibung.

dimorphipes UVAROV, 1953 (*Orthochtha*)

(Publ. Cult. Comp. Diamant Angola, 21, 147 – 148, Fig. 180 – 183)

♂ Holotypus, 20 ♂♂, 9 ♀♀, Paratypen, N. Rhodesien, Luano Valley, Chisowe, I. – IV. 1928, leg. BURR.

DEI: 1 Paratypus mit den Angaben der Beschreibung.

dohrni palawanica GÜNTHER, 1939 (*Xistrella*)

(Abh. u. Berichte d. Staatl. Mus. f. Tier- u. Völkerk. Dresden, 20, Reihe A, 150)

2 ♂♂, Nord-Palawan, Binaluan, XI./XII. 1913; 2 ♀♀, Nord-Palawan, Bacuit, XII. 1913, leg. BOETTCHER, im DEI.

DEI: ♂ Holotypus, 1 ♂ Paratypus, N. Palawan, Binaluan, XI./XII. 1913; 1 ♀, N. Palawan, Bacuit, XII. 1913, leg. BOETTCHER.

dubia WILLEMSE, 1932 (*Gelastorrhinus*)

(Ann. Soc. Ent. France, 101, 286–287)

♂ Holotypus, Hongkong, X. 1913, im DEI.

ebneri carpathica ČEJCHAN, 1958 (*Miramella*)

(Mitt. Münch. Ent. Ges., 48, 89–90, Fig. 2, 3)

♂ Holotypus, Ostslowakische Karpathen, Rabja Skala, 71. VIII. 1957, leg. MASNER; 60 ♂♂, 59 ♀♀, Rabja Skala, leg. MASNER; Nova Sedlica, VIII. 1957, leg. GAISLER & ŠIR; Polonia Balzatul und Hoverla, Ukrainische SSR.

DEI: 2 Paratypen, Slov. N. Sedlice env., 17. VIII. 1957, leg. MASNER.

elegantula WILLEMSE, 1930 (*Paratraulia*)

(Tijdschr. voor Ent., 73, 190–191, Fig. 98)

Sumatra, Fort de Kock, 2 ♂♂, 2 ♀♀; Tandjunggadang, 3 ♂♂, 5 ♀♀; Gunung Linggalang, 1 ♂, 1 ♀; leg. JACOBSON. Der ♀ Holotypus befindet sich im Museum Leiden. Aus der Originalbeschreibung geht nicht hervor, von welchem Fundort der Holotypus ist.

DEI: 1 ♂, 1 ♀, Paratypen, Gunung, Singgalang, Westküste Sumatra, 1000 m, VII. 1925, leg. JACOBSEN.

excentrica WILLEMSE, 1932 (*Boettcheria*)

(Ann. Soc. Ent. France, 101, 147–148)

♀ Holotypus, N. Palawan, Bacuit, XII. 1913, leg. BOETTCHER, im DEI.

exiguus GÜNTHER, 1935 (*Bolotettix*)

(Arb. morph. tax. Ent. Berlin, 2, 259–260, Fig. 4)

2 ♂♂, 3 ♀♀, Long Petak, 450 m, VIII./X./XL, im Mus. Buitenzorg, Dresden und im DEI.

DEI: 1 ♀, Paratypus, Midden, O. Borneo, 27. XI. 1925.

extenuatus HANCOCK, 1906 (*Stenodorsus*)

(Ent. News. Philadelphia, 17, 91)

Zahlreiche Exemplare, Marcapata, Peru, in der Sammlung HANCOCK.

DEI: 2 Paratypen, Marcapata, Peru.

flavomaculata WILLEMSE, 1932 (*Macularis*)

(Ann. Soc. Ent. France, 101, 153–154)

Mindanao, Surigao, ♂ Holotypus, 1 ♂ Paratypus, in Sammlung WILLEMSE, 1 ♂, im DEI, 1 ♂ im Museum Stockholm, 1 ♂ Dinagat, Philippines, in Sammlung WILLEMSE.

DEI: 1 Paratypus, Surigao Mindanao.

forcipatus HUBBELL, 1932 (*Melanoplus*)

(Misc. Publ. Mus. Zool. Univ. Michigan, 23, 51–56, Taf. I, Fig. 5, 6, Taf. II, Fig. 22, 23)

♂ Holotypus, 5,5 Meilen westlich von Orlando, Orange County, Florida, 6. IX. 1924, leg. WALKER; 97 Paratypen, Florida, nähere Angaben siehe Originalbeschreibung.

DEI: 2 Paratypen, Orange Co., Florida, Orlando, VIII. 1924, leg. WALKER.

fuscocineta portugalensis RAMME, 1931 (*Oedipoda*)

(Mitt. Zool. Mus. Berlin, 17, 193, Taf. I, Fig. 5)

Ca. 30 Paare aus Porto, Portugal, im Museum Berlin.
DEI: 4 Paratypen, Porto, Portugal.

gracilis WILLEMS, 1932 (*Meubelia*)

(Ann. Soc. Ent. France, 101, 282)

Philippines, Bucas, 3 ♀♀, davon ♀ Holotypus, in Sammlung WILLEMS; Philippines, Siargao; Philippines, Dinagat; Philippines, Catbalogan, in Sammlung WILLEMS; Philippines Panaon, Siargao, im DEI; Philippines Bucas 1 ♀; Mindanao, Surigao, im Museum Stockholm.

DEI: 1 Ex. Siargao, Philippinen; 1 Ex. Panaon, Philippinen.

gracilis WILLEMS, 1932 (*Philippinacris*)

(Ann. Soc. Ent. France, 101, 284–285, Taf. XII, Fig. 7)

♂ Holotypus, Mindanao, Surigao; 5 ♂♂, Philippines, Siargao, 4 ♂♂, in Sammlung WILLEMS, 1 ♂, im DEI; 2 ♂♂ Philippines, Bucas, 1 ♂, in Sammlung WILLEMS, 1 ♂ im Museum Stockholm, Paratypen.

DEI: 1 Paratypus, Siargao, Philippinen.

heldreichi adaliae UVAROV, 1928 (*Tmethis*)

(Ent. Mitt., 17, 176–177)

♂ Holotypus, Paratypen, 1 ♂, 3 ♀♀, Adalia, 15. VI. 1927; 1 ♀, Koppeshan, 3. VI. 1927, S. W. Anatolien. Holotypus, Paratypen, im DEI; 1 ♂, 2 ♀♀, Paratypen, im British Museum (N.H.)
DEI: Holotypus, 2 Paratypen mit den Angaben der Beschreibung.

hesperus MORSE, 1899 (*Paratettix*)

(Journ. N. York. Ent. Soc., 7, 198)

276 ♂♂, ♀♀, Syntypen, Glendale Or., 9. IX. 1897, leg. MORSE; 303 Adulte Ashland, Corvallis, Drain, Philomath, Or., 7.–15. IX.; Ahwanee, Calif., 15. VIII., leg. MORSE; Dallas, Or., Wickham (BRUNER), Sonoma, Marin Co., Calif., leg. OSTEN SACKEN. Santa Cruz, 3. VIII.; Palo Alto, 10./12. V./3. VIII.; Mt. Hamilton, 13.–24. V.
DEI: 6 Syntypen, Glendale Or., 9. IX. 1897.

insignis HEBARD, 1923 (*Amblytropidia*)

(Trans. Amer. Ent. Soc., 49, 198–201, Taf. XI, Fig. 18, 19)

♂ Holotypus, Gatun, Canal Zone, Panama, 16.–22. VIII. 1916, leg. HARROWER, in Sammlung HEBARD, Typen Nr. 457; Paratypen, 39 ♂♂, 16 ♀♀, vom selben Fundort, 12. VII. bis 22. VIII. 1916, leg. HARROWER, in Sammlung HEBARD; 1 ♂, westlich von Empire, Canal Zone, Panama, 14. IX. 1913, leg. HEBARD; 1 ♂, Hacienda Cincinnati, Sierra San Lorenzo, Magdalena, Colombia, 10. VII. 1913, leg. CARRIKER JR., 1 ♀, Susumuco; Cundinamarca, Colombia, 10. X. 1917, leg. MARIA; 1 ♀, Villavicencio, Intendencia del Meta, Colombia, V. 1917, leg. MARIA.
DEI: 3 Paratypen, Gatun, Panama, 12.–22. VII. 1916, leg. HARROWER.

javanicum WILLEMS, 1932 (*Anacridium*)

(Ann. Soc. Ent. France, 101, 143)

♀ Holotypus, Java, Pradjekan, im DEI.

kankauense KARNY, 1915 (*Acrydium*)

(Suppl. Ent., 4, 79)

Syntypen, 9 ♂♂, 14 ♀♀, 1 ♀ Larve, Kankau (Koshun), Formosa, IV. 1912, leg. SAUTER.
DEI: 10 Syntypen mit den Angaben der Beschreibung.

lithoeolletus REHN & REHN, 1934 (*Gymnotettix*)

(Mem. Amer. Ent. Soc., 8, 14–21, Taf. 1, Fig. 1; Taf. III, Fig. 11–15)

♂ Holotypus, Cantarranas, Rio Choluteca, Department of Tegucigalpa, Honduras, 2200 Fuß, 4. VIII. 1930, leg. REHN, in der Sammlung der Acad. Nat. Sci. Philadelphia, Typen Nr. 5532; 55 ♂♂, 84 ♀♀, Paratypen, vom selben Fundort, 19. VII.–9. VIII. 1930; 1 ♂, 1 ♀, Minas de Oro, Department of Comayagua, leg. EDWARDS, im Mus. Comp. Zool.
DEI: 1 ♂, 1 ♀, Paratypen, Cantarrana, Rio Choluteca, Honduras, 2200 Fuß, 4. VIII. 1930.

magnifica UVAROV, 1923 (*Staurocleis*)

(Ann. Mag. Nat. Hist., (9) 11, 682–684)

♂ Holotypus, Entebbe Uganda, 5. III. 1913, leg. GOWDEY; 112 ♂♂ ♀♀, vom selben Fundort und von Chagwe, Mabina Forest, Mbale, Tero in Uganda.
DEI: 1 Paratypus, Entebbe, 4. IX. 1912.

marcapata HANCOCK, 1906 (*Otumba*)

(Gen. Ins., 48, 44)

Pachitea und Marcapata, Peru.

DEI: 1 Paratypus, Marcapata, Peru.

millierei FINOT, 1884 (*Dericorys*)

(Bull. Soc. Ent. France, 1884, 27)

Syntypen, Oran, Algerien.

DEI: 2 Syntypen, Oran, 13. IX. 1879.

mindanaensis GÜNTHER, 1938 (*Hirrius*)

(Mitt. Zool. Mus. Berlin, 23, 304)

1 ♂, 2 ♀♀, Syntypen, Mindanao, Ganao, leg. SCHULTZE.

DEI: 2 Syntypen mit den Angaben der Beschreibung.

minuta UVAROV, 1953 (*Quangula*)

(Publ. Cult. Comp. Diamant Angola, 21, 197–198, Fig. 270–273)

Angola, Luchase district, ♂ Holotypus, 7 ♂♂, 8 ♀♀, Paratypen, r. Quangu, 13.–16. X. 1927; Moxico district, 3 ♂♂, 1 ♀, r. Munhang, 10. VIII. 1927; 1 ♀, Busaco, 28. VI. 1927; 1 ♂, r. Subengile, 18. VIII. 1927; 5 ♂♂, 9 ♀♀, r. Lungue Bungu, 8. X. 1927; 1 ♂, r. Mu-Simoj, 25. X. 1927; Bihé district, 3 ♂♂, 6 ♀♀, Cohemba, 20.–26. VIII. 1927; alle leg. BURR.
DEI: 1 Ex. Angola, Distr. of Luchase, River Quangu, 18. X. 1927, leg. BURR; 1 Ex. Angola, Distr. of Moxico, Valley of River, Mu-Simoj, 25. X. 1927, leg. BURR.

mirandus REHN, 1929 (*Hylopedetes*)

(Trans. Amer. Ent. Soc., 55, 62–66, Taf. I, Fig. 6; Taf. II, Fig. 2; Taf. III, Fig. 4, 5; Taf. IV, Fig. 12, 14)

♂ Holotypus, La Emilia, near Guäpiles, Costa Rica, 1000 Fuß, 15. VIII. 1923, leg. REHN, in der Sammlung der Acad. Nat. Sei. Philadelphia, Typen Nr. 5467; Paratypen alle vom selben Fundort, 1 ♀, 22. VII. 1929; 2 ♂♂, 6 ♀♀, 15. VIII. 1923; 1 ♂, 6 ♀♀, 16. VII. 1923; 1 ♀, 18. VIII. 1923; 1 ♂, 20. VIII. 1923.

DEI: 2 Paratypen mit den Angaben der Beschreibung, 5./6. VIII. 1923.

modestus crypsidomus HEBARD, 1922 (*Agroecotettix*)

(Trans. Amer. Ent. Soc., 48, 53–55, Taf. II, Fig. 4–6)

♂ Holotypus, Marathon, Brewster County, Texas, 3940–4160 Fuß, 12. IX. 1912, leg. REHN & HEBARD, in Sammlung HEBARD, Typen Nr. 750; 87 ♂♂, 102 ♀♀, Paratypen aus Texan und Mexico, nähere Angaben siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 Paratypus, Marathon, Brewster Co., Texas, 26.–27. VIII. 1912, leg. REHN & HEBARD.

multicolora WILLEMSE, 1932 (*Eoacridium*)(Ann. Soc. Ent. France, **101**, 155–156)

Holotypus, Paratypus, Mindanao, Surigao, Holotypus im Museum Stockholm.
DEI: 1 Paratypus mit den Angaben der Beschreibung.

multicoloris WILLEMSE, 1932 (*Conuacris*)(Ann. Soc. Ent. France, **101**, 291)

♂ Holotypus, 2 ♂♂ Paratypen, 1 ♂ durch Phenol entfärbt, Borneo, Nord-Palawan, Binaluan, XI.–XII. 1913, leg. BOETTCHER.

DEI: Holotypus, 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

nitidula KARSCH, 1891 (*Segellia*)(Berl. Ent. Zeitschr., **36**, 185)

Syntypen, zahlreiche Exemplare beider Geschlechter von der Barombi-Station, Kamerun, leg. PREUSS, im Museum Berlin.

DEI: 1 ♂, 1 ♀, mit den Angaben der Beschreibung.

obtusoalatus SJÖSTEDT, 1933 (*Coryphistes*)(Ark. Zool., **25**, B, Nr. 5, 1–2, Textfig. 1, 2)

2 ♀♀ Syntypen, N.S. Wales, leg. BOETTCHER, im DEI und Museum Stockholm.

örtendahli SJÖSTEDT, 1932 (*Karasicola*)

(Soc. Ent. France Livre Centenaire, 548–549, Taf. XXVII, Fig. 4, 4a, 4b, 5)

36 ♂♂, ♀♀, Syntypen, S. W. Afrika, Klein Karas, IV./V. 1931, leg. ÖRTENDAHL, im Museum Stockholm.

DEI: 1 Syntypus mit den Angaben der Beschreibung.

olsufieffi GÜNTHER, 1939 (*Rehnitettix*)(Abh. u. Berichte d. Staatl. Mus. f. Tier- u. Völkerk. Dresden, **20**, A, 93)

♀ Holotypus, Madagaskar, Forêt Analamazotra-Perinet, XII. 1930, leg. OLSUFIEW, im DEI.

oresterus REHN & REHN, 1934 (*Sethus*)

(Mem. Amer. Ent. Soc., 8, 49–54, Taf. II, Fig. 3; Taf. V, Fig. 42–49)

♂ Holotypus, Peña Blanca, above Rosario Mine, San Juancito Mountains, Honduras, 5900 Fuß, 22. VII. 1930, leg. REHN, in der Sammlung der Acad. Nat. Sci. Philadelphia, Typen Nr. 5530; 18 ♂♂, 29 ♀♀ vom selben Fundort, 11.–26. VII., 14. VIII. 1930, leg. REHN.
DEI: 1 ♀ Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, 26. VII. 1930.

palawicana WILLEMSE, 1935 (*Traulia*)

(Ent. Ber., 9, 139)

♀ Holotypus, Borneo, Nord-Palawan, Binaluan, XI./XII., leg. BOETTCHER, im DEI nicht vorhanden, 1940 an RAMME ausgeliehen, nach dessen Tod in seinem Nachlaß nicht aufzufinden.

palawanica GÜNTHER, 1938 (*Thoradonta*)(Stett. Ent. Ztg., **99**, 130–131, Fig. 13, 14)

2 ♂♂, 2 ♀♀, Syntypen, Nord-Palawan, Binaluan, XI. XII. 1913, leg. BOETTCHER.
DEI: 3 Syntypen mit den Angaben der Beschreibung.

palawanicus GÜNTHER, 1939 (*Bolivaritettix*)(Abh. u. Berichte d. Staatl. Mus. f. Tier- u. Völkerk. Dresden, **20**, A, 80)

8 ♂♂, 6 ♀♀, Syntypen, Nord-Palawan, Binaluan, XI./XII. 1913, leg. BOETTCHER, im DEI.

palaeanicus GÜNTHER, 1938 (*Falconius*)(Mitt. Zool. Mus. Berlin, **29**, 404–405)

1 ♂, 2 ♀♀, Nord-Palawan, Binaluan, XI./XII. 1933, leg. BOETTCHER.
 DEI: ♀ Holotypus, 1 ♂, 1 ♀, Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

palaeanicus GÜNTHER, 1939 (*Paraguelus*)(Abh. u. Berichte d. Staatl. Mus. f. Tier- u. Völkerk. Dresden, **20**, A, 39–40)

4 ♀♀, Syntypen, Nord-Palawan, Binaluan, XI./XII. 1913, leg. BOETTCHER.
 DEI: 3 Syntypen mit den Angaben der Beschreibung.

paraguensis GÜNTHER, 1939 (*Bolivaritettix*)(Abh. u. Berichte d. Staatl. Mus. f. Tier- u. Völkerk. Dresden, **20**, A, 82–83, Fig. 48, 49)

4 ♂♂, 3 ♀♀, Syntypen, Nord-Palawan, Binaluan, 11. XII. 1913, leg. BOETTCHER.
 DEI: 5 Syntypen mit den Angaben der Beschreibung.

pedestris UVAROV, 1953 (*Pseudogmothela*)(Publ. Cult. Comp. Diamant Angola, **21**, 187–188, Fig. 246)

♂ Holotypus, 13 ♂♂, 13 ♀♀, Paratypen, Northern Rhodesia, Luano Valley, Chisorwe, 30. I. bis 30. III. 1928, leg. BURR.

DEI: 2 Paratypen mit den Angaben der Beschreibung, 3. II./8. III. 1928.

plagiata UVAROV, 1953 (*Dnopherula*)(Publ. Cult. Comp. Diamant Angola, **21**, 178–179, Fig. 237, 238)

Angola, Luchase district, ♂ Holotypus, river Quangu, 15. X. 1927; Moxico district, 1 ♀, r. Luenha, village of Katula, 18. V. 1927; 2 ♂♂, 2 ♀♀, Villa Luso, 1.–9. VI. 1927; 1 ♂, 1 ♀, circa mile 1475, 4.–10. VIII. 1927; 4 ♂♂ r. Lungue Bungu, 3. X. 1927; Bihé district, 1 ♂, 2 ♀♀, Cohemba, 21.–31. VIII. 1927; 1 ♂, 14.–15. IX. 1927; Belgian Congo, Katanga province, 1 ♂, 1 ♀, Nasantoye, r. Lubudi, 12. XI. 1927; alle leg. BURR.

DEI: 2 Paratypen, Angola, Distr. of Moxico, Villa Luso, 300 Fuß, 1.–9. VI. 1927, leg. BURR.

platynota KARNY, 1915 (*Potua*)(Suppl. Ent., **4**, 77–78)

Syntypen, 1 ♀, Sokutsu, Banshoryo-Distr., 1912; 1 ♂, Kosempo, V. 1912.

DEI: ♀ Syntypus Sokutsu, Banshoryo-Distr., 22. VI. 1912, leg. SAUTER.

podisma KARNY, 1915 (*Oxya*)(Suppl. Ent., **4**, 86–87)

2 ♂♂, 1 ♀, Syntypen, Hoozan, Formosa, 1910, leg. SAUTER.

DEI: 2 Syntypen mit den Angaben der Beschreibung.

productus SJÖSTEDT, 1935 (*Paratettix*)(Kungl. Sv. Vet. Akad. Handl., **15**, Nr. 2, 14)

♂ Holotypus, N. S. Wales, Sydney, leg. LÜDDEMANN, im DEI.

prolongatus HANCOCK, 1899 (*Allotettix*)(Ent. News. Philadelphia, **10**, 276–277)

Bolivien, in Sammlung HANCOCK.

DEI: 1 Paratypus, Bolivien.

puer seminote HUBBELL, 1932 (*Melanoplus*)(Misc. Publ. Mus. Zool. Univ. Michigan, **28**, 28–32, Taf. III, Fig. 27–29)

♂ Holotypus, Arcadia, De Soto Co., 27. VIII. 1923, leg. WALKER, in Sammlung HEBARD; 116 Paratypen, Florida, nähere Angaben siehe Originalbeschreibung.

DEI: 2 Paratypen, Manatee Co., Florida, Manatee, 22. VIII. 1925, leg. HUBBELL.

pulchella HEBARD, 1925 (*Sinaloa*)

(Trans. Amer. Ent. Soc., 51, 288–289, Taf. VII, Fig. 6; Taf. VIII, Fig. 2, 3)

♂ Holotypus, Venvidio, Sinaloa, Mexico, 2. IX. 1918, leg. KUSCHE, in Sammlung HEBARD,
Typen Nr. 982; 5 ♂♂, 8 ♀♀, Villa Union, Sinaloa, 21./27. IX. 1918; 22 ♂♂, 26 ♀♀, 6 juv.
Venvidio, Sinaloa, 11. VIII.–2. IX. 1918.

DEI: 4 Paratypen, Venvidio, Sinaloa, Mexico, VIII. 1918, leg. KUSCHE.

pulchra SJÖSTEDT, 1920 (*Terpillaria*)

(Ark. Zool., 12, Nr. 20, 51–52)

4 ♂♂, 7 ♀♀, Syntypen, Nordwest-Australien, Kimberley-District, I.–III. 1910–13, leg.
MJÖBERG, im Museum Stockholm.

DEI: 1 Syntypus mit den Angaben der Beschreibung.

punctatus UVAROV, 1926 (*Aulacothrus*)

(Trans. Ent. Soc. London, 1925, 432–434, Taf. XLVII, Fig. 11, 12)

♂ Holotypus, 30 Paratypen beider Geschlechter, Kano Provinz, Azare Gebiet bei Sherifuri,
Nord Nigeria, leg. LLOYD.

DEI: 2 Paratypen mit den Angaben der Beschreibung.

pyramidata REHN, 1930 (*Andriana*)

(Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, 81 (1929), 506–508, Taf. 20, Fig. 7, 8; Taf. 21, Fig. 1, 2)

♀ Holotypus, Madagascar Lamberton, in der Sammlung der Acad. Nat. Sci. Philadelphia,
Typen Nr. 5476; 4 ♂♂, 13 ♀♀, vom selben Fundort; 1 ♂ Mahatzinjo, Madagascar, in Samm-
lung HEBARD.

DEI: 2 Paratypen, Madagascar, Lamberton.

rubritarsi WILLEMSE, 1932 (*Incolacris*)

(Ann. Soc. Ent. France, 101, 151–152)

♀ Holotypus, 2 ♀♀ Paratypen, Philippinen, Siargao, in Sammlung WILLEMSE; 1 ♀ im DEI;
1 ♀ im Museum Stockholm.

rugulosus KARNY, 1915 (*Hedotettix*)

(Suppl. Ent., 4, 81)

♂ Holotypus, Suisharyo, Formosa, X. 1911, leg. SAUTER, im DEI.

saigonensis GÜNTHER, 1938 (*Loxilobus*)

(Stett. Ent. Ztg., 99, 206, Fig. 107, 109)

2 ♀♀, Syntypen, Cochinchina, Saigon, XI. 1913, leg. HOFFMANN.

DEI: ♀ Syntypus mit den Angaben der Beschreibung.

salutator REHN, 1927 (*Zapata*)

(Trans. Amer. Ent. Soc., 53, 221–226, Taf. XXII, Fig. 6–9)

♀ Holotypus, Tumamoc Hill, Tucson Mountains, Pima County, Arizona, 2400–3092 Fuß,
3./4. X. 1910, leg. HEBARD & REHN, in Sammlung HEBARD, Typen Nr. 1110; 51 ♂♂, 55 ♀♀,
Paratypen, Arizona, nähere Angaben siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 Paratypus, Tumamoc Hill, Tucson Mts. Pima, Co. Ariz., 2400–3092 Fuß, 3. bis
4. X. 1910, leg. REHN & HEBARD; 1 Paratypus, Sonora Road Canyon, Tucson, Mts. Pima,
Co., Ariz., 3000 Fuß, 11. X. 1910.

sauteri GÜNTHER, 1941 (*Coptotettix*)

(Stett. Ent. Ztg., 102, 162–163, Taf. 1, Fig. 8, 9)

Syntypen, 1 ♂, Takao, 12. VIII. 1907; 1 ♀, Takao, im Museum Dresden; 3 ♂♂, 1 ♀, Takao,
VII./VIII. 1907, im Museum Berlin; 1 ♀, Takao, im DEI; mehrere ♂♂ und ♀♀, Takao, im
Museum Wien; 1 ♀, China, Fokien, Shaowu, 500 m, leg. KLAPPERICH, im Museum Bonn.

DEI: ♀ Syntypus, Takao, Formosa, leg. SAUTER.

sauteri KARNY, 1915 (*Dittopternis*)

(Suppl. Ent., 4, 84–85)

Syntypen, 1 ♂, Hoozan, 1910; 1 ♂, Taihorin, 1911; 1 ♂, 2 ♀♀, Kosempo, 1911; 1 ♂, 2 Larven, Kankau (Koshun), IV. 1912, Formosa, leg. SAUTER.
DEI: 1 ♀, Kosempo, Formosa, 1911, leg. SAUTER; 1 ♂, 1 Larve, Kankau, VI. 1912, leg. SAUTER; 1 ♂, Hoozan, Formosa, 1910, leg. SAUTER.

saxatile MORSE, 1894 (*Spharagemon*)

(Proc. Boston. Soc. Nat. Hist., 26, 229–232)

91 ♂♂, 60 ♀♀, Syntypen, Massachusetts: Blue Hill, Needham, Sherborn, Waltham, Wellesby; Connecticut: Greenwich, New Haven, Thompson; in der Sammlung der Cornell University.
DEI: 1 Syntypus Greenwich, Conn., 27. VIII. 1892; 1 Syntypus Waltham, Mass., 24. VII. 1892.

sokutsuense KARNY, 1915 (*Acrydium*)

(Suppl. Ent., 4, 79–80)

♂ Holotypus, Sokutsu, Formosa, 7. VI. 1912, leg. SAUTER, im DEI.

steinii REHN, 1914 (*Pteropera*)

(Wiss. Ergeb. Dtsch. Zentr. Afr. Exped., 5, III, 122–124)

Bugoe-Wald, Nordwest-Ruanda, II.–XI. 1908, leg. STEGMANN-STEIN, ♂ Holotypus, im Museum Berlin; 6 ♂♂, 44 ♀♀, Paratypen in Alkohol; 2 ♀♀, in Alkohol, Bugoe-Wald, Nordwest-Ruanda, XI. 1907; 1 ♂, 7 ♀♀ in Alkohol, Vulkangegend nordöstlich des Kiwu-Sees, X. 1907, leg. WIESE.

DEI: ♀ Paratypus, Bugoe Forst, N. W. Ruanda, C. Afrika, II.–XI. 1908, leg. STEGMANN-STEIN.

striata WILLEMESE, 1932 (*Gelastorrhinus*)

(Ann. Soc. Ent. France, 101, 287–288, Fig. 3)

2 ♂♂, 1 ♀, Holo- und Paratypen, Luzon, Manila, X. 1913, leg. BOETTCHER.

DEI: 1 ♂, 1 ♀, mit den Angaben der Beschreibung, beide mit Typus ausgezeichnet, das ♂ wird hiermit als Lectotypus festgelegt.

suavis REHN, 1930 (*Arexion*)

(Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, 81 (1929), 509–512, Taf. 21, Fig. 3–7)

♀ Holotypus, Madagascar, Lamberton, in der Sammlung der Acad. Nat. Sci. Philadelphia, Typen Nr. 5462; 6 ♂♂, 10 ♀♀, vom selben Fundort; 1 ♀, Madagascar, Sammlung HEBARD.
DEI: 1 Paratypus, Madagascar, Lamberton.

talamancae REHN, 1929 (*Microtylopteryx*)

(Trans. Amer. Ent. Soc., 55, 52–55, Taf. V, Fig. 5, 6, 8, 9, 12, 13)

♂ Holotypus, North end of Suretka Trail, Duroy River, Estrella Valley, Liman Province, Costa Rica, 100–150 Fuß, 9. IX. 1927, leg. REHN, in der Sammlung der Acad. Nat. Sci. Philadelphia, Typen Nr. 5471; 18 ♂♂, 18 ♀♀, Paratypen, Costa Rica, nähere Angaben siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 Paratypus, Atlanta Farm, Estrella Valley, Costa Rica, 7. IX. 1927, leg. REHN.

tenuis HEBARD, 1923 (*Opaonella*)

(Trans. Amer. Ent. Soc., 49, 303–305, Taf. 17, Fig. 5, 6)

♂ Holotypus, 3 ♂♂, 9 ♀♀, Paratypen, Muzo, Boyacá, Colombia, 2700 Fuß, IX. 1919, leg. MARIA, in Sammlung HEBARD, Typen Nr. 905; 2 ♂♂, 6 ♀♀, Pacho Cundinamarca, 5900 Fuß, 19. III. 1917, leg. MARIA; 5 ♂♂, 2 ♀♀, Choachi, Cundinamarca, 5900 Fuß, II./III. 1916, leg. MARIA; 1 ♂, 1 ♀, Fómeque, Cundinamarca, 5900 Fuß, V. 1914, leg. MARIA.
DEI: 1 Paratypus, Fomeque, Colombia, V. 1914, leg. MARIA.

tequestae HUBBELL, 1932 (*Melanoplus*)

(Misc. Publ. Mus. Zool. Univ. Michigan, **23**, 46–51, Taf. I, Fig. 2, 4, Taf. II, Fig. 21)

♂ Holotypus, Orlando, Orange County, Florida, 10. V. 1924, leg. HUBBELL, im Museum of Zoology, University of Michigan; 158 Paratypen, Florida, nähere Angaben siehe Originalbeschreibung.

DEI: 2 Paratypen, Orange Co., Florida, Orlando, 10. V. 1924, leg. WALKER.

tessmanni GÜNTHER, 1938 (*Trachylettix*)

(Mitt. Zool. Mus. Berlin, **23**, 412–414)

2 ♀♀, Südostkamerun, Uam-Gebiet, Bosum 4. V. 1914, leg. TESSMANN, im Museum Berlin; 2 ♂♂, Côte d'Ivoire, Dimbroko.

DEI: 1 ♂ Paratypus, Côte d'Ivoire, Dimbroko.

trifasciata WILLEMS, 1932 (*Incolacris*)

(Ann. Soc. Ent. France, **101**, 152)

Philippinen, Siargao, ♂ Holotypus, 1 ♂, Paratypus, in Sammlung WILLEMS; 1 ♂, Paratypus, im DEI; 1 ♂, Paratypus, im Museum Stockholm.

tristis KARSCH, 1891 (*Cyphocerastis*)

(Berl. Ent. Ztschr., **36**, 182)

Syntypen, zahlreiche Exemplare beider Geschlechter von der Barombi Station, Kamerun, leg. PREUSS, im Museum Berlin.

DEI: 1 Syntypus mit den Angaben der Beschreibung.

turgida REHN, 1930 (*Bara*)

(Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, **81** (1929), 502–504, Taf. 20, Fig. 3–6)

♀ Holotypus, Madagascar, Lamberton, in der Sammlung der Acad. Nat. Sci. Philadelphia, Typen Nr. 5475; 6 ♂♂, 30 ♀♀, vom selben Fundort.

DEI: 3 Paratypen mit den Angaben der Beschreibung.

vicinus GÜNTHER, 1938 (*Syzygotettix*)

(Stett. Ent. Ztg., **99**, 199, Fig. 91, 93)

5 ♂♂, 7 ♀♀, Syntypen, Nord-Palawan, Binaluan, XI./XII. 1913, leg. BOETTCHER.

DEI: 9 Syntypen mit den Angaben der Beschreibung.

virescens WILLEMS, 1939 (*Maculacris*)

(Natuurh. Maandbl., **28**, 73)

♀ Holotypus, Philippines, Surigao, Mindanao, im Gegensatz zur Originalbeschreibung im DEI.

viridis WILLEMS, 1932 (*Binaluacris*)

(Ann. Soc. Ent. France, **101**, 149)

♂ Holotypus, 1 ♂, Paratypus, Borneo, Nord-Palawan, Binaluan, XI.–XII. 1913, leg. BOETTCHER.

DEI: Holotypus mit den Angaben der Beschreibung.

viridis SJÖSTEDT, 1920 (*Calephorops*)

(Ark. Zool., **12**, Nr. 20, 6)

Syntypen, Queensland, Bellenden Ker, 21 ♂♂ ♀♀; Yarrabah, Tolga ♂ ♀, leg. MJÖBERG, 1910 bis 1913.

DEI: 1 Syntypus, Bellenden Ker, Queensland, leg. MJÖBERG.

Wahrscheinlich nicht beschrieben:

brevipes MILLER (*Gymnobostrus*)

1 Exemplar, Kilosa, 24. VIII. 1926, leg. MILLER; 1 Ex. Tanganyika Territory, Uluguru Mts., II. 1927, leg. MILLER, als Paratypen ausgezeichnet.

Tridactyloidea

bituba HEBARD, 1928 (*Rhipipteryx*)

(Trans. Amer. Ent. Soc., 54, 292–294, Taf. XXVII, Fig. 4)

♂ Holotypus, Upper Reservoir, Banana River, Costa Rica, 100 Fuß, 9. XI. 1909, leg. CALVERT, in Sammlung A.N.S.P., Typen Nr. 5441; 37 ♂♂, 14 ♀♀, Paratypen vom selben Fundort; 1 ♂, Zone limit five miles west of Empire, Canal Zone, Panama, 14. XI. 1912, leg. HEBARD.

DEI: 3 Paratypen mit den Angaben des Holotypus.

chopardi WILLEMS, 1922 (*Rhipipteryx*)

(Ent. Mitt., 11, 174–176)

♂ Holotypus, 2 ♂♂, 5 ♀♀, Paratypen, Port Allegre, Süd Brasilien, leg. WILLE.

DEI: Holotypus, 1 ♂, 2 ♀♀, Paratypen, ohne Fundortangaben.

insignis CHOPARD, 1937 (*Rhipipteryx*)

(Arb. morph. tax. Ent., 4, 150–152, Fig. 14, 15)

♂ Holotypus, Costa Rica, Turrialba, leg. P. & H. SCHILD, im DEI.

latipes CHOPARD, 1937 (*Tridactylus*)

(Arb. morph. tax. Ent., 4, 149–150, Fig. 13)

♂ Holotypus, Brésil, Espírito Santo, X. 1920–II. 1921, leg. HOFFMANN, im DEI.

Zusammenfassung

Es wird der zweite Teil eines Kataloges der im Deutschen Entomologischen Institut aufbewahrten Typen vorgelegt.

Summary

There is presented the second part of a catalogue of type specimens preserved in the collections of the Deutsches Entomologisches Institut.

Резюме

Предлагается вторая часть каталога типов, которые хранятся в Немецком Энтомологическом Институте.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Beiträge zur Entomologie = Contributions to Entomology](#)

Jahr/Year: 1970

Band/Volume: [20](#)

Autor(en)/Author(s): Petersen Günther, Gaedike Hannelore

Artikel/Article: [Katalog der in den Sammlungen des Deutschen Entomologischen Institutes aufbewahrten Typen - II \(Dermaptera, Mantodea, Blattariae, Isoptera, Phasmida, Saltatoria\). 145-172](#)