©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

Beitr. Ent. · Bd. 23 · H. 5/8 · S. 355—419 · Berlin

Institut für Pflanzenschutzforschung (BZA)
der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR zu Berlin
Zweigstelle Eberswalde
Abteilung Taxonomie der Insekten (ehem. DEI)
Eberswalde

HELGA DÖBLER

Katalog der in den Sammlungen des ehemaligen Deutschen Entomologischen Institutes[1] aufbewahrten Typen — IX

COLEOPTERA

Cicindelidae

Nach dem Muster der bisher erschienenen Bearbeitungen erfolgt im vorliegenden Beitrag die Darstellung der Cicindelidae-Typen, die sich in der Sammlung des Instituts befinden. Angaben über Synonyme wurden nur gemacht, wenn diese in der Bearbeitung von HORN (Coleopterorum Catalogus 86, Vol. 1; 1926) vermerkt wurden. Der Status der zahlreichen Taxa, die in der Sammlung HORN mit einem Typus-Etikett versehen waren, wurde ebenfalls nur auf der Grundlage der obengenannten Bearbeitung bestimmt. Nicht aufgenommen wurden die im Coleopterorum Catalogus mit der Bezeichnung 1), 2), alb-F, dlc-F, cc-F usw. versehenen Taxa, da es sich hierbei um infrasubspezifische Kategorien handelt. Da die überwiegende Mehrzahl der Cicindeliden seit HORNS Tod nicht mehr bearbeitet wurden, werden sich vor allem in bezug auf die Einstufung dieser Taxa sicherlich Änderungen ergeben; dies zu entscheiden bleibt den Spezialisten vorbehalten. Eine Bearbeitung dieses Materials wäre sehr wünschenswert.

Für zahlreiche Hinweise auf fehlende Zitate sei hiermit den Herren Dr. BASILEWSKY, TERVUREN, Prof. MANDL, Wien und BROUERIUS VAN NIDEK, Voorburg herzlich gedankt.

abruptesculpta HORN, 1914 (*Dromica*)

(Rev. Zool. Afr. 3, 423)

Syntypen, Belg. Congo: 1 ♀, Mufungwa Sampwe, 1.—16. XII. 1911, leg. BEQUAERT; 1 ♂, 2 ♀♀, IX.—XII. 1912.
DEI: Syntypen: 1 ♀, Mufungwa Sampwe, 1.—16. XII. 1911, leg. BEQUAERT; 1 Ex. Kapiri, IX. 1912, Miss. Agric.

acuniai MUTCHLER, 1924 (*Cicindela*)

(Amer. Mus. Novit. nr. 106, 1—3, Fig. 1, 2)

Cuba, Camaguey, Puerto Principe Province, leg. ACUÑA; ♂ Holotypus, No. 28051, 1 ♀, No. 28052, 7 ♀♀, No. 28054, 1 ♀, No. 28055, im Amer. Mus. Nat. Hist; 1 ♀, in Estacion Experimental Agronomica, Santiago de las Vegas, Cuba; Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, Cuba, Camaguey, 20.—23. VIII., No. 28053 [Nummer in der Beschreibung nicht genannt!], leg. ACUÑA, ex Amer. Mus. Nat. Hist. Dept. Invert. Zool.

acuteapicalis HORN, 1914 (*Collyris*)

(Arch. Naturg. 79, A 11 (1913), 4)

♀ Holotypus, Chandkhira, Sylhet, ex Coll. V. DE POLL; im DEI.

affine HORN, 1892 (*Megalomma*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 74)

♂ Holotypus, Madagascar, ex Coll. RICHTER; im DEI.
Syn. zu *rugicollis* FAIRMAIRE, 1871.

[1] Jetzt: Institut für Pflanzenschutzforschung (BZA) der AL der DDR zu Berlin, Zweigstelle Eberswalde, Abteilung Taxonomie der Insekten.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

affine HORN, 1893 (*Pogonostoma*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 14)

2 ♂♂, Syntypen, Madagascar, im Museum Berlin und in Coll. HORN.
DEI: 1 ♂, Syntypus, Madagascar, Annanarivo, leg. SIKORA.

affinis HORN, 1892 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 77)

Mehrere Syntypen, Venezuela.
DEI: 3 Syntypen, Venezuela, leg. SCHLÜTER.
Syn. zu *argentata* FABRICIUS, 1801.

affinis HORN, 1892 (*Collyris*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 363)

♂♂ Syntypen, Luzon, ex Coll. RICHTER und Coll. MEYER.
DEI: 1 ♂ Syntypus, ohne Fundort, ex. Coll. RICHTER.

affinis HORN, 1900 (*Oxychila*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 365; nom. praeocc., = *affinior* HORN, 1905, Syst. Ind. Cic., 49)

♂ Holotypus, Ecuador; im DEI.

agnes HORN, 1905 (*Tricondyla*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 64)

♂ Holotypus, Ceylon; im DEI.

alata LILJEBLAD, 1932 (*Cicindela*)

(Canad. Ent. **64**, 215)

♂ Holotypus, Chicago, Illinois, 13. VI. 1932, leg. GERHARD; 15 ♂♂, 17 ♀♀, Paratypen, dto., 24. VI., 13. VI.–11. VII. 1932; im Field Museum.
DEI: 1 ♂ Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, 29. VI. 1932.

alba HORN, 1894 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 112, Taf. 3, Fig. 8)

Mehrere Syntypen, Africa orient., Quilimane.
DEI: 3 Syntypen, D. O. Africa, Quilimane, durch STAUDINGER.

albens HORN, 1895 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 361)

♀ Holotypus, Afr. occid., Brazzaville; im DEI.

albitarsis THOMSON, 1857 (*Collyris*)

(Arch. Ent. **1**, 132; nom. praeocc., = *leucodactyla* CHAUDOIR, 1860, Bull. Moscou **33**, 2, 297)

♀ Holotypus, Borneo, Sarawak.
DEI: ♀ Holotypus, Borneo, ex cab. THOMSON — ex cab. BROWN — Coll. v. DE POLL.

alboclavata DOKHTOUROFF, 1883 (*Dromica*)

(Rev. mens. Ent. **1**, 8)

2 Syntypen, Natal, in Coll. DOKHTOUROFF.
DEI: 1 Syntypus, Natal.

albocyanescens HORN, 1912 (*Collyris*)

(Ent. Mitt., 132)

♀ Holotypus, Formosa, Tainan, leg. SAUTER, in Coll. HORN; im DEI.

alboguttata viridinitida MANDL, 1959 (*Cicindela*)

(Bonn. Zool. Beitr. **10**, Nr. 1–2, 101–102)

♂ Holotypus, Djibouti; 14 Paratypen, Djibouti und Berbera; leg. MARTIN; im Museum ALEXANDER KOENIG und in Coll. MANDL.
DEI: 1 Paratypus, Djibouti, 1901, leg. MARTIN.

albopilosa DOKHTOUROFF, 1885 (*Cicindela*)

(Horae Soc. Ent. Ross. **19**, 248)

10 Syntypen, Fergana, Narynpol, VIII., leg. WILKINS.
DEI: 1 Syntypus, Hpnkn. (?), 12. VIII.
Syn. zu *hybrida* LINNÉ, 1758.

alleni HORN, 1908 (*Cicindela*)

(Rec. Ind. Mus. **2**, 409)

♂ Holotypus, Borneo, Betong, leg. ALLEN, via HEWITT an HORN; im DEI.

alluaudi HORN, 1911 (*Cicindela*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. **55**, 27)

3 ♀♀, Syntypen, Afrika, Mont Kénia (O. et N. O. et S. O.), Zone inférieure, Prairie, 2000 m, XI. 1908, leg. ALLUAUD.
DEI: 1 ♀ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

amabilis rectipenis HORN, 1932 (*Odontochila*)

(Rev. Ent. **2**, 406–407)

♂ Holotypus, Rio Madeira, Manicoré, Mitte II. 1932, leg. WUCHERPFENNIG; im DEI.

ambitiosa PÉRINGUEY, 1893 (*Cosmema*)

(Trans. S. Afr. Phil. Soc. **7**, 84)

Mehrere Syntypen, South Africa, Transvaal, Barberton.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, ex Coll. PÉRINGUEY.

ampullacea HORN, 1901 (*Neocollyris*)

(Rev. Cic., 60–61)

Mehrere Syntypen, Basilan, Ins. Philippin., II.–III. 1898, leg. DOHERTY.
DEI: 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, ex Coll. FRUHSTORFER.

ampullicollis HORN, 1914 (*Collyris*)

(Arch. Naturg. (1913), **79**, A 11, 5)

3 ♀♀, Syntypen, Travancore, Wallardi, leg. LE MOULT; im DEI.

analis nigrosericea HORN, 1930 (*Odontochila*)

(Wien. Ent. Ztg. **47**, 9–10)

2 ♀♀, Syntypen, Insel Philippinen, Columbogan, VII.–VIII. 1917, Coll. HASLAM, im Museum Carnegie (Pittsburgh) und in Coll. HORN.
DEI: 1 ♀ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

ancorifera HORN, 1896–1897 (*Cicindela*)

(Ann. Mus. Genova (2), **17**, 271)

Mehrere Syntypen, Nov. Guinea, Hatam, VI. 1875, leg. BECCARI, im Museum Genua.
DEI: 3 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, VI.–VII. 1875, ex Museum Genua.

andersonii GESTRO, 1889 (*Cicindela*)

(Ann. Mus. Genova (2), **7**, 83)

Mehrere Syntypen, Hochland von Birmania, Teinzò, V., leg. FEA, in der Coll. in Genua.
DEI: 2 Syntypen, Birmania, Teinzò, 1886, leg. FEA.

andrewesi HORN, 1894 (*Calochroa*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 171, Taf. 3, Fig. 1)

Mehrere Syntypen, Vorder-Indien, Nord-Canara, leg. ANDREWES.
DEI: 4 Syntypen, Canara, 94, leg. ANDREWES.

andrewesi HORN, 1894 (*Collyris*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 170)

Mehrere Syntypen; Vorder-Indien, Nord-Canara; 1 Ex. Ceylon; im Museum Berlin.
DEI: 2 Syntypen, Canara.

andriana ALLUAUD, 1900 (*Cicindela*)

(Bull. Soc. Ent. Fr., 18–19, Fig. 2)

Mehrere Syntypen, südwestl. Madagascar Gebiet, Mahafaly.
DEI: 1 Syntypus, Madagascar (Sud), Bassin du Mandraré, 1900, leg. ALLUAUD, Nr. 48.

angularis HORN, 1892 (*Collyris*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 358)

♂ Holotypus, Luçon, ex Coll. RICHTER; im DEI.

angulicollis HORN, 1900 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 209)

♀ Holotypus, India orient., Dacca; im DEI.

angulihumerosa HORN, 1929 (*Cicindela*)

(Ent. Nachrichtenbl. 3, 8)

1 ♂, 1 ♀, Philippinen, ex Coll. V. DE POLL; mehrere ♀♀, Insel Samar, leg. BAKER; im National Museum Washington und in Coll. HORN; Syntypen.
DEI: 1 ♂, 1 ♀, Ins. Philippinen, ex Coll. V. DE POLL; 1 ♀, Island Samar, leg. BAKER; Syntypen.

angulipenis HORN, 1932 (*Odontochila*)

(Rev. Ent. **2**, 407–408)

2 ♂♂, Syntypen, Columbia orient., Rio Negro, 500 m, leg. FASSL.
DEI: 1 ♂ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

angustatus HORN, 1902 (*Therates*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 72)

2 ♀♀, Syntypen, Tonkin, Montes Mauson, IV.–V. 1900, 2–3000′, leg. FRUHSTORFER; im DEI.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

angusticollis PÉRINGUEY, 1894 (*Myrmecoptera*)

(Trans. Ent. Soc. Lond., 448)

Mehrere Syntypen, Mashunaland, Salisbury, leg. MARSHALL.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort.

angusticollis HORN, 1896 (*Tetracha*)

(Bull. Mus. Paris **2**, 328)

♀ Holotypus, 1 ♀, Venezuela, in Coll. HORN; 3 Ex. Haut-Orénoque, 1368—1887, leg. GAILLARD; im Museum d'Histoire Naturelle de Paris; Paratypen.
DEI: ♀ Holotypus, 1 ♀, mit den Angaben der Beschreibung; 1 Ex. Ht-Orénoque, 1368—1887, leg. GAILLARD; Paratypen.

angustoobliquatum HORN, 1925 (*Ctenostoma*)

(Ent. Bl. **21**, 132)

Mehrere Syntypen, Costa Rica, Turrialba, 400 Fuß, Coll. SCHILD.
DEI: 10 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, 15. IX. 1922.

annuligera prolongata HORN, 1932 (*Megacephala*)

(Rev. Soc. Ent. Argent. **22**, 103—104)

♀ Holotypus, Argentina borealis, an der Bolivian-Grenze; im DEI.

antatsima ALLUAUD, 1902 (*Cicindela*)

(Ann. Soc. Ent. Fr. **71**, 639—640)

Mehrere Syntypen, Madagascar, am unteren Fluß Mandraré, Ampasimpolaka, IX., leg. ALLUAUD.
DEI: 2 Syntypen, Madagascar (Sud), Bassin du Mandraré, 1900, leg. ALLUAUD, Nr. 44.

antennalis HORN, 1909 (*Collyris*)

(Rec. Ind. Mus., 259)

2 ♀♀, Syntypen, S. E. Borneo, Martapura, 1891, leg. DOHERTY, im Britischen Museum und in Coll. HORN.
DEI: 1 ♀ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

anulipes HORN, 1897 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 255)

♂ Holotypus, Minas Geraes; im DEI, durch STAUDINGER.

aphrodisia BAUDI, 1864 (*Cicindela*)

(Berl. Ent. Ztschr. **8**, 195)

Über 60 Syntypen, Insel Cypro und Asia minor, leg. TRUQUI.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, leg. TRUQUI, Coll. KRAATZ.

apicalis HORN, 1897 (*Cicindela*)

(Ent. Nachr. **23**, 17)

Syntypen: 1 ♀, Nebraska, durch STAUDINGER; mehrere Ex. Kansas, Kakley, leg. SRNKA.
DEI: 1 ♀ ,Neb., LUETGENS, durch STAUDINGER; 2 Ex. Kansas, Kakley, Salt Marsh, ex Coll. SRNKA: Syntypen.
Syn. zu *togata* LAFERTÉ, 1841.

apicalis KRAATZ, 1890 (*Cicindela*)

(Ent. Nachr. **16**, 136)

Holotypus, ohne Fundort, in Coll. KRAATZ; im DEI.
Syn. zu *maura* LINNÉ, 1758.

apicalis HORN, 1903 (*Dromica*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 317)

Mehrere Syntypen, Mashonaland, Salisbury, 1900, leg. MARSHALL.
DEI: 5 Syntypen, Salisbury, leg. MARSHALL.

apicalis contracta HORN, 1905 (*Collyris*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 295)

♂ Holotypus, Siam; im DEI.

aptera pseudocontracta HORN, 1937 (*Collyris*)

(Ent. Bl. **33**, 55—56)

2 ♀♀, Syntypen, Annam, Prov. Haut Donai, „Agr. Stat. of Blao", 800 m, leg. POILANE, im National Museum Washington und in Coll. HORN.
DEI: 1 ♀ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 2. VII. 1933.

apteroides HORN, 1901 (*Neocollyris*)

(Rev. Cic., 59)

♀ Holotypus, Manipur, [India or.][2] leg. DOHERTY; im DEI.

[2] In [ ] wurden die Angaben gesetzt, die sich auf den Etiketten befanden, in der Originalbeschreibung aber fehlten.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

argentata semicircumscripta MANDL, 1958 (*Cicindela*)

(Ent. Nachr. Österr. Schweiz. Ent. **10**, Nr. 2, 23, Fig. 1)

♂ Holotypus, Santiago del Estero, El Pinto, XI. 1956, leg. FLEISS; Paratypen: 7 Ex. dto.; 4 Ex. Paraguay, Chaco, XI. 1956; 1 Ex. Paraguay, Asuncion; in Coll. MANDL und Coll. HASSENTEUFEL.
DEI: 2 Paratypen, Argentina, Santiago del Estero, El Pinto, XI. 1956, leg. FLEISS.

arida DAVIS, 1928 (*Cincindela*)

(Pan-Pacific Ent. 5, 65)

♂ Holotypus, 8 Ex. California, Death Valley Junction, 31. III. 1928, leg. GUNDER, in Coll. DAVIS; mehrere Ex. dto., in Coll. FALL, Coll. HADDEN und in der California Academy of Sciences; Paratypen.
DEI: 1 ♂ Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

armandi FAIRMAIRE, 1886 (*Cicindela*)

(Le Natural. **8**, 223)

Mehrere Syntypen, Yunnan.
DEI: Syntypen: 1 Ex. Yunnan, leg. FAIRMAIRE; 2 Ex. dto. Bourgeois.

armigera DOKHTOUROFF, 1883 (*Dromica*)

(Rev. mens. Ent. **1**, 8)

Mehrere Syntypen, ohne Fundort.
DEI: 1 Syntypus, Kuriman, ex Coll. DOKHTOUROFF.
Syn. zu *furcata* BOHEMAN, 1848.

arnoldi HORN, 1904 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 430)

2 ♀♀, Syntypen, Kamerun, Benue sup., 11.—14. IV. 1903, leg. SCHULTZE; im DEI.

arrowi HORN, 1900 (*Heptodonta*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 362)

♂ Holotypus, Burma, N. Chin. Hills, [IV. 1894] via ARROW an HORN; im DEI.

aspera DOKHTOUROFF, 1883 (*Dromica*)

(Rev. mens. Ent. **1**, 8)

Mehrere Syntypen, ohne Fundort.
DEI: 1 Syntypus, Cap. bon. Spei, ex Coll. DOKHTOUROFF.

asperata breviformis HORN, 1913 (*Megacephala*)

(Rev. Zool. Afr. **2**, 278)

Belg. Congo, Syntypen: mehrere Ex. Kambove, IX. 1906/III., XI. 1907, leg. SHEFFIELD NEAVE; mehrere Ex. N.-E.-Rhodésie, Serenge Distr., 4500'', 19. XII., S.-E.-Katanga, 4000'', 24. XI., Kambove, 4000'', 10. XI., im Britischen Museum; 1 ♂, Kapoya, 12. XI. 1912; 1 ♀, Mufungwa, 1.—16. XI. 1911; leg. BEQUAERT; im Musée du Congo.
DEI: 1 Syntypus, Kambove, IX. 1906—III. 1907, leg. SHEFFIELD NEAVE.

asperata dodsi PÉRINGUEY, 1904 (*Tetracha*)

(Ann. S. Afr. Mus. **3**, 167)

2 ♂♂, 3 ♀♀, Syntypen, Southern Rhodesia, Sebakwe, leg. DODS, in Coll. PÉRINGUEY.
DEI: 1 ♀ Syntypus, S.-Rhodesia, Sebakwe, ex Coll. DODS.

asperata gratiosa HORN, 1904 (*Megacephala*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 95)

Mehrere Syntypen, Deutsch Ost-Afrika, Lindi, Lukuledi.
DEI: Syntypen: 3 Ex. Luculedi, leg. ERTL; 1 Ex. Lindi, SALOMON.

asperata kigonserana BASILEWSKY, 1966 (*Megacephala*)

(Ann. Mus. Afr. centr. (Sér. 8°) Sci. zool. no **152**, 69, Fig. 15c)

Afrique, Tanganyika: ♂ Holotypus, Kigonsera im MRAC; 5 Ex. Manow, im ZMB, im DEI und in Coll. MANDL; 2 Ex. Madibira, im ZSM und in Coll. MANDL; 2 Ex. Uhehe, im DEI; 20 Ex. Kigonsera, im MRAC, im ZSM, im NMP, im SMD, im MCZ und im Museum Hamburg; 1 Ex. dto., 1952, leg. HARTL, im Museum FREY; 2 Ex. dto. 1929, im Museum Praha; 3 Ex. Ugano, 1500—17000 m, Matengo Hochland, WSW Songea, XII. 1935, leg. ZERNY, im NMW, im MRAC und in Coll. MANDL; 2 Ex. Langiro, 1500 m, Matengo Hochland, WSW Songea, dto., im NMW und im MRAC; 1 Ex. Nyassa S., in Coll. MANDL; 1 Ex. Nyassa, im MCZ; 3 Ex. Tanganyika, im MRAC, im MCZ und im Museum Hamburg; Paratypen.
DEI: Paratypen: 2 Ex. D. O. Afrika, Manow; 2 Ex. Uhehe, 1905.

asperata occidentalis HORN, 1921 (*Megacephala*)

(Ent. Bl. **17**, 183)

1 ♂, 2 ♀♀, Oubangui-Territ, Fort Crampel, Fort Sibut, Coll. LE MOULT; 2 ♀♀, Neu-Kamerun, 28. V. 1914, leg. TESSMAN; im Museum Berlin und in Coll. HORN; Syntypen.
DEI: 1 ♂, 1 ♀, Franz. Congo, Fort-Crampel; 1 ♀, dto. Fort-Sibut, Haut Chari, Coll. LE MOULT; 1 ♀, Kamerun, Bosum, 28. V. 1914, leg. TESSMAN, ex Museum Berlin: Syntypen.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

aulicoides SAHLBERG, 1913 (*Cicindela*)

(Öf. Finska Vet. Soc. Förh. **55**, A, nr. 19 (1912–1913), 3)

Mehrere Syntypen, Palaestina, zwischen dem Fluß Jordan und dem Fluß Vadi, Nawâime, 14. III., Exped. 1903 bis 1904, leg. SAHLBERG und SAALAS.
DEI: 1 Syntypus, Jordan, leg. SAHLBERG.
Syn. zu *lunulata* FABRICIUS, 1781.

aureofusca grandisubtilis HORN, 1935 (*Collyris*)

(Koleopt. Rundsch. **21**, 50)

♂ Holotypus, „Hongkong 1864"; im DEI.

aureofusca grandivadosa HORN, 1935 (*Collyris*)

(Koleopt. Rundsch. **21**, 50–51)

♀ Holotypus, Tonkin, Montes Mauson, 2–3000′, IV.–V., Coll. FRUHSTORFER; im DEI.

auripennis DOKHTOUROFF, 1887 (*Cicindela*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. **31**, 154)

Mehrere Syntypen, Paraguay.
DEI: 5 Syntypen, Paraguay, leg. DRAKE, 188 (2 Ex. ex Coll. RICHTER).
Syn. zu *auripennis* LUCAS, 1857.

auripennis HORN, 1902 (*Collyris*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 67)

♀ Holotypus, Tonkin, Montes Mauson, IV.–V. 1900, 2–3000′, leg. FRUHSTORFER; im DEI.

auromarginata KRAATZ, 1887 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 150)

Syntypen: 1 Ex. Tecce-Turcmenien; 1 Ex. Turcmenien, 1 Ex. ohne Fundort; leg. LEDER.
DEI: 1 Syntypus, Tecce, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *decempustulata* MÉNÉTRIÉS, 1848.

aurosternalis HORN, 1894 (*Cratohaerea*)

(Ent. Nachr. **20**, 245)

Mehrere Syntypen, Togo, leg. CONRADT.
DEI: 5 Syntypen, Togo, 1892–1893, leg. CONRADT.

aurothoracica HORN, 1897 (*Cicindela*)

(Not. Leyd. Mus. **19**, 239)

Mehrere Syntypen, Celebes mer., Patunuang, I. 1896, leg. FRUHSTORFER, in Coll. HORN.
DEI: 2 Ex., mit den Angaben der Beschreibung; 1 Ex. ohne Fundort; leg. FRUHSTORFER: Syntypen.

baeri FLEUTIAUX, 1903 (*Odontochila*)

(Bull. Soc. Ent. Fr., 109)

Mehrere Syntypen, Pérou, Prov. Huallaga, Rio Mixiollo, 1.200 m, VII.–VIII. 1900, leg. BAER, in Coll. MAINDRON und Coll. HORN.
DEI: 1 ♂ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

baliensis BRANCSIK, 1892 (*Cicindela*)

(Jahrb. Nat. Ver. Trencs. Com., 210, Taf. 10, Fig. 8c)

Mehrere Syntypen, Bali-Bay bei Sualala, leg. FREY.
DEI: 3 Syntypen, Bali-Bay, durch BRANCSIK.
Syn. zu *abbreviata* KLUG, 1832.

balzani HORN, 1899 (*Cicindela*)

(Ann. Mus. Genova, (2) **19**, 502)

1 ♀, Ecuador, in Coll. HORN; 1 ♀, Bolivia, Rio Beni, La Paz-Reyes, 1891, leg. BALZAN, im Museum Civiv. Genuae; Syntypen.
DEI: 1 ♀, Syntypus, Ecuador.

banghaasi HORN, 1907 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 24)

Mehrere Syntypen, Cuyaba, Matto-Grosso, leg. STAUDINGER und BANG-HAAS, in Coll. HORN.
DEI: 6 Syntypen, Cuyaba, Matt. Gr.

banksi HORN, 1923 (*Prothyma*)

(Philipp. Journ. Sc. **22**, 360–362)

2 ♀♀, Syntypen, Insula Panay, Antique, Culasi, leg. GREGOR, in Coll. HORN und Coll. SCHULTZE.
DEI: 1 ♀ Syntypus, I. Panay, Culasi, leg. GREGOR.

basalis duploflavescens HORN, 1930 (*Therates*)

(Wien. Ent. Ztg. **47**, 3)

Mehrere Syntypen, Salomon Insel.
DEI: 2 Syntypen, Salomon I.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

basalis simpliflavescens HORN, 1930 (*Therates*)

(Wien. Ent. Ztg. **47**, 3)

Mehrere Syntypen, Salomon Insel.
DEI: 2 Ex. Salomon Is., VII.—VIII. 1909, leg. FROGGATT; 1 Ex. Guadalcanar I., Sol. Is., 1—21; Syntypen.

basidilatatum HORN, 1909 (*Pogonostoma*)

(Soc. Ent. Zürich **24**, nr. 12, 89)

♀♀ Syntypen, Madagascar, Majunga.
DEI: 3 ♀♀, Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, leg. DONCKIER.

batesi HORN, 1894 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 111)

Mehrere Syntypen, Oaxaca, Salina Cruz; Chiapas, Tonala; leg. HÖGE.
DEI: Syntypen: 2 Ex. Chiapas, Tonala; 3 Ex. Oaxaca, Salina Cruz; leg. HÖGE.
Syn. zu *macrocnema* CHAUDOIR, 1852.

batesi HORN, 1892 (*Collyris*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 355)

♀ Holotypus, Ind. or., ex Coll. RICHTER; im DEI.
Syn. zu *bonellii* GUÉRIN, 1834.

batesi HORN, 1900 (*Myrmecoptera*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 363)

Syntypen: 1 ♂, Africa orient. Britann., Stony Athi, leg. LE GROS; 2 Ex. dto. durch BATES, in Coll. HORN.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, durch BATES.

batesi HORN, 1892 (*Oxychila*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 89, 143)

♀ Holotypus, Sao Paulo; (durch STAUDINGER) im DEI.
Syn. zu *opacipennis* WATERHOUSE, 1889.

batesi HORN, 1893 (*Oxygonia*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 195)

♀ Holotypus, Peru; im DEI.
Syn. zu *prodiga* ERICHSON, 1847.

beccarii GESTRO, 1874 (*Tricondyla*)

(Ann. Mus. Genova, **6**, 306)

Mehrere Syntypen, Borneo, Batang, Lupar, Sarawak, 1865—67, leg. DORIA und BECCARI.
DEI: 1 ♀ Syntypus, Borneo, Sarawak, 1865—66, ex Coll. DORIA.
Syn. zu *cyanipes* ESCHSCHOLTZ, 1829.

bellana HORN, 1905 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 63)

Mehrere Syntypen, Vorder-Indien, Curachee, leg. BELL.
DEI: 2 Syntypen, Karachi, leg. BELL, ex Coll. ANDREWES. Im Gegensatz zu der in der Orginalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Curachee" steht auf dem Etikett „Karachi".

belli HORN, 1894 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 174)

Mehrere Syntypen, Vorder-Indien, Nord-Canara, Belgaum, leg. ANDREWES.
DEI: 3 Syntypen, Canara, 94, leg. ANDREWES (1 Ex. ohne Caput).

belloides HORN, 1907 (*Prothyma*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. **51**, 311)

3 ♂♂, Syntypen, Ind. or., Kanara bor., Basti, 11.—13. VI. 1907, leg. ANDREWES, in Coll. BELL, ANDREWES und HORN.
DEI: 1 ♂ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

beneshi VARAS ARANGUA, 1929 (*Cicindela*)

(Rev. chil. Hist. nat. **33**, 504)

2 ♀♀, Syntypen, Mexico, Rocky Point, Estado de Sonora, VII. 1929, leg. BENESH, in Coll. VARAS ARANGUA.
DEI: 1 ♀ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

bennigseni HORN, 1897 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 61)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Deutsch-Ost-Afrika, Usaramo, leg. v. BENNIGSEN.
DEI: 1 ♀ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

bennigseni HORN, 1896 (*Myrmecoptera*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 58)

1 ♀, Ost-Afrika, leg. v. BENNIGSEN; 1 ♂, dto., durch STAUDINGER; im DEI: Syntypen.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

bennigsenia HORN, 1901 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 357)
Mehrere Syntypen, Nova Guinea, am Fluß Herculis, 1901, leg. v. BENNIGSEN.
DEI: Syntypen: 3 Ex. Herculis Fl., leg. v. BENNIGSEN; 1 Ex. ohne Fundort, Coll. v. BENNIGSEN.

bertolonii (CHAUDOIR in litt.) HORN, 1899 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 52)
Mehrere Syntypen, Deutsch-Ost-Africa, Mozambique, Khutu, leg. v. BENNIGSEN.
DEI: 1 Ex. Mozambique; 5 Ex. Khutu; leg. v. BENNIGSEN; Syntypen.
Syn. zu *brevicollis* WIEDEMANN, 1823.

bianconi BERTOLONI, 1858 (*Odontochelia*)
(Mem. Acc. Sc. Inst. Bologna 8, 301, Taf. 23, Fig. 1)
Mehrere Syntypen; Mozambici, am Fluß Magnárra, Prov. Inhambanensis; Bononiae, 1848; in Coll. BERTOLONI.
DEI: 1 Syntypus, Mozambique.

bicolor HORN, 1902 (*Collyris*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 70)
1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Tonkin, Mauson-Gebirge, 2000–3000 ft., IV.–V. 1900, leg. FRUHSTORFER; im DEI.

bicostata HORN, 1914 (*Dromica*)
(Arch. Naturg. **79**, A 11 (1913), 8)
♂ Holotypus, Süd Angola, leg. ERTL; im DEI.

bicostulata HORN, 1914 (*Dromica*)
(Arch. Naturg. **79**, A 11 (1913), 9)
♀ Holotypus, Angola, Bailundo, leg. ERTL; im DEI.

bidentatum HORN, 1892 (*Pogonostoma*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 65)
♂ Holotypus, Madagascar, ex Coll. RICHTER; im DEI.
Syn. zu *chalybaeum* KLUG, 1835.

bidentilabris HORN 1934 (*Prothyma*)
(Natuur. Maandblad **23**, 144, **Fig.**)
♂ Holotypus, Samoa, ex Coll. CASTELNAU-EDW., BROWN-EHLERS-V. DE POLL; im DEI.

bigranifera DOKHTOORUFF, 1882 (*Dilatotarsa*)
(Rev. Ent. **1**, 114)
2 Syntypen, venant de lile Mindoro.
DEI: 2 Syntypen, Ins. Maluques, ex Coll. DOKHTOUROFF.
Syn. zu *patricia* SCHAUM, 1861.

biguttula ? marginemaculata HORN, 1934 (*Prothyma*)
(Mém. Acad. Malgache **20**, 25–26)
♂ Holotypus, Madagascar borealis, Reg. Nossibe, Diégo-Suarez, Vohémar; im DEI.
DEI: ♂ Holotypus, zwischen Nossi-be und Dagna Suarez, Volamar, JANSON.
Im Gegensatz zu der in der Orginalbeschreibung verwendeten Schreibweise ,,Diégo-Suarez, Vohémar", steht auf dem Etikett ,,Dagna Suarez, Volamar".

biguttula tricolorata HORN, 1934 (*Prothyma*)
(Mém. Acad. Malgache **20**, 25, Fig. 22)
Mehrere Syntypen, Madagascar Sud, Ampandrandava, Bekily, I. 1933, Betroka, I. 1934, leg. SEYRIG, im Museum Paris und in Coll. HORN.
DEI: Syntypen: 12 Ex. S. Madagascar, Bekily, I. 1933, 2 ♂♂ Genitalien dto.; 1 Ex. Ampandrandava; leg. SEYRIG; 1 ♂, Batroka, südl. von Fianavantzoa, I. 1931, leg. OLSUFIEW, Coll. SEYRIG.
Im Gegensatz zu der in der Orginalbeschreibung verwendeten Schreibweise ,,Betroka, I. 1934", steht auf dem Etikett ,,Batroka, I. 1931".

biimpressa HORN, 1937 (*Collyris*)
(Ent. Bl. **33**, 56–57)
2 ♀♀, Syntypen, Annam, Prov. Haut Donai, ,,Agr. Stat. of Blao", 800 m, leg. POILANE, im National Museum Washington und in Coll. HORN.
DEI: 1 ♀ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 2. VII. 1933.

biimpressicollis MANDL, 1960 (*Megacephala*)
(Beitr. Ent. **10**, Nr. 1–2, 187–188)
♂ Holotypus, Brasilien, in Coll. HORN; 1 ♂ Paratypus, Bolivien, Guaranigebiet, leg. PELOTAS, in Coll. MANDL.
DEI: ♂ Holotypus, Brasilia.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

bipunctata KRAATZ, 1890 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 368)

Mehrere Syntypen, ohne Fundort.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *atrata* PALLAS, 1776.

bispinosum HORN, 1892 (*Pogonostoma*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 65)

♂ Holotypus, Madagascar, ex Coll. RICHTER; im DEI.
Syn. zu *chalybaeum* KLUG, 1835.

blackburni SLOANE, 1906 (*Cicindela*)

(Proc. Linn. Soc. N. S. Wales **31**, 342, Taf. 28, Fig. 27)

Mehrere Syntypen, S. W. Australia, Norseman District, leg. FRENCH, in Coll. FRENCH und Coll. SLOANE.
DEI: 1 Syntypus, S. W. Australia, Norseman.

blanchardi FAIRMAIRE, 1882 (*Cicindela*)

(In: RÉVOIL, Faune & Flore Comalis, Col., 4, Taf. 1, Fig. 2)

Mehrere Syntypen, meridionale-orientale Afrique.
DEI: 1 Syntypus, Somali, Quarsanguélis, RÉVOIL, 1881.

bocandei GUÉRIN, 1848 (*Megacephala*)

(Rev. Zool. **11**, 347)

Mehrere Syntypen, Port. Guinea, zwischen Rio Casamance und Rio San Domingo, 16° westl. Länge — 12°, 25 Min. nördl. Breite, 1837—1848, leg. BOCANDÉ.
DEI: Syntypen: 1 Ex. ohne Fundort, ex Coll. DOKHTOUROFF; 1 Ex. Casamance, ex Coll. V. DE POLL.

bocandei levisquamosa HORN, 1932 (*Megacephala*)

(Tjidschr. Ent. **75**, 22—23)

♀ Holotypus, Katanga, Kinda, durch STAUDINGER & BANG-HAAS; im DEI.

bocandei overlaeti BURGEON, 1937 (*Megacephala*)

(Ann. Mus. Congo Belge Zool. (3) Sect. ii **6**, 12)

Holotypus, 25 Paratypen, Kafakumba, XII. 1930/I, XII. 1931/XII. 1932/XI. 1933/I. 1934, leg. OVERLAET, im Musée du Congo.
DEI: Kafakumba, leg. OVERLAET, XI.—XII. 1930/XI. 1933, ex Musée du Congo, 2 Paratypen.

bodongi HORN, 1914 (*Cicindela*)

(Ent. Mitt. **3**, 316)

Mehrere Syntypen, Africa orientalis Portugalensis, Nhambuica, Inhambane, 29. II.—11. V. 1914, leg. BODONG.
DEI: 11 Syntypen, Nhambuica, Inhambane, 29. II., 10., 11., 18. IV. 1914, leg. BODONG.

boisduvali HORN, 1896 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 152)

Holotypus, mehrere Paratypen, Nov. Guinea, Humboldt-Bay, IX.—X. 1893, leg. DOHERTY, in Coll. ROTHSCHILD und Coll. HORN.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

bolivari HORN, 1897 (*Oxychila*)

(Not. Leyd. Mus. **19**, 239)

2 ♂♂, Syntypen, Bolivia, Songo, in Coll. HORN [durch STAUDINGER]; im DEI.

borneana DOKHTOUROFF, 1883 (*Cicindela*)

(Rev. mens. Ent. **1**, 11)

Mehrere Syntypen, Borneo, in Coll. DOKHTOUROFF.
DEI: 2 Syntypen, Borneo.
Syn. zu *crespignyi* BATES, 1871.

bostockii CASTELNAU, 1867 (*Tetracha*)

(Trans. Roy. Soc. Vict. **8**, 36)

Mehrere Syntypen, Australien, Nickol Bay, leg. BOSTOCK.
DEI: 2 Syntypen, Nickol Bay, ex Coll. V. DE POLL.

bouchardi HORN, 1900 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 204)

♀ Holotypus, Sumatra, via BOUCHARD an HORN; im DEI.

boussingaultii GUÉRIN, 1843 (*Callidema*)

(Rev. Zool., 14)

Mehrere Syntypen, Cordilleren, Prov. Nouvelle-Grenade, am Paß Quindui, leg. GOUDOT.
DEI: 1 Syntypus, Columbien, leg. GOUDOT, ex Coll. V. DE POLL.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

brachycephala HORN, 1893 (*Collyris*)

(Ann. Mus. Genova, (2) **13**, 379)

Mehrere ♀♀, Syntypen, Birmania, Bhamò, Carin-Chebà, Rangoon, leg. FEA, in Coll. FEA.
DEI: Syntypen, Birmania: 1 Ex. Carin-Chebà, 900–1100 m, 5. XII. 1888; 1 Ex. Bhamò, VIII. 1885; leg. FEA.
Syn. zu *variitarsis* CHAUDOIR, 1860.

brachycephala HORN, 1893 (*Collyris*)

(Ann. Mus. Genova, (2) **13**, 378)

1 ♂, 3 ♀♀, Syntypen, Birmania, Carin-Chebà, leg. FEA, in Coll. FEA.
DEI: 2 Syntypen, Carin-Chebà, 900–1100 m, 5. XII. 1888, leg. FEA.
Syn. zu *subtilis* CHAUDOIR, 1863.

brazzai FLEUTIAUX, 1893 (*Cicindela*)

(Bull. Soc. Ent. Fr., 32, Fig.)

Mehrere Syntypen, Congo.
DEI: 1 Syntypus, Congo, ex Coll. FLEUTIAUX.

brevicollis HORN, 1914 (*Collyris*)

(Arch. Naturg. **79**, A 11 (1913), 3)

Syntypen, N. Borneo: 1 ♂, Kini Balu; 1 ♂, Palembang, Muara-Doea, III. 1890, leg. KANNEGIETER; ex Coll. v. DE POLL.
DEI: 1 ♂, Kini Balu, WATERSTRADT (Ex. sehr schlecht erhalten); 1 ♂, mit den Angaben der Beschreibung.
Fälschlicherweise als *brevithoracica* bezeichnet.

brevicollis HORN, 1905 (*Tricondyla*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 152)

Holotypus, Vorder-Indien, Trichinopolis, leg. CASTETS.
DEI: Holotypus, Hindoustan merid., Trichinopolis, leg. CASTETS.

brevicollis boreodilatata HORN, 1929 (*Cicindela*)

(Ent. Nachrichtenbl. **3**, 7)

Mehrere Syntypen, Galla-Länder, Galana, Gandjule, leg. NEUMANN; Britisch-Ost-Afrika, Lombwua, leg. SANDBERG; imMuseum Stockholm und in Coll. HORN.
DEI: 2 Ex. Britisch Ost-Afrika, Lombwua, leg. SANDBERG, ex Museum Stockholm; 4 Ex. Gandjule, II., 1 Ex. Galana; leg. NEUMANN: Syntypen.

brevicollis herero PÉRINGUEY, 1893 (*Cicindela*)

(Trans. S. Afr. Phil. Soc. **7**, 34)

Mehrere Syntypen, South Africa, Damaraland.
DEI: 1 Syntypus, Damara, durch DE VYLDER, ex. Coll PÉRINGUEY.

brevicollis obliquograciliaenea HORN, 1920 (*Cicindela*)

(Ark. Zool. **13**, no. 11, 13, 14, 16)

Mehrere Syntypen, Australien, Kassai-Land, Kondue, leg. LUJA, im schwedischen Reichsmuseum.
DEI: 5 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

brevicollis peezi MANDL, 1956 (*Cicindela*)

(Ent. Arb. Mus. FREY **7**, 395–396)

♂ Holotypus, S. Afrika, Cape-Prov. False-Bay, 6. XI. 1953, leg. PEEZ; 4 Paratypen, dto. 29. X./26. XI. 1953.
DEI: 2 Paratypen, S. Afrika, Cape, Fish-Hoek, 26. X. 1953 (nicht 26. XI.), leg. PEEZ.

brevicollis persicola HORN, 1934 (*Cicindela*)

(Vereinsschr. Ges. Lux. Naturf. Nr. **6**, **7**, **8**, **9**, **10**, 71, Separat Abdruck)

♀ Holotypus, Ost-Persien, 7 km nordöstl. von Kirman (Kerman), 20. VIII. 1931, leg. BECKER; im DEI.

brevicollis pseudodistans HORN, 1939 (*Cicindela*)

(Journ. East Afr. Uganda Nat. Hist. Soc. **14**, 152–153)

1 ♂, 3 ♀♀, Syntypen, Lake Magadi, III. 1938, leg. v. SOMEREN, im Coryndon Museum und in Coll. HORN.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

brevicorne HORN, 1898 (*Ctenostoma*)

(Rev. Cic., 29)

♀ Holotypus, Brasil. (?), leg. HÖGE, Coll. BRAUNS; im DEI.

brevicorne HORN, 1898 (*Pogonostoma*)

(Rev. Cic., 21)

2 ♀♀, Syntypen, Madagascar, Nossi-Bé.
DEI: 1 ♀ Syntypus, Madagascar, Nossi-Bé, leg. DONCKIER.

breviformis HORN, 1904 (*Euryoda*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 85)

Mehrere Syntypen, Antongil-Bay, leg. MOCQUERYS, in den Sammlungen von Paris und London.
DEI: 8 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

brevilabre HORN, 1931 (*Ctenostoma*)
(Rev. Chil. Hist. Nat. **35**, 101–102, Fig.)
Holotypus, Prov. Brasiliensi Sao Paulo, Est. S. Paulo, Matto do Governo, 16. XII. 1928, leg. MELZER; im DEI.

brevilabris HORN, 1893 (*Collyris*)
(Ann. Mus. Genova (2) **13**, 381)
2 Syntypen, Birmania, Carin Chebà, leg. FEA, in Coll. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Carin Chebà, 900–1100 m, 5. XII. 1888, leg. FEA.

brevilunata HORN, 1926 (*Cicindela*)
(Ent. Bl. **22**, 168–169)
Syntypen; 1 ♀, N. Zealand, ex Coll. SHARP, im Britischen Museum; 1 ♂, Honkianga, ex Coll. Mus. Britann., in Coll. HORN; 1 ♀, N-Seeland, in Coll. HORN.
DEI: 1 ♂, 1 ♀, Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, ex BROUN Coll. Brit. Mus. 1922–482.

brevinuda HORN, 1907 (*Dromica*)
(Stett. Ent. Ztg. **68**, 332)
Mehrere Syntypen, D. O. Afrika, Kigonsera, 1904–05, leg. ERLT.
DEI: 1 Syntypus, Kigonsera, 1904, leg. ERLT.
Syn. zu *egregia* GERMAR, 1843.

brevipalpis HORN, 1926 (*Cicindela*)
(Ent. Mitt. **15**, 77)
2 ♂♂, 1 ♀, Syntypen, Süd-Matto Grosso, Grasfelder der „Vacarias", XII. 1922, durch JOHN, HORACE, LANE entdeckt; in Coll. HORN.
DEI: 1 ♂ Syntypus, Matto Grosso, Vacaria, XII. 1922.

brevipennis HORN, 1901 (*Archicollyris*)
(Rev. Cic., 44)
♀ Holotypus, Prov. Bombay merid.; im DEI.

brevipennis HORN, 1907 (*Odontochila*)
(Stett. Ent. Ztg. **68**, 327)
♂ Holotypus, Brasilia, Matto Grosso, Cuyaba; (durch STAUDINGER) im DEI.

brevipilosa HORN, 1908 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 33)
2 ♂♂, Syntypen, China bor., Chantung, Fang-tse, Coll. SPLICHAL.
DEI: 1 ♂ Syntypus, China, Fang-tse, Coll. SPLICHAL.

brevipilosa kaiyaensis KANO & CHO, 1933 (*Cicindela*)
(Chosen n. H. Soc. **15**, 11)
♂ Holotypus, Central Korea, Kaiya nahe Kosengun, 25. VII. 1931, leg. CHO; 1 ♀, dto.; in Coll. TADAO KANO; 5 ♂♂, 2 ♀♀, dto. 1. VIII. 1931, in Coll. CHO: Paratypen.
DEI: 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung, 1. VIII. 1931.

brevipilosa klapperichi MANDL, 1942 (*Cicindela*)
(Mitt. Münch. Ent. Ges. **32**, Nr. 1, 87–89)
35 Syntypen, Südchina, Fukien, am Fluß Shaowu und Kwangtseh, 500 m, V.–VIII., im Museum ALEXANDER KOENIG und in Coll. MANDL.
DEI: Syntypen: 1 Ex. Fukien, Kwangtseh, 1. VIII. 1937; 1 Ex. Fukien, Shaowu, 500 m, 15. V. 1937; leg. KLAPPERICH.

brevipronotalis HORN, 1929 (*Collyris*)
(Ztschr. Insbiol. **24**, 18–19)
♀ Holotypus, Tonkin, Chapa, 8. V. 1918, leg. JEANVOINE; im DEI.

brevisexstriata HORN, 1922 (*Cicindela*)
(Zool. Meded. **7**, 105)
♀ Holotypus, Ganale inferior, Africa bor. or.; im DEI.

brouni HORN, 1893 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 336)
Mehrere Syntypen, Neu-Seeland.
DEI: 1 Syntypus, Neu-Seeland, 1891, leg. REISCH, ex Coll. Wien. Museum.
Syn. zu *campbelli* BROUN, 1886.
Diese Art wurde von HORN (D. E. Z., 97; 1892) irrtümlich für *perphispida* BROUN gehalten.

browni SLOANE, 1913 (*Cicindela*)
(Proc. Linn. Soc. N. S. Wales **38**, 401)
Mehrere Syntypen, West Australia, Lake Austin, nahe Cue, 5., 11. IV., leg. BROWN.
DEI: 1 Syntypus, West Australia, Lake Austin, leg. BROWN.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

bryanti HORN, 1922 (*Collyris*)

(Treubia **3**, 114)

♂ Holotypus, occid. Sarawak, Quop, 10. III. 1914, leg. BRYANT, in Coll. HORN; im DEI.

bryanti HORN, 1922 (*Therates*)

(Zool. Meded. **7**, 97–98)

2 ♀♀, Syntypen, Borneo occid., Quop, 6.–8. IV. 1914, leg. BRYANT, in Coll. BRYANT und in Coll. HORN.
DEI: 1 ♀ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, W. Sarawak, 8. IV. 1914.

bucephala HORN, 1900 (*Euryoda*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 199)

Mehrere ♀♀, Syntypen, Madagascar, Antongil-Bay, leg. MOCQUERYS.
DEI: 2 ♀♀, Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

bucephala HORN, 1909 (*Megacephala*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 284)

Mehrere Syntypen, Argentinien, Tukuman, 28. I. 1899, leg. GIRARD, Santiago del Estero, leg. STEINBACH.
DEI: Syntypen, Argentinien: 2 Ex. Santiago del Estero, leg. STEINBACH und MOSER; 1 Ex. Tukuman, 28. XI. 1899 (nicht 28. I. 1899), leg. GIRARD, ex Coll. DONCKIER.

californica mojavi CAZIER, 1937 (*Cicindela*)

(Pan-Pacific Ent. **13**, 116)

♂ Holotypus, 8 Ex. California, Saltdale, Mojave, 19. VI. 1932, leg. MCCLAY und SLOOP, in Coll. CAZIER; 2 Ex. dto. in der California Academy of Sciences und 7 Ex. in Coll. MCCLAY; Paratypen.
DEI: 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

campestris calabrica MANDL, 1944 (*Cicindela*)

(Koleopt. Rundsch. **30**, Nr. 1–3, 8–9)

Holotypus, mehrere Paratypen, Aspromonte, Kalabrien, leg. PAGANETTI, in Coll. MANDL und im DEI.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

campestris corsicana ROESCHKE, 1891 (*Cicindela*)

(In: HORN & ROESCHKE, Mon. pal. Cic., **67**, **74**, Taf. 2, Fig. 9b)

Mehrere Syntypen, Nizza, Korsika, Sardinien und die kleineren nahe gelegenen Inseln, wie San Pietro, „Fern vom Meer", IV., V.
DEI: Syntypen: 1 Ex. Korsika, Damry, ex Coll. SRNKA; 1 Ex. ohne Fundort.

campestris pseudomaroccana ROESCHKE, 1891 (*Cicindela*)

(In: HORN & ROESCHKE, Mon. pal. Cic., 70, Taf. 2, Fig. 6f)

Mehrere Syntypen, Süd-Ost Frankreich, nicht fern vom Meere, zwischen Marseille und Nizza und bis in die französischen Alpen, hart an der Schweizergrenze im Thale der Durance bei Briançon und Sisteron.
DEI: Syntypen: 1 Ex. St. Martin, Lautoscu (nicht lesbar!); 1 Ex. Marseille, leg. PERRET.

camposi HORN, 1925 (*Odontochila*)

(Rev. Chil. Hist. Nat. **29**, 183)

♂ Holotypus, Ecuador occidentalis, San Rafael, Barvaganetal, 200 m, leg. CAMPOS; im DEI.

camposi HORN, 1900 (*Tetracha*)

(Ent. Nachr. **26**, 54)

Mehrere Syntypen, Ecuador, Posorja, leg. CAMPOS.
DEI: 7 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

carinifrons HORN, 1901 (*Neocollyris*)

(Rev. Cic., 47)

♀ Holotypus, China, Ho-chan; im DEI.

carissima FLEUTIAUX, 1919 (*Cicindela*)

(Bull. Soc. Ent. Fr., 127)

Mehrere Syntypen, Laos, Pak Lay, Mékong, Luang-Prabang, VIII. 1918, leg. VITALIS DE SALVAZA.
DEI: 1 Syntypus, Laos, Pak Lay, 10. VIII. 1918, leg. VITALIS DE SALVAZA.

catoptroides HORN, 1892 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 78)

♀ Holotypus, Sumatra, ex Coll. RICHTER; im DEI.

celeripedestris HORN, 1896 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 357)

♂ Holotypus, Minas Geraes; (ex Coll. RUGE) im DEI.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

centropunctata HORN, 1934 (*Prothyma*)
(Mém. Acad. Malgache **20**, 23)

Mehrere Syntypen, N.-W. Madagascar, Ramena, Sambirano, Antsera-Ambobaka, III. 1933/I.—II. 1934, leg. MELLIS.
DEI: Syntypen, N.-W. Madagascar; 2 Ex. I.—II. 1933, 24 Ex. Ramena, Sambirano, Antsera-Ambobaka, leg. MELLIS.

ceylonensis HORN, 1892 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 87)

Mehrere Syntypen, Ceylon.
DEI: 3 Syntypen, Ceylon, leg. SCHLÜTER.

chamaelon HORN, 1892 (*Oxygoniola*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 71)

1 ♂, 1 ♀, Celebes, leg. RIBBE, ex Coll. RICHTER; 1 ♂, im DEI: Syntypen.
DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, BONTHAIN, 1882.

championi BATES, 1881 (*Odontocheila*)
(Biol. Centr. Amer. Col. **1**, 16)

Mehrere Syntypen, Guatemala, Zapote, leg. CHAMPION.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

chaudoiri BALLION, 1870 (*Cicindela*)
(Bull. Moscou **46**, 322)

Mehrere Syntypen, Umgebung von Kapal, unweit der chinesischen Grenze.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
Syn. zu *granulata* GEBLER, 1843.

chaudoiri HORN, 1892 (*Collyris*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 362)

Holotypus, Mindanao; (durch STAUDINGER) im DEI.

chaudoiri DOKHTOUROFF, 1887 (*Odontochila*)
(Ann. Soc. Ent. Belg. **31**, 157)

♀ Holotypus, Brésil, Petropolis, via SAHLBERG an HORN.
DEI: ♀ Holotypus, ohne Fundort.
Syn. zu *procera* CHAUDOIR, 1860.

chaudoiri HORN, 1894 (*Oxychila*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 111)

♂ Holotypus, Chiriqui; (durch STAUDINGER) im DEI.

chaudoiri HORN, 1895 (*Procephalus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 353)

♀ Holotypus, Brasilia; im DEI.

chaudoiri DOKHTOUROFF, 1882 (*Pseudoxychila*)
(Spec. Cic. **1**, 89)

2 Syntypen, Equateur, in Coll. DOKHTOUROFF.
DEI: 1 Syntypus, Equator.
Syn. zu *bipustulata* LATREILLE, 1811.

chaudoiri rariussculpta HORN, 1929 (*Collyris*)
(Ent. Nachrichtenbl. **3**, 4)

Mehrere Syntypen, Insel Samar, 23. V. 1921/25. V. 1924, leg. BAKER und GREGOR, im National-Museum Washington und in Coll. HORN.
DEI: 2 Syntypen, Island Samar, leg. BAKER.

chevrolati HORN, 1892 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 371)

♂ Holotypus, Yucalan, ex Coll. FLEUTIAUX; im DEI.
Syn. zu *cyaniventris* CHEVROLAT, 1834.

chevrolati HORN, 1894 (*Collyris*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 16)

♀ Holotypus, Insel Andaman [leg. DONCKIER]; im DEI.
Syn. zu *schaumi* HORN, 1892.

chevrolati GUÉRIN, 1838 (*Collyris*)
(Mag. Zool., 225, Taf. 225, Fig. 1a—c)

Mehrere Syntypen, Java.
DEI: 1 Syntypus, Java, ex Coll. v. DE POLL.
Syn. zu *tuberculata* M'LEAY, 1825.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

chiapana BATES, 1890 (*Cicindela*)

(Trans. Ent. Soc. London, 505)

Mehrere Syntypen, Mexico: Tapachula in Chiapas, La Noria in Sinaloa, leg. HÖGE; Guatemala, leg. CHAMPION; near the city, leg. SALVIN.
DEI: 2 Syntypen, Tapachula, Chiapas, leg. HÖGE.
Syn. zu *flavopunctata* CHEVROLAT, 1834.

chilensis THOMSON, 1857 (*Tetracha*)

(Mon. Cic. **1**, 34, Taf. 6, Fig. 1)

30 Syntypen, Pérou und Chili, in Coll. THOMSON.
DEI: 1 Syntypus, Lima, Coll. FLEUTIAUX.
Syn. zu *carolina* LINNÉ, 1766.

chiriquina excisipenis HORN, 1932 (*Odontochila*)

(Rev. Ent. **2**, 408–409)

Mehrere Syntypen: Ecuador, Cachabé, XII. 1896, Queredo, 100 m, leg. CAMPOS; West-Columbia, Juntas, Rio Dagua, 400 m, leg. FASSL; Columbia, Rio Dagua, leg. ROSENBERG; Bolivia, Santos Marcos, 2000 m.
DEI: Syntypen: Ecuador occid., 3 Ex. Cachabé, 1896, leg. ROSENBERG, 1 Ex. dto., low c. XII. 1896, 1 Ex. Queredo, 100 m, leg. CAMPOS; 1 Ex. Columbien, Rio Dagua, leg. ROSENBERG, 2 Ex. Juntas, Rio Dagua, 400 m, leg. FASSL, 1 Ex. ex Coll. BADEN, RUGE, 2000 m.

chloe DOKHTOUROFF, 1887 (*Cicindela*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. **31**, 156)

Holotypus, Indes orientales; im DEI.
Syn. zu *chloropleura* CHAUDOIR, 1865.

chrysochroa DOKHTOUROFF, 1882 (*Tetracha*)

(Spec. Cic. **1**, 41)

3 Syntypen, Pérou, in Coll. DOKHTOUROFF.
DEI: 2 Syntypen, Peru, ex Coll. DOKHTOUROFF.
Syn. zu *carolina* LINNÉ, 1766.

chrysopyga HORN, 1892 (*Odontochila*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 70)

♂ Holotypus, West-Afrika?, ex Coll. RICHTER.
DEI: ♂ Holotypus, ohne Fundort, ex Coll. RICHTER.

cicindeloides HORN, 1905 (*Odontochila*)

(Stett. Ent. Ztg. **66**, 279)

♁ Holotypus, bor. Madagascar, Montes Ambre, leg. HEYNE; im DEI.

cinctula BATES, 1881 (*Odontocheila*)

(Biol. Centr. Amer. Col. **1**, 16)

Mehrere Syntypen, Guatemala, Zapote, leg. CHAMPION.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, ex Museum Berlin.
Syn. zu *ignita* CHAUDOIR, 1860.

circumcincta CASTELNAU, 1867 (*Cicindela*)

(Trans. Roy. Soc. Victoria **8**, 34)

Mehrere Syntypen, Australien, Brisbane, Clarence River, Eastern Creek, Queensland, New Caledonia; leg. THOUZET.
DEI: Syntypen: 1 Ex. Queensland; 1 Ex. Brisbane; 1 Ex. Clarence River; ex cab. CASTELNAU.
Syn. zu *semicincta* BRULLÉ, 1834.

circumpictoides HORN, 1900 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 207)

♂ Holotypus, „Oceania" [leg. WITTE]; im DEI.

clavicornis HORN, 1902 (*Therates*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 73)

Mehrere Syntypen, Tonkin, Montes Mauson, IV.–V. 1900, 2–3000′, leg. FRUHSTORFER.
DEI: 5 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

clavipalpis HORN, 1901 (*Neocollyris*)

(Rev. Cic., 50)

♂ Holotypus, Borneo, ex Coll. RICHTER; im DEI.

cochinchinensis HORN, 1914 (*Collyris*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. **58**, 137)

♀ Holotypus, Cochinchine, Stieng, ex Coll. CASTELNAU-Coll. BROWN-Coll. V. DE POLL; im DEI.

coerulea LUCAS, 1857 (*Tetracha*)

(Voy. Cast., 28, Taf. 1, Fig. 5b, c)

Mehrere Syntypen, Amérique mérid.
DEI: 1 Syntypus, Amérique mérid., durch CASTELNAU, 1845, ex Museum Paris.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

coerulea selengensis MANDL, 1936 (*Cicindela*)

(Arb. morph. tax. Ent. **3**, Nr. 1, 12–13)

Mehrere Syntypen, Selengatal, Selengafe, Aksu Musart, Thian Schan, in Coll. HORN und Coll. MANDL.
DEI: 6 Ex. Transbaicalia, Selengatal, V.–VI. 1908, ex Coll. LEONHARD; 1 Ex. Transbaic., Selengafe; 2 Ex. Thian Schan, Aksu Musart, ex Coll. WINKLER: Syntypen.

colmanti HORN, 1899 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 381)

Mehrere Syntypen, Africa centr., nahe Surango, non procul a flumine Uellé, V., VI., X., leg. COLMANT.
DEI: 1 ♂, Syntypus, Surango, rive ganche d l'Uellé, leg. COLMANT.

compressicollis HORN, 1909 (*Collyris*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. **53**, 445)

♂ Holotypus, Assam; im DEI.

concinna CHAUDOIR, 1860 (*Derocrania*)

(Bull. Moscou **33**, 2, 298)

Mehrere Syntypen, Ceylon, im Museum Berlin.
DEI: 1 Syntypus, Ceylon, durch NIETNER, ex Museum Berlin.

confluens KRAATZ, 1890 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 368)

Mehrere Syntypen, ohne Fundort.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *atrata* PALLAS, 1776.

confluens HORN, 1893 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 197; nom. praeocc., = *confluentesignata* HORN, 1915, Gen. Ins. Cic., 407)

♀ Holotypus, Minas Geraes [durch STAUDINGER]; im DEI.

confluentesculpta HORN, 1913 (*Dromica*)

(Rev. Zool. Afr. **2**, 275)

Syntypen, Belg. Congo: 1 ♂, Kapoya, 12. XI. 1911; 1 ♀, Tekanini, 16. XI. 1911; leg. BEQUAERT; im Musée du Congo.
DEI: 1 ♀ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

confusa BASILEWSKY, 1954 (*Cratohaerea*)

(Rev. Zool. Bot. Afr. **50**, 345–355)

♂ Holotypus, Lualaba, Tshibalaka, Region Lulua, 9. XI. 1933, leg. OVERLAET, im Musée Royal du Congo Belge; mehrere Paratypen, Lualaba, Maniema, Tanganika, im Musée Royal du Congo Belge und im Institut Royal des Sciences naturelle à Bruxelles.
DEI: 1 Paratypus, Lulua, Kapanga, X. 1933, leg. OVERLAET.

congoana MANDL, 1964 (*Neochila*)

(Rev. Zool. Bot. Afr. **69**, 304)

♂ Holotypus, (No 535), Lualaba, Kakanda (Mutaka), XII. 1953, leg. DE CATERS, im Musée Royal de l'Afrique Centrale, Tervuren; Paratypen: 1 ♂ (No 537), 1 ♀ (No 541), N. Rhodesia, Abercon, X.–XI. 1946, 1 ♂ (No 536), Katanga, La Kipushi, XI. 1931, 1 ♂ (No 538), P.N.U. Kakanda (Mutaka), XII. 1953; leg. CATERS; 1 ♂ (No 540), Lubudi, X. 1931, leg. SEYDEL; 1 ♀ (No 542), Kapiri, IX. 1912, Miss. Agric; im Musée Royal de l'Afrique Centrale; 1 ♀ (No 554), Elisabethville, VI. 1948, leg. PANTOS, in Coll. MANDL; 1 ♂ (No 555), Mufungwa, 1.–16. XII. 1911, leg. BEQUAERT, im DEI.
DEI: 1 ♂ Paratypus (No 555) Belg. Congo, mit den Angaben der Beschreibung.

conjuncta KRAATZ, 1890 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 368)

Mehrere Syntypen, ohne Fundort.
DEI: Syntypen: 1 Ex. Astrachan, leg. HENKE; 1 Ex. ohne Fundort, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *atrata* PALLAS, 1776.

connexa PÉRINGUEY, 1893 (*Cosmema*)

(Trans. S. Afr. Phil. Soc. **7**, 90)

Mehrere Syntypen, South Africa, Natal, Frere.
DEI: Syntypen, Natal: 3 Ex. Escurt; 2 Ex. Frere; 1 Ex. ohne Fundort, Nr. 29; ex Coll. PÉRINGUEY.
Syn. zu *alboclavata* DOKHTOUROFF, 1883.

conradti HORN, 1894 (*Cratohaerea*)

(Ent. Nachr. **20**, 246)

♀ Holotypus, Togo, leg. CONRADT; im DEI.
Syn. zu *chrysopyga* HORN, 1892.

constricticollis HORN, 1914 (*Cicindela*)

(Arch. Naturg. **79**, A 11 (1913), 18)

1 ♂, 2 ♀♀, Syntypen, Madagascar, Ambositra, Coll. LE MOULT; im DEI.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

constricticollis HORN, 1909 (*Collyris*)

(Rec. Ind. Mus. 3, 259)

2 ♀♀, Syntypen, Borneo, Martapura, 1891, leg. DOHERTY, ex. Coll. SHARP; in Coll. HORN und im Britischen Museum.
DEI: 1 ♀ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

convergentefrontalis HORN, 1923 (*Collyris*)

(Zool. Jahrb. **47**, Abt. Syst., 316)

♀ Holotypus, Tonkin, prov. Laokay, Chapo, leg. LE MOULT; im DEI.

convexoabrupticollis HORN, 1931 (*Cicindela*)

(Ver. Ges. Lux. Naturf., 1—2 [Separat-Abdruck])

♂ Holotypus, Afrika, Oubangui, Yalinga, leg. LE TESTU; [Montblanc, 1930] im DEI.

cophognatoides HORN, 1914 (*Oxychila*)

(Arch. Naturg. **79**, A 11 (1913), 6)

♂ Holotypus, Santo Catharina, Piraly, II. 1910, leg. SCHMALZ; im DEI.

corbetti HORN, 1899 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 53)

2 ♂♂, Syntypen, Birma, Tharrawaddy, leg. ANDREWES und CORBETT.
DEI: 1 ♂, Syntypus, Tharrawaddy, Thrudy, leg. ANDREWES.

cosmemoides HORN, 1914 (*Cicindela*)

(Arch. Naturg. **79**, A 11 (1913), 20)

♂ Holotypus, Südost Angola; im DEI.

crassipalpis HORN, 1908 (*Cicindela*)

(Rec. Ind. Mus. **2**, 410)

1 ♂, 2 ♀♀, Syntypen, Oriental Region, Coimbatore distr., Potanur, X. 1907, 1.000 ft., leg. Capt. WELT DOWNING in Coll. ANDREWES, Capt. DOWNING und in Coll. HORN.
DEI: 1 Syntypus, Potanur, Akhela, leg. DOWNING, ex Coll. ANDREWES.

crebrepunctatus HORN, 1923 (*Therates*)

(Ent. Meddel. **14**, 215)

♂ Holotypus, Birma superior, Namtu, V. 1905; im DEI.

crebrepunctatus HORN, 1923 (*Therates*)

(Zool. Jahrb. **47**, Abt. Syst., 317)

♂ Holotypus, Borneo; im DEI.
Syn. zu *erinys* BATES, 1874.

cribrata BRULLÉ, 1837 (*Cicindela*)

(Voyage Orbigny, Ins. Col., 9)

Mehrere Syntypen, Bolivia, am Fluß Mamore, Prov. MOXOS, leg. ORBIGNY.
DEI: Syntypen: 1 Ex. Bolivia, ex cab. THOMSON-Coll. V. DE POLL; 1 Ex. Bolivia, Coll. FLEUTIAUX (sehr schlecht erhalten).

cribripennis THOMSON, 1857 (*Collyris*)

(Arch. Ent. **1**, 133)

2 Syntypen, Borneo, Sarawak, ex Coll. BATES, im DEI.
DEI: 1 Syntypus, Borneo, ex cab. THOMSON-Coll. BROWN-Coll. V. DE POLL.
Syn. zu *diardi* LATREILLE, 1822.

crista-galli HORN, 1935 (*Cosmema*)

(Natuur. Maandbl. **24**, 101)

♀ Holotypus, Südost-Kap-Kolonie, Port Grosvenor; im DEI.

crucifrons HORN, 1911 (*Ctenostoma*)

(Ent. Bl. **7**, 154)

♂ Holotypus, Peru, Tarapoto, IV.—V. 1885, leg. MATHAN; im DEI.

cruentata HORN, 1894 (*Collyris*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 224)

2 ♀♀, Syntypen, Borneo und Java.
DEI: 1 ♀, Borneo; 1 ♀ Java-Tisolack, Preanger; durch STAUDINGER: Syntypen.
Syn. zu *bonellii* GUÉRIN, 1834.

curacaoica VAN DE POLL, 1886 (*Tetracha*)

(Not. Leyd. Mus. **8**, 225)

Mehrere Syntypen, Indes occident., Curaçao, Brievengat, 1885, leg. JANVIER und FÉRRIER.
DEI: 3 Syntypen, Curaçao, Brievengat, 1885, ex Coll. V. DE POLL.
Syn. zu *affinis* DEJEAN, 1825.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

curvicollis SLOANE, 1905 (*Cicindela*)

(Proc. Linn. Soc. N. S. Wales **30**, 233)

Mehrere Syntypen, N. W. Australia, via FRENCH an SLOANE, in Coll. SLOANE.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, in Coll. SLOANE.
Syn. zu *mastersi* CASTELNAU, 1867.

curvipenis HORN, 1905 (*Odontochila*)

(Not. Leyd. Mus. **25**, 220)

Mehrere ♂♂ Syntypen, Amazon, Maices, in Coll. HORN.
DEI: 1 ♂, Amaz. Str., 1 ♂, Maices, durch STAUDINGER, 2 ♂♂, ohne Fundort: Syntypen.

cyanea brunnea DOKHTOUROFF, 1883 (*Tricondyla*)

(Rev. mens. Ent. **1**, 13)

Mehrere Syntypen, Sumatra, in Coll. DOKHTOUROFF.
DEI: 1 Syntypus, Sumatra.

cyanea paradoxa HORN, 1892 (*Tricondyla*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 371)

♀ Holotypus, Borneo, ex Coll. RICHTER; (WAHNES) im DEI.

cyaneipalpis HORN, 1923 (*Collyris*)

(Zool. Jahrb. **47**, Abt. Syst., 315)

♀ Holotypus, Nilgiri Hills, via ANDREWES an HORN, 1921; im DEI.

cyanella pseudomargineguttata HORN, 1930 (*Odontochila*)

(Rev. Chil. Hist. Nat. **34**, 310—311)

2 ♀♀, Syntypen, Brasilia, Cayenne; im DEI.

cyaneomarginata HORN, 1900 (*Odontochila*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 203)

Mehrere Syntypen, Espirito Santo, Rio Janeiro (San Fidelis), Minas Geraës (Philadelphia).
DEI: Syntypen: 1 ♀, St. Espirito; 1 ♂, 1 ♀, Brasil, Minas Geraës, 1897, ex Coll. FRUHSTORFER; 1 Ex. Philadelphia, leg. HAENSCH; 1 ♂, St^to. Antonio dos Brotos, Districto de San Fidelis, Prov. Rio de Janeiro, Brésil, 1876—1882, leg. DE LYON.

cyanescens DOKHTOUROFF, 1882 (*Megacephala*)

(Spec. Cic. **1**, 29)

2 Syntypen, Sénégal, in Coll. DOKHTOUROFF.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, ex Coll. DOKHTOUROFF.
Syn. zu *megacephala* OLIVIER, 1790.

cyanipes elongata HORN, 1906 (*Tricondyla*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 32)

Mehrere Syntypen, Mindanao, Mindoro.
DEI: 2 Syntypen, Mindanao, durch STAUDINGER, ex Coll. RUGE.

cylindricoflavescens HORN, 1922 (*Odontochila*)

(Zool. Meded. **7**, 101)

Mehrere Syntypen, Bolivia, Mapiri, durch STAUDINGER, in Coll. HORN.
DEI: 6 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

cylindriformis HORN, 1912 (*Cicindela*)

(Ent. Mitt. **1**, 135)

Mehrere Syntypen, Formosa, Kosempo, 1.—31. V. 1908, Taihanroku, 7.—15. VI. 1908; leg. SAUTER.
DEI: 3 Syntypen, Taihanroku, 7.—15. VI. 1908, leg. SAUTER.

damarensis PÉRINGUEY, 1893 (*Mantichora*)

(Trans. S. Afr. Phil. Soc. **7**, 13)

Mehrere Syntypen, South Africa, Damaraland, nahe Lake N'Gami.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, Nr. 14.
Syn. zu *latipennis* WATERHOUSE, 1837.

darwini SLOANE, 1909 (*Cicindela*)

(Proc. Linn. Soc. N.S. Wales **34**, 299)

Mehrere Syntypen, Australia, Port Darwin, leg. DODD, in Coll. SLOANE und Coll. HORN.
DEI: 1 Syntypus, Port Darwin, leg. DODD.

daurica MOTSCHULSKY, 1844—1845 (*Cicindela*)

(Ins. Sib., 33)

40 Syntypen, Gebiet von Baical-Mongolei, bei Selenguinsk.
DEI: 1 Syntypus, Kjachta, ex cab. BROWN-Coll. v. DE POLL.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

davidis FAIRMAIRE, 1887 (*Cicindela*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. **31**, 88 (nec HORN, Dtsch. Ent. Ztschr., 94; 1895))

Mehrere Syntypen, China, Moupin, durch DAVID.
DEI: 2 Syntypen, Mou-pin, 1870, durch DAVID.

debilis BATES, 1890 (*Cicindela*)

(Trans. Ent. Soc. London, 504, Taf. 16, Fig. 12)

Mexico, Ciudad in Durango, leg. HÖGE, mehrere Syntypen.
DEI: 3 Syntypen, Mexico, Durango city, leg. HÖGE.

decemmaculata DOKHTOUROFF, 1885 (*Cicindela*)

(Horae Soc. Ent. Ross. **19**, 277)

Holotypus, Turkestan, Tschaar-tasch; im DEI.
Syn. zu *granulata* GEBLER, 1843.

declivis HORN, 1900 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 364)

2 ♂♂, 1 ♀, Nov. Guinea, Bismarck Archip., Gazelle, Montes Baining, leg. v. BENNIGSEN, in Coll. HORN und Coll. v. BENNIGSEN; Syntypen; im DEI.

dejeani HORN, 1895 (*Collyris*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 82)

♂ Holotypus, China; im DEI.
Syn. zu *crassicornis* DEJEAN, 1825.

delavayi FAIRMAIRE, 1886 (*Cicindela*)

(Le Natural. **8**, 223)

Mehrere Syntypen, Yunnan.
DEI: 1 Syntypus, Yunnan, ex Coll. FLEUTIAUX.

densepunctata HORN, 1909 (*Dromica*)

(Ent. Rundsch. **26**, 101)

2 ♀♀, Syntypen, N. O.-Rhodesia, S. O. Katanga, Serenje District, 4000'', 4500'', 11., 25. XII. 1907, leg. NEAVE.
DEI: 1 ♀ Syntypus, N. E. Rhodesia, Serenje Distr., about 4.500 ft, 24. u. 25. XII. 1907, Coll. NEAVE, Nr. 230, ex Britischen Museum.

denticollis HORN, 1895 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 88)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Nov.-Guinea; im DEI.

dentifrons HORN, 1901 (*Ctenostoma*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 353)

♂ Holotypus, Brasil., Espirito Santo, MICHAELIS; im DEI.

denudata HORN, 1935 (*Cicindela*)

(Nov. Guinea, Leide, **17**, Zool., 301)

1 ♂, 2 ♀♀, Syntypen, Neu-Guinea, Kokoda, 1200 Fuß hoch, IV., V. 1933, leg. CHEESMAN; im Britischen Museum und in Coll. HORN.
DEI: 1 Syntypus, Papua, Kokoda, 1200 ft., IV. 1933, leg. CHEESMAN, ex Britischen Museum, 1933—427.

deserticoloides CODINA, 1931 (*Cicindela*)

(Bol. Soc. ent. Esp. **14**, 161)

3 ♂♂, 2 ♀♀, Holotypus und Paratypen, Spanien, Albatera (Alicante), 24. VIII. 1931, im Museo de Ciencias Naturales de Barcelona und im DEI.
DEI: 2 ♂♂, 2 ♀♀, Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

desgodinsii FAIRMAIRE, 1887 (*Cicindela*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. **31**, 87)

Mehrere Syntypen, China, Yunnan, Thibet, leg. DELAVAY und CHASLE.
DEI: 1 Syntypus, Thibet, ex Coll. OBERTHÜR-Coll. FLEUTIAUX-Coll. DONCKIER.

despectata HORN, 1892 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 86)

Mehrere Syntypen, Insel Philippinen, zum Teil Luzon, ex Coll. RICHTER.
DEI: Syntypen: 2 Ex. Insel Philippinen; 1 Ex. Insel Luzon; ex Coll. RICHTER.

destituta SRNKA, 1890 (*Cicindela*)

(Ent. Nachr. **16**, 249)

2 ♀♀, Syntypen, Podolien, in Coll. SRNKA.
DEI: 1 ♀ Syntypus, Podolia, FRIČ, ex Coll. SRNKA.
Syn. zu *campestris* LINNÉ, 1758.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

deyrollei GUÉRIN, 1849 (*Cicindela*)
(Rev. Mag. Zool. (2) **1**, 82)
Mehrere Syntypen, Port. Guinée, bei Bagnous und Cassangues, zwischen den Flüssen Rio-San-Domingo und Casamance, leg. BOCANDÉ.
DEI: 1 Syntypus, Senegal.

deyrollei pseudomechovi HORN, 1919 (*Cicindela*)
(Stett. Ent. Ztg. **90**, 321)
1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Nordost Congo-Staat, leg. GRAUER; im DEI.

differens HORN, 1892 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 82)
♀ Holotypus, Zansibar, ex Coll. RICHTER.
DEI: ♀ Holotypus, ohne Fundort, ex Coll. RICHTER.

digueti HORN, 1897 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 186)
♀ (?) Holotypus, California inf., DIGUET 1892, durch MAINDRON; im DEI.

dilatotarsa HORN, 1924 (*Cicindela*)
(Philipp. Journ. Sc. **24**, 87)
♂ Holotypus, Philippine, Luzon bor., Coll. v. DE POLL; im DEI.

discoidalis HORN, 1897 (*Cosmema*)
(Not. Leyd. Mus. **19**, 237)
♀ Holotypus, Transvaal, in Coll. HORN [Komatipoort, HARTMANN-KRAATZ]; im DEI.

discoscripta HORN, 1914 (*Cicindela*)
(Arch. Naturg. **79**, A 11 (1913), 23)
Mehrere Syntypen, Nordwest Rhodesia, ex Coll. PLASON.
DEI: 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, 1913, durch STAUDINGER.

discovelutinosa HORN, 1931 (*Cicindela*)
(Journ. Fed. Malay Mus. **16**, 288–289)
1 ♂, 1 ♀ Syntypen, N. Borneo, Mt. Kinabalu, nahe Lumu Lumu, alt 5.500 ft., im Museum F. M. S. und in Coll. HORN.
DEI: 1 ♀ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

discrepans HORN, 1893 (*Odontochila*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 197)
♂ Holotypus, Brasilia; im DEI.

discreta longimarginalis MANDL, 1970 (*Cicindela*)
(Ztschr. Arb. Österr. Ent. **22**, 3, 71, Abb. 2, Fig. 7)
♂ Holotypus, D. N. Guinea, Pionierlager, V.–VI. 1912, Kais. Augustafl.-Exp. BÜRGERS S. G. und mehrere Paratypen dto.
DEI: 1 Paratypus, Pionierlager, 30. IV.–14. VI. 1912, leg. LEDEMANN, S. G.

discretepunctata HORN, 1924 (*Prothyma*)
(Philipp. Journ. **24**, 88)
Mehrere Syntypen, Philippinen, Sibuyan, leg. BAKER.
DEI: 9 Syntypen, Island Sibuyan, leg. BAKER.

dissimilis PÉRINGUEY, 1893 (*Cicindela*)
(Trans. S. Afr. Phil. Soc. **7**, 50)
Mehrere Syntypen, South Africa, Delagoa Bay, Rikatla.
DEI: 4 Syntypen, Delagoa Bay, Rikatla, ex Coll. PÉRINGUEY.

dissimilis HORN, 1896 (*Oxychila*)
(Ent. Nachr. **22**, 338)
2 ♀♀, Syntypen, Brasilia.
DEI: 1 ♀, Brasilia, 1 ♀, ohne Fundort; Syntypen.
Syn. zu *similis* HORN, 1892.

dissimilis singalensis HORN, 1911 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Nat. Bibl. **2**, 53)
♀ Holotypus, Ceylon, Hambantola, XI., durch WICKHAM; im DEI.

distinguenda biprolongata HORN, 1937 (*Tetracha*)
(Rev. Chil. Hist. Nat. **41**, 141)
♀ Holotypus, Argentine, Rosario, 10. II. 1935, via NICOLAY an HORN, [2. I. 1935, nicht 10. II. 1935!]; im DEI.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

distypsideroides HORN, 1899 (*Nickerlea*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 136)
♀ (?) Holotypus, Australia bor. (ODEWAHN); im DEI.

divergente-hamulata HORN, 1929 (*Odontochila*)
(Rev. Chil. Hist. Nat. **33**, 154)
2 ♂♂, Syntypen, Bolivia, Rurrenabaque, nahe Rio Beni, X. 1921/22, Mulford Biol. Exp., Coll. MANN, in Coll. HORN und im National Museum Washington.
DEI: 1 ♂ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, X.

divina HORN, 1893 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 200)
♂ Holotypus, Insel Timor; im DEI.

dohertyi HORN, 1895 (*Collyris*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 83)
1 ♂, 2 ♀♀, Syntypen, S. O. Sumatra, Malacca und Marang, 1890, leg. DOHERTY, in Coll. FLEUTIAUX und Coll. HORN.
DEI: Syntypen: 1 Ex. Malacca, ex. Coll. FLEUTIAUX; 1 Ex. ohne Fundort.

dohertyi HORN, 1905 (*Therates*)
(Stett. Ent. Ztg. **66**, 277)
♀ Holotypus, Assam, Patkai Mts., leg. DOHERTY; im DEI.

dokhturowi HORN, 1898 (*Ctenostoma*)
(Rev. Cic., 32)
♂ Holotypus, Rio de Janeiro, ex Coll. DOKHTOUROFF; im DEI.

dolorosa HORN, 1896 (*Cicindela*)
(Stett. Ent. Ztg. **57**, 170)
Holotypus, Chili, durch FAIRMAIRE; im DEI.
Syn. zu *gormazi* REED, 1871.

dolosa PÉRINGUEY, 1894 (*Cosmema*)
(Trans. Ent. Soc. Lond., 452)
Mehrere Syntypen, Mashunaland, Salisbury, leg. MARSHALL.
DEI: 1 Syntypus, Mashunaland, Zambezia, ex Coll. PÉRINGUEY.

doriaë HORN, 1896—1897 (*Cicindela*)
(Ann. Mus. Genova (2) **17**, 273; l. c. (2) **14**, 681; 1895)
♀ Holotypus, Sumatra; im DEI (Ex. sehr schlecht erhalten).

dormeri HORN, 1898 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 198)
Mehrere Syntypen, Ceylon, Kandy, ex Coll. DORMER.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

dormeri HORN, 1898 (*Collyris*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 196)
♂ Holotypus, Ind. or., ex Coll. DORMER; im DEI.
Syn. zu *mniszechi* CHAUDOIR, 1864.

dormeri HORN, 1898 (*Ctenostoma*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 196)
♂ Holotypus, Brasilia, ex Coll. DORMER; im DEI.

dorotheae MANDL, 1957 (*Megacephala*)
(*Ent. Nachr. Österr. u. Schweiz. Ent.* **9**, *Nr.* 2, 29—30, Fig. 3—4)
♂ Holotypus, Paraguay, Asuncion, leg. SCHADE; 20 Paratypen: dto.; Argentinien, Corrientes, Santa Fé; in Coll. MANDL, im Zoologischen Institut, im DEI, im Museum ALEXANDER KOENIG und im Museum Budapest.
DEI: 7 Paratypen, Paraguay, Asuncion, ex Coll. MANDL.

drakei HORN, 1892 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 85)
Mehrere Syntypen; Mendoza, Drake, ex Coll. RICHTER; Argentinisches Hochgebirge, leg. KLÄGER.
DEI: 2 Ex. Mendoza, Drake, ex Coll. RICHTER; 2 Ex. Argentinisches Hochgebirge, leg. KLÄGER: Syntypen.

dromicaria KOLBE, 1894 (*Euryoda*)
(Stett. Ent. Ztg. **55**, 164)
Mehrere Syntypen, Ober-Guinea, Togo, Station Bismarckburg und Umgebung, Ende III. 1893, leg. CONRADT.
DEI: 2 Syntypen, Togo, Bismarckburg, 21. III.—30. IV. 1893, leg. CONRADT.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

duplosetosa HORN, 1929 (*Cicindela*)

(Stett. Ent. Ztg. **90**, 323)

Mehrere Syntypen, Katanga, Kinda, via STAUDINGER & BANG-HAAS an HORN.
DEI: 7 Syntypen, Belg. Congo, Katanga, Kinda.

eburatum BATES, 1872 (*Ctenostoma*)

(Ent. Monthly Mag. **9**, 49)

Mehrere ♀♀, Syntypen, S. Brazil, leg. ROGERS, in Coll. SAUNDER und Coll. BATES.
DEI: 1 ♀ Syntypus, Brazil.

egregius PÉRINGUEY, 1896 (*Bostricophorus*)

(Trans. S. Afr. Phil. Soc. **7**, 103)

Mehrere Syntypen, South Africa, Zambezia, Salisbury, Buluwayo.
DEI: 1 Syntypus, Buluwayo, Zambezia, ex Coll. PÉRINGUEY.
Syn. zu *rusticana* PÉRINGUEY, 1893.

ehlersi HORN, 1914 (*Cicindela*)

(Arch. Naturg. **89**, A 11 (1913), 31)

♀ Holotypus, Insel Timor, ex Coll. WALLACE-Coll. EHLERS-Coll. v. DE POLL; im DEI.

elaphroides DOKHTOUROFF, 1882 (*Cicindela*)

(Rev. Ent. **1**, 276)

Mehrere Syntypen, Manille, in Coll. DOKHTOUROFF.
DEI: 1 Syntypus, Manille.
Syn. zu *discreta* SCHAUM, 1863.

elegans atrorotundata HORN, 1934 (*Pogonostoma*)

(Arb. morph. tax. Ent. **1**, 28—29)

Mehrere Syntypen, Madagascar centr. occident., Tananarivo, Miandrivazo, im Museum Paris und in Coll. HORN.
DEI: Syntypen: 3 Ex. C. W. Madagascar; 1 Ex. Tananarivo; 2 Ex. Madagascar, dto., ex Museum Paris.

elegans externospinosa HORN, 1927 (*Pogonostoma*)

(Wien. Ent. Ztg. **44**, 36—37)

2 ♀♀, Syntypen, Madagascar, Mt. d'Ambre, leg. SICARD, in Coll. SICARD und Coll. HORN.
DEI: 1 ♀ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

elegans hamulipenis HORN, 1934 (*Pogonostoma*)

(Arb. morph. tax. Ent. **1**, 26—27)

5 ♂♂, 8 ♀♀, Syntypen, in silvis Analamazotra-Perinet, 4.—20. XII. 1930/5. I. 1931, leg. Familie OLSUFIEFF.
DEI: 11 Syntypen, Forêt Analamazotra-Perinet, Anfang XII., 4.—6., 5.—10., 10.—12., 12.—13., 15.—18., 16. bis 18., 18.—20. XII. 1930/5. I. 1931, leg. OLSUFIEFF.

elegans subtiligrossa HORN, 1934 (*Pogonostoma*)

(Arb. morph. tax. Ent. **1**, 25—26)

2 ♂♂, 1 ♀ Syntypen, Madagascar occid., Baly-Bay; im DEI.

elegans violaceolevigata HORN, 1927 (*Pogonostoma*)

(Wien. Ent. Ztg. **44**, 35—36)

Syntypen, Madagascar borealis; 3 ♂♂, Mt d'Ambre, in Coll. HORN und Coll. SICARD; 1 ♀, „Tamatave", leg. SICARD, in Coll. HORN.
DEI: Syntypen: 2 ♂♂, 1 ♀, mit den Angaben der Beschreibung.

elegantissima HORN, 1892 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 77)

Mehrere Syntypen, Ile Bodjo, ex Coll. RICHTER.
DEI: 1 Ex. Sumatra, Bodjo; 1 Ex. dto. Acut 84, durch WEYERS, ex Coll. RICHTER; Syntypen.

elongata HORN, 1892 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 81)

Syntypen; 1 ♂, Celebes, 1 ♂, im Museum Berlin.
DEI: 1 ♂ Syntypus, Celebes.
Syn. zu *wallacei* BATES, 1874.

elongata STURM, in litt. 1843 (*Cicindela*)

(Cat. Käfersamml., 3)

Mehrere Syntypen, Hispanica.
DEI: 1 Syntypus, Elonguisa, ex Coll. STURM.
Syn. zu *hispanica* GORY, 1833.

eoa HORN, 1898 (*Cicindela*)

(Not. Leyd. Mus. **20**, 105)

2 ♂♂, Syntypen, Luçon, 5—6000′, leg. WHITEHEAD, via HEYNE an HORN, ex Coll. JANSON; im DEI.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

epipleuralis HORN, 1923 (*Phaeoxantha*)
(Ent. Meddel. **14**, 212)
Mehrere Syntypen, Rio San Francisco, Bahia, leg. GARBE und MELZER, in Coll. HORN.
DEI: 9 Syntypen, Rio San Francisco, Bahia, Villa Nova b. Donzeiro, leg. GARBE und MELZER.

erichsoni HORN, 1898 (*Oxygenia*)
(Not. Leyd. Mus. **20**, 103)
Mehrere Syntypen, Bolivia, Songo, Yungan.
DEI: 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, durch STAUDINGER.

erikssoni PÉRINGUEY, 1893 (*Myrmecoptera*)
(Trans. S. Afr. Phil. Soc. **7** (1892), 66)
Mehrere Syntypen, Northern Ovampoland.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, ex Coll. PÉRINGUEY.

erlangeri HORN, 1904 (*Dromica*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 426)
♀ Holotypus, zwischen Gurgura und Gololoda, 17. VI. 1900, leg. NEUMANN und v. ERLANGER, Exped. vom Roten Meer zum Nil; im DEI.

erlangeri deflexicollis HORN, 1932 (*Dromica*)
(Mitt. Schweiz. Ent. Ges. **15**, 201)
2 ♀♀, Syntypen, Prov. Kenya, Marsabit, X.—XI. 1927, Kutal, XI.—XII. 1927, leg. v. SOMEREN, via MARSHALL an HORN.
DEI: 1 ♀ Syntypus, Kutal, XI.—XII. 1927, leg. v. SOMEREN.

euphratica LATREILLE & DEJEAN, 1822 (*Megacephala*)
(Hist. Nat. Col. **1**, 37, Taf. 1, Fig. 4)
Mehrere Syntypen, am Ufer des Euphrat, leg. OLIVIER.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, ex Coll. SCHAUM.

euphratica aida MANDL, 1959 *Megacephala*)
(Bonn. Zool. Beitr. **10**, Nr. 1—2, 103—104)
♂ Holotypus, 9 Paratypen, Djibouti, leg. MARTIN; im Museum ALEXANDER KOENIG und in Coll. MANDL.
DEI: 1 Paratypus, Djibouti, leg. MARTIN.

euprosopides HORN, 1901 (*Langea*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 354)
♀ Holotypus, Peru, Chanchamayo, durch LANGE; im DEI.

euryoides HORN, 1922 (*Odontochila*)
(Zool. Meded. **7**, 100—101, Fig. 9)
♂ Holotypus, Brasilia, ex cabin. DIECK, Coll. EHLERS-v. DE POLL; im DEI.

euryscopa BATES, 1890 (*Cincidela*)
(Trans. Ent. Soc. London, 506, Taf. 16, Fig. 9)
Mexico, mehrere Syntypen, Mazatlan in Sinaloa, leg. HÖGE.
DEI: 2 Syntypen, Mazatlan, Sinaloa, leg. HÖGE.

eurytarsipennis HORN, 1905 (*Odontochila*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 148)
1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Peru, Ucuyali, durch STAUDINGER; im DEI.

excisilabris HORN, 1905 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 160)
♂ Holotypus, Neu Guinea; im DEI.

exciso-clavipenis HORN, 1934 (*Pogonostoma*)
(Arb. morph. tax. Ent. **1**, 31—32)
2 ♂♂, 2 ♀♀, Syntypen, Fôret Analamazotra-Perinet, 4.—16. XII. 1930, leg. Familie OLSUFIEFF.
DEI: 3 Syntypen, Fôret Analamazotra-Perinet, 10., 15.—16. XII. 1930, leg. OLSUFIEFF.

fabricii HORN, 1894 (*Calochroa*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 171)
Mehrere Syntypen, Vorder-Indien, Nord-Canara, leg. ANDREWES.
DEI: 5 Syntypen, Canara, 94, leg. ANDREWES.
Syn. zu *octogramma* CHAUDOIR, 1852.

fairmairei HORN, 1899 (*Euryoda*)
(Ent. Nachr. **25**, 81)
Mehrere Syntypen, St. Marie de Madagascar, Perrot fréres, X.—XII. 1896.
DEI: 3 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

fasciatus pseudolatreillei HORN, 1928 (*Therates*)
(Koleopt. Rundsch. **14**, 170)
Syntypen, Mindanao: 2 ♂♂, 2 ♀♀, Pt. Bango, Coll. BÖTTCHER; 1 ♂, Zamboangan, Coll. BAKER; im DEI.

fasciatus pseudosemperi HORN, 1928 (*Therates*)
(Koleopt. Rundsch. **14**, 171)
4 ♀♀, Syntypen, Philippinen, Subaan, Coll. BÖTTCHER; im DEI.

fasciatus punctatoviridis HORN, 1933 (*Therates*)
(Natuur. Maandbl. **22**, 124)
Syntypen, Celebes: 1 ♂, Mt. Tangke Salokko auf der Insel merid. orient., 2000 m, 20. XII. 1931; 1 ♀, Mt. Latimodjong, 1500—1800 m, VII. 1930; leg. HEINRICH; 1 ♂ (in Kopal eingebettet), X. 1932, ex Firma MAINTZ & Cie. Producten Handel te Makassar, via SCHMITZ an HORN.
DEI: 1 ♀ Syntypus, Celebes, Latimodjonggeb., 1500—1800 m, E. VII. 1930, leg. HEINRICH, B. M. 1933—117.

fauveli DOKHTOUROFF, 1882 (*Cicindela*)
(Rev. Ent. **1**, 275)
Mehrere Syntypen, Malacca, in Coll. DOKHTOUROFF.
DEI: 1 Syntypus, Malacca.
Syn. zu *mandibularis* SCHAUM, 1860.

feae HORN, 1893 (*Collyris*)
(Ann. Mus. Genova (2), **13**, 373)
Mehrere Syntypen, Birmanie, Berg Carin Chebà, leg. FEA, in Coll. FEA.
DEI: 6 Syntypen, Carin Chebà, 900—1100 m, 5. XII. 1888, leg. FEA.

ferox PÉRINGUEY, 1893 (*Mantichora*)
(Trans. S. Afr. Phil. Soc. **7**, 17, Taf. 1, Fig. 1)
Mehrere Syntypen, South-Damaraland, Greaf Namaqualand (Goagas).
DEI: 5 Ex. Damara L., Ganab, 26. II., II. 1889; 1 Ex. ohne Fundort; ex Coll. PÉRINGUEY: Syntypen.
Syn. zu *gruti* BOUCARD, 1892.

ferriei FLEUTIAUX, 1894 (*Cicindela*)
(Bull. Soc. Ent. Fr., 281)
Mehrere Syntypen, Il d'Oschima, Najé, Japon méridional, leg. FERRIÉ, in Coll. FLEUTIAUX und Coll. OBERTHÜR.
DEI: 3 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

festiva babaulti HORN, 1926 (*Prothyma*)
(Ent. Bl. **22**, 166—167)
Syntypen, 2 ♂♂, Carnot, Ht. Sangha, leg. BABAULT und leg. LE MOULT, in Coll. HORN; 2 ♀♀, Buar, Camerun, 10.—29. V. 1914, im Britischen Museum und in Coll. HORN.
DEI: 2 ♂♂, 1 ♀ Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

filicornis HORN, 1895 (*Collyris*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 356)
♀ Holotypus, Patria verisimiliter Ins., Philippin; (ohne Fundort, GEILENKENSER) im DEI.

filicornis HORN, 1898 (*Myrmecoptera*)
(Ent. Nachr. **24**, 348)
♀ Holotypus, S. Africa, Transvaal, Komatipoort, leg. HARTMANN; im DEI.

flagellicornis HORN, 1897 (*Megalomma*)
(Not. Leyd. Mus. **19**, 235)
♂ Holotypus, Ste Marie de Madagascar, X.—XII. 1896, leg. PERROT FRÈRES, via OBERTHÜR an HORN; im DEI.

flagellicornisrectipenis HORN, 1934 (*Prothyma*)
(Mém. Acad. Malgache **20**, 21—22)
Mehrere Syntypen, N.-W. Madagascar, Antseva-Ambobaka, Ramena, Sambirano, I.—II. 1933—34, leg. MELLIS.
DEI: 26 Syntypen, N.-W. Madagascar, Antseva-Ambobaka, Ramena, leg. MELLIS.

flavicornis HORN, 1892 (*Derokrania*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 92)
1 ♀, 1 Ex., Syntypen, Ceylon, leg. FELDER, in Mus. Vienn. und in Coll. HORN.
DEI: 1 ♀ Syntypus, Ceylon, VIII. 1860, leg. FELDER, ex Coll. Wien. Museum.

flavoguttata HORN, 1895 (*Calochroa*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 359)
♀ Holotypus, Süd-West Küste von Vorderindien; im DEI.
Syn. zu *andrewesi* HORN, 1894.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

flavomaculatum HORN, 1892 (*Pogonostoma*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 372)

♂ Holotypus, Madagascar.
DEI: ♂ Holotypus, Madagascar, Annanarivo, leg. SIKORA.

flavovittata HORN, 1896 (*Dromica*)
(Ent. Nachr. **22**, 339)

♂ Holotypus, Region interior. Mosambic; im DEI.

fleissi MANDL, 1956 (*Megacephala*)
(Koleopt. Rundsch. **34**, Nr. 1—3, 42)

Argentinien: ♂ Holotypus, Prov. Neuquén, Rio Negro, Villa Regina, 5. III. 1956, leg. FLEISS, via HASSENTEUFEL an MANDL; 1 ♀, dto.; 4 ♂♂, 3 ♀♀, Rio Negro, San Juan, 1957, Jänner; Paratypen.
DEI: 1 ♂ Paratypus, Argentina, Rio Negro, I. 1957.

fleutiauxi HORN, 1892 (*Collyris*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 364)

♂ Holotypus, Borneo, ex Coll. RICHTER; im DEI.

fleutiauxi HORN, 1915 (*Langea*)
(In: WYTSMAN, Gen. Ins. Cic., 438)

♀ Holotypus, ohne Fundort [durch FLEUTIAUX]; im DEI.

fleutiauxi HORN, 1898 (*Oxychila*)
(Not. Leyd. Mus. **20**, 107)

♂ Holotypus, Brazil, Caraça, II. Sem. 1884, via GERMAIN an HORN, ex Coll. FLEUTIAUX; im DEI.

fleutiauxi HORN, 1896 (*Oxygonia*)
(Ent. Nachr. **22**, 340)

2 ♂♂, Peru, Moyobamba, 1887—1888, durch DONCKIER; mehrere Ex. in Coll. FLEUTIAUX und Coll. OBERTHÜR: Syntypen.
DEI: 3 Syntypen, Peru, Moyobamba, 1er. Sem. 1887—1888, leg. MATHAN, durch DONCKIER, ex Coll. OBERTHÜR.

fleutiauxi HORN, 1905 (*Pogonostoma*)
(Stett. Ent. Ztg. **66**, 276)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, bor. Madagascar, Diego Suarez, Montes Ambre; im DEI.

fleutiauxi HORN, 1898 (*Therates*)
(Not. Leyd. Mus. **20**, 106)

♂ Holotypus, Malacca merid.; im DEI.

floridula ♂ BATES, 1872 (*Oxygonia*)
(Ent. Monthly Mag. **8**, 241; nom. praeocc. = *uncifera* HORN, 1901, Dtsch. Ent. Ztschr., 124)

Mehrere Syntypen, Ecuador, leg. BUCKLEY.
DEI: 2 Syntypen, Ecuador, ex cab. BUCKLEY-Coll. v. DE POLL.

fluctuosa DOKHTOUROFF, 1888 (*Cicindela*)
(Horae Soc. Ent. Ross. **22**, 141)

Mehrere Syntypen, Mongolei centr., Ssu-van-nò, VII.
DEI: 3 Syntypen, Mongolei centr., 1886, leg. POTANIN.
Syn. zu *dokhtourowi* JAKOVLEFF & DOKHTOUROFF, 1885.

formosa PÉRINGUEY, 1894 (*Myrmecoptera*)
(Trans. Ent. Soc. London, 451)

Mehrere Syntypen, Mashunaland, Salisbury.
DEI: Syntypen, Mashunaland: 1 ♂, 1 ♀, Salisbury, 1 ♀, Zambezia, ex Coll. PÉRINGUEY.

formosa fletcheri CRIDDLE, 1925 (*Cicindela*)
(Canad. Ent. **57**, 127)

♂ Holotypus, Montana, Marias River, Sunshine Road, 5. IX. 1924, leg. CRIDDLE und 2 ♂♂, 6 ♀♀ Ex. dto.; 1 ♀ von McLeol, Alberta, 1 Ex. von Medicine Hat. Alberta, 1898; leg. FLETCHER; in der Coll. Canadian National' Ottawa, No. 1418; Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, Montana, Marias River, 5. IX. 1924, leg. CRIDDLE.

formosa pigmentisignata HORN, 1930 (*Cicindela*)
(Trans. Amer. Ent. Soc. **56**, 76)

Mehrere ♀♀, Texas, Mineola, 2. X. 1906, leg. BISHOPP; mehrere ♂♂, Texas, Rosser, 23. IX. 1905, leg. JONES; im U. S. National Museum und in Coll. HORN: Syntypen.
DEI: 3 Syntypen, Texas, Rosser, 23. IX. 1905, leg. JONES, Mineola, 2. X., leg. BISHOPP.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

formosana MINOVA, 1932 (*Cicindela*)

(Trans. nat. Hist. Soc. Formosa **22**, 293)

Syntypen, Formosa: 2 ♂♂, 1 ♀, Akô, 28. VI. 1906, ?; 1 ♀, ?, leg. SHIRAKI, im Entomological Museum, Government Research Institute, Tainoku.
DEI: 1 Syntypus, Akô, 28. VI. 1906.

formosanus obscurofemoratus MANDL, 1970 (*Neocollyris*)

(Ztschr. Arb. österr. Ent. **22**, 3, 65—66)

♂ Holotypus, Formosa, Taihorin, III. 1910, leg. SAUTER und 1 ♀, dto., mehrere Ex. Taihorin, Taihorinsho, III., IV., VI., VIII. 1910; im Museum Berlin und in Coll. MANDL: Paratypen.
DEI: 2 Paratypen, Formosa, Taihorin, III. 1910, leg. SAUTER.

foveicollis HORN, 1914 (*Dromica*)

(Arch. Naturg. **79**, A 11 (1913), 11)

♂ Holotypus, Zentral-Afrika, Katanga; im DEI.

foveifrons HORN, 1901 (*Neocollyris*)

(Rev. Cic., 60)

♂ Holotypus, Assam, Khasis, Nat. Coll.; im DEI.

foveolata PÉRINGUEY, 1886 (*Dromica*)

(Trans. S. Afr. Phil. Soc. **4**, 71)

♂ Holotypus, Lake N'Gami Region (wahrscheinlich der Fundort), Coll. ANDERSSON, in Coll. PÉRINGUEY.
DEI: ♂ Holotypus, ohne Fundort, 62.
Syn. zu *aspera* DOKHTOUROFF, 1883.

fruhstorferi HORN, 1902 (*Collyris*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 68)

Mehrere Syntypen, Tonkin, Montes Mauson, IV.—V. 1900, 2—3000′, leg. FRUHSTORFER.
DEI: 3 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

fruhstorferi HORN, 1902 (*Therates*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 72)

Mehrere Syntypen, Tonkin, Montes Mauson, IV.—V. 1900, 2—3000′, leg. FRUHSTORFER.
DEI: 10 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

fulgida parowana WICKHAM, 1905 (*Cicindela*)

(Canad. Ent. **37**, 165)

Mehrere Syntypen, Western United States, little Salt Lake, nahe Parowan Utah, VIII., leg. WICKHAM.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 11. VIII.

fulgida pilosipennis MANDL, 1956 (*Megacephala*)

(Opusc. Zool. München **11**, 2—3)

♂ Holotypus, tropisch. Bolivien, Region Chapare, ca. 400 m Meereshöhe, leg. ZISCHKA; mehrere Paratypen, dto.; in Coll. ZISCHKA und Coll. MANDL.
DEI: 3 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

fulgida pseudowillistoni HORN, 1938 (*Cicindela*)

(Ent. Beih. **5**, 13, Taf. 75, Fig. 7)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Süd-Wyoming, Como-See, 8000 ft., Yale College Scientific Expedition, leg. WILLISTON; via REINECKE an HORN; im DEI.

fundoplanata HORN, 1909 (*Dromica*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 90)

♀ Holotypus, Portug. Ostafrika, Busi-Tal, XII. 1907, leg. SWYNNERTON [Busi Valley, XII. 1906], nicht 1907!; im DEI.

funerea genetica HORN, 1926 (*Cicindela*)

(Ent. Bl. **22**, 169)

♀ Holotypus, Annam, Quang-Tri, durch THÉRY an HORN; im DEI.

funerea nigrocolorata MANDL, 1969 (*Heptodonta*)

(Reichenbachia **12**, Nr. 15, 153—154, Fig. 2)

♂ Holotypus, Laos, Umg. Vientiane, III.—VI. 1963, 7 Paratypen, dto.; in der Zoologischen Sammlung des Bayrischen Staates und in Coll. MANDL.
DEI: 3 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

fusiformis HORN, 1904 (*Tricondyla*)

(Spol. Zeyl. **2**, 5, 35, Taf. 7, Fig. 1)

Holotypus, Ceylon; im DEI.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

gabonensis DOKHTOUROFF, 1882 (*Cicindela*)

(Rev. Ent. **1**, 216)

Mehrere Syntypen, Gabon, in Coll. DOKHTOUROFF.
DEI: 1 Syntypus, Gabon.
Syn. zu *interrupta* FABRICIUS, 1775.

galapagoensis HORN, 1915 (*Cicindela*)

(In: WYTSMAN, Gen. Ins. Cic., 402)

Mehrere Syntypen, Galapagos-Inseln.
DEI: 2 Syntypen, Calif.-Exped., Galapagos Ins., Banks Bay, Acbermale I, durch WILLIAMS.

galathea THIEME, 1881 (*Cicindela*)

(Berl. Ent. Ztschr. **25**, 97)

Mehrere Syntypen, Turkestan, Hochgebirge bei Margelan, durch STAUDINGER.
DEI: 2 Syntypen, Turkestan, durch STAUDINGER, ex Coll. RICHTER.

ganglbaueri HORN, 1892 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 95)

2 ♀♀, Syntypen, Ceylon, leg. FELDER, im Museum Wien und in Coll. HORN.
DEI: 1 ♀ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

gemina HORN, 1927 (*Cicindela*)

(Rev. Zool. Afr. **15**, 333—334)

Syntypen; 1 ♂, 2 ♀♀, Kamerun merid., Tukan, Prov. Joko, VI. 1911, leg. COLIN, in Coll. HORN; 1 ♂, Haut-Uelé, Moto, 28. III. 1926, leg. BURGEON, im Congo Museum.
DEI: 1 ♂, 1 ♀, Kamerun merid., Tukan, Jokoby, VI. 1911, Ismine Jokoby, III. 1913 (Funddatum in der Beschreibung nicht genannt); leg. COLIN; 1 ♀, Kamerun, Joko: Syntypen.

germaini FLEUTIAUX, 1893 (*Oxychila*)

(Bull. Soc. Ent. Fr. **62**, 315)

Mehrere Syntypen, Bolivien, Prov. Cochabamba, 1889, leg. GERMAIN.
DEI: 1 ♂ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

germaini pseudonigroaenea HORN, 1938 (*Oxychila*)

(Ent. Beih. **5**, 25, Fig.)

Mehrere Syntypen, Peru, Chanchamayo, 1500 m, leg. HEYNE, Cuzco, 2—3000 m, Pozuzo, leg. ROLLE und FASSL, Quiroz am Rio Pancartambu, 10. XI. 1933, leg. WARD.
DEI: Syntypen, Peru: 2 Ex. Quiroz, Rio Pancartambu, 10. XI. 1933, leg. WARD; 3 Ex. Chanchamayo, 1500 m, leg. HEYNE; 1 Ex. Pozuzo, 2 Ex. Cuzco, 2—3000 m, leg. ROLLE.

germanica ferganensis DOKHTOUROFF, 1885 (*Cicindela*)

(Horae Soc. Ent. Ross. **19**, 256, Taf. 11, Fig. 5)

Holotypus, Umgebung v. Marghelan, leg. WILKINS; im DEI.

germanica umbratulosa HORN, 1930 (*Cicindela*)

(Ling. Science Journ. **9**, 403—404)

2 ♂♂, Syntypen, Hwa Yin Shan Sz'Tschwan, Hochow-Chung King, S. Ymsha, v. 1927, ex Coll. FRIEDRICH; im DEI.

gerstaeckeri HORN, 1898 (*Myrmecoptera*)

(Ent. Nachr. **24**, 347)

♂ Holotypus, S. Africa, Nyassa; im DEI.

gibbicollis HORN, 1913 (*Dromica*)

(Rev. Zool. Afr. **2**, 274)

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Belg. Congo, Elisabethville, Miss. Agric. Leplae; im Musée du Congo.
DEI: 1 ♀ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, XI. 1911.

gibbosa HORN, 1894 (*Euryoda*)

(Ent. Nachr. **20**, 247)

♀ Holotypus, Togo, leg. CONRADT.
DEI: ♀ Holotypus, Togoland, 1892—1893, leg. CONRADT, durch DONCKIER.

gigantea HORN, 1914 (*Prothyma*)

(Arch. Naturg. **79**, A 11 (1913), 14)

♀ Holotypus, Madagaskar, Fenerive, leg. PERROT, ex Coll. V. DE POLL; im DEI.

glabrogibbosa HORN, 1929 (*Collyris*)

(Journ. F. M. S. Mus. **14**, 466)

Syntypen, British North Borneo; 1 ♂, Sandakan, via BAKER an HORN; 1 ♀, Bettotan, 29. VII. 1927.
DEI: 1 ♂, Syntypus, Borneo, Sandakan, durch BAKER.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

gladiator HORN, 1934 (*Pogonostoma*)
(Mém. Acad. Malgache **20**, 21, Fig. 19)
♂ Holotypus, Madagascar, Mt d'Ambre, I. 1934, leg. ROBINSON; im DEI.

globifrons HORN, 1898 (*Ctenostoma*)
(Rev. Cic., 31)
♀ Holotypus, Pernambuco, Pery Pery, leg. GOUNELLE, V.—VI. 1892; im DEI.

gloriola ♂ BATES, 1872 (*Oxygonia*)
(Ent. Monthly Mag. 8, 240; nom. praeocc., = *simplipenis* HORN, 1901, Dtsch. Ent. Ztschr., 124)
Mehrere Syntypen, Equador, leg. BUCKLEY.
DEI: Syntypen; 2 ♂♂, ohne Fundort, ex Coll. RICHTER; 1 ♂, ohne Fundort, ex cab. BUCKLEY-Coll. v. DE POLL.

gloriola ♀ BATES, 1872 (*Oxygonia*)
(Ent. Monthly Mag. 8, 240; nom. praeocc., = *uncifera* HORN, 1901, Dtsch. Ent. Ztschr., 124)
Mehrere Syntypen, Equador, leg. BUCKLEY.
DEI: 1 ♀, Equador, ex cab. BUCKLEY-Coll. v. DE POLL; 1 ♀, ohne Fundort, ex cab. BUCKLEY: Syntypen.

glorioparadoxa HORN, 1914 (*Cicindela*)
(Arch. Naturg. **79**, A 11 (1913), 26)
♀ Holotypus, Nord-Celebes, Toli-Toli, XI.—XII. 1895, leg. FRUHSTORFER; im DEI.

gloriosula HORN, 1914 (*Cicindela*)
(Arch. Naturg. **79**, A 11 (1913), 25)
♀ Holotypus, Nord-Celebes, Toli-Toli, XI.—XII. 1895, leg. FRUHSTORFER, ex Coll. v. DE POLL; im DEI.

gounelli HORN, 1900 (*Tricondyla*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 361)
♀ Holotypus, Hindustania, Ramnad, 1883—1884, leg. FABRE; im DEI.

gracileguttatum MANDL, 1966 (*Hipparidium*)
(Beitr. Ent. **16**, Nr. 1—2, 179—181, Fig. 5—8)
♂ Holotypus, N. W. Kamerun, Bascho, 16.—22. II. 1906, leg. SCHULTZE, vend. 16. XI. 1918, ex Museum Hamburg; 1 ♂, 1 ♀, Paratypen, dto. 28. II. 1906; in Coll. HORN und Coll. MANDL.
DEI: ♂ Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung, 15.—22. II. 1906 [nicht 16.—22. II.!]; 1 ♀, Paratypus, Bascho, 28. II. 1906, leg. SCHULTZE.

gracilicornis HORN, 1895 (*Collyris*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 85)
♀ Holotypus, Java.
DEI: ♀ Holotypus, Java merid., Palabuan, 1892, leg. FRUHSTORFER.

gracilipalpis HORN. 1909 (*Vata*)
(Not. Leyd. Mus. **31**, 187)
♀ Holotypus, New Caledonia, Plum, VII. 1908, via FLEUTIAUX an HORN; [LE RAX] im DEI.

gracilis HORN, 1894 (*Collyris*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 13)
♀ Holotypus, Manilla, im DEI.

gracilis HORN, 1909 (*Dromica*)
(Ent. Rundsch. **26**, 101)
Mehrere Syntypen, N. O.-Rhodesia, S. O.-Katanga, Serenje District, 4000″, 4500″, 28. XI., 13., 28. XII. 1907, leg. NEAVE.
DEI: 1 Syntypus, N. E. Rhodesia, Serenje District, about 4.500 ft., 28. XI. 1907, ex Coll. NEAVE.

gracilis intermediopunctata HORN, 1925 (*Dromica*)
(Stett. Ent. Ztg. **90**, 315)
1 ♂, 3 ♀♀, Syntypen, Katanga. Kigonsera, NO-Nyassa-See, via STAUDINGER & BANG-HAAS an HORN; im DEI.

gracilis laterodeclivis HORN, 1929 (*Dromica*)
(Stett. Ent. Ztg. **90**, 315)
2 ♀♀, Syntypen, Deutsch-Ostafrika, Upangwa, via STAUDINGER & BANG-HAAS an HORN; im DEI.

gracilis punctatissima HORN, 1929 (*Dromica*)
(Stett. Ent. Ztg. **90**, 316)
♂ Holotypus, Katanga; im DEI.

gracilis spinipennis HORN, 1929 (*Dromica*)
(Stett. Ent. Ztg. **90**, 317)
1 ♀, Katanga, 1 ♂, Kapiri, IX. 1912, Miss. Agric., im Congo-Museum: Syntypen.
DEI: 1 ♀ Syntypus, Katanga.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

grandis HORN, 1897 (*Cicindela*)
(Ent. Nachr. **23**, 239)
♀ Holotypus, Afrika, Benguela; (DEYROLLE, HEYNE) im DEI.

grandopronotalia browni HORN, 1936 (*Prothyma*)
(Ent. Bl. **32**, 22—23, Fig.)
1 ♂, 4 ♀♀, Syntypen, Nordwest-Australien, Carnarvon, leg. BROWN, in Coll. BROWN und Coll. HORN.
DEI: 1 ♂, 2 ♀♀, Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung (1 ♀ sehr schlecht erhalten).

granulata DOKHTOUROFF, 1883 (*Dromica*)
(Rev. mens. Ent. **1**, 9)
Mehrere Syntypen, Cafrerie (?), in Coll. DOKHTOUROFF.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort.
Syn. zu *aspera* DOKHTOUROFF, 1883.

grossepunctata HORN, 1914 (*Cicindela*)
(Arch. Naturg. **79**, A 11 (1913), 17)
♀ Holotypus, Abessinien; im DEI.

grossula HORN, 1925 (*Cicindela*)
(Ent. Bl. **21**, 137)
♀ Holotypus, Madras meridionalis, Maniyachi, X. 1905; im DEI.

grossula HORN, 1914 (*Dromica*)
(Arch. Naturg. **79**, A 11 (1913), 12)
2 ♀♀, ♂♂, Syntypen, Angola, ex Coll. PLASON.
DEI: 3 Syntypen, W. Afrika, Angola, ex Coll. PLASON, 1913, durch STAUDINGER.

guineensis HORN, 1892 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 77)
♀ Holotypus, Neu-Guinea; im DEI.

guineensis umbrosa HORN, 1932 (*Cicindela*)
(Rec. South Austral. Mus. **4**, 553, Fig. 3)
Mehrere Syntypen, North-East Papua, Mt. Lamington, 1300—1500 ft., leg. MCNAMARA, im South Australian Museum.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

gunningi PÉRINGUEY, 1898 (*Myrmecoptera*)
(Trans. S. Afr. Phil. Soc. **10**, 312)
Mehrere Syntypen, Transvaal, Barberton, Leydenburg.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, ex Coll. PÉRINGUEY.

guttula viridimetallica HORN, 1934 (*Cicindela*)
(Bull. Soc. Nat. Lux. **44**, 74)
♂ Holotypus, Süd-Ost-Celebes, Tangke Salokko-Gebirge, 1500 m, 1.—5. I. 1932, leg. HEINRICH; [B. M. 1933—117 im DEI].

hackeri SLOANE, 1905 (*Cicindela*)
(Proc. Linn. N. S. Wales **30**, 229)
Mehrere Syntypen, Queensland, Cooktown, in Coll. HACKER, leg. SLOANE und FRENCH.
DEI: Syntypen: 2 Ex. ohne Fundort, Coll. HACKER; 1 Ex. Australia, Somerset I. 1876, leg. ALBERTIS.

hackeri SLOANE 1906 (*Distypsidera*)
(Proc. Linn. Soc. N. S. Wales **31**, 557)
Mehrere Syntypen, Queensland, Coen, 150 Meilen nördl. von Cooktown, leg. HACKER.
DEI: 2 Syntypen, Queensland, Coen District, Cape York, leg. HACKER.

haefligeri HORN, 1905 (*Cicindela*)
(Stett. Ent. Ztg. **66**, 281)
♂ Holotypus, Africae Germanicae Orientalis partes interiores, Kigonsera, leg. HÄFLIGER, via ERTL an HORN; im DEI.

haenschi HORN, 1900 (*Oxychila*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 364)
♂ Holotypus, Ecuadoria oriental, Napo, 1899—1900, leg. HAENSCH; im DEI.

halyi HORN, 1900 (*Tricondyla*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 193)
♂ Holotypus, Ceylon; [durch PLASON] im DEI.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

hamata PÉRINGUEY, 1893 (*Cosmema*)

(Trans. S. Afr. Soc. **7**, 92)

Mehrere Syntypen, South Africa, Cape Colony, Sunday River.
DEI: Syntypen: 2 Ex. Cape Colony, Grah. I. Grah. Ton; 2 Ex. ohne Fundort, G/m; ex Coll. PÉRINGUEY.
Syn. zu *coarctata* LATREILLE & DEJEAN, 1822.

hamulipenis HORN, 1938 (*Cicindela*)

(Ent. Beih. **5**, 14, Taf. 85, Fig. 1)

♂ Holotypus, Brasilia centr., Goyaz; im DEI.

hamulipenis HORN, 1933 (*Odontochila*)

(Rev. Chil. Hist. Nat. **37**, 76—77, Fig. 18)

♂ Holotypus, Columbia, ex Coll. BROWN-EHLERS-V. DE POLL; im DEI.

hanseatica HORN, 1927 (*Cicindela*)

(Ent. Mitt. **16**, Nr. 1, 58, Fig. 5)

Mehrere Syntypen, Küstengebiet des Persischen Golfes, Bender Abbas, leg. SCHMIDT.
DEI: 13 Syntypen, Abbas, 27.—29. V. 1926, leg. SCHMIDT.

harmandi FLEUTIAUX, 1893 (*Cicindela*)

(Ann. Soc. Ent. Fr. **62**, 494)

Mehrere Syntypen, Cambodge, Chaudoc, 1877, leg. HARMAND, im Museum Genua.
DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Cochinc., M. Chaudoc, 1877, leg. HARMAND, ex Museum Paris.

hauserana HORN, 1905 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 143)

Mehrere Syntypen, Ost-Afrika, Uheheland, Kidugala, durch HAUSER.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

helleri HORN, 1897 (*Cosmema*)

(Not. Leyd. Mus. **19**, 237)

♀ Holotypus, Transvaal, in Coll. HORN; [Komatipoort, durch HARTMANN-KRAATZ] im DEI.

hennebergorum HORN, 1892 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 221)

♀ Holotypus, Afrika, Njam-Njamensi, Dr. JUNKERI, durch HENNEBERG; im DEI.
Syn. zu *chrysopyga* HORN, 1892.

hennigi HORN, 1898 (*Heptodonta*)

(Ent. Nachr. **24**, 177)

♀ Holotypus, Assam, Khasia Staaten, leg. KRICHELDORFF, via HENNIG an HORN; im DEI.
Im Gegensatz zu der in der Orginalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Khasia Staaten", steht auf dem Etikett „Khasia-Hill, 1896".

hennigi HORN, 1898 (*Therates*)

(Ent. Nachr. **24**, 178)

♂ Holotypus, Assam, Khasi Staaten, leg. KRICHELDORFF, via HENNIG an HORN; im DEI.
Im Gegensatz zu der in der Orginalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Khasi Staaten", steht auf dem Etikett „Khasia-Hill, 1896".

henryi HORN, 1925 (*Cicindela*)

(Ent. Rec. & Journ. Var. **37**, 165)

1 ♂, 2 ♀♀, Syntypen, Ceylon, Horawupotana, 8.—14. X. 1924, leg. HENRY.
DEI: 1 Syntypus, Ceylon, Horawupotana, 14. X. 1924.

herculeana HORN, 1942 (*Tricondyla*)

(Arb. morph. tax. Ent. **9**, 138—139)

♀ Holotypus, Paloe, bei Lindoe, im westl. Celebes, 3700 Fuß hoch, V. 1937, leg. KALIS; im DEI.

herero PÉRINGUEY, 1893 (*Megacephala*)

(Trans. S. Afr. Phil. Soc. **7**, 22)

Mehrere Syntypen, South Africa, Damaraland.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, durch DE VYLDER, ex Coll. PÉRINGUEY.
Syn. zu *regalis* BOHEMAN, 1848.

hewitti HORN, 1908 (*Cicindela*)

(Journ. Asiat. Soc. Beng. Straits Branch **50**, 99)

♂ Holotypus, Borneo, Kuching, VI. 1903, leg. LEWIS; im DEI.

heydeni HORN, 1894 (*Ctenostoma*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 109)

♀ Holotypus, Brasilia, leg. FELDEGG, ex Coll. v. HEYDEN; im DEI.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

hidrophoba atroreducta HORN, 1930 (*Cicindela*)

(Rev. Chil. Hist. Nat. **34**, 9—10)

Mehrere Syntypen, Mexico, Yukatan, Chichen Itza, VI. 1929, Coll. BEQUAERT, im Museum Comparat. Anat. Cambridge (U. S. A.) und in Coll. HORN.
DEI: 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

hilariola BATES, 1874 (*Cicindela*)

(Ent. Monthly Mag. **10**, 263)

♂ Holotypus, Northern Persia, leg. MILLINGEN; im DEI.

hildebrandti HORN, 1903 (*Dromica*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 421)

♀ Holotypus, Africa Orientalis Britannica; im DEI.

hirsutum HORN, 1892 (*Ctenostoma*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 66)

♀ Holotypus, Brasilia, ex Coll. RICHTER; im DEI.
Syn. zu *macilentum* KLUG, 1834.

histrio TSCHITSCHERIN, 1903 (*Cicindela*)

(Horae Soc. Ent. Ross. **36**, 16)

34 Syntypen: Perse oriental.; Chorasan, région Zirkuh; massif de Bamrud, 20.—21. VII. 1901; Neh-i-Bendan (Nihbandan), env. de Bendan, 9. V. 1898; Seistan, env. de Nasir-abad, 23. V. 1898; Sarhad (Serhad), localités Hurmuk et Duz-ab, Duz-ab à Podahi, localité Kuh-i-Murhak, 10.—11., 12.—15., 16.—24., 24.—26. VI. 1898, et localité Shur-ab, 12. VIII. 1898; Région de Bampur, riv. Bampur, 15.—22. VII. 1898, et Rarra, 16.—17. IV. 1901; leg. ZARUDNY.
DEI: 2 Syntypen, Chorasan, région Zirkuh, Neh-i-Bendan, 9. V. 1898, leg. ZARUDNY.

honorei FLEUTIAUX, 1894 (*Derocrania*)

(Ann. Soc. Ent. Fr. **62** (1893), 502)

Mehrere Syntypen, Inde, Pulney-Hills, leg. HONORÉ, am Berg Kodeicanel, leg. CASTETS, im Museum Genua.
DEI: 1 Syntypus, Indes Orientales, Mts. Kodeicanel, leg. CASTETS.

hopei CASTELNAU, 1867 (*Tetracha*)

(Trans. Roy. Soc. Victoria **8**, 37)

Mehrere Syntypen, Australien, Nickol Bay, leg. BOSTOCK.
DEI: 1 Syntypus, Nickol Bay, ex Britischen Museum.

hopkinsi HORN, 1909 (*Prothyma*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 313)

Syntypen: 1 ♀, Philippinen, durch HOPKINS, in Coll. HORN; 1 ♀ Süd-Luçon, Depart. Fayabas, Dolores, Coll. CARLOS DE MAZAMEDO, im Museum Madrid; 1 ♂, Lamao, Bataan, 10. VII. 1907, Coll. CURRAN, im Museum Manila.
DEI: 1 ♀ Syntypus, ohne Fundort, durch HOPKINS.

horni KOLBE, 1897 (*Bennigsenium*)

(Ostafr. **4**, Col., 347; nom. praeocc. = *insperata* KOLBE, 1915, Gen. Ins. Cic., 276)

Mehrere Syntypen, Deutsch-Ost-Afrika, bei Taru im Hinterland von Mombassa, leg. THOMAS.
DEI: 1 Syntypus, Taru, Mombassa.

horni FAIRMAIRE, 1900 (*Cicindela*)

(Bull. Soc. Ent. Fr., 134; nom. praeocc. = *umbratilis* FAIRMAIRE, 1903, Ann. Soc. Ent. Belg. **47**, 358)

Mehrere Syntypen, Madagascar, Suberbieville, leg. PERRIER.
DEI: 2 Syntypen, Madagascar, leg. PERRIER.

horni KOLBE, 1896 (*Mantica*)

(Ent. Nachr. **22**, 7)

2 ♂♂, Syntypen, Süd-West-Afrika, Gr. Namaland, auf dem Han-ami-Plateau, II. 1885, leg. SCHENCK; in Coll. HORN und im Museum Berlin.
DEI: 1 ♂ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

hornianus HORN, 1892 (*Omus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 91)

♂ Holotypus, California?, ex Coll. RICHTER.
DEI: ♂ Holotypus, ohne Fundort, ex Coll. RICHTER.
Syn. zu *californicus* ESCHSCHOLTZ, 1829.

howittii CASTELNAU, 1867 (*Megacephala*)

(Trans. Roy. Soc. Victoria, 31)

Mehrere Syntypen, Australien, Cooper's Creek, leg. HOWITT; in Coll. HOWITT und Coll. CASTELNAU.
DEI: 1 Syntypus, Centr. Australia, Cooper's Creek, ex Coll. V. DE POLL.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

humeralis HORN, 1913 (*Dromica*)

(Rev. Zool. Afr. **2**, 277)

Mehrere Syntypen, Angola, Bailundo, via ERTL an HORN, im Musée du Congo.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

humillima GESTRO, 1893 (*Cicindela*)

(Ann. Mus. Genova (2) **13**, 353)

Mehrere Syntypen, Birmania, am Fluß Iravaddi, Bhamò, Teinzò, Shwegoo, Kathà, Rangoon, leg. FEA, in Coll. FEA.
DEI: 14 Ex. Birmania, Bhamò, VI. VIII. 1885 und 1 Ex. Teinzò, 1886; leg. FEA: Syntypen.

hybrida grumi TSCHITSCHERIN, 1903 (*Cicindela*)

(Horae Soc. Ent. Ross. **36**, 98)

16 Syntypen. Monts Nan-shan, région de la riv. Babo-che, 11.000′—12.700′ d'alt., expéd. GRUM-GRZHIMAÏLO! 1890, ex Coll. SEMENOV.
DEI: 3 Syntypen, Babo-che, u X 51—X0, Do 13, VIII. 1890.

hybrida hamifasciata KOLBE, 1886 (*Cicindela*)

(Arch. Naturg. **52**, 1, 170)

Mehrere Syntypen, Korea, IX. 1884, zwischen Söul und Pingan, leg. GOTTSCHE, im Museum Berlin.
DEI: 1 Syntypus, Korea, ex Museum Berlin.

hybrida iberica MANDL, 1935 (*Cicindela*)

(Arb. morph. tax. Ent. **2**, Nr. 4, 302—303)

Mehrere Syntypen, Nordspanien, Soria, Valadolid, Olmedo, in Coll. MANDL und Coll. HORN.
DEI: 1 ♂, Espagne, ex Coll. LE MOULT; 1 Ex. Hispanien, Olmedo, leg. LAUFFER; 1 ♂, Valladolid; 1 Ex. Lagune de Valladolid: Syntypen.
Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Valadolid" steht auf dem Etikett „Valladolid".

hybrida kozlovi TSCHITSCHERIN, 1903 (*Cicindela*)

(Horae Soc. Ent. Ross. **36**, 99)

10 Syntypen, Thibet or., région Dabasun-gobi (au SE du lac Dalaï-dabasu et au N de la chaîne Tamyrtyn-ula), expéd. KOZLOV und KAZNAKOV!, 1901, ex Coll. SEMENOV.
DEI: 3 Syntypen, Dabasun-gobi, 2. VIII., VIII. 1901, Exped. KOZLOV.

hybrida lusitanica MANDL, 1935 (*Cicindela*)

(Arb. morph. tax. Ent. **2**, 4, 303)

Mehrere Syntypen, Portugal, Nord-Estremadura, Marinha Grande, in Coll. MANDL und Coll. HORN.
DEI: 5 Syntypen, Portugal, Marina Grande (nicht Marinha!), durch LE MOULT.

hybrida magnifica HORN, 1905 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 156)

Mehrere Syntypen, Nord-Mongolei, Changai-Gebirge.
Der Fundort wurde aus Ent. Nachr. 141; 1893 entnommen.
DEI: 29 Syntypen, nördl. Mongolei, Changai-Gebirge, durch REITTER-LEDER.

hybrida magyarica ROESCHKE, 1891 (*Cicindela*)

(In: HORN & ROESCHKE, Mon. pal. Cic., 35, 38, 40, Taf. 1, Fig. 8f—g; Taf. 5, Fig 8c)

Mehrere Syntypen, Ungarn, leg. MERKL.
DEI: Syntypen: 4 Ex. S.-Ungarn; 1 Ex. Banat; leg. MERKL; 1 Ex. ohne Fundort.

hybrida majalis MANDL, 1935 (*Cicindela*)

(Arb. morph. tax. Ent. **2**, Nr. 4, 304—305)

Mehrere Syntypen, Italien, Benevento, Lavellotal, Sambiase-Calabrien, Stazzano, Pianazo, Modena, Bebbiena, Spilamberto-Emilia, in Coll. MANDL, Coll. HORN und im Naturhistorischen Museum Wien.
DEI: Syntypen: 1 Ex. Italien, durch REITTER-LEDER; 1 Ex. Italien, Lavello, durch REITTER; 3 Ex. Benevento, 5. 97, durch ROUSSEAU.

hybrida przewalskii DOKHTOUROFF, 1887 (*Cicindela*)

(Horae Soc. Ent. Ross. **21**, 439)

Mehrere Syntypen, Thibet septentr., am Fluß Yang tzékiang und Kon-tschun-tschu, Tschun-Tschu-Oumà, Bydjun, 12,000—14,000 ft., leg. PRZEWALSKY.
DEI: 2 ♂♂, 1 ♀ Syntypen, Amdo, 1884, leg. PRZEWALSKY.

hybrida pseudoriparia MANDL, 1935 (*Cicindela*)

(Arb. morph. tax. Ent. **2**, Nr. 4, 305)

Mehrere Syntypen, Westküste Frankreichs, St. Jean de Monts, Arcachon, Pau, Gave der Pau; Spanien, Bilbao.
DEI: 6 Ex. St. Jean de Monts, durch SIRGUEY; 2 Ex. dto. durch VENDIC; 1 Ex. Arcachon, durch HORN; 1 Ex. Gave de Pau, durch MICOLAS; 5 Ex. Bilbao, durch HEYNE: Syntypen.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

hybrida reitteri HORN, 1897 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 253)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Mongolia borealis, Urga, durch REITTER.
DEI: 1 Syntypus, Mongolia borealis, durch REITTER.

hybrida rumelica APFELBECK, 1904 (*Cicindela*)
(Käferf. Balkanh. **1**, 5)

Mehrere Syntypen, Ost-Rumelien, am See Vajakiöj, leg. APFELBECK.
DEI: 4 Syntypen, Burgas, Vajakiöj-See, leg. APFELBECK.

illecebrosa DOKHTOUROFF, 1885 (*Cicindela*)
(Horae Soc. Ent. Ross. **19**, 280)

Mehrere Syntypen, Kourgan-Tubé, am Fluß Vakch (Sourkhab, Kisyl-soù), Boukhara, IV., leg. GROUM-GRGIMAÏLO.
DEI: 1 Syntypus, Kourgan-Tubé, ex Coll. DOKHTOUROFF.

immaculatum HORN, 1924 (*Procephalus*)
(Rev. Col. Nac. Vic. Rocafuerte **6**, nr. 15/18, 10, Taf. Fig. 4)

Mehrere Syntypen, Ecuador occid., Naranjapata, leg. CAMPOS. (Der Fundort wurde aus Revista Chil. H. N. **29**, 182; 1925 entnommen.)
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

impressifrons CHAUDOIR, 1864 (*Collyris*)
(Ann. Soc. Ent. Fr. (4) **4**, 500)

3 ♂♂, 1 ♀ Syntypen, Cochinchine, durch DEYROLLE, im Museum Paris.
DEI: 1 ♂ Syntypus, Cochinchine, 1874, ex Coll. CHAUDOIR.

incerta HORN, 1892 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 81)

♂ Holotypus, Insel Philippin, ex Coll. RICHTER; im DEI.
Syn. zu *terminata* DEJEAN, 1825.

incognita HORN, 1892 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 82)

♀ Holotypus, Neu-Seeland ?, ex Coll. RICHTER; im DEI [ohne Fundort].
Syn. zu *austromontana* BATES, 1878.

indica FLEUTIAUX, 1893 (*Cicindela*)
(Ann. Soc. Ent. Fr. **62**, 484)

Mehrere Syntypen, Inde, im Museum Genua.
DEI: 1 Syntypus, Indien, ex Coll. FLEUTIAUX.

innocens HORN, 1893 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 199)

♀ Holotypus, Nova Guinea; im DEI.

innocentior HORN, 1904 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 427)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Deutsch Neu-Guinea, leg. HAUSER; im DEI.

insignis coapteroides HORN, 1935 (*Collyris*)
(Koleopt. Rundsch. **21**, 53—54)

♂ Holotypus, Assam, Margherita, IV.—V. 1889, leg. DOHERTY, ex Coll. V. DE POLL; im DEI.

insignis pseudacrolia HORN, 1935 (*Collyris*)
(Koleopt. Rundsch. **21**, 54)

1 ♀, Philippinen, ex Coll. BROUN; 1 ♀, dto., ex Coll. RUGE; 1 ♀, Insel Negros, Cuernos Mts., Coll. BAKER; 1 ♂, Punjab, ex Coll. Museum Tring.; Syntypen.
DEI: 1 ♀, Insel Negros, Cuernos, Coll. BAKER; 1 ♀, Philippinen, ex Coll. BROUN; 1 ♂ Punjab: Syntypen.

insignis semiaenescens HORN, 1935 (*Collyris*)
(Koleopt. Rundsch. **21**, 52—53)

♀ Holotypus, Laos, Oberer Mekong [V.]; im DEI.

insperata crassicollis HORN, 1934 (*Cicindela*)
(Ver. Ges. Lux. Naturf., Nr. 6, 7, 8, 9, 10, 73—74, Separat Abdruck)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Lower Tana-Sabake, IV.—V. 1932, leg. TURNER und ARTHUR.
DEI: 1 ♀ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Tana-Sabake", steht auf dem Etikett „Tana-Sabakil".

intempestiva PÉRINGUEY, 1893 (*Cicindela*)
(Trans. S. Afr. Phil. **7**, 53)

Mehrere Syntypen, South Africa, Cape Colony, Bathurst, Seymour.
DEI: Syntypen: 1 Ex. ohne Fundort, Nr. 22; 1 Ex. Seymour, 1892; ex Coll. PÉRINGUEY.
Syn. zu *marginella* DEJEAN, 1826.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

intermedia HORN, 1892 (*Cosmema*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 68)

(♀) Holotypus, Caffraria [Zulu-Caffraria]; im DEI.
Syn. zu *elegantula* BOHEMAN, 1848.

intermedia SLOANE, 1906 (*Megacephala*)

(Proc. Linn. Soc. N. S. Wales **31**, 323, Taf. 29, Fig. 55)

Mehrere Syntypen, N. W. Australia, King's Sound, Carnot Bay, in Coll. MAC LEAY Museum, FRENCH, LEA, SLOANE.
DEI: 1 ♂ Syntypus, N. W. Australia, Carnot Bay, ex. Coll. SLOANE.

interrupta DOKHTOUROFF, 1883 (*Distypsidera*)

(Rev. Mens. Ent. **1**, 7)

Mehrere Syntypen, Australia, Somerset.
DEI: 1 Syntypus, Australia, Somerset, I. 1875, leg. D'ALBERTIS.
Syn. zu *gruti* PASCOE, 1862.

interruptofasciata FLEUTIAUX, 1893 (*Cicindela*)

(Ann. Soc. Ent. Fr. **62**, 494, Fig.)

Holotypus, Birmanie, Siam, Lakhon, leg. HARMAND.
DEI: Holotypus, Lakhon, 1878, leg. HARMAND.
Syn. zu *mouhoti* CHAUDOIR, 1865.

intersita PÉRINGUEY, 1893 (*Cicindela*)

(Trans. S. Afr. Phil. **7**, 53)

Mehrere Syntypen, South Africa, Cape Colony, Riversdale, Enon.
DEI: 1 Syntypus, Cape Colony, Enon., ex Coll. PÉRINGUEY.
Syn. zu *marginella* DEJEAN, 1826.

intricatorugulosa HORN, 1942 (*Tricondyla*)

(Arb. morph. tax. Ent. **9**, 139)

♀ Holotypus, Ceylon, Urugalla, 5. V. 1902; im DEI.

invicta PÉRINGUEY, 1894 (*Myrmecoptera*

(Trans. Ent. Soc. London, 452)

Mehrere Syntypen, Mashunaland, Salisbury, leg. MARSHALL.
DEI: 3 Syntypen, Mashunaland.

io microgemmea HORN, 1932 (*Cicindela*)

(Rec. South Austral. Mus. **4**, 551—552, Fig. 2)

Mehrere Syntypen, North-East Papua, Mt. Lamington, 1.300—1.500 ft., leg. MCNAMARA, im South Australian Museum.
DEI: 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

iodopleura BATES, 1872 (*Odontochila*)

(Ent. Monthly Mag. **8**, 285)

Mehrere Syntypen, Chontales, Nicaragua, durch BELT.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

jacobsoni HORN, 1913 (*Cicindela*)

(Not. Leyd. Mus. **35**, 249)

Syntypen: 2 ♀♀, Simalur, Lasikin, IV. 1913 (nos. 2756 und 2758); 1 ♀, Simalur, Labuan Badjang, VI. 1913 (no. 3743); leg. JACOBSON, in Coll. JACOBSON und Coll. VETH.
DEI: 1 ♀ Syntypus, Labuan Badjang, VI. 1913, leg. JACOBSON.

janthinum FAIRMAIRE, 1903 (*Megalomma*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. **47**, 359)

Mehrere Syntypen, Région Malgache, Ankarahitra, leg. PERRIER.
DEI: Syntypen, Madagascar, 2 Ex.; 1 Ex. dto. Suberb^{lle}; leg. PERRIER.

jo HORN, 1900 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 203—204)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen. N. Guinea, Milne Bay [durch STAUDINGER]; im DEI.

jordani HORN, 1896—97 (*Caledonomorpha*)

(Ann. Mus. Genova (2) **17**, 270)

Mehrere Syntypen: Fergusson, IX.—XII. 1894, leg. MEEK, Tring; M^{ts} Astrolabe, II. 1893, leg. LORIA, im Museum Genua und Tring.
DEI: 2 Ex. N. Guinea S. E., M^{ti} Astrolabe, II. 1893, leg. LORIA, ex Museum Genua; 1 Ex. Fergusson I., IX.—XII. 1894, leg. MEEK, ex Museum Tring.; Syntypen.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

jordani HORN, 1899 (*Myrmecoptera*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 53)

♂ Holotypus, Lindi, XII. 1896, leg. REIMER, 1 Ex. dto., in Coll. Mus. Tring und Coll. HORN; 1 ♀, Zomba, Upp. Shire R., 3000 p., X.—XII. 1895, leg. RENDALL, in Coll. Mus. Tring; Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.
Syn. zu *egregia* GERMAR, 1843.

jordani HORN, 1898 (*Odontochila*)

(Not. Leyd. Mus. **20**, 102)

♂ Holotypus, mehrere Paratypen, Ecuador, Cachabé, low. c., XI. 1896, leg. ROSENBERG, im Museum Tring (ROTHSCHILD) und in Coll. HORN.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, ex Museum Tring.

juncta KRAATZ, 1887 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 150)

Mehrere Syntypen, ohne Fundort.
DEI: 1 ♀ Syntypus, ohne Fundort, 87, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *decempustulata* MÉNÉTRIÉS, 1848.

junkeri KOLBE, 1892 (*Cicindela*)

(Stett. Ent. Ztg. **53**, 144)

♀ Holotypus, Afrika, Njam-Njam, leg. JUNKER; [durch SCHLÜTER] im DEI.

juno HORN, 1901 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 355)

♂ Holotypus, Africa centr. Britann., Ubemba.
DEI: ♂ Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung, 1900, leg. GUILLEMÉ.

junodi PÉRINGUEY, 1893 (*Myrmecoptera*)

(Trans. S. Afr. Phil. Soc. **7** (1892), 67)

Mehrere Syntypen, South Africa, Delagoa Bay, 20 Meilen von Lourenço Marques.
DEI: Syntypen: 2 Ex. Delagoa Bay; 1 Ex. Lightfoot, 1893; 4 Ex. ohne Fundort; ex Coll. PÉRINGUEY.

kachowskyi HORN, 1903 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 422)

♀ Holotypus, Provincia „Harrar", leg. KACHOWSKY, in Coll. HORN [X]; im DEI.

kampeni HORN, 1913 (*Cicindela*)

(Tijdschr. Ent. **56**, 310)

♂ Holotypus, N. Neu-Guinea, Hollandia, 6. IV. 1911, leg. v. KAMPEN und GJELLERUP, in Coll. HORN; im DEI.

katangana MANDL, 1964 (*Neochila*)

(Rev. Zool. Bot. Afr. **69**, Nr. 3—4, 307—308)

♂ Holotypus (No 543), Katanga, Kalehe, XI. 1937; 1 ♀ (No 548), dto.; 1 ♂ (No 544), Lulua, Kafakumba; 1 ♂ (No 563), Kafakumba, XII. 1932, leg. OVERLAET; 1 ♂ (No 545) Katanga, riv. Sashila, leg. OVERLAET; 2 ♂♂ (No 546 bis No 547), Mukunkoto, 1937; 2 ♀♀ (No 549—No 550), riv. Sashila; 1 ♀ (No 551), Luashi, XI. 1938, leg. FREYNE; im Musée Royal de l'Afrique Centrale, Tervuren; 1 ♀ (No 557), Katanga, Sashila, X. 1925, ex LE MOULT, ex Coll. HORN; 1 ♀ (No 553), Kalehe; 1 ♀ (No 562), Elisabethville, 1935, leg. RICHARD; in Coll. MANDL; Paratypen.
DEI: 1 ♀ Paratypus, Belg. Congo, Katanga, riv. Sashila, X. 1925 (No 557), ex LE MOULT.

kigonserana HORN, 1905 (*Odontochila*)]

(Stett. Ent. Ztg. **66**, 278)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Africae Germanicae Orientalis partes interiores, Kigonsera, leg. HAEFLIGER, via ERTL an HORN.
DEI: 1 ♀ Syntypus, Kigonsera, 1904.

kigonserana prototypica HORN, 1926 (*Odontochila*)

(Ent. Bl. **22**, 165)

Mehrere Syntypen, Nord-Rhodesia, Belg. Congo, Mufungwa, 1.—16. XII. 1911, leg. BEQUAERT; 150—200 miles W-of Kambowe, 3500—4500 ft., leg. NEAVE; Deutsch-Ostafrika, Upangwa.
DEI: 1 Syntypus, Belg. Congo, Katanga.

kimberleyensis MJÖBERG, 1916 (*Megacephala*)

(Ark. Zool. **11**, nr. 10, 3)

3 ♂♂, 2 ♀♀, Syntypen, Australien, Fitzroy River, Noonkanbah, Kimberley District.
DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, N. W. Australien, Kimberley District, durch MJÖBERG.

klagesi HORN, 1903 (*Tetracha*)

(Proc. Ent. Soc. Wash. **5**, 332)

1 ♀, mehrere ♂♂, Syntypen, South Venezuela, in den Bergen von Parima, V.—VI. 1898—1900, 2.500—3.000 ft., leg. KLAGES.
DEI: 3 Syntypen, Venezuela, Mt. Juajual, 3500 ft. (nicht 2.500—3.000 ft.), 5. IV. 1900.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

klugi HORN, 1898 (*Ctenostomi*)
(Rev. Cic., 28)
♂ Holotypus, Brasilia; im DEI.
Syn. zu *rugosum* KLUG, 1824.

klugi HORN, 1893 (*Pogonostoma*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 14)
♀ Holotypus, Madagascar, ex Coll. RICHTER (Dupont); im DEI.
Syn. zu *elegans* BRULLÉ, 1834.

kolbei HORN, 1897 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 253; nom. praeocc. = *kolbeana* HORN, 1915, Gen. Ins. Cic. 273, Fig. 234)
2 ♀♀, Syntypen, D. O.-Africa, Ugogo, leg. v. BENNIGSEN; im DEI.

kolbei HORN, 1897 (*Cosmema*)
(Ent. Nachr. **23**, 238)
1 ♂, 1 ♀, Afrika, Transvaal, Mp' hôme, im Museum Berlin; 1 ♀, Huilla, in Coll. HORN; Syntypen.
DEI: 1 ♀ Syntypus, Angola, Huilla, Coll. NONFRIED.

kolbei HORN, 1894 (*Cratchaerea*)
(Ent. Nachr. **20**, 245)
Mehrere Syntypen, Togo, leg. CONRADT.
DEI: 2 Syntypen, Togo, leg. CONRADT.
Syn. zu *chrysopyga* HORN, 1892.

kollari HORN, 1901 (*Neocollyris*)
(Rev. Cic., 47)
♂ Holotypus, centrales Indiae Orientalis Ant. provinciae; im DEI.

kraatzi HORN, 1894 (*Calochroa*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 172, Taf. 3, Fig. 4)
♀ Holotypus, Vorder-Indien, Nord-Canara, leg. ANDREWES.
DEI: ♀ Holotypus, Canara, 94, leg. ANDREWES.
Syn. zu *calligramma* SCHAUM, 1861.

kraatzi DOKHTOUROFF, 1883 (*Cicindela*)
(Rev. Mens. Ent. **1**, 10)
Mehrere Syntypen, N. Guinea, in Coll. DOKHTOUROFF
DEI: 1 Syntypus, Nov. Guinea.
Syn. zu *tetrachoides* GESTRO, 1876.

kraatzi HORN, 1892 (*Collyris*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 365)
♂ Holotypus, Java, ex Coll. RICHTER; im DEI.

kraatzi HORN, 1899 (*Heptodonta*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 54)
♀ Holotypus, Sikkim; im DEI.

kraatzi HORN, 1894 (*Pogonostoma*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 221)
♂ Holotypus, Nossibé, durch KRAATZ; im DEI.

kraatzi HORN, 1900 (*Therates*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 195)
♂ Holotypus, Penang, im DEI.

krüperi HORN, 1892 (*Megacephala*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 91)
♂ Holotypus, Africa occident., leg. KRÜPER; im DEI.
Syn. zu *megacephala* OLIVIER, 1790.

labiomaculata HORN, 1892 (*Collyris*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 357)
♂ Holotypus, Borneo, ex Coll. RICHTER; im DEI.

labiopalpis HORN, 1932 (*Collyris*)
(Soc. ent. France, Livre cent., 205, Fig. 15 u. 25)
♂ (!) Holotypus, Tonkin, Chapa [ex JEANVOINE, Coll. CLERMONT]; im DEI.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

lacordairei DEJEAN, 1831 (*Iresia*)

(Spec. Col. 5, 207)

Mehrere Syntypen, Transversal.
DEI: 1 Syntypus, Rio, ex cab. DEJEAN-Coll. V. DE POLL.

lacunosa PUTZEY, 1875 (*Cicindela*)

(Compt. rend. Soc. Ent. Belg., 68 (sep. (2) 1875, nr. 14, 4))

Mehrere Syntypen, Ceylon, Anaradjapoora, leg. VOLXEM.
DEI: 1 ♀ Syntypus, Ceylon.

laeta TATUM, 1851 (*Myrmecoptera*)

(Ann. Mag. Nat. Hist. (2) 8, 51; nom. praeocc. = *revoili* FAIRMAIRE, 1882. In: REVOIL, Faune & Flore Comalis Col., 6)

Mehrere Syntypen, Abyssinia.
DEI: 1 Syntypus, Abyssinia, leg. TATUM.

laevicollis mandli BASILEWSKY, 1966 (*Megacephala*)

(Ann. Mus. Afr. centr. (Sér. 8°) Sci. zool. no 152, 77, Fig. 17b)

Afrique, Kenya: ♂ Holotypus, Kibwezi, im MRAC; 11 Ex., dto. im MRAC, BM, ZMB und DEI; 1 Ex. dto. leg. SCHEFFER, im NMW; 5 Ex. Ikutha, im ZMB und DEI; 1 Ex. Bura, im MRAC; 1 Ex. lac Jipe, Teita Distr., rive NE, VII. 1957, leg. BASILEWSKY und LELEUP, im MRAC; 1 Ex. Brit. East Africa, 1900, leg. BETTON, im DEI: Paratypen.
DEI: Paratypen: 1 Ex. Africa or., Ikutha; 1 Ex. E. Africa, Kibwezi, durch JANSON; 1 Ex. Brit. East Africa, 1900, eg. BETTON.

lanei HORN, 1924 (*Cicindela*)

(Bull. Soc. Sc. Cluj **2**, 47)

1 ♂, 2 ♀♀, Syntypen, Brésil, Rio Vaccaria, Matto Grosso.
DEI: 1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Matto Grosso, Vacaria (nicht Vaccaria!), XII. 1922, leg. LANE.

laportei HORN, 1900 (*Pogonostoma*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 193)

♂ Holotypus, Madagascar, Sikora, am Fuß des östl. Hochplateaus, im DEI.

lateralis HORN, 1905 (*Tetracha*)

(Not. Leyd. Mus. **25**, 219)

♀ Holotypus, Amazonas, [Amazonen-Strom] in Coll. HORN; im DEI.

laticollis HORN, 1903 (*Dromica*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 318)

Mehrere ♀♀, Syntypen, Transvaal, Pietersburg, leg. DONCKIER.
DEI: 2 ♀♀, Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

latipennis WATERHOUSE, 1837 (*Manticora*)

(Ann. Mag. Nat. Hist. (2) **1**, 503, Fig. 62)

Mehrere Syntypen, nahe Kurrichane, leg. SMITH.
DEI: 1 Syntypus, Port Natal, durch BANEMAN-KLUG, ex Museum Berlin.

leai SLOANE, 1905 (*Cicindela*)

(Proc. Linn. Soc. N. S. Wales **30**, 234)

Mehrere Syntypen, Australia, Cooktown, in Coll. HACKER, Coll. LEA, Coll. FRENCH und Coll. SLOANE.
DEI: Syntypen, Queensland: 1 Ex. Cooktown, 1906, ex Coll. SLOANE; 4 Ex. Cape York, Coen Distr., ex Coll. HACKER.

lefroyi HORN, 1908 (*Cicindela*)

(Rec. Ind. Mus. **2**, 409)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Bengal, Pusa, Chapra, leg. LEFROY, via ANDREWES an HORN; im DEI.

lepidula HORN, 1903 (*Dromica*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 318)

Mehrere Syntypen, Transvaal, Pietersburg, leg. DONCKIER.
DEI: 5 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

leptalis BATES, 1881 (*Odontocheila*)

(Biol. Centr. Amer. Col. **1**, 15)

Mehrere Syntypen, Mexico, Cerro de Plumas, leg. HÖGE, Juquila, leg. BOUCARD, Coll. SALLÉ.
DEI: 1 Syntypus, Mexico, Cerro de Plumas, leg. HÖGE, ex Museum Berlin.

leuconoe BATES, 1890 (*Cicindela*)

(Trans. Ent. Soc. London, 508, Taf. 16, Fig. 11)

Mehrere Syntypen, Mexico, Manzanillo in Michoacan, Acapulco in Guerrero; leg. HÖGE.
DEI: Syntypen: 2 Ex. Manzanillo, Michoacan; 3 Ex. Acapulco, Guerrero; leg. HÖGE.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

levigata HORN, 1894 (*Collyris*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 14)

♀ Holotypus, Borneo or., Coll. KRAATZ; [1892, leg. FRUHSTORFER] im DEI.

levigatum HORN, 1908 (*Pogonostoma*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 367)

Mehrere Syntypen, Nordost-Madagascar, Amboaniho, Vohemar.
DEI: 5 Syntypen, Amboaniho.

levisculpta HORN, 1894 (*Distypsidera*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 222)

♂ Holotypus, Queensland; im DEI.

levithoracica HORN, 1891 (*Cicindela*)

(In: HORN & ROESCHKE, Mon. pal. Cic., 148—149)

Mehrere Syntypen, Süd-Kaukasus.
DEI: 1 Syntypus, Kaukasus, durch STAUDINGER.
Syn. zu *sublacerata* SOLSKY, 1874.

limbata BERTOLONI, 1858 (*Dromica*)

(Mem. Accad. Bologna **1**, 308, Taf. 23, Fig. 3, 4)

Mehrere Syntypen, am Fluß Magnárra, Prov. Inhambanensis Mozambici, leg. KAROLUS FORNASINIUS; Bononiae, 1848; in Coll. BERTOLONI.
DEI: 1 Syntypus, Mozambique, Magnárra.

limbigera PÉRINGUEY, 1893 (*Cicindela*)

(Trans. S. Afr. Phil. Soc. **7**, 60; nom. praeocc. = *limbifera* PÉRINGUEY, Gen. Ins. Cic., 271)

Mehrere Syntypen, South Africa; Cape Colony, Port Elisabeth; Transvaal, Potchefstroom, Boksburg; Orange Free State Parys; Natal, Frere.
DEI: Syntypen: 2 Ex. Excourt Natal; 1 Ex. ohne Fundort, ex S. African Museum; ex Coll. PÉRINGUEY.

limpopoiana PÉRINGUEY, 1893 (*Myrmecoptera*)

(Trans. S. Afr. Phil. Soc. **7**, 69)

Mehrere Syntypen, South Africa, Middle Limpopo, Neighbourhood of Fort Tuli.
DEI: 1 Syntypus, Middle Limpopo, ex Coll. PÉRINGUEY.

linearis discretegrossesculpta HORN, 1942 (*Collyris*)

(Arb. morph. tax. Ent. **9**, 140)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Tonkin, Hoah Binh, 1928, leg. COOMAN; im DEI.

linearis pronotalis HORN, 1901 (*Neocollyris*)

(Rev. Cic., 46)

♀ Holotypus, Siam, „Chan", leg. MOUHOT; im DEI.

linearis srnkai HORN, 1894 (*Collyris*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 15)

♂ Holotypus, Birmania sup., Ruby Mines, 7500′, ex Coll. SRNKA; im DEI.

lineifera SLOANE, 1913 (*Cicindela*)

(Proc. Linn. Soc. N. S. Wales **38**, 402)

Holotypus, mehrere Paratypen, W. Australia, 100 Meilen nördl. von Kalgoorlie, leg. DU BOULAY, im Museum Melbourn.
DEI: 1 Paratypus, W. Australia, 17. XI. 1911, leg. DU BOULAY.
Syn. zu *tetragramma* BOISDUVAL, 1835.

litorea alboreducta HORN, 1934 (*Cicindela*)

(Ver. Ges. Lux. Nat. Nr. **6**, 7, 8, 9, 10, 71)

1 ♀, Obock, ex Coll. Théry, 1 ♂, Djibuthi, ex Coll. Plason, STAUDINGER, 1913; in Coll. HORN; 1 ♂, 1 ♀, Djibuthi, XII. 1926, leg. OMER COPER, im Britischen Museum: Syntypen.
DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

liturata ROESCHKE, 1891 (*Cicindela*)

(In: HORN & ROESCHKE, Mon. pal. Cic., 69, Taf. 2, Fig. 6a)

Mehrere Syntypen, ohne Fundort.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, 88, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *campestris* LINNÉ, 1758.

livingstoni HAROLD, 1879 (*Cicindela*)

(Col. Hefte **16**, 9; nom. praeocc. = *congoensis* PÉRINGUEY, 1888, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) **2**, 219

Mehrere Syntypen, West-Afrika, aus dem Innern, 1874, leg. POGGE.
DEI: 1 Syntypus, Lunda Reich, leg. POGGE, durch HAROLD, ex Museum Berlin.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

löffleri MANDL, 1969 (*Heptodonta*)

(Zeitschr. Arb. österr. Ent. **21**, 2, 51 – 52, Fig. 1)

♂ Holotypus, 11 Paratypen, Nord-Borneo, Kinabalu-Westhang, ca. 1900 m, 5. III. 1969, leg. LÖFFLER, in Coll. MANDL.
DEI: 2 ♀♀, Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

lomii HORN, 1938 (*Cicindela*)

(Atti Mus. Civ. Stor. Natur. Trieste **14**, 135 – 136)

Syntypen, Somaliland: 1 ♂, bei Belet-Uen, IV. 1926, leg. LOMI; 1 ♂, Gabredarre, 4. IV. 1937, leg. FACCA.
DEI: 1 ♂ Syntypus, Somali/T., Gabredarre, 4. IV. 1937, leg. FACCA.

longestriata HORN, 1912 (*Cicindela*)

(Arch. Naturg. **78**, A 11, 83)

Mehrere Syntypen, Französisch-Kongo, Fort-Sibut, ex. Coll. LE MOULT.
DEI: 2 Syntypen, H'Chari-Tchad, Fort-Sibut, ex Coll. LE MOULT.

longesulcata HORN, 1900 (*Tricondyla*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 194)

♀ Holotypus, Madikere; [Hindoustan Mérid.] im DEI.

longicollis HORN, 1892 (*Collyris*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 358)

2 ♂♂, Syntypen, Philippinen.
DEI: 1 ♂ Syntypus, Ins. Philippinen, ex Coll. RICHTER.
Syn. zu *albitarsis* ERICHSON, 1834.

longicornis HORN, 1914 (*Cicindela*)

(Arch. Naturg. **79**, A 11 (1913), 33)

♂ Holotypus, San Salvador, La Union; im DEI.

longilabris HORN, 1896 (*Oxychila*)

(Ent. Nachr. **22**, 338)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Brasilia, in Coll. HORN und im Museum Berlin.
DEI: 1 ♂ Syntypus, Brasilia.
Syn. zu *similis* HORN, 1892.

longipalpis HORN, 1892 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 78)

♂ Holotypus, Java; im DEI.

loriae HORN, 1896 – 97 (*Cicindela*)

(Ann. Mus. Genova (2) **17**, 272)

2 ♀♀, Syntypen, Nouvelle Guinée britannique, Paumomu Riv., IX. – XII. 1892, leg. LORIA, im Museum Genua.
DEI: 1 ♀ Syntypus, N. Guinea S. E., Paumomu Riv., IX. – XII. 1892, leg. LORIA.

lucasi DOKHTOUROFF, 1882 (*Cicindela*)

(Rev. Ent. **1**, 274)

Mehrere Syntypen, N. Guinea, in Coll. DOKHTOUROFF.
DEI: 1 Syntypus, N. Guinea.
Syn. zu *funerata* BOISDUVAL, 1835.

lucidicollis aeneoparva HORN, 1934 (*Prothyma*)

(Natuur. Maandblad **23**, 145)

Mehrere Syntypen. Insel Philippinen, Samar, Biliran, Cabuntug, Sargao, leg. BAKER und GREGOR.
DEI: Syntypen, Philippinen: 4 Ex. Island Samar; 4 Ex. Island Biliran, leg. BAKER; 1 Ex. Cabuntug, Sargao; 1 Ex. Island Biliran; leg. GREGOR.

lucidicollis opacosericea HORN, 1929 (*Prothyma*)

(Ent. Nachr. **3**, 6)

Mehrere Syntypen, S. O. Luzon, Mt. Isarog, 1916, leg. BÖTTCHER, Sorsogon, leg. BAKER, in Coll. BAKER, Washington und Coll. HORN.
DEI: Syntypen, S. Luzon: 1 Ex. Mt. Isarog; 2 Ex. Sorsogon, leg. BAKER.

luctuosa RAGUSA, 1904 (*Cicindela*)

(Il Natur. Sicil. **17**, 85)

Mehrere Syntypen, Sicilia, Monello bei Palermo, VIII., leg. RAGUSA.
DEI: 1 Syntypus, Sicilia, leg. RAGUSA.
Syn. zu *aphrodisia* BAUDI, 1864.

lugens RAGUSA, 1881 (*Cicindela*)

(Il Natur. Sicil. **1**, 5, Taf. 1, Fig. 1)

Syntypen: Mehrere Ex. Mondello bei Palermo, VII., leg. RAGUSA; 1 Ex. ohne Fundort, leg. ROTTENBERG.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, von RAGUSA geschenkt.
Syn. zu *aphrodisia* BAUDI, 1864.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

lunulata mandli (SCHILDER) MANDL, 1967 (*Cicindela*)

(Ann. Nat. Mus. Wien **70**, 381—382, Fig. 1)

52 Syntypen, zwischen Van und Özalp, 27. V. 1966, Türkei-Expedition.
DEI: 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

luteoguttata BRANCSIK, 1892 (*Cicindela*)

(Jahrb. Naturw. Ver. Trencs. Com., 209)

5 Syntypen, Nossibé, leg. FREY.
DEI: 1 Syntypus, Nossibé, durch BRANCSIK.
Syn. zu *madagascariensis* HORN, 1892.

macleayi HORN, 1895 (*Collyris*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 81)

♀ Holotypus, Thibet; im DEI.
Syn. zu *smithi* CHAUDOIR, 1864.

maculicorne HORN, 1934 (*Pogonostoma*)

(Arb. morph. tax. Ent. **1**, 31)

Mehrere Syntypen, N.-Madagascar, Mt. d'Ambre, ded. HEYNE und SICARD; 1 ♂, Volamar, zwischen Nossi Bé und Dagna Imarez, ded. JANSON; im Museum Paris und in Coll. HORN.
DEI: Syntypen, Madagascar: 2 Ex. Mt. d'Ambre, ded. SICARD, ex Museum Paris; 1 Ex. durch NICKERL; 1 Ex. Ambre Gebirge, ded. HEYNE; 1 Ex. zwischen Nossi Bé und Dagna Suarez, Volamar, ded. JANSON.
Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Dagna Imarez" steht auf dem Etikett „Dagna Suarez".

madagascariensis HORN, 1892 (*Euryoda*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 71)

♀ Holotypus, Madagascar, Nossibé [durch SCHRÖDER]; im DEI.

maheva FAIRMAIRE, 1897 (*Cicindela*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. **41**, 363—364)

3 Syntypen, Suberbieville, leg. PERRIER.
DEI: 1 Ex. Madagascar, Suberbieville, leg. PERRIER; 1 Ex. ohne Fundort, durch FAIRMAIRE; Syntypen.
Syn zu. *maheva* KÜNCKEL, 1887.

maindroni HORN, 1897 (*Cicindela*)

(Ent. Nachr. **23**, 98)

Mehrere Syntypen, Kurrachee, Sind, M. VIII. 1896, leg. MAINDRON.
DEI: 2 Syntypen, Kurrachee, leg. MAINDRON.

maindroni HORN, 1900 (*Therates*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 197)

♂ Holotypus, Borneo occident., Pontianak, 1898, via MAINDRON an HORN; im DEI.

malabarica FLEUTIAUX & MAINDRON, 1903 (*Cicindela*)

(Bull. Soc. Ent. Fr., 72)

Mehrere Syntypen, Malabarica, am Fluß Mahesiae, leg. MAINDRON, in Coll. FLEUTIAUX, Coll. MAINDRON und im Museum Paris.
DEI: 4 Syntypen, Cote de Malabar, Mahé, VII. 1901, leg. MAINDRON.

malaris HORN, 1896 (*Cicindela*)

(Bull. Mus. Paris **2**, 329)

♂ Holotypus, 2 Paratypen, Pébas, Haut-Amazone, 1847, leg. CASTELNAU; im Museum d'Histoire Naturelle de Paris.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

mandibularis HORN, 1895 (*Cratohaerea*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 86)

♀ Holotypus, Senegambia [leg. FELSCHE]; im DEI.
Syn. zu *brunet* GORY, 1833.

marginata KRAATZ, 1890 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 367)

Mehrere Syntypen, ohne Fundort.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *atrata* PALLAS, 1776.

marginepunctata HORN, 1908 (*Cosmema*)

(Not. Leyd. Mus. **30**, 32)

Mehrere Syntypen, Angola, Chiyaka Distr., XI. 1907, leg. WELLMANN.
DEI: 8 Syntypen, Benguella, XI. 1907, leg. WELLMANN.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

mariae GESTRO, 1893 (*Cicindela*)

(Ann. Mus. Genova (2) **13**, 361)

Mehrere Ex. am Berg Carin Chebà, Biapò, 400–900 m, IV. 1888; 1 Ex. Umgebung Toungoo, am Fluß Sittang, V. 1888; leg. FEA; in Coll. FEA: Syntypen.
DEI: 1 Syntypus, Carin Chebà, 400–900 m, IV. 1888, leg. FEA.

maritima kirgisica MANDL, 1936 (*Cicindela*)

(Arb. morph. tax. Ent. **3**, Nr. 1, 28–29)

Mehrere Syntypen, Mittel- und Südrußland: Tirowo, Mosir im Gouv. Minsk, Wolga- und Dnjeprinseln und Buchten im Gouv. Kostroma und Saratow, Katherinenburg; Gouv. Saratow, Simbirsk, Cherson, Uralsk, Kirgisensteppe; Fl. Andisk im Kaukasus.
DEI: Syntypen: 2 Ex. Kirgisen, durch KÖNIG; 1 Ex. Cherson, durch STAUDINGER; 1 Ex. Wolgabucht bei Saratow auf Sand, 30. VI. 1918, leg. BEHNING; 1 Ex. Saratow, 3. VII. 1919; 1 Ex. Andisk, ex cab. DEYROLLE-Coll. V. DE POLL; 1 Ex. Tirowo, Mosir im Gouv. Minsk, 11. VI. 1905.

marquardti HORN, 1906 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 91)

Mehrere Syntypen, Sao Paulo oder Matto Grosso.
DEI: 6 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

marshallana HORN, 1901 (*Myrmecoptera*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 123)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Süd-Africa, Mashonaland, Umtali, Dec.
DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, XII. 1900, durch MARSHALL.

marshalli PÉRINGUEY, 1896 (*Cicindela*)

(Trans. S. Afr. Phil. Soc. **7**, 108–109)

Mehrere Syntypen, South Africa, Zambezia, Salisbury.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, ex Coll. PÉRINGUEY.

marshallisculpta HORN, 1914 (*Cicindela*)

(Arch. Naturg. **79**, A 11 (1913), 17)

♀ Holotypus, Deutsch-Ostafrika, Neu-Langenburg; im DEI.

mashuna PÉRINGUEY, 1894 (*Cicindela*)

(Trans. Ent. Soc. London, 448)

Mehrere Syntypen, Mashunaland, Salisbury, leg. MARSHALL.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, Nr. 30, ex Coll. PÉRINGUEY.
Syn. zu *uncivittata* QUEDENFELDT, 1883.

mastersi CASTELNAU, 1867 (*Cicindela*)

(Trans. Roy. Soc. Victoria, 8, 33)

Mehrere Syntypen, New South Wales, Eastern Creek.
DEI: 2 Syntypen, Eastern Creek, ex cab. BROWN – cab. CASTELNAU.

mathani HORN, 1897 (*Cicindela*)

(Ent. Nachr. **23**, 18)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Ecuador, La Chima, I.–III. 1893, leg. MATHAN [1er Semestre 1893]; im DEI.

mauchi albocostata HORN, 1939 (*Dromica*)

(Journ. East Afr. Uganda Nat. Hist. Soc. **14**, 152)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Kitui, leg. TOKER, im Museum Coryndon und in Coll. HORN.
DEI: 1 Syntypus, Africa, Nairobu. Kitui, X. 1937, leg. TOKER.

maxillaris HORN, 1894 (*Cicindela*)

(Ann. Mus. Genova (2) **14**, 679)

3 ♂♂, Syntypen, Sumatra, Si-Rambé, leg. MODIGLIANI.
DEI: 1 ♂ Syntypus, Si-Rambé, XII.–III. 1891, leg. MODIGLIANI.

mediopilosa HORN, 1934 (*Megacephala*)

(Nat. Maandblad **12**, 155)

♂ Holotypus, Australia occident., Swan-River, Carnarvon District, 1932, leg. LE MOULT; im DEI.

mediospinosa HORN, 1898 (*Pogonostoma*)

(Rev. Cic., 21)

♂ Holotypus, Diego-Madagaskar, Annanarivo; [leg. SIKORA] im DEI.
Syn. zu *coeruleum* CASTELNAU & GORY, 1837.

megalommoides HORN, 1896 (*Cicindela*)

(Ent. Nachr. **22**, 342)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Madagascar, Nossibé, leg. SIKORA; [durch DONCKIER] im DEI.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

megaspilota DOHRN, 1884 (*Cicindela*)

(Stett. Ent. Ztg. **45**, 44)

Holotypus, Turkestan; im DEI.
Syn. zu *granulata* GEBLER, 1843.

melancholica semicircumcincta MANDL, 1959 (*Cicindela*)

(Stuttg. Beitr. Nat. **18**, 2—3, Fig. 4)

♂ Holotypus, SO-Iran, Djiroft, Anbar Abad, leg. RICHTER; 29 Ex. dto., 1.—18. V. 1956; 1 Ex. Iran-Khuzistan, Shadegan, 1.—10. IV. 1956; 10 Ex. Iran-Belutschistan, Iranshar, 800 m, 1.—10., 22.—30., 23. IV., 1.—10., 11. bis 21. V. 1954, leg. RICHTER und SCHÄUFFELE; im Museum für Naturkunde Stuttgart: Paratypen.
DEI: Paratypen: 1 Ex. S. O. Iran, Djiroft, Anbar Abad, 1.—18. V. 1956, leg. RICHTER; 1 Ex. Iran, Belutschistan, Iranshar, 800 m, 22.—30. IV. 1954, leg. RICHTER und SCHÄUFFELE.

mesoepisternalis HORN, 1933 (*Cicindela*)

(Mitt. Ent. Ver. Bremen **21** (Bericht), 3, Fig.)

♀ Holotypus, Kashmir, Skardo, VII. 1887, leg. LEECH; im DEI.

microcephala HORN, 1924 (*Cicindela*)

(Philipp. Journ. Sc. **24**, 87)

♀ Holotypus, Philippine, Mindanao, Surigao, leg. BAKER; im DEI.

microtuberculatum HORN, 1934 (*Pogonostoma*)

(Arb. morph. tax. Ent. **1**, 29—30)

3 ♀♀, Antongil Bay, 1898, leg. MOCQUERYS jr., im Museum Paris, in Coll. FLEUTIAUX und in Coll. HORN.
DEI: 1 ♀ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

mimula PÉRINGUEY, 1896 (*Cicindela*)

(Trans. S. Afr. Phil. Soc. **7**, 109)

Mehrere Syntypen, South Africa, Zambezia, Salisbury.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, ex Coll. PÉRINGUEY.

minarum PUTZEYS, 1845 (*Cicindela*)

(Mém. Soc. Sc. Liége **2**, 369)

7 Syntypen, Brésil, Province des Mines.
DEI: 1 ♂ Syntypus, Brasilien, leg. PUTZEYS, ex Coll. RICHTER.

minimum HORN, 1893 (*Megalomma*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 197)

2 ♂♂, Syntypen, Madagascar, leg. GOUDOT, im Museum Berlin und in Coll. HORN.
DEI: 1 ♂ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

minimum levisculptum HORN, 1934 (*Pogonostoma*)

(Arb. morph. tax. Ent. **1**, 32)

♀ Holotypus, Forêt Analamazotra-Perinet, XII. 1930, leg. OLSUFIEFF; im DEI.

minutissima MANDL, 1967 (*Cicindela*)

(Ent. Arb. Mus. FREY **18**, 386—387)

♂ Holotypus, Australia, Northern Territory, Beswick, I. 1958, leg. DEMARZ; mehrere Paratypen, dto.; in Coll. FREY, Tutzing und in Coll. MANDL.
DEI: 3 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

minutula GUÉRIN, 1849 (*Cicindela*)

(Rev. Mag. Zool., 144)

3 Syntypen, Port. Guinée, an der Quelle Kakand, nahe des Dorfes Papels, 1,5 km von Cacheo, leg. BOCANDÉ.
DEI: 1 Syntypus, Senegal port., ex cab. BROWN — Coll. V. DE POLL.

miseranda HORN, 1893 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 200)

2 ♂♂, Syntypen, Bukoba, leg. STUHLMANN, im Museum Berlin und in Coll. HORN.
DEI: 1 ♂ Syntypus, Bukoba, 19. XI. 1890, leg. STUHLMANN.

mixta HORN, 1892 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 215; nom. praeocc. = *mixtula* HORN, 1915, Gen. Ins. Cic., 409)

2 ♀♀, Syntypen, ohne Fundort, ex Coll. RICHTER; im DEI.

modica GESTRO, 1893 (*Cicindela*)

(Ann. Mus. Genova (2) **13**, 354)

Mehrere Syntypen, Birmania, Palon, Pegù, VIII., IX., leg. FEA, in Coll. FEA.
DEI: Syntypen: 2 Ex. Palon, Pegù, VIII., IX. 1887; 1 Ex. Birmania, Rangoon, VI. 1887; 1 Ex. Birmania, Bhamò, VIII. 1886; leg. FEA.
Syn. zu *decempunctata* DEJEAN, 1825.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

mona lisa HORN, 1927 (*Cicindela*)

(Ent. Mitt. **16**, Nr. 1, 56, Fig. 1)

♂ Holotypus, Küstengebiet des Persischen Golfes, Bender Abbas, leg. SCHMIDT [27.—29. V. 1926]; im DEI.

moseri HORN, 1901 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 356)

Mehrere Syntypen, Insula Larat, Timor Laut, durch MOSER.
DEI: 5 Syntypen, Larat Insel, Tenimber I.

motschulskyi HORN, 1893 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 198; nom. praeocc. = *motschulskyana* HORN, 1915, Gen. Ins. Cic., 289)

♀ Holotypus, Ind. or.; im DEI.

mucronata JORDAN, 1894 (*Cicindela*)

(Nov. Zool. **1**, 663)

Mehrere Syntypen, N. Luzon, Philippines, 5.000—6.000 ft., 1894, leg. WHITEHEAD.
DEI: 1 Syntypus, N. Luzon, C. Engano, leg. WHITEHEAD.

murchisona corpulenta HORN, 1907 (*Megacephala*)

(Not. Leyd. Mus. **29**, 63)

♀ Holotypus, Queensland borealis, in Coll. HORN; [Nr. 18, durch BATES] im DEI.

murchisona elongata HORN, 1934 (*Megacephala*)

(Natuur. Maandblad **23**, 154)

18 ♂♂, 10 ♀♀, Syntypen, Violet-See (der ein Teil des Way-Sees ist), leg. DARLINGTON, Exped. HARVARD, im Museum Comp. Zool. Cambridge, USA, im W. Austral. Museum und in Coll. HORN.
DEI: 7 ♂♂, 4 ♀♀, Syntypen, Australia, L(ake), part of L. Way, Wiluna, W. A., 2., 3. XII. 1933, Exped. HARVARD, leg. DARLINGTON, ex Museum Cambridge, USA.

mygaloides THOMSON, 1857 (*Manticora*)

(Mon. Cic. **1**, 66)

2 Syntypen, Mozambique, Kurrechan, Natal, in Coll. THOMSON.
DEI: 1 Syntypus, Mozambique, ex Coll. V. DE POLL.
Syn. zu *latipennis* WATERHOUSE, 1837.

nahuelbutas PENA, 1957 (*Cylindera*)

(Rev. chil. Ent. **5**, 35, Fig. 1—2)

♂ Holotypus, Caramávida Nahuelbuta (W), Arauco, 750 m, 25.—31. XII. 1953; 1 Ex. dto., 1.200—1.400 m, 1.—5. I. 1954; 27 Ex. Caramávida, 750 m, 25.—31. XII. 1953; 2 Ex. Caramávida, Nahuelbuta,720—1.000 m, 5.—10. II. 1953; 139 Ex. Caramávida, 1.200—1.400 m, 1.—6. I. 1954; 18 Ex. Alto de Caicupil, 1.200—1.300 m, 8.—12. I. 1954; 37 Ex. Pichinahuel, 1.100—1.400 m, 23.—31. I. 1954; leg. PENA; im Museo Nacional de Historia Natural de Santiago, Sociedad Cientifica Chilena CLAUDIO GAY de Santiago, Colección Nacional de Insectos del Ministerio de Agricultura de Santiago, Investigaciones Entomológicas de la Universdiad de Chile, Instituto Pedagógica de Santiago, en la Academia de Ciencias de California (U.S.A.), en la colección del WENDLER-FUNARO de New Rochelle (U.S.A.), en la colección DOEDEYNS, en Mineola (U.S.A.), U. S. National Museum Washington (U.S.A.), Chicago Natural History Museum, Chicago, Illinois (U.S.A.) y colección NELSON de Michigan (U.S.A.): Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, Chile, Caramávida, Nahuelbuta, 1.200—1.400 m, 1.—16. I. 1954.

nanula HORN, 1937 (*Cicindela*)

(Ent. Bl. **33**, 57)

5 ♂♂, 1 ♀ Syntypen, Insel Lucon, Laguna, Paete, leg. GREGOR, im National Museum Washington und in Coll. HORN.
DEI: 2 ♂♂, Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

natalensis PÉRINGUEY, 1886 (*Cicindela*)

(Trans. S. Afr. Phil. Soc. **4**, 69)

2 Syntypen, Cape Colony, Kowie (wahrscheinlich der Fundort), in Coll. PÉRINGUEY.
DEI: 1 Ex. ohne Fundort, Nr. 39.
Syn. zu *intricata* DEJEAN, 1831.

natalica PÉRINGUEY, 1893 (*Dromica*)

(Trans. S. Afr. Phil. Soc. **7**, 77)

Mehrere Syntypen, Natal, D'URBAN.
DEI: 1 Syntypus, Natal.
Syn. zu *clathrata* KLUG, 1834.

neervoorti HORN, 1914 (*Cicindela*)

(Arch. Naturg. **79**, A 11 (1913), 27)

♂ Holotypus, Insel Engano, Res. Benkoden, leg. DOHERTY, ex Coll. V. DE POLL; im DEI.

neumanni KOLBE, 1894 (*Cicindela*)

(Stett. Ent. Ztg. **55**, 361)

Mehrere Syntypen, Afrika, Magila in Usambara, Anfang V. 1893, leg. NEUMANN.
DEI: 1 Syntypus, Africa orient., mit den Angaben der Beschreibung, ex Museum Berlin.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

nevadica tubensis CAZIER, 1939 (*Cicindela*)
(Bull. Brooklyn ent. Soc. **34**, 25)

♀ Holotypus, Arizona, Tuba City, Coconino Co., 5. VII. 1937, leg. ALLEN, in Coll. CAZIER; 5 ♂♂, 10 ♀♀, Paratypen, dto.; in Coll. ALLEN und Coll. CAZIER.
DEI: 1 ♂, 1 ♀ Paratypen, Tuba City, Ariz., 5., 30. VII. 1937, leg. ALLEN.

nietneri HORN, 1894 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 200)

♂ Holotypus, Ceylon; im DEI.

nietneri HORN, 1895 (*Collyris*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 357)

♀ Holotypus, Ceylon; im DEI.
Syn. zu *punctatella* CHAUDOIR, 1864.

nigra DOKHTOUROFF, 1885 (*Cicindela*)
(Horae Soc. Ent. Ross. **19**, 266)

Mehrere Syntypen, Boukhara, Samarkand, Djam, Karschy.
DEI: 2 Syntypen, ohne Fundort, ex Coll. DOKHTOUROFF.
Syn. zu *decempustulata* MÉNÉTRIÉS, 1848.

nigraelabris DOKHTOUROFF, 1885 (*Cicindela*)
(Horae Soc. Ent. Ross. **19**, 266)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Taschkent.
DEI: 1 Syntypus, Turkestan, ex Coll. DOKHTOUROFF.
Syn. zu *decempustulata* MÉNÉTRIÉS, 1848.

nigricans HORN, 1926 (*Oxygonia*)
(Rev. Chil. Hist. Nat. **30**, 189)

2 ♂♂, 1 ♀, Syntypen, Gorgona Island (Columb.), Exped. St. GEORGE, Collenette. Museum Britann.
DEI: 1 ♀ Syntypus, Gorgona Island, on rocles in stream, VII. 1924, St. GEORGE Exped. Collenette.

nigrilabris BATES, 1890 (*Cicindela*)
(Trans. Ent. Soc. London, 495)

Mehrere Syntypen, Mexico, Refugio in Durango, leg. HÖGE.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

nigripalpis HORN, 1894 (*Tricondyla*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 224)

♂ Holotypus, Insel Ceylon; im DEI.

nigroplagiata HORN, 1926 (*Myrmecoptera*)
(Ent. Bl. **22**, 164—165)

Mehrere Syntypen, Katanga, Sashila-Fluß, X. 1925, leg. LE MOULT.
DEI: 7 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

nigroplagiata dilacerata HORN, 1931 (*Myrmecoptera*)
(Ver. Ges. Lux. Natur., 8)

Mehrere Syntypen, S-W-Katanga, Sandoa am Oberen Lulua, 10. XI. 1920/X. 1930, leg. OVERLAET.
DEI: 7 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, ex Musée du Congo.

nigroreticulata HORN, 1927 (*Cicindela*)
(Rev. Chil. Hist. Nat. **31**, 139—140, Fig. 9)

♂ Holotypus, Brazil, Chochilha Grande, leg. R. Grande do Sul; im DEI.

nigrovittata HORN, 1896 (*Cicindela*)
(Stett. Ent. Ztg. **57**, 172)

Mehrere Syntypen, Minas Geraes, in Coll. DOHRN und Coll. HORN.
DEI: 3 Syntypen, Minas Geraes, durch NONFRIED.

nivicinctoides HORN, 1892 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 81)

♂ Holotypus, Vaterland Süd-Ost-Asien oder Malaiischer Archipel, ex Coll. RICHTER.
DEI: ♂ Holotypus, ohne Fundort, ex Coll. RICHTER.
Syn. zu *limosa* SAUNDERS, 1834.

novaseelandica HORN, 1892 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 83)

Mehrere Syntypen, Nov. Zeeland, ex Coll. RICHTER.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
Syn. zu *helmsi* SHARP, 1886.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

nubifera QUEDENFELDT, 1883 (*Cicindela*)
(Berl. Ent. Ztschr. **27**, 243, Taf. 3, Fig. 2)
Mehrere Syntypen, Angola, Malange, leg. MECHOW.
DEI: 2 Syntypen, Malange.
Syn. zu *flavipes* PUTZEYS, 1880.

nudopectoralis HORN, 1903 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 423)
♂ Holotypus, Deserta „Danakil", 1896, leg. KACHOWSKY; im DEI.

oberthüri HORN, 1896 (*Oxychila*)
(Ent. Nachr. **22**, 337)
2 ♂♂, Syntypen, Bolivia, Cochabamba, 1889, leg. GERMAIN, via OBERTHÜR an HORN; im DEI.

oberthüri HORN, 1896 (*Oxygonia*)
(Ent. Nachr. **22**, 340)
Mehrere Syntypen, Prov. de Bolivar, Balzapamba, III.—IV. 1894, leg. MATHAN, in Coll. HORN und Coll. OBERTHÜR.
DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

obliquefasciata HORN, 1912 (*Therates*)
(Ent. Mitt. **1**, 133)
2 ♂♂, 1 ♀ Syntypen, Formosa, Fuhosho, Alihang, leg. SAUTER, im Museum Viennensis und in Coll. HORN.
DEI: 1 ♂ Syntypus, Formosa, Alihang, leg. SAUTER.

obliquus FLEUTIAUX, 1893 (*Therates*)
(Ann. Soc. Ent. Fr. **42**, 497)
Mehrere Syntypen, Haute-Birmanie, États de Momeit, mines des Rubis, leg. DOHERTY, im Museum Genua.
DEI: 1 Syntypus, H^te^ Birmanie, Mines des Rubis, 1200—2300 m, 1890, leg. DOHERTY, ex Coll. FLEUTIAUX.

obscurata HORN, 1894 (*Collyris*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 218)
♂ Holotypus, Patria ignota, confer infra!
DEI: ♂ Holotypus, ohne Fundort.
Syn. zu *rugosa* CHAUDOIR, 1864.

obscuripes BATES, 1886 (*Cicindela*)
(Ann. Mag. Nat. Hist. (5) **17**, 70—71)
Mehrere Syntypen, Ceylon, Bogawantalawa, 27. XI.—27. IV. 1881—1882, leg. LEWIS.
DEI: 1 Syntypus, Ceylon, 3. IV. 1882, leg. LEWIS.
Syn. zu *nietneri* MOTSCHULSKY, 1859.

obsoletesignata HORN, 1895 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 91)
♀ Holotypus, St. Catharina; im DEI (leg. RIBBE).

ocellifera HORN, 1905 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 144)
♂ Holotypus, Deutsch-Ostafrika, Mpwapwa, leg. v. BENNIGSEN, in Coll. HORN; im DEI.

octussis DOHRN, 1885 (*Cicindela*)
(Stett. Ent. Ztg. **46**, 255)
Mehrere Syntypen, Turcomanniae, Merw.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort.
Syn. zu *decempustulata* MÉNÉSTRIÉS, 1848.

o'neili HORN, 1924/1925 (*Dromica*)
(Proc. Rhodesia Sc. Assoc. **23**, 24)
Mehrere Syntypen, S. Rhodesia, Chilimanzi Reserve, 17.—19. XII. 1919, Umvuma, XI.—XII. 1917; leg. O'NEIL.
DEI: Syntypen, S. Rhodesia, leg. O'NEIL: 1 Ex. Umvuma norfil, 1 Ex. dto. XII. 1917, 2 Ex. Chilimanzi Reserve, 17., 19. XII. 1919.

orbicollis SLOANE, 1904 (*Distypsidera*)
(Proc. Linn. Soc. N. S. Wales **29**, 529)
Mehrere Syntypen, Queensland, Cairns Distr., leg. DODD.
DEI: 1 Syntypus, Kuranda, durch HACKER.

ordinata JAKOVLEFF & DOKHTOUROFF, 1885 (*Cicindela*)
(Horae Soc. Ent. Ross. **19**, 250, Taf. 11, Fig. 6)
Holotypus, Fergana, Dorf Balyktchy, leg. KUSCHAKIEWITSCH und WILKINS.
DEI: Holotypus, Fundort auf dem Etikett nicht zu lesen, 9. VII., ex Coll. JAKOVLEFF.
Syn. zu *deserticola* FALDERMANN, 1836.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

orichalcina HORN, 1896 (*Collyris*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 149)

♂ Holotypus, mehrere Paratypen, Naga Hills, N-Manipur, Punjab, in Coll. ROTHSCHILD und Coll. HORN.
DEI: Paratypen: 1 Ex. Assam, N-Manipur, 1 Ex. Naga Hills; ex Tring. Museum.

oscari HORN, 1904 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 425)

♀ Holotypus, Amuma/Gande Kore, Land Argobbas, 19. V. 1900, leg. v. ERLANGER und NEUMANN, Exped. vom Roten Meer zum Nil; im DEI.

ovicolle HORN, 1893 (*Pogonostoma*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 15)

2 ♂♂, Syntypen, Madagascar, im Museum Berlin (GOUDOT) und in Coll. HORN.
DEI: 1 ♂ Syntypus, Madagascar, Sikora, Annanarivo.

ovipennis BATES, 1883 (*Cicindela*)

(Trans. Ent. Soc. London, 214, Taf. 13, Fig. 1)

Mehrere Syntypen, Japan, Sado, leg. LEWIS.
DEI: 1 Syntypus, Insel Sado, 6. X. 1881, leg. LEWIS.

oxychiliformis HORN, 1905 (*Megacephala*) **nom. nud.**

(Syst. Ind. Cic., 50)

DEI: 4 Syntypen, Philadelphia, leg. HAENSCH.

palpalis DOKHTOUROFF, 1888 (*Cicindela*)

(Horae Soc. Ent. Ross. **22**, 139)

Syntypen: 1 Ex. chinesisch. Provinz, Kan-ssu, VI., leg. POTANIN; 1 ♂, 1 ♀, China, in Coll. DOKHTOUROFF.
DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, China.
Syn. zu *hybrida* LINNÉ, 1758.

papuana GESTRO, 1879 (*Distypsidera*)

(Ann. Mus. Genova **14**, 556)

3 Syntypen, Nova Guinea merid., am Fluß Katau und Fly, leg. D'ALBERTIS, im Museum Genua.
DEI: 1 Syntypus, Nova Guinea, Katau, leg. D'ALBERTIS.

paradoxa HORN, 1892 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 75)

1 ♂, Ceylon, 2 Ex. im Museum Berlin; Syntypen.
DEI: 1 ♂ Syntypus, Ceylon.

parallelum HORN, 1909 (*Pogonostoma*)

(Soc. Ent. **24**, nr. 12, 89)

Mehrere Syntypen, Madagascar, Majunga.
DEI: 3 Syntypen, Madagascar, Majunga, durch DONCKIER.

parowana platti CAZIER, 1936 (*Cicindela*)

(Bull. S. Calif. Acad. Sci. **35**, 161, Fig. 6)

California, Benton's Crossing, Mono Co., VII., IX. 1935, leg. PLATT und CAZIER, ♂ Holotypus und mehrere Paratypen; in Coll. CAZIER, Coll. PLATT, Coll. BLOEKER, Jr. und in der California Academy of Sciences.
DEI: 1 ♂, 1 ♀ Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung, 8. IX. 1935/12. VIII. 1936 (Funddatum in der Beschreibung nicht genannt).

pauper HORN, 1896 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 151, 358)

Holotypus, mehrere Paratypen, Lucon bor., leg. WHITEHEAD, in Coll. ROTHSCHILD und Coll. HORN.
DEI: 2 Paratypen, Lucon, 94, leg. WHITEHEAD.
Syn. zu *virginea* SCHAUM, 1860.

pentacomioides HORN, 1900 (*Odontochila*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 202)

♀ Holotypus, St. Paulo, im DEI.

pentheri HORN, 1899 (*Myrmecoptera*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 381)

2 ♀♀, Syntypen, Africa merid., Matabeleland, leg. PANTHER.
DEI: 1 ♀ Syntypus, Süd-Afrika, leg. PENTHER (nicht PANTHER!), ex Museum Vienn.

péringueyi HORN, 1895 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 359)

Mehrere Syntypen, Togo, leg. CONRADT.
DEI: 5 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

péringueyi HORN, 1896 (*Dromica*)
(Ent. Nachr., 338)
♂ Holotypus, Region interior. Mosambic; im DEI.

perrieri FAIRMAIRE, 1897 (*Cicindela*)
(Ann. Soc. Ent. Belg. **41**, 364)
Mehrere Syntypen, Malgacha, Suberbieville, leg. PERRIER, in Coll. OBERTHÜR.
DEI: 1 Syntypus, Madagascar, durch FAIRMAIRE.

perrieri FAIRMAIRE, 1900 (*Pogonostoma*)
(Bull. Soc. Ent. Fr., 135)
Mehrere Syntypen, Madagascar, Suberbievielle, leg. PERRIER.
DEI: Syntypen, leg. PERRIER: 1 Ex. Madagascar, Suberbieville; 1 Ex. ohne Fundort.

phalangioides SCHMIDT-GOEBEL, 1846 (*Cicindela*)
(Faun. Col. Birm. **1**, 8, Taf. 1, Fig. 5)
Mehrere Syntypen, aus einer der birmenischen Provinzen, 1836–1839, leg. HELFER.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, ex Coll. HELFER – Coll. NICKERL.

picolominii RIVERS, 1893 (*Amblychila*)
(Zoë **4**, 219, Taf. 29)
Mehrere Syntypen, W. Arizona, Peach Springs, Truxton Valley, Höhe 5000 ft.
DEI: 2 Syntypen, Arizona, Peach Springs, leg. RIVERS.

piligera HORN, 1897 (*Cicindela*)
(Ent. Nachr. **23**, 18)
♂ Holotypus, Minas Geraes, Coll. FAIRMAIRE, via FLEUTIAUX an HORN; im DEI.

pilosifrons HORN, 1924/25 (*Dromica*)
(Proc. Rhodesia Sc. Assoc. **23**, 23)
♂ Holotypus, Rhodesia borealis, in Coll. HORN; im DEI.

pilosipes HORN, 1925 (*Cicindela*)
(Rev. Chil. H. N. **29**, 181–182, Fig. 22d)
2 ♂♂, 1 ♀ Syntypen, Pto. Castilla, Rep. Honduras, 21. III., 11. IV. 1924, leg. BEQUAERT; im DEI.

pilosulum HORN, 1898 (*Ctenostoma*)
(Rev. Cic., 29)
♀ Holotypus, Pernambuco, Serra de Communaty, leg. GOUNELLE, I.–III. 1893; im DEI.

pinguis HORN, 1894 (*Collyris*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 14)
♀ Holotypus, Sumatra (Dehli); im DEI.

plagiata PÉRINGUEY, 1893 (*Myrmecoptera*)
(Trans. S. Afr. Phil. Soc. **7**, 19, Taf. 2, Fig. 2)
Mehrere Syntypen, South Africa, Damaraland, Walfish Bay.
DEI: 5 Syntypen, Walfish Bay, I. 1892, ex Coll. PÉRINGUEY.
Syn. zu *pallida* FABRICIUS, 1801.

planicornis HORN, 1897 (*Bennigsenium*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 61)
Mehrere Syntypen, Deutsch-Ost Afrika, Dar-es-Salaam.
DEI: Syntypen: 6 Ex. mit den Angaben der Beschreibung; 1 Ex. ohne Fundort; ex Coll. v. BENNIGSEN.

planifrons HORN, 1905 (*Collyris*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 293)
♀ Holotypus, Ceylon; im DEI.

planifrons HORN, 1896 (*Dromica*)
(Ent. Nachr. **22**, 339)
♂ Holotypus, Zululand, ex Coll. BROWN; im DEI.

planifrontoides HORN, 1925 (*Collyris*)
(Ent. Rec. Journ. Var., 165)
Syntypen, Ceylon: 1 ♂, 1 ♀, Anuradhapura, 7. XII. 1916, leg. HENRY; 1 ♀, Wellawaya, XI. 1905.
DEI: Syntypen: 1 ♀, Wellawaya, XI. 1905, 1 Ex. Anuradhapura, 7. XII. 1916.

plasoni HORN, 1903 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 423)
♀ Holotypus, Borneo bor., Kinibalu, leg. EVERETT, durch PLASON; im DEI.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

plicaticollis HORN, 1911 (*Ctenostoma*)
(Ent. Bl. **7**, 153)
♂ Holotypus, Peru, Amazonas, Tarapoto, IV. trim. 1885, leg. MATHAN; im DEI.

plicicollis HORN, 1901 (*Neocollyris*)
(Rev. Cic., 63–64)
♀ Holotypus, Ind. or. merid., Nilgiri Hills; im DEI.

plurigemnosa HORN, 1937 (*Cicindela*)
(Occ. Pap. Bernice P. Bishop Mus. **13**, 1–3, Fig. 1)
5 ♂♂, 2 ♀♀, Syntypen, Solomon Islands, Tulagi, 16.–24. XII. 1934, leg. PAGDEN, „Sasapi cutting".
DEI: 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, SAKM.

plustchevskyi DOKHTOUROFF, 1883 (*Distypsidera*)
(Rev. Mens. Ent. **1**, 7)
2 Syntypen, Australie, Somerset, in Coll. DOKHTOUROFF.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, I. 1875, leg. D'ALBERTIS.
Syn. zu *gruti* PASCOE, 1862.

praecisa BATES, 1890 (*Cicindela*)
(Trans. Ent. Soc. London, 498, Taf. 16, Fig. 4)
Mehrere Syntypen Mexico, Chilpancingo in Guerrero, leg. SMITH und HÖGE.
DEI: 1 Syntypus, Chilpancingo, Guerrero, leg. HÖGE.

prepusula HORN, 1907 (*Odontochila*)
(Stett. Ent. Ztg. **68**, 328)
Mehrere Syntypen, Matto Grosso.
DEI: 6 Syntypen, Matto Grosso, durch STAUDINGER.

pretiosa DOKHTOUROFF, 1882 (*Cicindela*)
(Rev. Ent. **1**, 276)
Mehrere Syntypen, Amazone, in Coll. DOKHTOUROFF.
DEI: 2 Syntypen, Amazone.

princeps angusto-nigrescens HORN, 1928 (*Therates*)
(Koleopt. Rundsch. **14**, 169)
♂ Holotypus, Ost-Borneo, Mahakan-Fluß, Songei Boh, Coll. MJÖBERG; im DEI.

prodiga ERICHSON, 1847 (*Cicindela*)
(Arch. Naturg. **13**, 68)
Mehrere Syntypen, Peru.
DEI: 2 ♀♀, Peru, Cumbase, durch STAUDINGER.

prodotiformis HORN, 1892 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 88)
♂ Holotypus, West-Africa, ex Coll. RICHTER-PLASON; im DEI.

proepipleuralis HORN, 1926 (*Myrmecoptera*)
(Ent. Bl. **22**, 164)
Mehrere Syntypen, Katanga, Sashila-Fluß, X. 1925, leg. LE MOULT.
DEI: 4 Syntypen, B. Congo, Katanga, riv. Sashila, leg. LE MOULT.

pronotalis HORN, 1922 (*Cicindela*)
(Zool. Meded. **7**, 108)
♀ Holotypus, Tonkin, Hoo-Binh, leg. DONCKIER; im DEI.

proserpina HORN, 1904 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 424)
♂ Holotypus, Kaffa, leg. NEUMANN und v. ERLANGER, Exped. vom Roten Meer zum Nil.
DEI: ♂ Holotypus, Kaffa, II., leg. NEUMANN.

prothymoides HORN, 1908 (*Cicindela*)
(Stett. Ent. Ztg. **69**, 120)
Mehrere Syntypen, Malabar, Karkur Ghat, leg. ANDREWES; in Coll. ANDREWES und Coll. HORN.
DEI: 2 Syntypen, Malabar, Karkur Ghat.

pseudanthracinum HORN, 1934 (*Pogonostoma*)
(Arb. morph. tax. Ent. **1**, 30–31)
Mehrere Syntypen; Diego Suarez, leg. HEYNE, ALLUAUD und DONCKIER; Mt. d'Ambre, leg. HEYNE und SICARD; Forêt Analamazotra-Perinet, 12.–13. XII. 1930, leg. OLSUFIEFF; im Museum Paris und in Coll. HORN.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

DEI: Syntypen: 1 Ex. Amber Geb.; 1 Ex. Diego Suarez; 1 Ex. dto. leg. HEYNE; 1 Ex. Madagascar, Diego Suarez, 1893, leg. ALLUAUD; 1 Ex. Madagascar, ex cab. BROWN; ex Coll. EHLERS V. DE POLL; 2 Ex. Forêt Analamazotra-Perinet, 12.—13., 18.—20. XII. 1930 (Funddatum in der Bechreibung nicht genannt), leg. OLSUFIEFF; 1 Ex. Mt. d'Ambre, leg. SICARD, ex Museum Paris.

pseudochrysis HORN, 1929 (*Odontochila*)

(Rev. Chil. Hist. Natur. **33**, 382—383, Fig. 94)

Syntypen; 1 ♂, Matto Grosso, via STAUDINGER & BANG-HAAS; 1 ♀, Bolivia, Prov. Del Sara, Coll. STEINBACH, in Carnegie Museum, Pittsburgh.
DEI: 1 ♂ Syntypus, Matto Grosso.

pseudocoarctata HORN, 1924/25 (*Dromica*)

(Proc. Rhodesia, S. Assoc. **23**, 23)

2 ♂♂, 2 ♀♀, Syntypen, S. Rhodesia, Vumba Mts., 2.—15. XI. 1924, im Rhodesia Museum und in Coll. HORN.
DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, 5.700 ft., 2.—15. II. (nicht 2.—15. XI.!).

pseudocylindriformis HORN, 1914 (*Prothyma*)

(Arch. Naturg. **79**, A 11 (1913), 15)

Mehrere Syntypen, Formosa, Shisha, V.—VI. 1912, Banshoryo-Distrikt, Sokutsu, leg. SAUTER.
DEI: Syntypen, Formosa: 2 Ex. Shisha, V.—VI. 1912, 2 Ex. Shis A 5 6, V.—VI. 1912, 1 Ex. Sokutsu, Banshoryo-Distrikt, 1912; leg. SAUTER.

pseudodeserticola HORN, 1891 (*Cicindela*)

(In: HORN & ROESCHKE, Mon. pal. Cic., 112, Taf. 3, Fig. 15)

Mehrere ♂♂, Syntypen, chinesisch Turkestan, Chotan, 1200 m, VI., leg. CONRADT.
DEI: 2 ♂♂, Syntypen, Chotan, 1200 m, 18. VI. 1890, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

pseudodromica HORN, 1932 (*Cicindela*)

(Stylops **1**, 81)

2 ♀♀, Syntypen, Trichinopolis, Mudukolam, IX. 1931, leg. Sammler des Government Entomologist, Combatore (P. S. N.), im Imperial Institut of Entomology und in Coll. HORN.
DEI: 1 ♀ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

pseudointerposita HORN, 1924 (*Cicindela*)

(Mem. Depart. Agr. India **8**, nr. 9, 90)

Mehrere Syntypen, Insula Panaon, XII. 1915, Coll. BOETTCHER.
DEI: 5 Syntypen, Phillipinen, Panaon.

pseudolongipalpis HORN, 1930 (*Cicindela*)

(Arch. Hydrobiol., Suppl., **8**, 47)

Mehrere Syntypen, Südsumatra, in der Nähe Tjurup, am Wasserfall Kapala Tjurup und am Musi-Fluß, in der Nähe von Aër Simpang, 5., 6. V. 1929, leg. FEUERBORN; in Coll. HORN, in Museen Dresden, Hamburg, Leiden und Amsterdam.
DEI: 5 Syntypen, Sumatra, Musi-Tjurup, 6. V. 1922.

pseudo-minimum HORN, 1934 (*Pogonostoma*)

(Arb. morph. tax. Ent. **1**, 29)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, in silvis Analamazotra-Perinet, 10.—12. VII. 1930, leg. Familie OLSUFIEFF; im DEI.

pseudo-nana HORN, 1924 (*Cicindela*)

(Mem. Dep. Agr. Ind., **8**, nr. 9, 90)

1 ♂, 2 ♀♀, Syntypen, Luzon, Mt. Banahao, IV.—VI. 1914, via MAINDRON-KERREMANS und MOSER an HORN.
DEI: Syntypen, Luzon: 1 Ex. Mt. Banahao, IV. 1914, Coll. BOETTCHER; 1 Ex. durch MAINDORN-KERREMANS.

pseudoplebeja MANDL, 1960 (*Cicindela*)

(Beitr. Ent. **10**, Nr. 1—2, 185—186)

♂ Holotypus, Cairns, Barron River, I. 1907, leg. DODD; 19 Paratypen, dto.; in Coll. HORN und Coll. MANDL.
DEI: Paratypen: 6 Ex. Cains; 8 Ex. Cains, Barron River, 4 Ex. dto., I. 1907; leg. DODD.

pseudopupillata HORN, 1938 (*Cicindela*)

(Ent. Beih. **5**, 12, Taf. 56, Fig. 26)

♂ Holotypus, Neu-Guinea, Toricelli Gebirge, 900 m, leg. SCHLAGINHAUFEN; im DEI.

pseudorafflesia HORN, 1925 (*Cicindela*)

(Ent. Bl. **21**, 139)

1 ♂, Nord-West Australien, Sharks Bay, Carnarvon, leg. SLOANE, 1 ♀ Nord-Australien, leg. BLACKBURN, in Coll. HORN; Syntypen; im DEI.

pseudorusticana HORN, 1921 (*Cicindela*)

(Ent. Bl. **17**, 182)

2 ♂♂, Syntypen, Neu-Kamerun, Pama-Quelle, IV. 1913, Coll. HOUY, im Museum Berlin und in Coll. HORN.
DEI: 1 ♂ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

pseudoscabra PÉRINGUEY, 1893 (*Mantichora*)
(Trans. S. Afr. Phil. Soc. **7**, 10, 16)
♂ Holotypus, Ovampoland, Cunene River, leg. ERIKSSON [1890—1891]; im DEI.
Syn. zu *latipennis* WATERHOUSE, 1837.

pseudosignata HORN, 1902 (*Collyris*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 70)
2 ♀♀, Syntypen, Tonkin, Montes Mauson, IV.—V. 1900, 2—3000', leg. FRUHSTORFER; im DEI.

pseudospeciosa HORN, 1932 (*Collyris*)
(Soc. ent. France, Livre cent., 208)
Mehrere Syntypen, Philippinen, Insel Sibuyan, leg. BAKER, in Coll. HORN und im National Museum Washington.
DEI: 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

pseudosuturalis HORN, 1914 (*Cicindela*)
(Arch. Naturg. **79**, A 11 (1913), 21)
2 ♀♀, Syntypen, Angola, Katanga, Bihe, XII. 1906, 5200 Fuß hoch, leg. WELLMANN.
DEI: 1 ♀ Syntypus, Katanga.

pseudotereticollis HORN, 1929 (*Cicindela*)
(Stett. Ent. Ztg. **90**, 322)
♀ Holotypus, Belg. Congo, Katanga, Kinda, via STAUDINGER & BANG-HAAS an HORN; im DEI.

pseudotrimaculata HORN, 1934 (*Prothyma*)
(Mém. Acad. Malgache **20**, 22)
Mehrere Syntypen, N.-W. Madagascar, Ramena, Sambirano, Antseva-Ambobaka, XI. 1933/I.—II. 1934, leg. MELLIS; 1 ♀, Majunga, leg. DONCKIER.
DEI: Syntypen, N.-W. Madagascar: 11 Ex. Antseva-Ambobaka, Ramena, 1 Ex. Antseva, XI. 1931; leg. MELLIS; 1 Ex. Mazunga, leg. DONCKIER.
Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Majunga" steht auf dem Etikett „Mazunga".

psilogramma BATES, 1890 (*Cicindela*)
(Trans. Ent. Soc. London, 507, Taf. 16, Fig. 10)
Mehrere Syntypen, Mexico, Villa Lerdo in Durango, leg. HÖGE.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
Syn. zu *tenuisignata* LECORDAIRE, 1851.

punctata DOKHTOUROFF, 1882 (*Cicindela*)
(Rev. Ent. **1**, 216)
Mehrere Syntypen, Turkestan.
DEI: 1 Ex. Čal-Kuldscha?, 1 Ex. Fluß Tamla: Syntypen.
Syn. zu *granulata* GEBLER, 1843.

punctipennis FAIRMAIRE, 1903 (*Megalomma*)
(Ann. Soc. Ent. Fr. **72**, 181)
Mehrere Syntypen, Région Malgache, Ankarahitra, leg. PERRIER.
DEI: 1 Syntypus, Ankarahn, leg. PERRIER.
Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Ankarahitra", steht auf dem Etikett „Ankarahn".

purpurea HORN, 1895 (*Collyris*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 82)
Mehrere Syntypen, Java.
DEI: 5 Syntypen, Java occident., Pengalengan, 4000, Sukabumi, 2000, 1893, leg. FRUHSTORFER.

putzeysi HORN, 1900 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 207)
♂ Holotypus, Angola; [Kakonda] im DEI.

quadrinotatus binotatus HORN, 1892 (*Euprosopus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 69)
♀ Holotypus, Brasilia, ex Coll. RICHTER; im DEI.

quadripunctulata MANDL, 1969 (*Cicindela*)
(Reichenbachia **12**, Nr. 5, 154—155)
♂ Holotypus, Indien, Madras, Anamalai Hills, Cinchona, 3500 ft., V. 1965, leg. NATHAN und mehrere Paratypen dto.; in der Zoologischen Sammlung des Bayerischen Staates in München und in Coll. MANDL.
DEI: 6 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

quadrisignata rivalieri BASILEWSKY, 1966 (*Megacephala*)

(Ann. Mus. Afr. centr. (Sér. 8°) Sci. zool. no **152**, 46, Fig. 6b)

Afrique, Haute-Volta: ♂ Holotypus, Batie, VIII. 1954, leg. BAUDON, im MRAC; 1 ♂, Kolumbia, Bobo-Dioulasso, IX. 1959, leg. HAMON, im ORSTOM; N. Togo: 1 ♂, Sokode, im DEI; 1 ♂, de Sokode à Basari, leg. SCHRÖDER, im ZMB; N. Dahomey: 1 ♀, Parakou, im MRAC; 1 ♀, Djougou, im DEI; Paratypen.
DEI: 1 ♂, Paratypus, Sokode, ex Coll. v. BENNIGSEN.

quadristriata HORN, 1897 (*Cicindela*)

(Ent. Nachr. **23**, 239)

2 ♀♀, Syntypen, Afrika, Huilla [Coll. NONFRIED]; im DEI.

quadrisulcata HORN, 1935 (*Collyris*)

(Koleopt. Rundsch. **21**, 49)

♀ Holotypus, Süd-Madras; im DEI.

quattuorpunctata KRAATZ, 1890 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 282, Taf. 2, nr. 2, f, 3)

Mehrere Syntypen, Tarbagatei.
DEI: 1 Syntypus, Tarbagatai, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *granulata* GEBLER, 1843.

queenslandica SLOANE, 1909 (*Cicindela*)

(Proc. Linn. Soc. N. S. Wales **34**, 300)

Mehrere Syntypen, Queensland, Cairns ("Anderson, on seabeach"), via LEA an HORN.
DEI: 1 Syntypus, Cairns.

quinquecostata HORN, 1892 (*Dromica*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 67)

♂ Holotypus, Natal; im DEI.

reconciliatrix HORN, 1900 (*Euryoda*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 200)

♀ Holotypus, Tenasserim, im DEI.

rectangulivertex HORN, 1929 (*Collyris*)

(Journ. F. M. S. Mus. **14**, 465)

♀ Holotypus, British North Borneo, Sandakan, via BAKER an HORN; im DEI.

rectolabialis FAIRMAIRE, 1914 (*Prothyma*)

(Arch. Naturg. **79**, A 11 (1913), 13)

1 ♂, Madagaskar, Diego Suarez, leg. DONCKIER; 1 ♀, dto. in Coll. FLEUTIAUX: Syntypen.
DEI: 1 ♂ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

reducta HORN, 1892 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 370)

Mehrere Syntypen, Sumatra, ex Coll. RICHTER.
DEI: 5 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
Syn. zu *discreta* SCHAUM, 1863.

regalis atrospinosa HORN, 1931 (*Megacephala*)

(Ver. Ges. Lux. Naturf., 6–7 (Separatabdruck))

Mehrere Syntypen, Katanga, Kafakumba, 1928, leg. OVERLAET, Coll. LE MOULT, im Museum Congo und in Coll. HORN.
DEI: Syntypen, B. Congo, Katanga, Kafakumba: 2 Ex. Coll. LE MOULT; 7 Ex. 1928, leg. OVERLAET.

regalis katangana BASILEWSKY, 1950 (*Megacephala*)

(Bull. Soc. ent. Fr. **55**, 79)

Elisabethville (Mission, AGRICOLE LEPLAE, XI. 1911; MASSART, XI. 1930, Holotypus; SEYDEL, XI. 1948), Nieuwdorp (Miss. AGRIC. LEPLAE, XII. 1911), Sampwe (BEQUAERT, XII. 1911), Mukabe-Kasari (DONCKER, 1936), Lukafu (DE WITTE, XI.–XII. 1930); 15 Ex. im Musée du Congo Belge à Tervuren; 1 Ex. im Institut royal des Sciences naturelles de Belgique: Elisabethville (BRÉDO, 1. 1939): Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, Katanga, Makabe-Kasari, 1936, leg. DONCKER.

regalis naivashae BASILEWSKY, 1962 (*Megacephala*)

(Ann. Mus. Afr. centr. (Sér. 8°), Sci. Zool. no. **107**, 74, Fig. 6)

Holotypus, 24 Paratypen, Kenya, Naivasha, 2.000 m, 13.–14. V. 1937, Miss. Afrique orientale, im Musée Royal de l'Afrique Centrale, Tervuren.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, Miss. Zool. I. R. S. A. C. en Afrique orientale (BASILEWSKY und LELEUP), ex Coll. Mus. Congo.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

regalis revoili LUCAS, 1881 (*Megacephala*)

(Bull. Soc. Ent. Fr., 101)

Mehrere Syntypen, Somali, Ouarsangueles, Darror, Karkar, leg. RÉVOIL.
DEI: 1 Syntypus, Somali, Ouarsangueli, 1881, leg. RÉVOIL, ex Museum Paris.

regalis rugipennis HORN, 1935 (*Megacephala*)

(Stett. Ent. Ztg. **96**, 161—162)

♀ Holotypus, Ebango, XI., Schweiz. wiss. Exped. Angola, 1932/33; im DEI.

regalis sebakuana PÉRINGUEY, 1903 (*Megacephala*)

(Bull. Soc. Ent. Fr., 338)

Mehrere Syntypen, Rhodésia mérid., Sebakwe.
DEI: Syntypen, Rhodesia: Sebakwe, 1 Ex.; Gnelo, 1902, 1 Ex.; leg. PÉRINGUEY; Coll. PÉRINGUEY.

regalis serratosetosa HORN, 1932 (*Megacephala*)

(Tjidschr. Ent. **75**, 26—27)

Afrika, nahe Harrar und Kolubi, leg. KRISTENSEN, mehrere Syntypen.
DEI: 18 Ex. Harrar, 3 Ex. Kolubi-Ab.; leg. KRISTENSEN: Syntypen.

regalis vansoni BASILEWSKY, 1966 (*Megacephala*)

(Ann. Mus. Afr. centr. (Sér. 8°), Sci., Zool. no. 152, 93—95)

Southern Rhodesia, Umtali: ♀ Holotypus, XII. 1953, im MRAC; 1 ♀, im AMNH; 1 ♂, XII. 1945, im NMSR; 1 ♀, 1902, leg. BODONG, im SAM; 6 ♂♂, 2 ♀♀, XI.—XII. 1931, leg. SHEPPARD, im MRAC; 1 ♂, X. 1952, leg. MYERE, im Museum FREY; 1 ♂, XI. 1953, leg. JUNOR, im Albany Museum; Wedza: 1 ♀, leg. BOULTON, im Carnegie Museum; Vumba Mts., Mpudzi Riv.: 2 ♀♀, XI. 1901, leg. MARSHALL, im RIPP und DEI; Chirinda: 1 ♀, 1912, leg. SWYNNERTON, im BM; Chirinda Forest: 2 ♀♀, I. 1948/XI. 1957, im NMSR und MRAC; 1 ♀, XII. 1952, leg. v. SON, im TM; Chirinda Forest, Mt. Selinda: 1 ♀, I. 1948, im MRAC; Moçambique, Vila Pery: 3 ♂♂, 1 ♀, XII. 1929, leg. LESNE, im MP, MRAC und DEI; Transvaal, Zoutpansberg: 1 ♀, 700 m, in Coll. MANDL; Koedoes River: 1 ♂, 2 ♀♀, XII. 1902, leg. BREYER, im TM und MRAC; Duivelskloof: 1 ♂, I. 1925, leg. JANSE, im TM; Krabbefontein, Politsi near Tzaneen: 1 ♀, I. 1914, im TM; Shilouvane: 3 ♀♀, 1904, leg. JUNOD, im MRAC, MP und DEI; Leydsdorp: 1 ♂, II. 1927, leg. v. SON, im TM; Pretoria: 1 ♂, XI. 1923, leg. JANSE, im TM; Grootdraai, Olifants Riv.: 1 ♀, XI. 1927, leg. LANG, im TM; Paratypen.
DEI: Paratypen: 1 ♀, Mpudzi Riv., Mawida, XI. 1901, leg. MARSHALL; 1 ♀, Shilouvane, 1904; 1 ♂, Mozambique, Vila Pery, Anf. XII. 1929, leg. LESNE.

regalis viridissima BASILEWSKY, 1966 (*Megacephala*)

(Ann. Mus. Afr. centr. (Sér. 8°) Sci. Zool. no **152**, 102, Fig. 21 und 20b)

Afrique, N.E. Rhodesia: ♂ Holotypus, Chiengi, lac Moera, XII. 1946, leg. CASTERS, im MRAC; 9 ♂♂, 4 ♀♀, Ubemba, 1902, leg. GUILLEMÉ, im MRAC und im MP; 1 ♂, 2 ♀♀, Rosallas, im DEI; 2 ♂♂, 4 ♀♀, Kasama, XII. 1951, leg. BOLKOMB, im NMSR und im MRAC; 2 ♂♂, 4 ♀♀, Kabatu, im NMF, MCZ, Museum Prague und Museum Leiden; 2 ♂♂, Rhodesia, in Coll. MANDL: Paratypen.
DEI: Paratypen: 1 Ex. N. West-Rhodesia, 2 Ex. Rhodesia, Rosalla, 1 Ex. Rhodesia, Rabetu (Fundort in der Beschreibung nicht genannt!); Coll. PLASON, STAUDINGER, 1913.

respiciens HORN, 1920 (*Cicindela*)

(Ark. Zool. **13**, nr. 11, 18)

Mehrere Syntypen, merid. Galla, Ganale, Haro Gobam, 7.—13. IV. 1901; Somali; leg. ERLANGER; im Museum Berlin und in Coll. HORN.
DEI: Syntypen: 3 Ex. S. Galla, Ganale, 7., 13. IV. 1901; 1 Ex. S. Galla, Haro-Gobana; leg. ERLANGER.
Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Haro Gobam", steht auf dem Etikett „Haro-Gobana".

resplendens DOKHTOUROFF, 1888 (*Cicindela*)

(Horae Soc. Ent. Ross. **22**, 143)

Mehrere Syntypen, Ordoss, VIII.
DEI: 2 Syntypen, Ordoss, 1884, leg. POTANIN.

resplendens HORN, 1902 (*Collyris*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 66)

♀ Holotypus, Tonkin, Montes Mauson, IV.—V. 1900, 2—3000', leg. FRUHSTORFER; im DEI.

reticostata HORN, 1908 (*Cicindela*)

(Proc. Acad. Philad., 509)

♂ Holotypus, Angola, Enyalanganja, 3 Std. südl. von Ekuiva River, XI. 1907, leg. WELLMANN.
DEI: Benguella, XI. 1907, leg. WELLMANN; vielleicht Holotypus.

revoili FAIRMAIRE, 1882 (*Dromica*)

(In: REVOIL, Faune & Flore Comalis, Col., 6)

Mehrere Syntypen meridionale-orientale Afrique.
DEI: 1 Syntypus, Somali, Ouarsanguélis, 1881, durch RÉVOIL.

rhytidopteroides HORN, 1924 (*Cicindela*)

(Mem. Dep. Agric. India 8, nr. 9, 89)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Bengal.
DEI: 1 Ex. Hanus, Ledir, 1923.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

ribbei HORN, 1895 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 360)
2 ♂♂, Syntypen, Salomo Archip., Shortlands Ins., leg. RIBBE.
DEI: 1 ♂ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

richteri HORN, 1901 (*Neocollyris*)
(Rev. Cic., 62)
♀ Holotypus, Borneo, ex Coll. RICHTER; im DEI.

ritsemae HORN, 1895 (*Cicindela*)
(Not. Leyd. Mus. **17**, 15)
2 ♀♀, Syntypen, in den Bergen von Argentinien, Prov. Catamarca, 1893, leg. TEN KATE.
DEI: 1 ♀ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, Laogebergstrecke, ex Museum Leyden.

roeschkei HORN, 1892 (*Collyris*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 365)
♀ Holotypus, Calcutta, ex Coll. RICHTER [Calcutta-ATKINSON]; im DEI.

roseiventris linearis HORN, 1905 (*Cicindela*)
(Syst. Ind. Cic., 22)
Mehrere Syntypen, Costa Rica, San Carlos, Coll. SCHILD-Burgdorf; im DEI.
DEI: 5 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

rothschildi HORN, 1896 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 152)
Holotypus, mehrere Paratypen, Luzon bor., leg. WHITEHEAD, 94, in Coll. ROTHSCHILD und in Coll. HORN.
DEI: 1 ♂, S. Luzon, Albay; 1 ♀, N. Luzon; leg. WHITEHEAD, 94, ex Museum Tring.: Paratypen.

rudolfbennigseni HORN, 1912 (*Cicindela*)
(Ent. Mitt. **1**, 306)
♂ Holotypus, Neu-Guinea, Sattelberg, ex Coll. v. BENNIGSEN; im DEI.

rufiventris beckeri HORN, 1897 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 171)
Mehrere Syntypen, Mexiko, Sierra de Durango, nahe bei Canelas, leg. BECKER.
DEI: 1 ♂ Syntypus, Sierra de Durango, leg. BECKER.

rufiventris nigroconfluens HORN, 1923 (*Cicindela*)
(Zool. Jahrb. Abt. Syst. **47**, 322)
1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Costa Rica, Turrialba, leg. SCHILD; im DEI.

rufiventris reducta HORN, 1897 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 171; nom. praeocc. = *rufiventris reducens* HORN, 1915, Gen. Ins. Cic., 386)
Mehrere Syntypen, Mexico, Guadalajara, leg. HÖGE.
DEI: 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

rufomarginata maculatovittata HORN, 1938 (*Cicindela*)
(Ent. Beih. **5**, 11, Taf. 45, Fig. 15–19)
Mehrere Syntypen, Kassai-Land, Kondue, leg. LUJA; Franz. Kongo-Gebiet, Franceville und Diélé, via DONCKIER an HORN.
DEI: Syntypen, Congo: 11 Ex. Kassai, Kondue, leg. LUJA; 2 Ex. dto. Coll. ROLLE; 3 Ex. Diélé, Coll. DONCKIER; 1 Ex. Franceville, Coll. V. DE POLL; 1 Ex. ohne Fundort, ex Coll. RICHTER.

rugatilis BATES, 1890 (*Cicindela*)
(Trans. Ent. Soc. London, 497)
Mehrere Syntypen, Mexico, Toluca, leg. SALLÉ und HÖGE.
DEI: Syntypen: 1 Ex. Mexico, Toluca, leg. HÖGE und 1 Ex. dto., ex Coll. RICHTER.

rugei HORN, 1892 (*Collyris*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 354)
♀ Holotypus, Mindanao, ex Coll. RUGE; im DEI.

rugifer HORN, 1895 (*Procephalus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 354)
♀ Holotypus, Bahia; im DEI.

rugifer HORN, 1902 (*Therates*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 74)
♀ Holotypus, Tonkin, Montes Mauson, IV.–V. 1900, 2–3000', leg. FRUHSTORFER; im DEI.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

rugosa BERTOLONI, 1858 (*Dromica*)
(Mem. Accad. Bologna, **1**, 305, Taf. 23, Fig. 2)
Mehrere Syntypen; am Fluß Magnára, Prov. Inhambanensis Mosambici, leg. KAROLUS FORNASINIUS; Bononiae, 1848, Coll. BERTOLONI.
DEI: 1 Syntypus, Mokambo-Bai.
Syn. zu *bertolonii* THOMSON, 1856.

rugosoangustus HORN, 1929 (*Therates*)
(Ztschr. Insbiol. **24**, 19—20)
♂ Holotypus, Tonkin, Chapa, 1. VII. 1927, leg. JEANVOINE; im DEI.

rugulosus HORN, 1900 (*Therates*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 194)
1 ♂, N. O.-Sumatra, Tebing tinggi, leg. SCHULTHEISS; 1 ♀, Java (?): Syntypen; im DEI.

rusticana PÉRINGUEY, 1893 (*Cicindela*)
(Trans. S. Afr. Phil. Soc. **7**, 43—44)
Mehrere Syntypen, South Africa, Transvaal, Barberton.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, ex Coll. PÉRINGUEY.

ruth HORN, 1907 (*Megacephala*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 266)
♂ Holotypus, Matto Grosso.
DEI: ♂ Holotypus, Garbe, Grenze von S-Paulo & Matto Grosso, durch STAUDINGER.

saetigera HORN, 1893 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 198)
♀ Holotypus, Cap York, durch SRNKA; im DEI.

sarawakensis THOMSON, 1957 (*Collyris*)
(Arch. Ent. **1**, 133)
Holotypus, Borneo, Sarawak, ex Coll. BATES; im DEI.

sauteri HORN, 1912 (*Cicindela*)
(Ent. Mitt. **1**, 134)
Mehrere Syntypen, Formosa, Kosempo, 1. V.—14. VI. 1908, Taihorin, VI. 1911; leg. SAUTER.
DEI: 5 Ex. Formosa, Taihorin, VI. 1911, 1 Ex. Kosempo, 2.—14. VI. 1908; leg. SAUTER: Syntypen.

sauteri HORN, 1912 (*Collyris*)
(Ent. Mitt. **1**, 131)
2 ♂♂, 2 ♀♀, Syntypen, Formosa, Taihorin, VII. 1911, leg. SAUTER.
DEI: 2 Syntypen, Formosa, Taihorin, VI. 1911 (Funddatum in der Beschreibung nicht genannt), VII. 1911, leg. SAUTER.

sauteri grossepunctata HORN, 1935 (*Collyris*)
(Koleopt. Rundsch. **21**, 49)
♂ Holotypus, Tonkin; im DEI.

scabra PÉRINGUEY, 1893 (*Mantichora*)
(Trans. S. Afr. Phil. Soc. **7**, 16; nom. praeocc. = *manica* PÉRINGUEY, 1898, l. c. **10**, 305)
Mehrere Syntypen: Delagoa Bay, Rikatla, Antiocha; Mashunàland, Manica Tuli; Mozambique.
DEI: 1 Syntypus, Delagoa Bay, ex Coll. PÉRINGUEY.

scapularis HORN, 1896 (*Odontochila*)
(Bull. Mus. Paris **2**, 328)
2 ♂♂, Syntypen, Cayenne, ex Coll. DEJEAN — Coll. CHAUDOIR.
DEI: 1 ♂ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

schaefferi HORN, 1903 (*Cicindela*)
(Journ. New York Ent. Soc. **11**, 213)
♀ Holotypus, „California ?", via SCHAEFFER (Brooklyn) an HORN; im DEI.

schaumi HORN, 1892 (*Collyris*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 366)
♀ Holotypus, Cornwallis, ex Coll. RICHTER; im DEI.

schaumi HORN, 1895 (*Ctenostoma*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 354)
♀ Holotypus, Bahia [leg. FRUHSTORFER]; im DEI.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

schaumi HORN, 1892 (*Derocrania*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 67)
1 ♀, Ceylon; 1 Ex. im Museum Berlin: Syntypen.
DEI: 1 ♀ Syntypus, Ceylon, leg. SCHLÜTER.

schaumi HORN, 1892 (*Megalomma*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 73)
♂ Holotypus, Madagascar, ex Coll. RICHTER; im DEI.
Syn. zu *viridicyanea* AUDOUIN & BRULLÉ, 1839.

schaumi HORN, 1892 (*Myrmecoptera*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 220)
Ost-Afrika, 1 ♀, Madinula, in Coll. HORN, 1 ♀, Witu, Dana Fl., im Museum Berlin: Syntypen.
DEI: 1 ♀ Syntypus, Ost-Afrika, Madinula, leg. DE HILAIRE.

schaumi HORN, 1893 (*Pogonostoma*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 16)
♂ Holotypus, Madagascar, ex Coll. RICHTER-PLASON (GOUDOT); im DEI.

schaumi HORN, 1892 (*Therates*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 69; nom. praeocc. = *schaumianus* HORN, 1905, Syst. Ind. Cic., 11)
♀ Holotypus, Borneo, ex Coll. RICHTER; im DEI.

schaumi HORN, 1892 (*Thopeutica*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 75)
♀ Holotypus, Celebes, Minahassa; im DEI.

schaumi triangulomicans HORN, 1942 (*Cicindela*)
(Arb. morph. tax. Ent. 9, 139—140)
♀ Holotypus, bei Koelawi Paloe im westlichen Celebes, 3100 m, III. 1937, leg. KALIS; im DEI.

schaumianus flavoornata HORN, 1931 (*Therates*)
(Ent. Nachrichtenbl. 5, 5—6)
5 ♂♂, Borneo occident., Mowong, Mitte IX. 1907, leg. MUIR, via ARANGUA an HORN; 4 weitere Ex. durch HADDEN an HORN; im Museum Honolulu und in Coll. HORN: Syntypen.
DEI: 3 ♂♂, Syntypen, W. Borneo, Mowong, IX. 1907, leg. MUIR.

schmalzi HORN, 1898 (*Ctenostoma*)
(Rev. Cic., 32)
2 ♀♀, Syntypen, St. Catharina, leg. SCHMALZ; im DEI.

schmalzi HORN, 1896 (*Oxychila*)
(Ent. Nachr. 22, 337)
Mehrere Syntypen, Brasilia, St. Catharina, dur ch SCHMALZ an HORN; 1 Ex. im Museum Berlin.
DEI: 1 Ex. Brasilia, durch FELSCHE, 5 Ex. Joinville, durch SCHMALZ.
Syn. zu *similis* HORN, 1892.

schmidtgoebeli HORN, 1893 (*Collyris*)
(Ann. Mus. Genova (2) 13, 378)
Birmanie, Teinzò, Carin Chebà, Tenasserim, leg. FEA, mehrere ♀♀, 4 ♂♂; in Coll. FEA: Syntypen.
DEI: 2 Syntypen, Carin Chebà, 900—1100 m, 5. XII. 1888, leg. FEA.
Syn. zu *variitarsis* CHAUDOIR, 1860.

schmidtgoebeli HORN, 1895 (*Euryoda*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 87)
♀ Holotypus, Laos [leg. STEVENS]; im DEI.

schmidti HORN, 1927 (*Cicindela*)
(Ent. Mitt. 16, Nr. 1, 57, Fig. 2)
♀ Holotypus, Küstengebiet des Persischen Golfes, Bender Abbas, leg. SCHMIDT [27.—29. V. 1926]; im DEI.

schultzei HORN, 1908 (*Prothyma*)
(Philipp. Journ. Sc. 3, 273)
Syntypen, Philippinen: 2 ♂♂, Insula Romblon, No. 2049, 1 ♀, Insula Sibuyan, No. 1965; leg. GREGOR; in Coll. „Bureau of Science", Manilensis.
DEI: 1 ♂ Syntypus, Insula Romblon, leg. GREGOR, Acc. No. 2049.

schultzeorum HORN, 1904 (*Megacephala*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 430)
♀ Holotypus, Kamerun, Yola, 20. V. 1903, leg. SCHULTZE; im DEI.

schwarzi HORN, 1923 (*Cicindela*)
(Zool. Jahrb. 47, Abt. Syst., 324, f, c)
♂♂, 6 ♀♀, Syntypen; am Licht, Panama, Ancon, IV. 1911, leg. KRAFT; Canalzone, Alt-Panama, 15. V. 1909/49. II. 1912.
DEI: 1 Ex. Old Pan., Beach, 1 ♀, Old Panama, R. of. Pan., 15. V. 1909, 1 ♂, 1 ♀, arc-light globe Ancon, CZ Pan, IV. 1911, leg. KRAFT; ex Coll. JENNINGS: Syntypen.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

scitula SLOANE, 1909 (*Cicindela*)

(Proc. Linn. Soc. N. S. Wales **34**, 298)

♂ Holotypus, Australia, Northern Territory, Pine Creek Distr., durch FRENCH an SLOANE; [VII. 1909] im DEI.

scripta HORN, 1891 (*Cicindela*)

(In: HORN & ROESCHKE, Mon. pal. Cic., 141—143)

Süd-Ost-Rußland, Charkow, Kurusch, Derbent etc., mehrere Syntypen.
DEI: 1 Syntypus, Caucasus, durch STAUDINGER.

seidlitzii KRAATZ, 1890 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 111)

Mehrere Syntypen, wahrscheinlich ehemals Siebenbürgen.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *elegans* FISCHER, 1823—1824.

seleiensis NIDEK, 1955 (*Cicindela*)

(Ent. Bl. **50** (1954), 232, Fig. 1—3)

♂ Holotypus, 2 ♂♂, Paratypen, Saleier, leg. KALIS, in Coll. v. NIDEK.
DEI: 1 ♂ Paratypus, Celebes, Ins. Saleier, XII. 1938, leg. KALIS.

semicincta HORN, 1892 (*Odontochila*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 69)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, ohne Fundort, ex Coll. RICHTER; im DEI.
Syn. zu *batesi* CHAUDOIR, 1860.

* ***semilevis*** HORN, 1897 (*Dromica*)

(Ent. Nachr. **23**, 98)

♂ Holotypus, Zululand, ex. Coll. DOKHTOUROFF; im DEI.

semperi HORN, 1893 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 320)

♂ Holotypus, Insel Philippinen; im DEI.

septentrionale FLEUTIAUX, 1903 (*Pogonostoma*)

(Bull. Soc. Ent. Fr., 172)

Mehrere Syntypen, Madagascar, Diego-Suarez, montagne d'Ambre, durch DONCKIER.
DEI: Madagascar, Diego Suarez, durch DONCKIER, 2 Syntypen.

sericeolongicornis HORN, 1926 (*Cicindela*)

(Ent. Mitt. **15**, 76)

2 ♀♀, Syntypen, Uganda, Gulu, IV.—V. 1925, leg. CARPENTER.
DEI: 1 ♀ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

sericeus CASEY, 1897 (*Dromochorus*)

(Ann. New York Acad. Sc., 294)

2 ♂♂, 1 ♀ Syntypen, Texas.
DEI: 1 Syntypus, Texas, durch CASEY.
Syn. zu *belfragei* SALLÉ, 1877.

seriegutta HORN, 1934 (*Cicindela*)

(*Mém.* Acad. Malgache, **20**, 28, Fig. 20)

5 ♂♂, 1 ♀ Syntypen, N.-W. Madagascar, Antseva, Ambobako, Riv. Ramena, XI. 1933/I., II.1934, leg. MELLIS; im DEI.

seriepunctata HORN, 1892 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 80)

2 ♂♂, Syntypen, Darjeeling, von ATKINSON, ex Coll. RICHTER; im DEI.

seriepunctata HORN, 1929 (*Dromica*)

(Stett. Ent. Ztg. **90**, 312—313)

Mehrere Syntypen, Katanga, Kinda, via STAUDINGER & BANG-HAAS an HORN.
DEI: 9 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

serietuberculata HORN, 1929 (*Dromica*)

(Stett. Ent. Ztg. **90**, 314)

Syntypen, Katanga: 1 ♀, Kinda, via STAUDINGER & BANG-HAAS an HORN; 1 ♀, Kafakumba, via LE MOULT an HORN; im DEI.

setosula HORN, 1909 (*Dromica*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 92)

♀ Holotypus, Africa centralis, Kwango-District; im DEI.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

sexmaculata PÉRINGUEY, 1893 (*Cosmema*)

(Trans. S. Afr. Phil. Soc. 7, 85, Taf. 2, Fig. 8)

Mehrere Syntypen, South Africa, Transvaal, Lydenburg, Potchefstroom, Delagoa Bay, teste CHAUDOIR.
DEI: 1 Syntypus, Potchefstroom, N. 64, ex Coll. PÉRINGUEY.
Syn. zu *citreoguttata* CHAUDOIR, 1864.

shirakii HORN, 1927 (*Cicindela*)

(Wien. Ent. Ztg. 44, Nr. 1 u. 2, 41)

4 Syntypen, Formosa: 1 ♂, 1 ♀, Roeichi, nördlich-zentrales Formosa, ca. 8000 Fuß hoch, 14. IV. 1924; 1 ♂, 1 ♀, Tattaka, mittleres-zentrales Formosa, ca. 9000 Fuß hoch, 20. V. 1924; leg. SHIRAKI.
DEI: Syntypen, Formosa: 1 Ex. Roeichi, 15. IV. 1924 (nicht 14. IV. 1924!); 1 Ex. Tattaka, 20. V. 1924, ex Coll. LE MOULT.

sicardi HORN, 1927 (*Pogonostoma*)

(Wien. Ent. Ztg. 44, Nr. 1 u. 2, 38)

Madagascar borealis, Mont d'Ambre, leg. SICARD, via SICARD an HORN, ♂ Holotypus; im DEI.

sicheli THOMSON, 1857 (*Manticora*)

(Mon. Cic., 9, Taf. 2, Fig. 7, 8, 10)

Syntypen, Frontiére de la Cafferie; 1 ♂, in Coll. THOMSON, 1 ♂, 1 ♀, in Coll. MNISZECH, provenant de l'ancienne Coll. SAFFERLING.
DEI: 1 ♂ Syntypus, Cape, ex Coll. V. DE POLL.
Syn. zu *tuberculata* GEER, 1778.

signata HORN, 1902 (*Collyris*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 69)

Mehrere Syntypen, Tonkin, Montes Mauson, IV.–V. 1900, 2–3000′ leg. FRUHSTORFER.
DEI: 6 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

sikorae HORN, 1896 (*Megalomma*)

(Ent. Nachr. 22, 342)

♀ Holotypus, Madagascar, am Fuß des östl. Hochplateaus, leg. SIKORA; im DEI.

sikorae HORN, 1894 (*Pogonostoma*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 239)

Madagascar, durch SIKORA, 1 ♀; in Coll. SRNKA 1 ♂: Syntypen.
DEI: 1 ♀ Syntypus, Madagascar, durch SIKORA.

similis HORN, 1892 (*Euryoda*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 70)

1♀, Guinea; 1 ♀, im Museum Berlin; Syntypen.
DEI: 1 ♀ Syntypus, Guinea.
Syn. zu *versicolor* DEJEAN, 1825.

similis HORN, 1892 (*Oxychila*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 89)

♀ Holotypus, Rio Grande do Sul; [durch STAUDINGER] im DEI.

simpliceps HORN, 1900 (*Ctenostoma*)

(Dtschr. Ent. Ztschr., 361)

♀ Holotypus, Rio de Janeiro; im DEI.

simulator HORN, 1894 (*Odontochila*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 223)

♂ Holotypus, Columbia; im DEI.

simulatrix HORN, 1896 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 150)

♂ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, Ins. Philipp.; in Coll. ROTHSCHILD und Coll. HORN.
DEI: 1 ♀ Paratypus, Ins. Philipp.

sinaloae BATES, 1890 (*Cicindela*)

(Trans. Ent. Soc. London, 505)

Mexico, Mazatlan, leg. HÖGE, mehrere Syntypen.
DEI: 1 ♂, 2 ♀♀, Mazatlan, in Sinaloa, leg. HÖGE.

singularis FLEUTIAUX, 1899 (*Metopon*)

(Bull. Soc. Ent. Fr., 255)

Mehrere Syntypen, Brésil, Jatahy, Prov. de Goyas.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

singularis somolica MANDL, 1959 (*Cicindela*)

(Bonn. Zool. Beitr. **10**, Nr. 1–2, 101)

♂ Holotypus, 12 Paratypen, Berbera, leg. MARTIN, im Museum ALEXANDER KOENIG und in Coll. MANDL.
DEI: 1 Paratypus, Berbera, leg. MARTIN.

sinuosa BRULLÉ, 1837 (*Cicindela*)

(Voyage Orbigny, Ins. Col., 8)

Mehrere Syntypen, am Ufer des Parana, Corrientes, leg. ORBIGNY.
DEI: 1 Syntypus, Parana, leg. ORBIGNY, durch SPENGER, Coll. WEBER.

sjöstedti HORN, 1927 (*Cicindela*)

(Wien. Ent. Ztg. **44**, Nr. 1 u. 2, 42–43)

British-Ost Afrika, Gilgil, 8000 Fuß hoch, IV., leg. SANDBERG, mehrere Syntypen, im Museum Stockholm und in Coll. HORN.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

sloanei HORN, 1920 (*Megacephala*)

(Ark. Zool. **13**, nr. 11, 2)

♀ Holotypus, Australia; im DEI.

smaragdina HORN, 1894 (*Collyris*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 220)

♀ Holotypus, Ind. or.; [durch DEYROLLE] im DEI.

soalalae FAIRMAIRE, 1903 (*Cicindela*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. **47**, 358)

Mehrere Syntypen, Région Malgache, Soalala, Ankarahitra, leg. PERRIER.
DEI: 2 Ex. Soalala, 1 Ex. Ankarahis; leg. PERRIER: Syntypen. Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Ankarahitra" steht auf dem Etikett „Ankarahis".

sobrina erichsoni HORN, 1892 (*Tetracha*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 369)

♂ Holotypus, ohne Fundort, ex Coll. RICHTER; im DEI.

sobrina globosicollis HORN, 1914 (*Megacephala*)

(Arch. Naturg. **79**, A 11 (1913), 5)

Mehrere ♂♂, Syntypen, Britisch-, Holländisch- und Französisch Guyana.
DEI: 1 ♂, Br. Guyana, durch STAUDINGER; 1 ♂, Surinam, Coll. SCHAUM; 1 ♂, Cayenne, Armitage, durch BATES; 1 ♂, Blanc: Syntypen.

solskyi DOKHTOUROFF, 1882 (*Cicindela*)

(Rev. Ent. **1**, 275)

Mehrere Syntypen, Malacca, in Coll. DOKHTOUROFF.
DEI: 1 Syntypus, Malacca.
Syn. zu *conicollis* SCHAUM, 1862.

soror HORN, 1935 (*Cosmema*)

(Stett. Ent. Ztg. **96**, 163)

♀ Holotypus, W. Afrika, Angola, Benguella, 1913, ex Coll. PLASON, via STAUDINGER & BANG-HAAS an HORN; im DEI.

sparsimpilosa HORN, 1914 (*Cicindela*)

(Arch. Naturg. **79**, A 11 (1913), 29)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Port Darwin, Palmerston, XI. 1908, leg. DODD; im DEI.

speciosula HORN, 1892 (*Collyris*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 361)

Mehrere Syntypen, Palawan.
DEI: 4 Syntypen, Palawan, durch STAUDINGER.

spectabilis PÉRINGUEY, 1893 (*Myrmecoptera*)

(Trans. S. Afr. Phil. Soc. **7**, 64)

Mehrere Syntypen, South Africa, Zambezia.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, ex Coll. PÉRINGUEY.

spectabilis inhumerosa HORN, 1928 (*Therates*)

(Koleopt. Rundsch. **14**, 169)

♂ Holotypus, Ost-Borneo, Mamakan-Fluß, Songei Boh, Coll. MJÖBERG; im DEI.

speculifera HORN, 1934 (*Prothyma*)

(Mém. Acad. Malgache **20**, 27)

Mehrere Ex. Madagascar, merid. Ampandradava, Bekily, 1 ♂, Ambovombé, 3. IV. 1932, 1 ♀, M-gne Kalambatitra, I. 1933; leg. SEYRIG; im Museum Paris und in Coll. HORN: Syntypen.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

DEI: 29 Ex. S. Madagaskar, Ampandrandava, 1 Ex. Kalambatitra, I. 1933; leg. SEYRIG: Syntypen.
Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Ampandradava" steht auf dem Etikett „Ampandrandava".

spenceri SLOANE, 1897 (*Megacephala*)
(Proc. Linn. Soc. N. S. Wales **22**, 33)

Mehrere Syntypen, West-Australia, Murchison River, Coll. FRENCH.
DEI: 1 ♀ Syntypus, West-Australia, Murchison River.

sphaericollis HORN, 1931 (*Cicindela*)
(Ent. Nachr. **5**, 3–4)

♂ Holotypus, Celebes, Macassar, Coll. V. DE POLL; im DEI.

spinicollis HORN, 1908 (*Cicindela*)
(Journ. Asiat. Soc. Bengal, Straits Branch, **50**, 100)

♀ Holotypus, North Borneo; im DEI.

spinipenne HORN, 1893 (*Pogonostoma*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 13)

♀ Holotypus, aus dem Innern von Madagascar, leg. HILDEBRANDT; [ex. Coll. RICHTER] im DEI.
Syn. zu *chalybaeum* KLUG, 1835.

spinolae GESTRO, 1889 (*Cicindela*)
(Ann. Mus. Genova (2) **7**, 85)

Mehrere Ex. Birmania, Teinzò, V., Bhamo, VI.; 1 Ex. Meetan, Tenasserim, IV.; in Coll. FEA: Syntypen.
DEI: 2 Syntypen, Birmania, Teinzò, 1886, Coll. FEA.

spinosa violaceanigra MANDL, 1956 (*Megacephala*)
(Opusc. Zool. München **11**, 3)

Bolivia, Region Amazonica, Trinidad, X. 1951, leg. ZISCHKA, in Coll. ZISCHKA und Coll. MANDL, ♂ Holotypus, 6 Paratypen.
DEI: 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

spuria HORN, 1892 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 360)

♂ Holotypus, Sumatra, ex Coll. RICHTER; im DEI.
Syn. zu *cruentata* SCHMIDT-GOEBEL, 1846.

srnkae HORN, 1893 (*Pogonostoma*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 15)

♀ Holotypus, Madagascar, durch SRNKA; im DEI.

staudingeri HORN, 1892 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 368)

Mehrere Syntypen, Sao Paulo, durch STAUDINGER.
DEI: 5 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
Syn. zu *chlorosticta* KOLLAR, 1836.

staudingeri KRAATZ, 1883 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. **27**, 337)

5 Syntypen, Turkestan, Osch.
DEI: 1 Ex. Turkestan Osch., Coll. KRAATZ, ex cab. STAUDINGER-Coll. v. DE POLL; 1 Ex. ohne Fundort, Coll. KRAATZ: Syntypen.
Syn. zu *sturmi* MÉNÉTRIÉS, 1832.

sternbergi HORN, 1898 (*Odontochila*)
(Not. Leyd. Mus. **20**, 101)

♂ Holotypus, Venezuela, Coll. STERNBERG; im DEI.

stiengensis HORN, 1914 (*Collyris*)
(Ann. Soc. Ent. Belg. **58**, 138)

♀ Holotypus, Cochinchine, Stieng, ex Coll. CASTELNAU-Coll. BROWN-Coll. EHLERS v. DE POLL; im DEI.

strachani HOPE, 1842 (*Calochroa*)
(Ann. Mag. Nat. Hist. **10**, 91)

Mehrere Syntypen, Sierra Leone, leg. STRACHAN.
DEI: 2 Syntypen, Guinea, ex Coll. DOKHTOUROFF.

strandi HORN, 1914 (*Dromica*)
(Arch. Naturg. **79**, A 11 (1913), 11)

♀ Holotypus, Südost Angola; im DEI.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

strandi HORN, 1914 (*Oxychila*)
(Arch. Naturg. **79**, A 11 (1913), 7)
♂ Holotypus, Peru, Chanchamayo, leg. HEYNE.

strandi crebrepunctata HORN, 1929 (*Dromica*)
(Stett. Ent. Ztg. **90**, 315)
♀Holotypus, Katanga, Kawa-Fluß, XII. 1925, via LE MOULT an HORN; im DEI.

striolata auricollis FLEUTIAUX, 1886 (*Cicindela*)
(Compt. rend. Soc. Ent. Belg., 88)
1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Sumbava.
DEI: 1 ♀ Syntypus, Sumbava, ex Coll. FLEUTIAUX.

striolata uniens HORN, 1896 (*Cicindela*)
(Stett. Ent. Ztg. **57**, 174)
S.-Palawan und Balabak, mehrere Syntypen.
DEI: 3 Ex. S.-Palawan, 6 Ex. Balabak; durch STAUDINGER: Syntypen.

striolata wetterensis HORN, 1914 (*Cicindela*)
(Arch. Naturg. **79**, A 11 (1913), 28)
♀ Holotypus, Insel Wetter, 1901, leg. KÜHN; [Asia Arch.] im DEI.

stutzeri HORN, 1913 (*Dromica*)
(Rev. Zool. Afr. **2**, 272)
Belg. Congo: 1 ♀, Katanga, leg. STUTZER; mehrere Ex. Elisabethville, 14. XI. 1911, leg. BEQUAERT und Miss. AGRIC. LEPLAE, im Musée du Congo: Syntypen.
DEI: Belg. Congo; 1 ♀, Katanga, leg. STUTZER; 3 Ex. Elisabethville, 14. XI. 1911, Miss. AGRIC. LEPLAE: Syntypen.

suavis HORN, 1896 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 151)
♀ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, Lucon merid., Albay, leg. WHITEHEAD, 94; in Coll. ROTHSCHILD und Coll. HORN.
DEI: 1 ♀ Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

subfasciata HORN, 1892 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 370)
♂ Holotypus, Sumatra, ex Coll. RICHTER; im DEI.
Syn. zu *discreta* SCHAUM, 1863.

sublacerata SOLSKY, 1874 (*Cicindela*)
(Reise Turk. FEDTSCHENKO, Col., 8)
Mehrere Syntypen, bei der Stadt Kokan, 10. VI. 1871, 7. VI., auf der Strecke Mochrama—Biš-Aryk; leg. FEDTSCHENKO-Exped. Turk.
DEI: 1 Ex. Turkmenien, 1 Ex. ohne Fundort, ex Coll. RICHTER: Syntypen.

submetallicus niger CAZIER, 1937 (*Omus*)
(Pan-Pacific Ent. **13**, 94)
♂ Holotypus (No. 4478 C. A. S. Ent.), Paratypen; 1 ♀ (No. 4479 C. A. S. Ent.) und mehrere Ex.; California, Wartham Canyen, Fresno Co., 26. III. 1937, leg. BLUM, 18. III. 1928, leg. WAGNER; in Coll. WAGNER, Coll. BLUM, Coll. NUTTING und Coll. CAZIER.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, 26. III. 1937, leg. BLUM.

subtilis HORN, 1904 (*Pogonostoma*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. **1**, 81)
Mehrere Syntypen, Diego-Suarez.
DEI: 5 Syntypen, Madagascar, Diego Suarez, 1893, leg. ALLUAUD.

subtilobscurata HORN, 1925 (*Collyris*)
(Ent. Bl. **21**, 133)
♀ Holotypus, Basilan; im DEI.

subvittata KRAATZ, 1890 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 368)
Mehrere Syntypen, ohne Fundort.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *atrata* PALLAS, 1776.

sumatrensis HORN, 1896 (*Collyris*)
(Stett. Ent. Ztg. **57**, 176)
Mehrere Syntypen, Insel Sumatra, Mitt I. 1894, leg. DOHRN.
DEI: 1 Syntypus, Soekaranda, I. 1894, leg. DOHRN.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

suturalis HORN, 1900 (*Tetracha*)

(Ent. Nachr. **26**, 53)

Ecuador, Posorja, leg. CAMPOS, mehrere Syntypen.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

tascosaensis DAVIS, 1918 (*Cicindela*)

(Bull. Brookl. Ent. Soc. **13**, 33—34, Taf. 2)

♂ Holotypus, mehrere Paratypen, Texas, Tascosa, V. 1917, in Coll. DAVIS, Coll. HARRIS und Coll. LENG.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.
Syn. zu *roseiventris* CHEVROLAT, 1834.

tenella PÉRINGUEY, 1893 (*Myrmecoptera*)

(Trans. S. Afr. Phil. Soc. **7**, 63—64)

♂ Holotypus, South Africa, Barberton, Transvaal.
DEI: ♂ Holotypus, ohne Fundort, ex Coll. PÉRINGUEY.

tenellula HORN, 1903 (*Dromica*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 317)

Gazaland, Mt. Chirinda, XII., leg. MARSHALL, mehrere Syntypen.
DEI: 5 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

tenuilineata HORN, 1892 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 80)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Madagascar, ex Coll. RICHTER.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
Syn. zu *melancholica* FABRICIUS, 1798.

terminalis completesignata HORN, 1929 (*Cicindela*)

(Journ. F. M. S. Mus. **14**, 468)

Mehrere Syntypen, Britisch Nord-Borneo, Kudat, 1st—10th. IX.
DEI: 5 Syntypen, N. Borneo, Kudat, 2., 3., 9., 10. IX. 1927.

tetradia FAIRMAIRE, 1899 (*Cicindela*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. **43**, 511)

Mehrere Syntypen, Malgache, Vallée de la Betsiboka, leg. PERRIER.
DEI: 1 Syntypus, Madagascar, Suberb^{lle}, leg. PERRIER.

thebana VRIES VAN DOESBURGH, 1895 (*Cicindela*)

(Tijdschr. Ent. **38**, 4—5, Fig.)

9 Syntypen, Aegypten, Karnak, am Ufer des Nils.
DEI: 1 Syntypus, Aegypten, Karnak, 1893.
Syn. zu *trisignata* DEJEAN, 1822.

thierfelderi HORN, 1925 (*Distipsidera*)

(Ent. Mitt. **14**, 179)

♀ Holotypus, Südküste vom Holländischen Neu-Guinea, leg THIERFELDER, durch METHNER; im DEI.

thomsoni HORN, 1894 (*Collyris*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 217)

♂ Holotypus, Penang [ohne Fundort]; im DEI.

thomsoni DOKHTOUROFF, 1882 (*Tetracha*)

(Spec. Cic. **1**, 61)

2 Syntypen, Bolivie, in Coll. DOKHTOUROFF.
DEI: 1 Syntypus, Bolivie, durch STAUDINGER.
Syn. zu *coerulea* LUCAS, 1857.

thoracica HORN, 1892 (*Tetracha*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 90)

♀ Holotypus, Amazonen-Strom [ex Coll. RICHTER]; im DEI.
Syn. zu *affinis* DEJEAN, 1825.

tonkinensis HORN, 1902 (*Therates*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 73)

Mehrere Syntypen, Tonkin, Montes Mauson, IV.—V. 1900, 2—3000', leg. FRUHSTORFER.
DEI: 9 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

traducens HORN, 1903 (*Dromica*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 316)

♂ Holotypus, Gazaland, Up. Busi R., XII. 1901, leg. MARSHALL; im DEI.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

transwaalensis DOKHTOUROFF, 1883 (*Dromica*)

(Rev. Mens. Ent. **1**, 9)

Mehrere Syntypen, Transvaal, in Coll. DOKHTOUROFF.
DEI: 1 Syntypus, Transvaal.
Syn. zu *furcata* BOHEMAN, 1848.

tremolerasi HORN, 1909 (*Megacephala*)

(Rev. Mus. La Plata **16**, 32)

Syntypen: 1 ♂, 2 ♀♀, Uruguay, Salto, leg. TREMOLERAS, in Coll. HORN; 1 ♀, von SILVESTRI, XI. 1899, in Entre Rios provincia illa Argentiniae, leg. CONCORDIAM.
DEI: 1 ♂, 2 ♀♀, mit den Angaben der Beschreibung: Syntypen.

tricostata HORN, 1897 (*Dromica*)

(Ent. Nachr. **23**, 237)

♀ Holotypus, Afrika, Benguela; [DEYROLLE] im DEI.

tricostulata HORN, 1932 (*Dromica*)

(Mitt. Schweiz. Ent. Ges. **15**, 200—201 (Separat-Abdruck)).

♀ Holotypus, Angola merid., Fluß („mulola"), Chimporo, XI., leg. MONARD, Miss. Scient. Suisse 1928/29; im DEI.

tricuspipenis HORN, 1932 (*Odontochila*)

(Rev. Ent. **2**, 409—410)

1 ♂, Rio Anajas, Para, VI., 1 ♂, ohne Fundort: Syntypen; im DEI.

trifasciata boliviana MANDL, 1956 (*Cicindela*)

(Ent. Arb. Mus. G. FREY **7**, 386—387)

♀ Holotypus, 4 Paratypen, Bolivia tropica, Santa Cruz, 500 m ü. M., 20. X. 1954, leg. ZISCHKA, in Coll. ZISCHKA.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

trifasciata latioresignata MANDL, 1967 (*Cicindela*)

(Ent. Arb. Mus. G. FREY **8**, 435—437)

♂ Holotypus, Nord-Peru, Puerto Pizarro, 14 km nördl. v. Tumbas, 1. V. 1959, leg. WEYRAUCH; 17 Paratypen, dto.
DEI: 4 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

triramosa KOLLAR, 1836 (*Cicindela*)

(Ann. Hofmus. Wien, 330)

Mehrere Syntypen, Ind. or., Madras.
DEI: 1 Syntypus, Madras.
Syn. zu *cognata* WIEDEMANN, 1823.

trispecularis HORN, 1895 (*Pentacomia*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 358)

♂ Holotypus, Brasilia; im DEI.
Syn. zu *degandei* TATUM, 1851.

tristis pseudofemoralis HORN, 1938 (*Oxychila*)

(Ent. Beih. **5**, 22)

1 ♂, 1 ♀, Gebirge von Rio Grande do Sul bei Taquara, II. 1926, leg. EMRICH; 1 ♀, Brasilien: Syntypen.
DEI: 1 ♀, Süd-Brasilien, S. Francisco de Paulo, leg. EMRICH; 1 ♂, S. Francisco de Paulo, mit den Angaben der Beschreibung; 1 ♀, Brésil.

tristis pseudonigroaenea HORN, 1938 (*Oxychila*)

(Ent. Beih. **5**, 25)

Mehrere Syntypen, Peru, Chanchamayo, 1500 m, leg. HEYNE, Cuzco, 2—3000 m und Pozuzo, leg. ROLLE und FASSL, Quiroz, am Rio Pancartambu, 10. XI. 1933, leg. WARD.
DEI: Syntypen, Peru: 3 Ex. Chanchamayo, 1500 m, leg. HEYNE; 2 Ex. Cuzco, 2—3000 m, 1 Ex. Pozuzo; leg. ROLLE; 2 Ex. Quiroz, Rio Pancartambu, 10. XI. 1933, leg. WARD.

tritoma FLEUTIAUX, 1893 (*Cicindela*)

(Ann. Soc. Ent. Fr. **62**, 493, Fig.)

Mehrere Syntypen, Birmanie, Cochinchine, im Museum Paris und Genua.
DEI: 2 ♀♀, Syntypen, Birmanie, Teinzò, 1886, durch FEA.
Syn. zu *mouhoti* CHAUDOIR, 1865.

triumphalis HORN, 1902 (*Euryoda*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 75)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Tonkin, Montes Mauson, IV.—V. 1900, 2—3000', leg. FRUHSTORFER; im DEI.

truncatilabris FAIRMAIRE, 1897 (*Cicindela*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. **41**, 364)

Mehrere Syntypen, Malgache, Suberbieville, leg. PERRIER, in Coll. OBERTHÜR.
DEI: 1 Syntypus, Madagascar, durch FAIRMAIRE.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

tuolumnae LENG, 1902 (*Cicindela*)

(Trans. Amer. Ent. Soc. **28**, 157)

Nord-Amerika, Hetch Hetchy Valley, Tuolumne Co., Cal., leg. VAN DYKE, mehrere Syntypen.
DEI: 1 Syntypus, Tuolumne Co. Cal., leg. VAN DYKE.
Syn. zu *pusilla* SAY, 1817.

umfuliana PÉRINGUEY, 1896 (*Myrmecoptera*)

(Trans. S. Afr. Phil. Soc. **7**, 116)

Mehrere Syntypen, South Africa, Zambezia, Umfuli River.
DEI: 1 ♀, Zambezia, Buluwayo, 1 ♂, Mashunaland, ex. Coll. PÉRINGUEY: Syntypen.
Syn. zu *mauchi* BATES, 1872.

uncifera HORN, 1901 (*Oxygonia*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 124)

Mehrere Syntypen, Ecuador, leg. HAENSCH.
DEI: 3 ♂♂, Syntypen, Ecuador, Santa Inéz, leg. HAENSCH.

unicolor HORN, 1892 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 86; nom. praeocc. = *rufoaenea* HORN, 1915, Gen. Ins. Cic., 402)

♂ Holotypus, Argentinisches Hochgebirge, leg. KLÄGER; im DEI.

unicolor HORN, 1935 (*Collyris*)

(Koleopt. Rundsch. **21**, 52)

♀ Holotypus, Laos, Stadt Ju, IV.; im DEI.

uniformis HORN, 1900 (*Oxygonia*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 201)

♂ Holotypus, Ecuador; im DEI.

upangwana MANDL, 1964 (*Neochila*)

(Rev. Zool. Bot. Afr. **69**, Nr. 3—4, 306—307)

♀ Holotypus (No 558), Dtsch. O. Afr., Upangwa, STAUDINGER; 1 ♀ Paratypus (No 559), dto.; in Coll. HORN; im DEI.

van hageni MUTCHLER, 1938 (*Cicindela*)

(Amer. Mus. Novit. no. 981, 2, Fig.)

♂ Holotypus, 1 ♂, 7 ♀♀ (1 ♀ schlecht erhalten); Paratypen, Galapagos, Indefatigable Island, 13. XI. 1935 at 7:30 A. M., leg. v. HAGEN, im American Museum.
DEI: 1 ♀ Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

variventris QUEDENFELDT, 1883 (*Cicindela*)

(Berl. Ent. Ztschr. **27**, 245)

Angola, Malange, leg. v. MECHOW, mehrere Syntypen.
DEI: 1 Syntypus, Malange, ex Coll. RICHTER.
Syn. zu *erythropyga* PUTZEY, 1880.

ventanasa BATES, 1890 (*Cicindela*)

(Trans. Ent. Soc. London, 503)

Mehrere Syntypen, Mexico, Ventanas in Durango, La Noria in Sinaloa, leg. HÖGE.
DEI: 1 Syntypus, Ventanas, Durango, leg. HÖGE.
Syn. zu *rufiventris* DEJEAN, 1825.

ventralis obscuriventris HORN, 1933 (*Prepusa*)

(Rev. Chil. Hist. Nat. **37**, 77)

4 ♂♂, 1 ♀ Syntypen, Amazonas, Sao Paulo de Olivença, II., III. 1932, leg. WUCHERPFENNIG; im DEI.

venus HORN, 1907 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 22)

Mehrere Syntypen, Nilgiri Hills, leg. ANDREWES; in Coll. HORN und Coll. ANDREWES.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

vermifera HORN, 1908 (*Heptodonta*)

(Ent. Wochenbl. **25**, 84)

3 ♂♂ Syntypen, Yunnan; im DEI.

versicolor bottegoi HORN, 1896—1897 (*Euryoda*)

(Ann. Mus. Genova (2) **17**, 268)

Syntypen, Somali; am Berg Egherta, X. 1895, leg. BOTTEGO; 1 ♂, 1 ♀, Scioa, Kaka, IV., Arramba, IX. 1877, leg. ANTINORI; im Museum Genua.
DEI: 1 ♂ Syntypus, Scioa, Arramba, IX. 1877, leg. ANTINORI.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

versicolor duplicata HORN, 1923 (*Prothyma*)

(Zool. Jahrb. **47**, Abt. Syst. 318)

♂ Holotypus, Brit. Ost-Afrika, Liban [Süd Abessin]; im DEI.

vestitum FAIRMAIRE, 1900 (*Pogonostoma*)

(Bull. Soc. Ent. Fr., 134)

Mehrere Syntypen, Madagascar, Environs de Suberbieville, leg. PERRIER.
DEI: 1 Ex. ohne Fundort, durch FAIRMAIRE; 1 Ex. Madagascar, Suberbieville; leg. PERRIER: Syntypen.

vicina confluentesubtilis HORN, 1914 (*Cicindela*)

(Rev. Zool. Afr. **3**, 421)

Syntypen, Belg. Congo; 1 ♂, Kapiri, IX. 1912; mehrere Ex. Mufungwa, 1.—16. XII. 1911, leg. BEQUAERT, im Musée du Congo, Tervueren und in Coll. HORN.
DEI: 2 Syntypen, Belg. Congo, Mufungwa, 1.—16. XII. 1911, leg. BEQUAERT.

virginalis HORN, 1901 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 358)

♀ Holotypus, Luzon, SEMPER; im DEI.

virgulata FAIRMAIRE, 1904 (*Euryoda*)

(Bull. Soc. Ent. Fr., 128)

Mehrere Syntypen, Madagascar, Namoroka, Ambongo, leg. PERRIER.
DEI: 1 Ex., mit den Angaben der Beschreibung; 1 Ex. ohne Fundort; Syntypen.

viridescens HORN, 1894 (*Collyris*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 219)

♂ Holotypus, Java, Preanger [Larvang, durch STAUDINGER]; im DEI.
Syn. zu *rugosa* CHAUDOIR, 1864.

viridicincta HORN, 1894 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 173)

Mehrere Syntypen, Vorder-Indien, Nord-Canara, leg. ANDREWES.
DEI: 3 Syntypen, Canara, 94, leg. ANDREWES.

viridicyanea natalia HORN, 1934 (*Prothyma*)

(Mém. Acad. Malgache **20**, 23—24, Fig. 21)

Mehrere Syntypen, Madagaskar, Forêt Périnet-Analamazaotra, 5.—18. XII. 1930, leg. NATALIE OLSOUFIEFF.
DEI: 18 Syntypen, Forêt Analamazotra-Perinet, 5., 5.—10., 12.—13., 15.—18. XII. 1930, leg. OLSOUFIEFF.
Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Analamazaotra" steht auf dem Etikett „Analamazotra".

viridicyanea subtilevelutina HORN, 1934 (*Prothyma*)

(Mém. Acad. Malgache **20**, 24)

♀ Holotypus, Madagascar; im DEI.

viridiflavescens HORN, 1923 (*Cicindela*)

(Zool. Jahrb. **47**, Abt. Syst., 329)

Mehrere Syntypen, San Domingo, Ihaituba, X. 1922, leg. KAEMPFER.
DEI: 7 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

viridiflavescens originalis HORN, 1936 (*Cicindela*)

(Ent. Bl. **32**, 23—24)

4 ♂♂, 1 ♀ Syntypen, Haiti, zwischen Kenskoff und Furcy, 5000' hoch, 23. IX. 1934, leg. DARLINGTON jr., im Museum Comp. Zool. Cambridge und in Coll. HORN.
DEI: 2 ♂♂, Syntypen, Auto Rd., Furcy-Kenskoff, Mt. La Selle, 5000 ft., IX. 1923, Haiti, 1934, leg. DARLINGTON.

viridis RAFFRAY, 1882 (*Cicindela*)

(Bull. Soc. Ent. Fr. 47)

Mehrere Syntypen, Abyssinie, Adoua.
DEI: 1 Syntypus, Abyssinie, Adoua.

viridisticta interjecta HORN, 1935 (*Cicindela*)

(Pan-Pacific Ent. **11**, 65)

4 ♀♀, Syntypen, Mexico, Jalisco, nahe Guadalajaram, 3. XII. 1903, leg. CLENDON, ex Coll. BONDITCH, im Museum Cambridge, Mass. und in Coll. HORN.
DEI: 2 ♀♀, Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

vitalisi HORN, 1924 (*Collyris*)

(Faune Opusc. Inst. Sc. Indochine, nr. 3, 10)

♂ Holotypus, Annam, Giaray, 2. II. 1921, leg. DE SALVAZA; im DEI.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

vuilletorum HORN, 1914 (*Cicindela*)

(Rev. Zool. Afr. **3**, 427)

3 ♀♀, 1 ♂ Syntypen, Soudan Franc., Haut-Sénégal-Niger, Koulikoro, VII., leg. VUILLET; 1 ♂, Kati, VII. 1913, leg. FOUQUET, in Coll. FLEUTIAUX.
DEI: 1 ♂, 3 ♀♀, Syntypen, Koulikoro, 7. VII. 1911, leg. VUILLET.

waageni HORN, 1900 (*Euryoda*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 198)

♂ Holotypus, Sudan orient., Fassoglu; im DEI.

waagenorum HORN, 1900 (*Therates*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 198)

♀ Holotypus, nahe der Berge Darjeeling (Darjiling), leg. v. WAAGEN; im DEI.

waterhousei HORN, 1900 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 206)

♀ Holotypus, Ceylon, via Britisches Museum an HORN; im DEI.

wellmani HORN, 1907 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 421)

♂ Holotypus, Angola, Ciyaka, 6000′, IX.—X. 1906, leg. WELLMAN; im DEI.

wellmani HORN, 1908 (*Cosmema*)

(Not. Leyd. Mus. **30**, 31)

Mehrere Syntypen, Angola, Chiyaka Distr., XI. 1907, leg. WELLMAN.
DEI: 1 Ex. mit den Angaben der Beschreibung, 7 Ex. Benguella, XI. 1907, leg. WELLMAN.

wickhami HORN, 1903 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 182)

Mehrere Syntypen; S. Arizona, Tucson, 13.—15. VII., 23—2500′, leg. WICKHAM; Arizona, in Coll. KOEBELE; Mexico, in Coll. FUCHS.
DEI: 1 Ex. Ariz., Tucson, 13.—15. VII., 23—2500 ft., leg. WICKHAM; 1 Ex. Mex. LUETGENS, 1 Ex. Mexico o., Schawapp; ex Coll. FUCHS: Syntypen.

wilkinsi DOKHTOUROFF, 1885 (*Cicindela*)

(Horae Soc. Ent. Ross. **19**, 279)

♀ Holotypus, am Fluß Mouk-sòu, Karateghinoise, 8—9,000 Fuß, 16. VIII. 1878, leg. WILKINS; im DEI.
Syn. zu *granulata* GEBLER, 1843.

willeyi HORN, 1904 (*Cicindela*)

(Spol. Zeyl. **2**, 36, 41, Taf. 7, Fig. 4)

2 ♀♀, Syntypen, Ceylon, Central Province.
DEI: Ceylon: 1 ♀, Nr. 92—59, ex Britischen Museum, 1 ♀, leg. WILLEY: Syntypen.

willistoni amargosae DAHL, 1939 (*Cicindela*)

(Bull. Brooklyn ent. Soc. **34**, 221)

♂ Holotypus, California, 4 Meilen nördl. von Furnace Creek, Death Valley, Inyo County, 3. IV. 1939, leg. DAHL, in Coll. DAHL; 41 ♂♂, 51 ♀♀, Paratypen, dto., leg. HAGEN, BARR, JENSEN und DAHL; 8 Ex. in Coll. HAGEN, 4 Ex. in Coll. BARR, 15 Ex. in Coll. JENSEN, 2 Ex. in der California Academy of Sciences, 2 Ex. in Coll. HORN, 4 Ex. in Coll. CAZIER und 57 Ex. in Coll. DAHL.
DEI: 1 ♂, 1 ♀ Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

willistoni pseudosenilis HORN, 1900 (*Cicindela*)

(Ent. Nachr. **26**, 117)

Mehrere Syntypen, California, Owen's lake, Inyo Co.
DEI: Syntypen, California: 2 Ex. Owen's lake, LUETGENS, Inyo Co., 4 Ex. Inyo Co., leg. RICKSECKER, 1 Ex. LUETGENS, durch STAUDINGER.

wimmeri MANDL, 1958 (*Megacephala*)

(Kol. Rundsch. **36**, 31)

Holotypus, mehrere Paratypen, Bolivien, Santa Cruz, 500 m ü. M., leg. ZISCHKA, in Coll. MANDL, Coll. ZISCHKA, im DEI und in diversen anderen Sammlungen.
DEI: 2 Paratypen, Bolivia, oriental, Santa Cruz, 500 m, 10. X. 1954, leg. ZISCHKA.

zarudniana TSCHITSCHERIN, 1903 (*Cicindela*)

(Horae Soc. Ent. Ross. **36**, 5)

26 Syntypen, Perse orient., Neh-i-Bendan (Nihbandan), env. de Bendan, 8.—9. V. 1898, Sarhad (Serhad), Duz-ab à Podahi, 16.—24. VI. 1898, Noukabad, Kuusha, 1., 2.—5. V. 1901; leg. ZARUDNY.
DEI: 3 Syntypen, Persisch Beludzhistan, Kerman, Sarhad, 16.—24. VI. 1898, 1., 2.—3. V. 1901, leg. ZARUDNY.

zikani HORN, 1911 (*Ctenostoma*)

(Ent. Bl. **7**, 152)

Mehrere Syntypen, Minas Geraes, Mar de Hespanha, 12. XII.—7. I., leg. ZIKAN.
DEI: 4 Syntypen, Minas-Brazil, Mar de Hespanha, 12. XII. 1909/5., 7. I. 1910, leg. ZIKAN.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

zischkai MANDL, 1956 (*Cicindela*)

(Ent. Arb. Mus. G. FREY, **7**, 384—386)

♂ Holotypus, 9 Paratypen, Bolivia, 35 km NE von Cochabamba, 3500 m ü. M., 10. I. 1954, leg. ZISCHKA, in Coll. MANDL und Coll. ZISCHKA.
DEI: 1 Ex. Bolivia, 35 km NE de Cochabamba, 3500 m; 1 Ex. dto., 10. I. 1954; leg. ZISCHKA: Paratypen.

Wahrscheinlich nicht beschriebene Arten:

colossea HORN (*Cicindela*)

DEI: 3 Ex. Basse-Californie, La Paz, 2 Ex. Golfe de Californie, Ile San José; 1914, DIGUET, ex Museum Paris; 2 Ex. Mexico, Coll. CHARERI-GHILIANI-V. DE POLL-Museum Genua; Typen.

fallaciosa SCHMIDT (*Cicindela*)

DEI: 1 Type, Celebes, Menado, ex Coll. V. DE POLL.

hauseri REITTER (*Cicindela*)

DEI: 2 Typen, Turkestan, Thian-Schan.

horni PÉRINGUEY (*Myrmecoptera*)

DEI: 3 Ex. ohne Fundort, ex Coll. PÉRINGUEY; Typen.

nigropilosa HORN (*Odontochila*)

DEI: 2 Ex. Manaos, I, II, 9.-, 16.—VII. 1927, leg. ZIKAN; Typen.

oculata penthica ALLUAUD (*Cicindela*)

DEI: 1 Ex. Madagascar, Bekily 1, 1933; 1 Ex. dto. 1932; leg. SEYRIG; Paratypen.

orellana BATES (*Ctenostoma*)

DEI: 1 Typus, Ega, leg. BATES, ex cab. TURNER-Coll. V. DE POLL.

silvaticoides HORN (*Cicindela*)

DEI: 2 Ex. Sagres, V. VOLXEM, Coll. PUTZEYS; Typen.

tuberculata GESTRO (*Tricondyla*)

DEI: 2 Ex. Carin Chebà, 900—1100 m, 5. XII. 1888, leg. FEA; Typen.

yamahoi MIWA (*Cicindela*)

DEI: 1 Type, Formosa, Alikang, VII. 1932, leg. MIWA.

Zusammenfassung

Es wird ein Katalog der Cicindelidae-Typen vorgelegt, die in den Sammlungen des ehemaligen Deutschen Entomologischen Instituts aufbewahrt werden.

Summary

A catalogue of the types of Cicindelidae preserved in the collections of the former Deutsches Entomologisches Institut is presented.

Резюме

Предлагается каталог типов семейства Cicindelidae, которые хранятся в коллекциях бывшего Немецкого Энтомологического Института.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.23.5-8.355-419

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Beiträge zur Entomologie = Contributions to Entomology

Jahr/Year: 1973

Band/Volume: 23

Autor(en)/Author(s): Döbler Helga

Artikel/Article: Katalog der in den Sammlungen des ehemaligen Deutschen Entomologischen Institutes aufbewahrten Typen - IX (Coleoptera, Cicindelidae). 355-419