

Institut für Pflanzenschutzforschung (BZA)
der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR zu Berlin
Zweigstelle Eberswalde
Abteilung Taxonomie der Insekten (ehem. DEI)
Eberswalde

HELGA DÖBLER

Katalog der in den Sammlungen des ehemaligen Deutschen Entomologischen Institutes¹ aufbewahrten Typen — XII

(Coleoptera: Carabidae)

abnormicollis HEYDEN, 1882 (*Tachypus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 26, 100, 118)

♂ Holotypus, Hochgebirge um Margelan, leg. HABERHAUER, in Coll. KRAATZ; im DEI.

acroglyptus BATES, 1892 (*Colpodes*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 374)

Mehrere Syntypen, Burma; Karin Asciuii Ghecù, alt. 1400–1500 m, leg. FEA; Naga Hills, alt. 4000–5000 ft., leg. CHEN-NELL.

DEI: 1 Syntypus, Carin Asciuii Ghecù, alt. 1400–1500 m, III.–IV. 1888, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

acutipennis BATES, 1892 (*Gnathaphanus*)

(l.c., 328)

Mehrere Syntypen, Burma, Rangoon, Mandalay, Toungoo, leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Birmania, Rangoon, 1887, leg. FEA.

Syn. zu *taevistriatus* STURM, 1818.

adamsi subcyaneus KRAATZ, 1878 (*Sphodristus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 22, 101)

Mehrere Syntypen, Kaukasus, Coll. LEDER.

Lectotypenfestlegung durch MANDL (im Druck).

DEI: Lectotypus, Kaukasus, durch LEDER, Nr. 120, Coll. KRAATZ; 2 Ex. dto., 1 Ex. dto. KASBECK, 1 Ex. Coll. KRAATZ; Paralectotypen.

aegaeus APFELBECK, 1904 (*Zabrus*)

(Käferf. Balkanh. 1, 312–313)

Mehrere Syntypen, Griechenland, Attika, Kykladen, Syra, Naxos, leg. KRÜPER und LEONIS; Kreta, leg. v. OERTZEN.

DEI: 1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Syra, leg. LEONIS, Coll. FRANKLIN MÜLLER.

aeneipennis BATES, 1889 (*Drypta*)

(Ann. Mus. Genova (2) 7 (27), 109)

Mehrere Syntypen, Burma, Bhamô, leg. FEA, in Coll. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Birmania, Bhamô, VII. 1885, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

aenesceps CHAUDOIR, 1850 (*Feronia*)

(Bull. Soc. Nat. Moscou 23, 142–143)

Mehrere Syntypen, parties orientales de la Sibérie, leg. GEBLER und SÉDAKOFF.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, durch CHAUDOIR, Coll. KRAATZ, Nr. 12.

enigmaticus ALLUAUD, 1935 (*Hyperectenus*)

(Afra 9, 15–16, Fig. 7–8)

Holotypus, Camerun, leg. CONRADT, ex Coll. KRAATZ; im DEI.

aeguecostata STERNBERG, 1907 (*Anthia*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 49, 60)

3 ♂♂, Syntypen; Brit. Ostafrika, östlich vom Shire-Fluß, Blantyre; Deutsch-Ostafrika, Uhehe; in Coll. STERNBERG.
DEI: 1 ♂, Syntypus, Kigonseré, 1906, Coll. KRAATZ.

aetolica olympica MAŘAN, 1938 (*Nebria*)

(Sborn. Nar. Mus. Praze 1, No. 4, 52, 55)

ca. 150 Syntypen; Thessalia, Berg Olympos, 2000–2700 m, 1. VI. 1937, im Museum Prag.
DEI: 1 Syntypus, Graecia alpin, Olympos, 2200–2700 m.

¹ Jetzt: Institut für Pflanzenschutzforschung (BZA) der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR, Zweigstelle Eberswalde, Abteilung Taxonomie der Insekten.

aetolus SCHAUM, 1864 (*Zabrus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 8, 186)

Mehrere Syntypen, Griechenland, am Velucchi, leg. KRUEPER.
DEI: 3 Syntypen, Velucchi, Coll. SCHAUM.***afgana*** JEDLIČKA, 1956 (*Cymindis*)

(Acta Ent. Mus. Pragae 30 (1955), Nr. 452, 203)

Holotypus, 20 Paratypen, Afghanistan, Badakshan, Anjuman Paß, 1952—1953, Exped. KLAPPERICH, in Coll. KLAPPERICH und Coll. JEDLIČKA.
DEI: 1 Paratypus, NO-Afghanistan, Badakshan, Anjuman-Paß, Anjuman-Geb., 4200 m, 18. VIII. 1952, leg. KLAPPERICH.***albanicus*** APFELBECK, 1904 (*Zabrus*)

(Käferf. Balkanh. 1, 316)

♀ Holotypus, Albanien, bei Prisren, leg. DIECK, in Coll. v. HEYDEN; im DEI [Sweti Troitze]¹.***albicornis*** KOLBE, 1889 (*Euleptus*)

(Stett. Ent. Ztg. 50, 121)

Mehrere Syntypen, Kongo, im Gebiet des unteren Quango, Kwako bis Kimpoko, leg. BÜTTNER.
DEI: 1 Syntypus, Kongo, Kimpoko, leg. BÜTTNER, Coll. KRAATZ.***albicornis*** SCHAUM, 1860 (*Tachys*)

(Berl. Ent. Ztschr. 4, 199)

Mehrere Syntypen, Honkong, leg. BOWRING.
DEI: 2 Syntypen, Honkong, Coll. GERMAR-SCHAUM.
Syn. zu *ovatus* MOTSCHULSKY, 1851.***alini*** JEDLIČKA, 1942 (*Amara*)

(Arb. morph. tax. Ent. 9, 10—11)

♀ Holotypus, Mandschukuo, Gaolinzsy, leg. ALIN; im DEI. [14. VII. 1946]

alpestris kalofericus MLYNÁŘ, ? (*Molops*)

(soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden)

DEI: 1 Paratypus, Kalofer-Balkan, VI. 1933, Mař. Tab.

alpestris rhilensis APFELBECK, 1904 (*Molops*)

(Käferf. Balkanh. 1, 225)

Mehrere Syntypen, Bulgarien, Rhilo-Dagh.
Lectotypenfestlegung durch MLYNÁŘ (soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden).
DEI: 1 ♂ Paralectotypus, Balkan, via KRAATZ.***alternans*** KUNTZEN, 1912 (*Dercyliedes*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 583)

2 ♂♂, 2 ♀♀, Columbien, leg. MORITZ; 1 ♂, 1 ♀, bei Caracas, leg. THIEME, im Museum Berlin; Syntypen.
DEI: 1 Syntypus, Venezuela, Coll. SCHAUM-Coll. KRAATZ.***alveolatus*** BATES, 1892 (*Mastax*)

(Ann. Mus. Civ. Genova, (2) 12 (32), 398)

Mehrere Syntypen, Palon (Pegu), leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Palon (Pegu), VIII. IX. 1887, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *laeviceps* BATES, 1891.***amphibolus*** MÜLLER, 1922 (*Dyschirius*)

(Koleopter. Rundsch. 10, 40, 57)

Mehrere Syntypen, Transkaspien, Gr.-Balachan, Dschebell, 1898, leg. HAUSER, im Wiener Museum.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.***anatolica*** JEDLIČKA, 1965 (*Nebria*)

(Reichenbachia 5, 213, Fig. 1 b)

♂ Holotypus, mehrere Paratypen, Anatolien, Egribel-Paß südlich Giresun, ca. 2400 m Höhe, am Rande von Schneefeldern, VII., leg. HEINZ und KORGE, in Coll. JEDLIČKA, Coll. KORGE und HEINZ.
DEI: 1 Paratypus, Anatolia bor., Egribel-Paß, 2000—2400 m, 28. VII. 1963, leg. KORGE.***andreae*** TSCHITSCHERIN, 1898 (*Amara*)

(Horae Soc. Ent. Ross. 32, 221—222)

3 ♂♂ Syntypen, Province de Semiretchje, Umgebung von Issyk-kul, durch KOLTZE.
DEI: 1 ♂ Syntypus, Issik-kul (nicht Issyk-kul!), leg. TSCHITSCHERIN, Coll. KOLTZE, Nr. 1837.***andreae polonicum*** MÜLLER, 1930 (*Bembidion*)

(Coleopt. Centralbl. 5, 1)

Holotypus, Warschau, im Museum „Pietro Rossi“ in Duino; 4 Ex. Umgeb. von Warschau; 1 Ex. N.-O. Polen, Wilno;
1 Ex. N.-W. Russland, Peipus-See; durch MAKOLSKI: Paratypen.
DEI: 2 Paratypen, Warszawa, Baniocha.¹ In [] wurden die Angaben gesetzt, die sich auf den Etiketten befanden, in der Originalbeschreibung aber fehlten.

andreinii GESTRO, 1907 (*Anophthalmus*)

(Ann. Mus. Genova (3) 3, 170–171)

Mehrere Syntypen, in der Nähe Castelnovo di Garfagnana, 17. IV. 1907, leg. DODERO und GESTRO.
DEI: 1 Syntypus, Garfagnana, durch PAGANETTI, Coll. FRANKLIN MÜLLER.*andrewesi* JEDLIČKA, 1932 (*Horniulus*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. 29, 86)

Holotypus, 15 Paratypen, Formosa, Banshoryo, Distr. Sokutsu, SAUTERS Exp., im DEI, in Coll. ANDREWES und Coll. JEDLIČKA.

DEI: Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung, 7. VIII. 1912, leg. SAUTER; 11 Paratypen dto.

andrewesi JEDLIČKA, 1931 (*Pterostichus*)

(l.c. 28, 23–24)

ca. 70 Syntypen, China mer., Prov. Szetschuan, Chung-king, V.–VI. 1929, in Coll. ANDREWES, Coll. BECKER, Coll. JEDLIČKA und im DEI.

DEI: 2 Syntypen, Szetschuan, Chung-king, Coll. BECKER.

andrewesi JEDLIČKA, 1932 (*Risophilus*)

(l.c. 29, 84–85, Fig.)

Holotypus, Formosa, Suisharyo, Exp. SAUTER; im DEI.

andrewesi JEDLIČKA, 1932 (*Tachys*)

(l.c. 79–80)

Holotypus, 10 Paratypen, Formosa, Akau, Exp. SAUTER, im DEI, in Coll. ANDREWES und Coll. JEDLIČKA.

DEI: Holotypus, 6 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung, XII. 1907.

andrewesi EMDEN, 1937 (*Taridius*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 4, 123–125)

♂ Holotypus, 36 Paratypen, Java, Nongkodjadjar, in Coll. v. EMDEN, Coll. ANDREWES und im DEI.

DEI: 3 Paratypen, O.-Java, Tengger, Nongkodjadjar, 1300 m, leg. WEGENER, Gesch. XII. 1935 von OVERBECK.

angolensis BASILEWSKY, 1942 (*Hystrichopus*)

(l.c., 9, 165–166)

Holotypus, Angola, Benguela, ex Coll. v. BENNIGSEN; im DEI [Portug. 90. A].

angulifrons BATES, 1892 (*Siagona*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 284–285)

Mehrere Syntypen, Burma, Rangoon, Mandalay, Palon (Pegu), leg. FEA.

DEI: 2 Ex. Palon, Pegu, 8. IX. 1887; 2 Ex. Birmania, Rangoon, 1886, leg. FEA, Coll. KRAATZ; Syntypen.

angusticollis BATES, 1892 (*Dolichoctis*)

(l.c., 413)

Mehrere Syntypen, Burma, Mectan, Moulmein (Tenasserim), leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Tenasserim, Moulmein, VII. 1887, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

apfelbecki GANGLBAUER, 1892 (*Molops*)

(Käfer Mitteleuropas 1, 302, 305–306)

Mehrere Syntypen, Herzegowina, Volujak, leg. APFELBECK.

DEI: 1 Syntypus, Herzegowina, Montenegro, Volujak, leg. APFELBECK, Coll. FRANKLIN MÜLLER.

arctica SAHLBERG, 1880 (*Feronia*)

(Svensk. Akad. Handl. (2) 17, nr. 4, 31)

Mehrere Syntypen, nordwestl. Sibirien, Lapponia rossica, im Thal des Jenisseensi, Exped. 1876–1877, im Museum Holm. und Museum Helsingf.

DEI: 1 Syntypus, Lapp. ross., leg. SAHLBERG, Coll. KRAATZ.

Syn. zu *fastidiosus* MANNERHEIM, 1853.*arimao* DARLINGTON, 1934 (*Schizogenius*)

(Psyche 41, 71–72)

♂ Holotypus, no. 19492, 24 Ex. Cuba, Soledad, nahe Cienfuegos, aus dem Arimao River, VI., 19. X., 1., 3. XII., leg. DARLINGTON, im Museum Comparative Zoölogy; 1 Ex. Cumanayagua, Santa Clara, 10. VI., leg. DE ZAYAS, in Coll. Estación E. Agronómica, Cuba; Paratypen.

DEI: 2 Paratypen, Cuba, Soledad, Cienfuegos, 1. XII. 1926, leg. DARLINGTON.

armeniacus repletus REITTER, 1884 (*Carabus*)

(Wien. Ent. Ztg. 3, 143)

Mehrere Syntypen, Kaukasus, Swanetien, leg. LEDER.

DEI: 1 Syntypus, Kaukasus, Swanetien, LEDER-REITTER, Coll. KRAATZ, Nr. 462.

armeniacus scintillus REITTER, 1884 (*Carabus*)

(l.c., 143)

Mehrere Syntypen, Kaukasus, Swanetien, leg. LEDER.

DEI: 1 Syntypus, Kaukasus, Swanetien, durch LEDER-REITTER, Coll. KRAATZ.

armenicacus subincatenatus KRAATZ, 1878 (*Sphodristus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 22, 108)

♂ Holotypus, ex Coll. SCHAUM; im DEI.

articulatooides JEDLIČKA, 1932 (*Bembidion*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. 29, 79)

Holotypus, China, Prov. Schantung, im DEI; 2 Ex. dto.; 7 Ex. Tientsin: Paratypen.

DEI: Holotypus, 1 Ex. China, Schant., Jentschoufu, 1911—1912, leg. KREYENBERG, 6 Ex. Tientsin, Ross commut: Paratypen.

asper JEDLIČKA, 1936 (*Platynus*)

(Čas. Čs. Spol. Ent. 33, 17)

Holotypus, China, Yunnan fous; 18 Paratypen, dto., in Coll. JEDLIČKA, Coll. ANDREWES und im DEI.
DEI: 2 Paratypen, China merid., Provincia Yunnan.***europunctata alaiensis*** LAPOUGE, 1930 (*Campalita*)

(Misc. Ent. 32, 85—86)

Mehrere Syntypen, Alai.

DEI: 1 Syntypus, Alai, Jspajran, Coll. LEONHARD.

babaulti ANDREWES, 1924 (*Bembidium*)

(Miss. BABAULT, Prov. Centr. Inde, 80—81, Tafel 1, Fig. 7)

Indien, occ. Himalaya, 1914: 1 Ex. Kulu, Mandi, leg. BABAULT; mehrere Ex. Kumaon, W. Almora und Nainital, leg. CHAMPION; Syntypen.

DEI: 1 Syntypus, W. Almora, Divn, Kumaon, U.P. III. 1917, leg. CHAMPION.

badakschanus JEDLIČKA, 1955 (*Harpalus*)

(Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 30, Nr. 452, 196)

♂ Holotypus, 4 ♂♂ Paratypen, Afghanistan, Badakschan, Shiwa, Exped. KLAPPERICH, 1952—1953, in Coll. KLAPPERICH und Coll. JEDLIČKA.

DEI: 1 ♂, Paratypus, NO-Afghanistan, Badakschan, Schiwa, Hochsteppe, 2900 m, 11. VII. 1953, leg. KLAPPERICH.

bakeri DUPUIS, 1913 (*Casnoidea*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. 57, 270—277)

3 Syntypen, Philipines, Los Banos, leg. BAKER.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, P.J.

balcanicus HEYDEN, 1883 (*Zabrus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 27, 309)

♂ Holotypus, Balkangebirge, leg. HABERHAUER, in Coll. v. HEYDEN; im DEI.

banningeri JEDLIČKA, 1931 (*Pterostichus*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. 28, 24—25)

11 ♂♂, Syntypen, China mer.; Prov. Szetschuan, Chung-king, V.—VI. 1929, in Coll. ANDREWES, Coll. JEDLIČKA und im DEI.

DEI: 1 Syntypus, Chung-king, Szetschuan, Coll. BECKER.

basalis SLOANE, 1907 (*Phloeocarabus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 182)

Mehrere Syntypen, New Guinea, New Pommerania (N. Britain), Gazelle, Peninsula, leg. v. BENNIGSEN, in Coll. HORN und Coll. v. BENNIGSEN.

DEI: 1 Syntypus, Gazelle, M. Insel, Coll. v. BENNIGSEN.

batesii CHAUDOIR, 1861 (*Hiletus*)

(Bull. Soc. Nat. Mosc. 34 (1), 508—510)

Mehrere Syntypen, Region des Amazonas, Ega, leg. BATES.

DEI: 1 Syntypus, Ega, ex Museo BATES 1892 — ex Coll. v. HEYDEN.

beckeri JEDLIČKA, 1931 (*Dolichus*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. 28, 28—29)

11 Syntypen, China mer.; Prov. Szetschuan, Chung-king, V.—VI. 1929, in Coll. JEDLIČKA.

DEI: 1 Syntypus, Chung-king, Szetschuan, Coll. BECKER.

beesoni ANDREWES, 1927 (*Pterostichus*)

(Ent. Mitt. 16, Nr. 2, 145—146)

Holotypus, Irak, Amara, 13.—15. XI. 1916, leg. BEESON, im Britischen Museum; 3 Ex. dto., 6 Ex. Basra, 16.—22. IV., 13. VI. 1926, leg. SCHMIDT, im DEI; Paratypen.

DEI: 4 Paratypen, Basra, 16.—22. IV., 13. VI. 1926, leg. SCHMIDT.

belli ANDREWES, 1925 (*Tachys*)

(Ann. Mus. Genova 51, 411—412)

14 Syntypen, Sind, Karachi, leg. BELL.

DEI: 1 Syntypus, Karachi, leg. BELL.

bennigseni STERNBERG, 1906 (*Anthia*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 164—165)

6 ♂♂, Syntypen, Afrika, in Coll. STERNBERG.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, Coll. v. BENNIGSEN.

bennigseni SLOANE, 1907 (*Colpodes*)

(l.c., 177—178)

Mehrere Syntypen, New Guinea, Kaiser Wilhelm Land, Sattelberg, leg. v. BENNIGSEN, in Coll. HORN.

DEI: 1 Syntypus, D.N. — Guinea, Sattelberg, Coll. v. BENNIGSEN.

bennigseni SLOANE, 1907 (*Lesticus*)

(l.c., 471—472)

♀ Holotypus, New Guinea, Gazelle Peninsula, Herbertshöhe, leg. v. BENNIGSEN, in Coll. HORN; im DEI [Hinterland von Herbertshöhe].

bennigseni ALLUAUD, 1935 (*Rhopalomelus*)

(Afr. 9, 11—12)

Holotypus, Afrique, N.-E. Nyassa, Uhéhé, Coll. v. BENNIGSEN, im DEI.

bhamoensis BATES, 1892 (*Ophionea*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 380)

Mehrere Syntypen, Burma, Bhamo, leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Birmania, Bhamo, VI. 1885, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

biangulata DUPUIS, 1912 (*Pentagonica*)

(Bull. & Ann. Soc. Ent. Belg. 56, 312—314)

Holotypus, Formosa, Kosempo, leg. SAUTER; im DEI [VIII. 1909].

bicolor BASILEWSKY, 1942 (*Pseudolebia*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 9, 164, Fig. 1)

4 Syntypen, Madagascar, Coll. KRAATZ, im DEI.

DEI: 1 Ex. Madagascar, Coll. KRAATZ, 1 Ex. ohne Fundort; Syntypen.

bifasciata SCHAUM, 1860 (*Pericatus*)(Berl. Ent. Ztschr. 4, 191—192, Tab. 3, Fig. 4; nom. praeocc. = *schaumii* CHAUDOIR, 1861, l.c., 5, 123)

Mehrere Syntypen, Costarica, leg. WAGNER.

DEI: 1 Syntypus, Costa Rica, Coll. SCHAUM.

biharicus BREIT, 1912 (*Pterostichus*)

(Koleopter. Rundsch. 1, 153—154)

Mehrere Syntypen, Ungarn, Südbihar, Waldregion des Cucurbetastockes, leg. BREIT.

DEI: 2 Syntypen, Hungaria, Biharförde, Bihar.-Com., Coll. LEONHARD.

Syn. zu *sacheri* FRIVALDSKY, 1865.***binoculus*** BATES, 1892 (*Creagris*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 390)

Mehrere Syntypen, Burma, Bhamo, Khasia Hills, leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Birmania, Bhamo, VIII. 1885, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

birmanica BATES, 1892 (*Galerita*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 385—386)

Mehrere Syntypen, Birmania, Bhamo, leg. FEA.

DEI: 2 Syntypen, Birmania, Bhamo, VIII., IX. 1886, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

Syn. zu *peregrina* DOHRN, 1880.***birmanicus*** BATES, 1892 (*Megalonychus*)

(l.c., 360)

Mehrere Syntypen, Burma, Bhamo, Teinzò, Karin Asciuui Chebà, alt. 1200—1300 m; Noa Dehing in Assam, Khasia Hills, alt. 2000 ft.; leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Carin Asciuui Chebà, 1200—1300 m, III. 1888, leg. FEA.

birmanicus BATES, 1892 (*Trechus*)

(l.c., 297—298)

Mehrere Syntypen, Burma, Karin Asciuui Ghecù, alt. 1400—1500 m, leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Carin Asciuui Ghecù, 1400—1500 m, III.—IV. 1888, leg. FEA.

blandulum NETOLITZKY, 1910 (*Bembidion*)

(Wien. Ent. Ztg. 29, 221—223)

Holotypus, „Persia sett. Doria 62“, ex Museo Civ. Genova, in Coll. v. HEYDEN; im DEI.

blandus ANDREWES, 1924 (*Tachys*)

(Miss. BABault, Prov. Centr. Inde, 85—87, Taf. 1, Fig. 8)

Indien, occ. Himalaya, 1914; 1 Ex. Provinces Centrales, Montinala, leg. BABault; mehrere Ex.: Nagpur, Hoshangabad, Mandla, Fluss Nerudda, leg. D'ABREU; Chota Nagpur, Ranchi, leg. IRVINE, im Indischen Museum; Bombay, Khandesh, leg. BELL; Syntypen.

DEI: 1 Syntypus, Ranchi, leg. IRVINE, Indian-Museum Calcutta.

blumenthalii HEINZ, 1965 (*Pterostichus*)

(Reichenbachia 6, 18—20)

♂ Holotypus, Kleinasien, Abant-Gebirge, 8. VIII. 1963, ca. 1100 m, leg. HEINZ, in Coll. HEINZ; Paratypen: 5 Ex. dto., in Coll. HEINZ und Coll. JEDLICKA; 16 Ex. dto., 20., 21. VIII. 1964, in Coll. HEINZ; 18 Ex. dto., 8. VIII. 1963/30. V. 1964, leg. KORGE, in Coll. KORGE.
DEI: 1 Paratypus, Anatolia bor., Abant-Geb. bei Bolu, 30. V. 1964, leg. KORGE.

bodemeyeri REITTER, 1907 (*Agonum*)

(Wien. Ent. Ztg. 26, 66)

Mehrere Syntypen, Kleinasien, Sabandja, Karakeny, leg. v. BODEMEYER; Syrien, Kaukasus.
DEI: 1 Syntypus, Asia minor, Sabandja, leg. v. BODEMEYER, Coll. LEONHARD.

bodemeyeri DANIEL, 1902 (*Bembidium*)

(Münch. Kol. Ztschr. 1, 101)

Mehrere Syntypen, Asiae minoris provinciae, Phrygia und Bithynia, Biledschik, Eskischehir, 1899, leg. v. BODEMEYER.
DEI: 1 Syntypus, Asia minor, Biledjek, leg. v. BODEMEYER, Coll. LEONHARD.

bodemeyeri APFELBECK, 1904 (*Brachynus*)

(Käferf. Balkanh. 1, 347, 352—353, Fig. 4)

Mehrere Syntypen, Ost-Rumelien, Burgas, am Ufer des Salzsee's von Athanaskenj, 1892; Türkei, Konstantinopel, am Meeresstrand bei San Stefano, Floria, und Kütschük Tschekmedje, 1900; Griechenland, Konfu, Salzsumpf bei Kalichopoulos, 1893; leg. APFELBECK; Missolonghi, leg. LEONIS; Albanien, Valona, leg. PATSCH; Kleinasien, Ak Chéhir, Konia, Burna, Bulghar Maadén, 1899, leg. v. BODEMEYER; Kaukasus; Algerien, Zeitoun; in Coll. REITTER; Andalusien, Chiclana, 1890, leg. KORB, im Museum Wien.
DEI: 2 Syntypen, Asia-Minor, Bulghar-Maaden, Konia, leg. v. BODEMEYER.

bodemeyeri GANGLBAUER, 1900 (*Laemostenus*)

(In BODEMEYER, Quer durch Klein-Asien, 134—135)

1 ♂, 2 ♀, Syntypen, bei Bulghar-Magara, Nordseite des ciliischen Taurus.
DEI: 2 Syntypen, Asia minor, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. LEONHARD.

bodemeyeri FLEISCHER, 1915 (*Tachys*)

(Ent. Mitt. 4, Nr. 4/6, 130)

Mehrere Syntypen, Nordpersien, Iran, Elburzgebirge, leg. v. BODEMEYER.
DEI: 2 Ex. mit den Angaben der Beschreibung, Coll. LIEBMANN, 1 Ex. dto. Dörwögh-Dagh, Coll. LEONHARD; Syntypen.

bodemeyeri GANGLBAUER, 1914 (*Zabrus*)

(Münch. Kol. Ztschr. 4, 95, 129)

♂ Holotypus, Bos Dagh bei Eski Schehir, leg. v. BODEMEYER; im DEI [Asia minor, Bos-Dagh].

bodoanus REITTER, 1913 (*Trechus*)

(Ent. Bl. 9, 172—173)

Mehrere Syntypen, Chinesisch-Turkestan, Thian-Schan, leg. v. BODEMEYER.
DEI: 1 Syntypus, China, Thian-Schan, leg. v. BODEMEYER, Coll. LEONHARD.

bodongi STERNBERG, 1910 (*Tefflus*)

(Stett. Ent. Ztg. 71, 139)

Wenige Syntypen, Rhodesia, Manika-Land, Umtali, leg. BODONG, Zomba, Brit. S.-O. Afrika.
DEI: 1 Syntypus, Rhodesia, Umtali, leg. BODONG, Coll. KRAATZ.

bombycinus ANDREWES, 1925 (*Tachys*)

(Ann. Mus. Genova 51, 385—386)

Mehrere Syntypen, Kumaon, Tanakpur, Swal River Basin, River Sarda Gorge, Haldwani-Nandhauer River; leg. CHAMPION; Dehra Dun, leg. CAMERON, im Forest. Res. Inst.; Eastern Duars; Sikkim, Gopaldhara; leg. STEVENS.
DEI: 1 Syntypus, E. Dooars, leg. STEVENS.
[Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Eastern Duars“ steht auf dem Etikett „E. Dooars“.]

bradycelloides REITTER, 1900 (*Harpalus*)

(Verh. naturf. Ver. Brünn 38 (1899), 113)

Mehrere Syntypen, Ostsibirien, Irkut; Nördliche Mongolei, Urga, Changai; Turkestan, Thian-Schan.

DEI: 1 Syntypus, Quell. d. Irbut, leg. REITTER.

Syn. zu *pusillus* MOTSCHULSKY, 1850.
[Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Irkut“ steht auf dem Etikett „Irkut“.]

breiti montisgrappae AGAZZI, 1960 (*Duvalius*)

(Boll. Soc. Ent. Ital. 90, 78—80, Fig. 1—3)

Veneto, M. Grappa (Vicenza): in una cannoniera lungo la S. S. Cadorna (N. 141), il 1. VII. 1951, leg. MAGISTRETTI, 4 Ex.; Valle di Cancell' alto, sotto pietre infossata, tra il terriccio delle dolinette e di un piccolo cañon di origine glaciale e sotto pietre vicino le pozze di neve: 9 Ex. 20. VI. 1957, leg. GIACOMAZZO; 7 Ex. 17. VII. 1957, leg. RAFFONE; 28 Ex. (di cui una ♀ molto immatura), 15. VIII. 1957, leg. CADAMURO; 13 Ex. 15. VI. 1958, leg. BUCCIARELLI; 38 Ex. 10. VIII. 1958, leg. AGGAZZI; 75 Ex. 15. VIII. 1958, leg. CADAMURO; 10 Ex. 28. V. 1959, leg. CADAMURO; 34 Ex. 5. VI. 1960, leg. AGAZZI; Holotypus und Paratypen, in Coll. AGAZZI; altri paratypi nelle Coll. CADAMURO, BUCCIARELLI und MAGISTRETTI.
DEI: 1 ♀, Paratypus, M. Grappa, Cancell' alto, 5. VI. 1960, leg. AGAZZI, Col. AGAZZI.

bremii GERMAR, 1817 (*Nebria*)

(Fauna Ins. Eur. 14, Nr. 1, Tab. 1)

Mehrere Syntypen, Helvetiae alpibus, im Museum GERMAR.
DEI: 1 Syntypus, Helvetic Alp., Coll. GERMAR-SCHAUM.***brevicostatus forticostis*** BASILEWSKY, 1932 (*Tefflus*)

(Bull. Soc. Ent. Fr., 203)

D.O. Afrika: ♀ Holotypus, Usequa, 1 ♂, Usambara; im Britischen Museum; 2 Ex. Bagamoyo, im Museum Paris; Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, D.O. Afrika, Bagamoyo.***breviformis*** BATES, 1892 (*Epicosmus*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 299)

Mehrere Syntypen, Burma, Karin Chebà, alt. 900–1100 m, Palon in Pegu, Thagata in Tenasserim; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Palon, Pegu, VII.–IX. 1887, leg. FEA, Coll. KRAATZ.***brevimarginatus*** STRANEO, 1941 (*Caelostomus*)

(Ann. Mus. Stor. nat. Genova 61, 12–13)

Holotypus, mehrere Paratypen; Kenya, Budongo, Kaimosi, leg. TURNER; N. Kavirondo, Osiri, leg. TURNER; Kamerun; Togo; Is. Fernando Poo, Basilé, leg. FEA; Congo Belga, Elisabethville, leg. RICHARD; in Coll. STRANEO.
DEI: 4 Paratypen, Togo, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.***breviuscula*** SAHLBERG, 1844 (*Feronia*)

(In Faun. Insect. Rossicam Symbola, 31)

Mehrere Syntypen, Ochotsk.
DEI: 1 Ex. Ochotsk, 1 Ex. ohne Fundort; Coll. KRAATZ, Syntypen.***breviusculus*** KRAATZ, 1876 (*Procerus*)

(Bull. Moscou 51, 132, 135–137, Taf. 1, Fig. 2, 3)

Mehrere Syntypen, Kleinasiens, Brussa.
DEI: Syntypen: 1 Ex. Brussa, leg. KRAATZ; 1 Ex. Brussa, leg. FRIWALD; 5 Ex. ohne Fundort; Coll. KRAATZ.
Syn. zu *scabrosus* OLIVIER, 1795.***brucei*** ANDREWES, 1923 (*Amara*)

(Ann. Mag. Nat. Hist. (9) 11, 276)

Mehrere Syntypen, Tibet, in der Nähe Base Camp, Upper Rombuk, 16.500 ft., V., leg. LONGSTAFF, Mount Everest Expedition.
DEI: 1 Syntypus, Tibet, Everest base camp, Boungbuk Glacier, 16.500 ft., 17.–20. V. 1922, leg. LONGSTAFF.***bruckii*** SCHAUM, 1859 (*Pterostichus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 3, 47)

Mehrere Syntypen, Serbien, leg. ZEBE.
DEI: 1 Ex. Serbia, 2 Ex. ohne Fundort; Coll. GERMAR-SCHAUM, Syntypen.***bucculentus*** KRAATZ, 1874 (*Harpalus*)

(l.c. 18, 299)

Mehrere Syntypen, bei Sarepta, leg. BECKER.
DEI: 2 Syntypen, Sarepta, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *servus* DUFTSCHMIDT, 1812.***bucharica*** TSCHITSCHERIN, 1898 (*Amara*)

(Horae Soc. Ent. Ross. 32, 211)

♀ Holotypus, Buchara occid., Karakum, Prov. Transcaspienne, leg. HAUSER, Coll. v. HEYDEN; im DEI.

bucharicus TSCHITSCHERIN, 1898 (*Harpalus*)

(L'Abeille 29, 94–95)

Mehrere Syntypen, Emirat de Buchara, durch STAUDINGER, in Coll. TSCHITSCHERIN.
DEI: 1 Syntypus, Buchara, Coll. KRAATZ.***bucolica*** KOLBE, 1894 (*Anthia*)

(Stett. Ent. Ztg. 55, 201)

Mehrere Syntypen, Central-Afrika, Bokoba, Westufer des Victoria-Njansa, 19. XI. 1890, leg. STUHLMANN.
DEI: 1 Syntypus, N. Victoria-Nyassa, Ussoga u. Uganda, V.–VIII. 1894, durch NEUMANN.***burgeoni*** STRANEO, 1941 (*Caelostomus*)

(Ann. Mus. Stor. nat. Genova 61, 9–10)

Holotypus, mehrere Paratypen, Is. Fernando Poo, Basilé, 400–600 m, leg. FEA; Camerun, Reg. Lolodorf, leg. VADON; Victoria, leg. FEA; Congo, Ogooué, Sam Kita; Lambaréne; leg. ELLENBERGER; im Museum Civio di Genova, in Coll. STRANEO und im Museum di Parigi.
DEI: 2 Paratypen, Kamerun, durch CONRADT, Coll. KRAATZ.***bureti*** KNIRSCH, 1923 (*Pheggomisetes*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. 20, 1–5, Fig. 1)

Mehrere Syntypen, Bulgariae, in der Nähe Vratca, leg. BUREŠ.
DEI: 1 Syntypus, Levlenik b. Vratca, Balkan, Bulgarien, Coll. LEONHARD-Coll. KNIRSCH.

byzantinus APFELBECK, 1901 (*Trechus*)

(Glasm. zem. muz. Sarajevo 13, 426)

Mehrere Syntypen, Bujuk-Dere (Zarigrad), leg. APFELBECK.
DEI: 1 Syntypus, Constantinopel, Belgrader-Wald, durch v. BODEMEYER.***caligatus*** BATES, 1889 (*Brachinus*)

(Ann. Mus. Genova (27) 7 (2), 109—110)

Mehrere Syntypen, Burma, Bhamō, leg. FEA, in Coll. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Birmania, Bhamō, VIII. 1886, leg. FEA, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *melancholicus* SCHMIDT-GOEBEL, 1846.***calva*** STERNBERG, 1907 (*Anthia*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 59)

7 ♂♂, 2 ♀♀, Syntypen, Region des Tanganjika, ex Coll. OBERTHÜR, in Coll. STERNBERG und OBERTHÜR.
DEI: 1 ♂, Syntypus, Region du Tanganyika, 1900—, leg. DEPAILLAT, Coll. KRAATZ.***camerunus breuningi*** BASILEWSKY, 1932 (*Heteroteflus*)

(Ent. Bl. 28, 24)

♀ Holotypus, Cameroun, Joko; im DEI.

caprai STRANEO, 1938 (*Caelostomus*)

(Ann. Mus. Stor. nat. Genova 60, 66—67)

Holotypus, mehrere Paratypen (ca. 100 Ex.), Java: Mons Gede, Pengalengang, leg. FRUHSTORFER; Tangkoeban Prahoe, leg. DRESCHER und JACOBSON; Preanger, M. Boetangrang, G. Patoeha-Preanger, G. Oengaran, Zuïd-Banjoemas, Koebangkang Koeng, G. Slamat, Batoerraden; leg. DRESCHER; Toegeoe, Gounod Gedeh, Radja Mendala; leg. LEDRU; G. Raoang, Bajoe Kidoe, leg. LUCHT; Teibodas, leg. BECCARI, etc.; in Coll. STRANEO, Coll. DRESCHER, Coll. OBERTHÜR, im Museum Civ. Genova, Museum Amsterdam, Museum Buitenzorg und im Museum Paris.
DEI: 1 Paratypus, Java, Preanger, G. Tangkoeban Prahoe, 4000—5000 ft., XII. 1937, leg. DRESCHER.***castaniventris*** BATES, 1892 (*Colpodes*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 374)

Mehrere Syntypen, Burma, Karin Asciuii Ghelu, alt. 1400—1500 m, leg. FEA.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, III.—IV. 1888, Coll. KRAATZ.***catenulatus rattii*** MANDL, 1966 (*Carabus*)

(Koleopter. Rundsch. 43/44 (1965), 48—49)

♂ Holotypus, Italien, Erber, Mte. Palanzzone (Como), ca. 1000 m, 20. III. 1966; Paratypen: 1 ♀, dto., 26 Ex. Mte. Palanzzone; leg. RATTI; 2 Ex. Lombardia, Canzo, Gajum, in der Nähe Mte. Palanzzone, leg. BARI; in Coll. MANDL.
DEI: 2 Paratypen, Italia, Prealpi Lombarde, Mt. Palanzzone (Co.), 800—1000 m, 11. V. 1966, leg. RATTI.***celebensis*** SCHAUFUSS, 1885 (*Miscelus*)

(Horae Soc. Ent. Ross. 19, 184)

Mehrere Syntypen, Süd-Celebes, Macassar, leg. HOECK, im Museum LUDWIG SALVATOR, in Coll. SCHAUFUSS oder Coll. KLOCKE.
DEI: 1 Syntypus, Macassar, Coll. SCHAUFUSS.
Syn. zu *javanus* KLUG, 1834.***cephalonicus*** WINKLER, 1914 (*Trechus*)

(Koleopter. Rundsch. 3, 171)

Mehrere Syntypen, Cephalonia, Megalo Vuno, IV. 1905, ca. 1200 m, leg. LEONHARD, MOCZARSKI und WINKLER.
DEI: 1 Syntypus, Kephallenia, Gletherios-Paß, 1905, leg. LEONHARD, Coll. LEONHARD.***ceylanensis*** STRANEO, 1938 (*Caelostomus*)

(Ann. Mus. Stor. nat. Genova 60, 28—29, Fig. 31)

Holotypus, mehrere Paratypen, Ceylon, Vavuniya, Anuradhapura, leg. HORN; Hiwaite; in Coll. ANDREWES, Coll. STRANEO, Coll. OBERTHÜR, im Museum Oxford und im DEI.
DEI: 1 Paratypus, Anuradhapura, 1899, leg. HORN, Coll. KRAATZ.***charis*** ANDREWES, 1925 (*Tachys*)

(Ann. Mus. Genova 51, 407, 454—455)

Holotypus, Central Provinces, Nagpur, leg. D'ABREU; mehrere Paratypen: Ceylon, leg. NIETNER, HORN und HENRY; Bombay, Belgaum, leg. ANDREWES; Chota Nagpur, Konbir, leg. CARDON; Orissa, Kallikote, leg. ANNANDALE; Bengal, Galatea Expedition-Copenhagen Mus.; Madras, Nilgiri Hills, leg. ANDREWES und MAINDRON, Vizagapatam, leg. PATUCK; Mysore, leg. ANDREWES und CAMPBELL.
DEI: 2 Paratypen, Ceylon, Anuradhapura, 1899, leg. HORN.***chinadensis*** JEDLIČKA, 1932 (*Harpalus*)

(Ent. Nachr.bl. 6, 69—70)

Holotypus, 89 Paratypen, China, Prov. Szetschuan, Tatsienlu, in Coll. JEDLIČKA, Coll. SCHAUBERGER und Coll. REITTER.
DEI: Paratypen: 4 Ex. China, Tatsienlu-Kiulung, leg. REITTER; 1 Ex. China merid. Tatsienlu, Prov. Szetschuan.***chinensis*** JEDLIČKA, 1932 (*Tachys*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. 29, 81—82)

Holotypus, China, Prov. Schantung, Jentschoufu, im DEI; 3 Ex. dto.; 1 Ex. Tientsin; Paratypen.
DEI: Holotypus, 1 Ex. Jentschoufu, Schantung, 22. V. 1911—12, leg. KREYENBERG; 1 Ex. China, Tientsin, Ross commut.; Paratypen.

chinnada ANDREWES, 1921 (*Dioryche*)

(Rec. Ind. Mus. 22, 342—343)

Holotypus, Bombay, Belgaum, leg. ANDREWES, (?) Ex. Kanara, leg. BELL; 5 Ex. Madras, Bangalore, Malabar, Pondicherry, Bombay, Ceylon, Trincomali, leg. BAKER; im Britischen Museum; 1 Ex. Madras, Ganjam Dist., Chilka Lake, Barkuda, leg. ANNANDALE, 1 Ex., „at light“, U.P., Gorakhpur; 1 Ex. Bombay, Satara, Medha, 1 Ex. Ratnagiri, Pimpri, Rashiishi Valley, leg. GRAVELY; im Ind. Museum; 2 Ex. Madras, leg. PATTON, im Bombay Nat. Hist. Soc.; 1 Ex. Bengal, Pusa, 2 Ex. Bombay, Belgaum, 1 Ex. C.P., Bilaspur, Janjir, 1 Ex. Madras, Coimbatore; im Agric. Res. Inst. Pusa; 1 Ex. Madras, Coimbatore, im Agric. Coll. Res. Inst. Coimbatore; mehrere Ex. C.P., Nagpur, Raipur Dist., Tumgaon, leg. D'ABREU, im Centr. Mus. Nagpur; 1 Ex. Mysore State, leg. CAMPBELL, 3 Ex. BUTLER coll. PONDICHERRY; im Oxford University Museum (Hope Dept.); Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, C.P. India, Tumgaon, Raipur Distr., 21. II. 1917, leg. D'ABREU, Central Mus. Nagpur, C.P.

chitra ANDREWES, 1923 (*Dolichoctis*)

(Spol. Zeyl. 12, 246—247)

Ceylon, leg. GREEN, in Coll. ANDREWES (Holotypus), Nalanda, Negombo und Kandy, leg. HORN, im DEI, Ceylon, leg. NIETNER, im Museum Stettin; mehrere Paratypen.
DEI: 2 Paratypen, Ceylon, Kandy, Negombo, 1899, leg. HORN.

circassicus GANGLBAUER, 1886 (*Tribax*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 30, 334, 336)

6 ♂♂, 9 ♀♀, Syntypen, west. Kaukasus, Atchischcho, Pseaschha, leg. STARCK.
DEI: 2 Syntypen, Caucasus, durch GANGLBAUER, Nr. 344, Coll. KOLTZE.

circumtinctus BATES, 1892 (*Brachinus*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 396)

Mehrere Syntypen, Burma, Sennigion, leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Birmania, Sennigion, 28. II. 1886, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

clandestinum STURM, 1824 (*Agonum*)

(Deutschl. Fauna, Insekta. 5, 212, Taf. 137, Fig. c, C)

Mehrere Syntypen, Oesterreich, leg. MEGERLE VON MÜHLFELD.
DEI: 1 Syntypus, Oesterreich, Coll. GERMAR-SCHAUM.
Syn. zu *mülleri* HERBST, 1785.

clarum ANDREWES, 1923 (*Bembidium*)

(Ent. Monthly Mag. 59, 98—99)

Holotypus, Sikkim, Gopaldhara, mehrere Ex. dto. und Gielle Khola in der Tisla Valley; leg. STEVENS, in Coll. ANDREWES; mehrere Ex.: Assam, Yambung und Janakhmukh, Bank von Dihong River, leg. KEMP, Abor Expedition, im Indischen Museum; Kumaon, W. Almora, Chakrata, Khaula, Ranikhet, Tanakpur, Nainital, Upper Gumti Valley, River Sarda Gorge; Garhwal, Siunti Gad; leg. CHAMPION; Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, Br. Sikkim, Gopaldhara, leg. STEVENS.

coelestis BALIANI, 1932 (*Amaro*)

(Mem. Soc. Ent. Ital. 11, 16, Taf. 2, Fig. 12)

11 ♂♂, 15 ♀♀, Syntypen, China centrale, Tatsienlu-Chiulung, prov. di Szechuan, durch REITTER.
DEI: 1 Syntypus, China, Tatsienlu Kiulung, durch REITTER.

coelestis buchi HAUSER, 1913 (*Coptolabrus*)

(Stett. Ent. Ztg. 74, 304—306)

Mehrere Syntypen, Prov. Tschekiang, ad urb. Wenchow und Haimen.
DEI: 1 Syntypus, Tschekiang, Wentschan.

coeruleiceps BATES, 1892 (*Chlaenius*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 320—321)

Mehrere Syntypen, Burma, Karin Chebā, alt. 900—1100 m, leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Carin Chebā, 900—1100 m, V. XII. 1888, leg. FEA, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *pudicus* FABRICIUS, 1801.

coeruleipennis HAUSER, 1913 (*Coptolabrus*)

(Stett. Ent. Ztg. 74, 304)

Mehrere Syntypen, Yuyao.
DEI: 1 Syntypus, Chekiang, Yuyao.
Syn. zu *lafossei* FEISTHAMEL, 1845.

colchicum CHAUDOIR, 1850 (*Bembidium*)

(Bull. Soc. Nat. Moscou 23, 175—176)

Mehrere Syntypen, Armenien, am Ufer des Rion, in Mingrélie und bei Koutais in Imérétie, leg. CHAUDOIR.
DEI: 1 Syntypus, Armenien, Coll. SCHAUML.

compactum ANDREWES, 1922 (*Bembidium*)

(Ent. Monthly Mag. 58, 240—241)

Holotypus, mehrere Paratypen, United Provinces, Kumaon, West Almora, Ranikhet, Bhatkot, Swal R. basin, R. Sarda gorge, leg. CHAMPION, Dehra Dun, leg. CAMERON, im For. Res. Inst. und Britischen Museum.
DEI: 1 Paratypus, W. Almora, Kumaon, leg. CHAMPION.

***concinna* ZIMMERMANN, 1832 (*Amara*)**

(Faunus, Gistl, 1, 32)

Mehrere Syntypen, Deutschland.

Neotyphenfestlegung durch FASSATI, 1858; Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 32, 519—532 (aller Wahrscheinlichkeit nach existiert die *Amara*-Sammlung ZIMMERMANNS nicht mehr).

DEI: 9 Neotypus, Freienwalde, Coll. KRAATZ; 1 ♂, Küstrin, STIERLIN, 1 ♂, Saxonia, leg. WEHNCKE; Coll. HEYDEN; 1 ♀, Coll. STIERLIN; 1 ♀, Hyères, Coll. GERMAR-SCHAUM; 2 Ex. Le Plansag (?), Coll. LEONHARD; 1 ♀, Zürich, Coll. LETZNER; 1 ♂, Zaleszany, K. Sandomierza, 9. III. 1891, leg. und Coll. STOBIECKI, teste MAKOLSKII und FASSATI, ex Coll. Zool. Mus. Warszawa, 57, Coll. FASSATI, Nr. 824; 1 Ex. Coll. GERMAR-SCHAUM, 1 Ex. St. Quentin, leg. SCHULZ, Coll. KÜNNEMANN (in der Beschreibung nicht erwähnt!); Neoparatypen.

Syn. zu *lepidia* ZIMMERMANN, l. c. (?)***congoensis* BURGEON, 1928 (*Graphipterus*)**

(Ann. Soc. Ent. Belg. 68, 114)

Mehrere Syntypen; Katanga, Dilolo, 14. X. 1920, leg. OVERLAET; Kasai, Luluabourg, Hemptinne Saint-Benoit, leg. CALLEWAERT und HAAS, im Musée du Congo und Bruxelles.

DEI: 1 Syntypus, Katanga, Tschibobe, 25. IX. 1921, leg. OVERLAET.

[Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Dilolo“ steht auf dem Etikett „Tschibobe“.]

***constricticollis* KRAATZ, 1886 (*Coptolabrus*)**

(Dttsch. Ent. Ztschr. 30, 241—242, Fig. 1, 3)

3 Syntypen, Suyfun (Amur), leg. DÖRRIES, via STAUDINGER an KRAATZ, in Coll. KRAATZ.

DEI: 2 Syntypen, Suyfun, Coll. KRAATZ.

***constrictus* SCHAUM, 1860 (*Trechus*)**

(Nat. Ins. Deutschl. Col. 1, 1 (1856—60), 651)

Mehrere Syntypen, in den Alpen von Steiermark, leg. MILLER, in Kärnthen, leg. KAHR.

DEI: 1 Syntypus, Styria, Coll. SCHAUM.

***constrictus franzi* SCHWEIGER, 1950 (*Trechus*)**

(Proc. 8th int. Congr. Ent. Stockholm (1948), 492—493, Fig. 3, 4)

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Tappenkar, westliche Radstätter Tauern, leg. LEDER, in Coll. SCHWEIGER.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

***convexus bucciarelli* MANDL, 1966 (*Carabus*)**

(Koleopter. Rundsch. 43/44, 30—31)

♂ Holotypus, Monte San Giorgio, 29. XI. 1964, Ligurischer Appennin (nördlich von Savona), leg. BUCCIARELLI; 1 ♀, dto.; mehrere Ex. vom Monte San Giorgio; in Coll. MANDL, Coll. BUCCIARELLI und Coll. RAVIZZA: Paratypen.

DEI: 1 Ex. APP. Ligur, Montenatle (SV), m 450/600, 877—XII. 1964 (nicht lesbar!); 1 Ex. APP. Lig./Emiliano, Pey (Pe) Mtc Lesina, 29. IV. 1962, m 1400; leg. RAVIZZA: Paratypen.

***corax* REITTER, 1889 (*Pterostichus*)**(Dttsch. Ent. Ztschr. 33, 52—54; nom. praeocc. = *epiroticus* CSEKI, 1930, Coleopt. Cat., 694)

Mehrere Syntypen, Griechenland, Koraxgebirge, westlich vom Parnass, 1887, leg. v. OERTZEN.

DEI: 1 Syntypus, Griechenland, Korax Geb., leg. v. OERTZEN, Coll. KRAATZ.

***cordatus* LETZNER, 1841 (*Pterostichus*)**

(Übers. Arb. Veränder. schles. Ges., 101)

4 Syntypen, Schlesien, Altvater, 4200 ft. über der Ostsee, E. VII. 1840, leg. LETZNER.

DEI: 4 Syntypen, Altvater, leg. LETZNER (4 weitere Ex. vom gleichen Fundort aus der Coll. LETZNER werden nicht in der Beschreibung genannt).

***cordicollis* SLOANE, 1907 (*Promecoderus*)**

(In LEA, Proc. Roy. Soc. Victoria 20, 147—148)

Mehrere Syntypen, nordwestl. Tasmanien, King Island.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. HACKER,

***cordipenne* SLOANE, 1897 (*Carenum*)**

(Proc. Linn. Soc. N.S. Wales 22, 196—197)

♂ Holotypus, 5 ♂♂, Paratypen, Victoria, North-western District, via FRENCH an SLOANE.

DEI: 1 ♂, Paratypus, SI Mallie (nicht lesbar!), V. (C.F.Jr.), Coll. v. BENNIGSEN.

***corinna* HOLDHAUS, 1924 (*Reicheia*)**

(L'Abeille 32, 171, 183—184)

Mehrere Syntypen; Umgeb. von Rom: Berg Albani, nahe Lago Albano, Exkursion von LUIGIONI und RAFFRAY; Subiaco leg. RAFFRAY; Marino, leg. MÜNSTER; Oriolo Romano, Lago di Nemi, leg. LUIGIONI.

DEI: 3 Syntypen, Roma, 1899, leg. MÜNSTER, Coll. LEONHARD.

***corpulentus* SCHAUM, 1864 (*Zabrus*)**

(Berl. Ent. Ztschr. 8, 182—183)

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Vorderasien, Syrien oder Rhodus, leg. KINDERMANN, via LEDERER an SCHAUM.

DEI: 1 Syntypus, Orient, Coll. SCHAUM.

***costaricensis* LIEBKÉ, 1930 (*Calophaena*)**

(Mitt. Zool. Mus. Berlin 15, 677, 715, Fig. 54)

40 Syntypen, Costa Rica, Farm „Hamburg“, Reventazon, 15. III., 10. IX. 1923/1. X., 7. XI. 1924/5. XI., 3. XII. 1925/3. VI. 1926, leg. NEVERMANN, in Coll. NEVERMANN.

DEI: 1 Syntypus, Costa Rica, Hamburgfarm, Reventazon, Ebene Limon, 6. XI. 1925, leg. NEVERMANN.

crassipes SLOANE, 1904 (*Morio*)

(Proc. Linn. Soc. N.S. Wales 29, 533–534)

Mehrere Syntypen, Australien, Cairns District, Kuranda, leg. DODD, in Coll. SLOANE.
DEI: 1 Syntypus, Kuranda, durch HACKER.

cribrifennis SCHAUERGER, 1938 (*Lampropophonus*)

(Arb. morph. tax. Ent. 5, 41–42)

Holotypus, Paratypen (3 ♂♂, 2 ♀♀), Annam, Phuc-Son, leg. FRUHSTORFER, in Coll. ANDREWES, Coll. SCHAUERGER und im DEI.
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Annam, Phuc-Son, XI. XII., leg. FRUHSTORFER, Coll. KRAATZ.

croaticus KRAATZ, 1875 (*Molops*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 19, 371–372)

Mehrere Syntypen, Croatia, leg. HAMPE.

Lectotypenfestlegung durch MLYNÁČ (soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden).

DEI: Lectotypus, Croatia, leg. HAMPE, Coll. KRAATZ.

Syn. zu *simplex* CHAUDOIR, 1868.

cubanus BÄNNINGER, 1937 (*Taeniolobus*)

(Ent. Bl. 33, 321–322)

Mehrere Syntypen, Cuba, Buenos Aires, Trinidad Mts., 2500–3500 Fuß, leg. DARLINGTON, im Museum of Comparative Zoölogy, Cambridge, Mass., U.S.A.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 8.–14. V. 1936.

cupricollis KRAATZ, 1886 (*Eutelcarabus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 30, 263)

Mehrere Syntypen, Suyfun-Mündung, leg. DÖRRIES, Amur, leg. CHRISTOPH; via STAUDINGER an KRAATZ.

DEI: 1 Ex. Askold, durch KRAATZ, Nr. 572; 1 Ex. Ussuri, leg. DÖRRIES; Coll. KOLTZE; 1 Ex. Suyfun, Coll. KRAATZ, Nr. 174; Syntypen.

Syn. zu *billbergi* MANNERHEIM, 1827.

curvatus SAHLBERG, 1880 (*Trechus*)

(Svenska Akad. Handl. (2) 17, nr. 4, 20)

Mehrere Syntypen, nordwest. Sibirien, im bergigen und waldigen Gebiet des Jenisseensi, von Krasnojarsk bis Fatjanovsk, Exped. 1876–1877, im Museum Holm., Museum Helsingf., in Coll. HAGL und Coll. SAHLBERG.

DEI: 1 Syntypus, Jeniseisk, leg. SAHLBERG, Coll. KRAATZ.

Syn. zu *montanus* MOTSCHOLSKY, 1844.

cyanellus KRAATZ, 1874 (*Harpalus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 18, 300)

Mehrere Syntypen, Sarepta und Astrachan, leg. BECKER.

DEI: 2 Ex. Sarepta, 1 Ex. ohne Fundort; Coll. KRAATZ.

Syn. zu *fuscicornis* MÉNÉTRIÉS, 1832.

cyanellus BATES, 1889 (*Stenolophus*)

(Ann. Mus. Genova (2) 7 (27), 103–104)

Mehrere Syntypen, Burma, Teinzò, Bhamò, Mandalay, Rangoon, leg. FEA, in Coll. FEA.

DEI: 2 Syntypen, Birmania, Teinzò, V. 1886, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

Syn. zu *smaragdulus* FABRICIUS, 1798.

dalmatinum levantinum VŠETEČKA, 1941 (*Bembidium*)

(Sborn. ent. odd. Zemsk. Praze 19, 89–90)

Mehrere Syntypen, Syrien, Damaskus, Libanon, Chtaura, Hamana und Palästina, Haifa.

DEI: 1 Syntypus, Syrien, Chtaura, Coll. KULT.

damascenus REICHE & SAULCY, 1855 (*Zabrus*)

(Ann. Soc. Ent. France (3) 3, 624–625)

♂ Holotypus, Umgebung von Damas in Syrie, X.–III. 1851, leg. SAULCY; im DEI [Syria, Coll. SCHAUM].

debilicostis STERNBERG, 1910 (*Tefflus*)

(Stett. Ent. Ztg. 71, 114–117)

Mehrere Syntypen, Ht. Congo, Leopoldville (Unterer Congo), Kisantu (Congo), Manghai (Kassai), Beni Bendi (Sankurru), Lulua, Luluaberg, Kassai, Kuango, Malange, Mukenge.
DEI: 1 ♂, Syntypus, Kassai-Fluss.

debilis BATES, 1892 (*Clivina*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 278; nom. praeocc. = *invalida* ANDREWES, 1919, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) 3, 470)

Mehrere Syntypen, Birmania, Rangoon, leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Birmania, Rangoon, 1886, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

deceptor DARLINGTON, 1934 (*Pseudaptinus*)

(Psyche 41, 128, Taf. 5, Fig. 12)

Holotypus, no. 19545, 55 Paratypen, Cuba, Soledad, nahe Cienfuegos, VI., 21. X.–7. XI., im Museum of Comparative Zoölogy.

DEI: 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung, 21. X. 1926, leg. DARLINGTON.

declivis LIEBKE, 1934 (*Lebia*)

(Arb. morph. taxon. Ent. I, 277—278)

4 Syntypen, Peru, Callanga, Coll. KRAATZ, im DEI.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.***delectum*** LIEBKE, 1933 (*Zuphiump*)

(Rev. Ent. Rio de Janeiro 3, 469—470)

2 Syntypen, U.S.A., Massachusetts, Framingham, XII. 1911, leg. FROST, im DEI und in Coll. LIEBKE.
DEI: 1 Syntypus, Framingham (Mass), 13. XII. 1911—12, leg. FROST.***demessus*** ANDREWES, 1923 (*Microlestes*)

(Spol. Zeyl. 12, 248—249)

Mehrere Exemplare, Ceylon: Kanthalay, Trincomalee und Anuradhapura, leg. HORN, im DEI; Holotypus, in Coll. ANDREWES und Paratypen, im DEI.
DEI: Ceylon, 1899, leg. HORN: 3 Ex. Anuradhapura, 2 Ex. Kanthalay: Paratypen.***dentalis*** ANDREWES, 1925 (*Tachys*)

(Ann. Mus. Genova 51, 343—344, Taf. 3, Fig. 1)

Mehrere Syntypen: 3 Ex. Malay States, Singapore, leg. SAUNDERS, in Coll. SAUNDERS; 1 Ex. Siam, Renong, leg. DOHERTY, im Britischen Museum; 1 Ex. Cambodia, Kompong Kedey, leg. VITALIS DE SALVAZA; 1 Ex. Cambodia, im Museum Brüssel; 1 Ex. Cochin-China, Long Xuyen, leg. DORR, in Coll. FLEUTIAUX; 1 Ex. Java, Batavia, leg. GRABOWSKY, in Coll. SLOANE; 1 Ex. Sockaboemi, leg. WALSH, im Britischen Museum, 1 Ex. Princes Island, leg. DAMMERMANN, im Museum Buitenzorg, 1 Ex. Java, leg. KOLLER, im Museum Brüssel; ? Ex. Sumatra, Medan, leg. CORPORAAL.
DEI: 1 Syntypus, Prinsen Eil., 21. I. 1922, leg. DAMMERMANN, ex Mus. Buitenzorg.***depressus*** MEIXNER, 1922 (*Trechus*)(Koleopter. Rundsch. 10, 30, Fig.; nom. praeocc. = *meixneri* JEANNEL, 1924, Cat. Col. reg. palaearet. I, 100)

♂ Holotypus, Bosnien, Bosna-Tal, VIII. 1900, ex Coll. LEONHARD; im DEI.

deubeli REITTER, 1896 (*Carabus*)

(Wiener Ent. Ztg. 15, 225)

Mehrere Syntypen, Transylvanische Alpen, leg. DEUBEL.
DEI: 1 Syntypus, Transylv. Alpen, m. 1896, Coll. REITTER, 5. IX. 1906, Coll. ROESCHKE.***diaphanus*** ROTTENBERG, 1874 (*Trechus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 18, 328—329)

Mehrere Syntypen, Taygetos, leg. RAYMOND.
DEI: 1 Syntypus, Taygetos, leg. RAYMOND, Coll. LETZNER-ROTTENBERG.***dichroma*** ANDREWES, 1923 (*Lebia*)

(Spol. Zeyl. 12, 249—250)

Ceylon: Hambegamuwa, im Colombo Museum, Anuradhapura, leg. HORN, im DEI; Madras, Nilgiri Hills, leg. HAMPSON, im Britischen Museum; Hyderabad, Sikandarabad, leg. BUTLER, in Coll. BUTLER; Bombay, Khandesh, leg. BELL, in Coll. ANDREWES (Holotypus), Stadt Bombay, leg. KINNEAR, im Bomb. Nat. Hist. Soc.; Bengal, Chapra, leg. MACKENZIE, im Agric. Res. Inst., Pusa; mehrere Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, Ceylon, Anuradhapura, 1899, leg. HORN.***diegana*** ALLUAUD, 1897 (*Lebia*)

(Ann. Soc. Ent. France 66, 169)

Mehrere Syntypen, Madagascar, Diego-Suarez, XI. en Juni 1893 montagne d'Ambre, 1.000 m, d'altitude.
DEI: 1 Syntypus, Madagascar, Diego-Suarez, 1893, leg. ALLUAUD.***diffinis pseudoquadrifollis*** SCHAUBERGER, 1932 (*Harpalus*)

(Koleopter. Rundsch. 18, 62—63)

♂ Holotypus, Sardinien, mehrere Paratypen, Korsika, Sizilien, Balearen und im westlichen Nordafrika.
DEI: 2 Paratypen, Maroc, Casablanca, durch ANTOINE.***dilatatus*** ROTTENBERG, 1870 (*Tachys*)

(Berl. Ent. Ztschr. 14, 18)

Mehrere Syntypen, Sicilien, bei Palermo, am Oreto, 7. XII.—20. II. 1868, leg. v. ROTTENBERG.
DEI: 3 Syntypen, Sizilien, Palermo, Coll. LETZNER-v. ROTTENBERG.
Syn. zu *algoricus* LUCAS, 1846.***diligens*** STURM, 1824 (*Platysma*)

(Deutschl. Faune, Insekt. 5, 81—83, Taf. 117, Fig. a, A)

Mehrere Syntypen, in Mauer bei Wien, leg. MEGERLE VON MÜHLFELD.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort.***dilutus*** DANIEL, 1902 (*Trechus*)(Münch. Koleopt. Ztschr. 1, 63; nom. praeocc. = *validipes* DANIEL, 1902—1903 (1902), Münch. Kol. Ztschr. 1, 62)Mehrere Syntypen, Herzegovina, Cvrstnica, 18. VIII. 1901, durch LEONHARD.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.***distigma*** LIEBKE, 1934 (*Lebia*)

(Arb. morph. taxon. Ent. I, 278, Fig. 1)

2 Syntypen, Peru, Callanga, Coll. KRAATZ, im DEI.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

distinctum BÄNNINGER, 1918 (*Omophron*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 108)

Syntypen: 2 ♂♂, Kondué, 1904, leg. LUJA, 1 ♀, „Haut Soudan, Oswald“; im DEI.
DEI: 1 ♂, Syntypus, Belg. Congo, Kondué, 1904, leg. LUJA.***diversus*** PÉRINGUEY, 1898 (*Abacetus*)

(Trans. South Afr. Phil. Soc. 10, 360–361)

Mehrere Syntypen, Salisbury, Zambesia.

DEI: 1 Syntypus, S. Rhodesia, leg. BODONG.

dives guadarramensis WAGNER, 1932 (*Chlaenius*)

(Coleopter. Centralbl. 6, 9)

Spanien, Südhang der Sierra Guadarrama, bei El Escorial, Puerto Navacerrada, Madrid; Sierra de Gredos, Coll. LAUFLER; Holotypus und mehrere Paratypen, im Museum Berlin, im DEI und in Coll. WAGNER.
DEI: 9 Ex. Escorial, leg. v. HEYDEN, Coll. STERN und Coll. v. HEYDEN; 2 Ex. Gallia mer., Coll. KRAATZ und Coll. LETZNER; 1 Ex. Gudalusia, Coll. LEONHARD; 4 Ex. Hispania, Coll. KRAATZ, Coll. ROLPH und Coll. v. ROTTENBERG; 1 Ex. Madrid, Coll. v. ROTTENBERG; 1 Ex. Denalara, leg. v. HEYDEN; Paratypen.***dochii*** APPELBECK, 1906 (*Pterostichus*)

(Sitz. Akad. Wiss. Wien, 115, 1663)

Mehrere Syntypen, Albanien, Gebirge der Merdita, Mal Shéit, 1905, leg. APPELBECK und LATIF.
DEI: 1 Syntypus (Ex. verliehen, können nicht überprüft werden).***doderai*** HOLDHAUS, 1924 (*Reicheia*)

(L'Abeille 32, 172, 209–210)

12 Syntypen, Umgebung Dorgali in Sardinien, leg. DODERO.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, V. 1910, Coll. LEONHARD.

dohrni KRAATZ, 1887 (*Coptolabrus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 31, 148)

Mehrere Syntypen, Amur.

DEI: 1 Syntypus, Amur, Coll. KRAATZ.

Syn. zu *smaragdinus* FISCHER V. WALDHEIM, 1824.***eccoptopterus*** KRAATZ, 1894 (*Apotomopterus*)

(I.c. 138–139, Taf. 1, Fig. 17–18)

Mehrere Syntypen, Central-China, Omei-Shan.

DEI: 2 Syntypen, Omei-Shan, Coll. KRAATZ.

edwardsii BATES, 1872 (*Amarotypus*)

(Ent. Monthly Mag. 9, 51)

3 Syntypen, New Zealand, leg. EDWARDS.

DEI: 2 Syntypen, New Zealand, ex Museo, BATES, 1892.

eichhoffi KRAATZ, 1888 (*Pseudolimnaeum*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 32, 365)

2 Syntypen, Lothringen, leg. EICHHOFF, ex. Coll. SCHILSKY und Coll. FISCHER, in Coll. KRAATZ.

DEI: 2 Syntypen, Lothringen, 1888, Coll. KRAATZ.

Syn. zu *inustum* JACQUELIN, 1857.***elatus plitvicensis*** HEYDEN, 1880 (*Pterostichus*)

(Verh. zool.-bot. Ges. Wien 29 (1879), 37)

Mehrere Syntypen, Ljescovac am See Plivica Croatiae, an der Grenze Bosniae, leg. v. HEYDEN, HOPFFGARTEN und REITTER.
Lectotypenfestlegung durch MLYNAŘ (soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden).

DEI: ♂ Lectotypus, Ljescovac, 1857.

elegans ANDREWES, 1929 (*Colpodes*)

(Ann. Mus. Genova 53, 437–438)

9 Syntypen, Sumatra: 3 Ex. Mount Singalang, VII. 1878, leg. BECCARI; 6 Ex. Si-Rambé, XII. 1890–III. 1891, leg. MODIGLIANI; im Museum Genova und im DEI.

DEI: 1 Syntypus, Sumatra, Si-Rambé, XII. 1890–III. 1891, leg. MODIGLIANI, Coll. KRAATZ.

elegans SLOANE, 1907 (*Dendrocellus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 473)

2 Syntypen, New Guinea, Baining Berge, Gazelle Peninsula, leg. v. BENNIGSEN, in Coll. HORN.

DEI: 1 Syntypus, Baining Berge, Coll. v. BENNIGSEN.

ellipticus BURGEON, 1928 (*Graphipterus*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. 68, 115–116)

Mehrere Syntypen; Katanga, Tschibobe, 25. XI. 1921, leg. OVERLAET, Sankisia und Tekanini, 6. X., 16. XI. 1911, leg. BEQUAERT, Kundelungu, leg. Mme. TINANT; im Museum Tervuren.

DEI: 1 Syntypus, Katanga, Tschibobe, 25. IX. 1921, leg. OVERLAET, Musée du Congo.

elongata DUPUIS, 1913 (*Hexagonia*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. 57, 263–269)

Holotypus, Formosa, Suisharyo, leg. SAUTER; im DEI [X. 1911].

emmerichi BALIANI, 1932 (*Amara*)

(Mem. Soc. Ent. Ital. 11, 14—15, Taf. 2, Fig. 10)

18 ♂♂, 16 ♀♀, Syntypen, China centrale, Tatsienlu-Chiulung, Prov. di Szechuan, durch REITTER.
DEI: 2 Syntypen, China, Tatsienlu-Kiulung, durch REITTER.*emmerichi* JEDLIČKA, 1932 (*Colpodes*)

(Ent. Nachrichtenbl. 6, 108)

Holotypus, 8 Paratypen, China, Prov. Szetschuan-Tatsienlu, in Coll. JEDLIČKA und Coll. REITTER.
DEI: 2 Paratypen, China, Tatsienlu-Kiulung, Coll. REITTER.*eous* TSCHITSCHERIN, 1902 (*Harpalus*)

(Horae Soc. Ent. Ross. 35, 236)

Mehrere Syntypen, Mantschurie, Japon.
DEI: 1 Syntypus, Japon, Coll. KRAATZ.*ericae* WOLLASTON, 1854 (*Olisthopus*)

(Insect. Maderensia, 37, Tab. 1, Fig. 8)

Mehrere Syntypen, Madeira, Region Fanalensi bei Cruzinhas, unter der Rinde von *Erica scoparia* L. und *E. arborea* L., 4000'—5000' s.m., VII. 1850, leg. WOLLASTON.
DEI: 4 Syntypen, Madeira, Coll. KRAATZ.*erosus karascharensis* EIDAM, 1931 (*Zococarabus*)

(Wien. Ent. Ztg. 48, 80)

4 ♂♂, 1 ♀, Syntypen, China septentr.-occid., Kurla, Bagratsch-Kul, Karaschar, V. 1902, Coll. HAUSER-LEONHARD, im DEI.
DEI: 4 Syntypen, Ost-Turkestan, Bagratsch-Kul, Hurla, V. 1902, Coll. HAUSER—Coll. LEONHARD.*esau* HEYDEN, 1885 (*Sabienus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 29, 285)

♀ Holotypus, Turkestan, Namagan, durch STAUDINGER, in Coll. v. HEYDEN; im DEI.

eucharis BATES, 1892 (*Pristomachaerus*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 305—306)

Mehrere Syntypen, Burma, Bhamo, Karin Cheba, alt. 900—1100 m, Palon, Pegu; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Palon, Pegu, VIII. IX. 1887, leg. FEA, Coll. KRAATZ.*eucnemis* BATES, 1892 (*Colpodes*)

(l.c., 376)

Mehrere Syntypen, Burma, Karin Cheba, alt. 900—1100 m, leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 5. XII. 1888, Coll. KRAATZ.*eulamprus* BATES, 1892 (*Hypolithus*)

(l.c., 340)

Syntypen: 2 Ex. Palon, Pegu, 1 Ex. Kawkareet, Tenasserim; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Palon, Pegu, VIII. IX. 1887, leg. FEA, Coll. KRAATZ.*eutherum* ANDREWES, 1923 (*Bembidium*)

(Ent. Monthly Mag. 59, 96)

Holotypus, Eastern Duars, leg. STEVENS, in Coll. ANDREWES; mehrere Paratypen: Sikkim, Tista Valley, Gielle Khola, 600 ft., leg. STEVENS; Assam, Pasighat and Kobo, Bank of Dihong River, leg. KEMP, Abor Expedition, im Indischen Museum; Punjab: Simla Hills States, Matiana, leg. KEMP, im Indischen Museum; Kumaon, Nainital, Jalabani, im Indischen Museum; West Almora, River Sarda Gorge, Tanakpur, Ranikhet, leg. CHAMPION; Dehra Dun, Mussoorie, Mossy Falls, Kemti Falls, leg. CAMERON, im Forest Res. Inst.
DEI: 1 Paratypus, Kobo, 400'.*exaratus* BATES, 1892 (*Gnathaphanus*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 329)

Mehrere Syntypen, Burma, Karin Cheba, alt. 900—1100 m, leg. FEA.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, V. XII. 1888.*exiguus* ANDREWES, 1933 (*Oodes*)

(Ent. Monthly Mag. 69, 56—57)

Holotypus, 1 Paratypus (♂, ♀), Sumatra, im DEI und in Coll. ANDREWES.
DEI: Holotypus, Sumatra, Coll. KRAATZ.*exilis* SCHAUER, 1857 (*Blechrus*)(Berl. Ent. Ztschr. 1, 132; nom. praeocc. = *apterus* HOLDHAUS, 1904, in APFELB. Käferf. Balk. 1, 330)5 Syntypen, Griechenland, Zante, leg. v. KIESENWETTER.
DEI: 1 Syntypus, Zante.*extensus* HEYDEN, 1884 (*Antisphodrus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 28, 1, 220—221)

♂ Holotypus, Turkestan, Osch, Coll. KRAATZ, im DEI.

fabulosa LIEBKE, 1939 (*Calleida*)

(Festschr. STRAND 5, 100)

1 Ex. Brasilien, Rio de Janeiro, Petropolis, XII. 1926, leg. OHAUS, in Coll. LIEBKE, 3 Ex. Sta. Catharina, Nova Teutonia, 27 Grad 11 Min. südl. Breite, 52 Grad 23 Min. westl. Länge, leg. PLAUMANN, in Coll. LIEBKE und Coll. PLAUMANN; 1 Ex. Paraguay, Hohenau, leg. JAKOB, im DEI: Syntypen.
DEI: 1 Syntypus, Paraguay, Hohenau, 3. IX. 1935, leg. JACOB, Nr. 1752.

fasciatus MOTSCHULSKY, 1851 (*Trechus*)

(Bull. Soc. Nat. Moscou 24, 4, 506)

Mehrere Syntypen, Ind. or.

DEI: 1 Syntypus, Ind. or. (Mndrstrn.)

fassatii KULT, 1947 (*Clivina*)

(Cas. Čsl. Spol. Ent. 44, 35–37)

Holotypus, Paratypen (ca. 50 Ex.), Brasilia, Corumba, Matto Grosso, in Coll. KULT, Coll. BÄNNINGER, im Museum Brüssel, Museum Prag, DEI, etc.; 4 Ex. Brasilia, Santos, leg. METZ, Coll. KRAATZ, im DEI; 1 Ex. Argentina, Missiones, S. Anna, in Coll. KULT; 2 Ex. Paraguay, leg. FIEBRIG, im DEI.
DEI: 2 Ex. Paraguay, leg. FIEBRIG, 1 Ex. Corumba, Matto Grosso, 4 Ex. Santos, leg. METZ, Coll. KRAATZ; Paratypen.

feae BATES, 1889 (*Epicosmus*)

(Ann. Mus. Genova (2) 7 (27), 101)

Mehrere Syntypen, Burma, Bhamo, Teinzò, Thigyam, Prome, leg. FEA, in Coll. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Bhamo, Birmania, VII–VIII. 1885, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

feae BATES, 1892 (*Nanochlaenus*)

(l.c. (2) 12 (32), 322)

Mehrere Syntypen, Burma, Rangoon, Kathà, Palon, Pegu; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Palon, Pegu, VIII. IX. 1887, Coll. KRAATZ.

feae BATES, 1889 (*Pirantillus*)

(Ann. Mus. Genova (2) 7 (27), 109)

Mehrere ♀♀, Syntypen, Burma, Tenasserim, Meetan, leg. FEA, in Coll. FEA.
DEI: 1 ♀, Syntypus, Tenasserim, Meetan, IV. 1887, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

ferdinandikoburgi BREIT, 1912 (*Trechus*)

(Ent. Mitt. 1, 199)

Mehrere Syntypen, Rhodopegebirge, Xuchia Tschan, Schendemo, Schmerdele, leg. HILF, in Coll. LEONHARD und Coll. BREIT.

DEI: Syntypen, Rhodopegebirge, leg. HILF, Coll. LEONHARD: 2 Ex. Xuchia Tschan, 2 Ex. Schmerdele, 10. VIII. 1911, 1 Ex. Schendemo, 20. VIII.

ferrugatus REITTER, 1902 (*Ophonus*)

(Wien. Ent. Ztg. 21, 191–192)

Mehrere Syntypen, Algier, Bou-Berak, bei Dellys.

DEI: 1 Syntypus, Algeria, Bou-Berak, leg. REITTER, Coll. KRAATZ.

fissuralis REITTER, 1900 (*Blechrus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 376)

Mehrere Syntypen, Griechenland, Syrien, Kaukasus, Transcaspien.

DEI: 1 Syntypus, Attica, Coll. KRAATZ.

flavipes MOTSCHULSKY, 1858 (*Hispalis*)

(Etudes Ent. 7, 24)

Mehrere Syntypen, Ostindien.

DEI: 1 Syntypus, India orient., Mariderstjerna (Ex. beschädigt).

fokiensis SCHAUBERGER, 1930 (*Harpalus*)

(Coleopt. Centr.bl. 4, 175–177, 195)

Holotypus und mehrere Paratypen, südwest- und südliche Provinzen Chinas: Fokien, wahrscheinlich Futschou, ex Museum Hamburg; Szetschuan, Kwanhien, Mts. Yunling, ex Coll. HAUSER; Yunnan, Gebirge bei Mengtze, ex Coll. HAUSER.
DEI: 1 Paratypus, Szechuan, Giufu Shan, 1500–2000 m, leg. REITTER.

formosana DUPUIS, 1912 (*Diorycha*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. 56, 324–328)

2 Syntypen, Formosa, Anping, leg. SAUTER; im DEI [11. V.].
Syn. zu *flavilabris* FABRICIUS, 1798.

formosana DUPUIS, 1912 (*Coptocera*)

(l.c., 328–334)

16 Syntypen, Formosa, Hoozan, leg. SAUTER.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Hoozan, IX. 1910, leg. SAUTER.

Syn. zu *japonica* BATES, 1883.***formosana*** DUPUIS, 1912 (*Pentagonica*)

(l.c., 316–319)

Holotypus, Formosa, Kosempo, leg. SAUTER; im DEI [VIII. 1909].

8 Beitr. Ent. 25, H. 1

formosanus DUPUIS, 1912 (*Cillenus*)

(l.c., 334—338)

Holotypus, Formosa, Anping, leg. SAUTER; im DEI [22. VII. 1911].

formosanus DUPUIS, 1912 (*Mastax*)

(l.c., 282—285)

5 Syntypen, Formosa, Anping, leg. SAUTER.

DEI: 3 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, VI. 1911.

formosanus DUPUIS, 1913 (*Pericallus*)

(l.c., 57, 83—87)

Mehrere Syntypen, Formosa, Hoozan, 7. VI. 1911, Sokutsu, 1912, leg. SAUTER.

DEI: 1 Ex. Formosa, Chip Chip, 1907—1909, 4 Ex. Hoozan, IX. 1910; leg. SAUTER, Syntypen.

formosanus JEDLIČKA, 1932 (*Tachys*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. 29, 81)

Holotypus, Formosa, Anping, SAUTERS Expedition; im DEI.

formosum BATES, 1892 (*Zyphium*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 386—387)

Mehrere Syntypen, Burma, Palon, Pegu, leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Palon, Pegu, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

forticostis LIEBKÉ, 1934 (*Brachynus*)

(Mem. Soc. Ent. Belg. 24, 35)

Holotypus, Freistaat, Reddenburg, Orange, leg. BRAUNS, Coll. LANGENHAN, im Museum Dresden; 1 Ex. dto.; 1 Ex. Caffraria, leg. v. VAHRENDRÖFF, im Museum Stettin; 1 Ex. Transvaal, im DEI; 7 Ex. Freistaat, Bloemfontein, Orange, im Imperial Institut of Entomology und in Coll. SCHAUBERGER; Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, Transvaal.*foveella* LIEBKÉ, 1937 (*Agra*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 4, 158—159, Fig. 2)

♂ Holotypus, Mexiko, in Coll. LIEBKÉ; 1 ♂, Paratypus, dto., im DEI.

DEI: 1 ♂, Paratypus, Mexiko, Coll. KRAATZ.

Syn. zu *obscuripes* CHAUDOIR, 1854.*foveolatus* KOLBE, 1889 (*Euleptus*)

(Stett. Ent. Ztg. 50, 121)

Mehrere Syntypen, Kongo, im Gebiet des unteren Quango, Kwako bis Kimpoko, leg. BÜTTNER.

DEI: 2 Syntypen, Kongo, Kimpoko, leg. BÜTTNER, Coll. KRAATZ.

fulvibasis REITTER, 1900 (*Blechrus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 377)

Mehrere Syntypen, Calabrien, Istrien (Ins. Veglia), Griechenland, Araxesthal, Talysch, Transcaspien, Turkestan.

DEI: 1 Syntypus, Attica, Coll. KRAATZ.

fumatus SCHAUM, 1853 (*Peronomerus*)

(Ann. Soc. Ent. France (3) 1, 440—441)

Mehrere Syntypen, Hongkong, leg. BOWRING.

DEI: 1 Syntypus, Hongkong.

fumicata MOTSCHULSKY, 1851 (*Tachys*)

(Bull. Soc. Nat. Moscou 24, 509)

Mehrere Syntypen, Ind. or.

DEI: 1 Syntypus, Ind. or. (Mndrstrn.) Coll. v. HEYDEN.

furcatula LIEBKÉ, 1934 (*Lebia*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 1, 278—279, Fig. 2)

2 Syntypen, Peru, Callanga, Coll. KRAATZ, im DEI.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.]

fuscitarsis SCHAUM, 1857 (*Chlaenius*)

(Berl. Ent. Ztschr. 1, 135)

Syntypen: 1 Ex. Creta, leg. ZEBE, 1 Ex. Zante (Griechenland), leg. v. KIESENWETTER.

DEI: 1 Syntypus, Graecia, Coll. SCHAUM.

Syn. zu *nigricornis* FABRICIUS, 1787.*fusiforme* NETOLITZKY, 1914 (*Bembidion*)

(Ent. Mitt. 3, 168—169)

Mehrere Syntypen, Formosa, Botanwan, Paiwandistr., VII. 1912, leg. SAUTER, im DEI.

DEI: 5 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

gaedikei JEDLIČKA, 1965 (*Nebria*)

(Reichenbachia 5, 213)

♂ Holotypus, Westkaukasus, Umgebung Dombai, 1900—2200 m Höhe, leg. GAEDIKE, in Coll. GAEDIKE; 2 Paratypen, dto., leg. BRAASCH, in Coll. BRAASCH.

DEI: ♂ Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung, 11.—12. VIII. 1963.

ganglbaueri APFELBECK, 1904 (*Brachynus*)
(Käferf. Balkanh. 1, 348—349, Fig. 8)

Mehrere Syntypen: Bosnien, Dervent, Sarajevo, D. Unac; Herzegowina, Sumpfgebiet der unteren Narenta bei Gabela und Dracévo, Utovo blato, Mostarsko blato bei Mostav; Serbien, Požarevac, Bela Palanka, leg. HILF; Epirus, Chani Driskos bei Jannina, 1900; Griechenland, Korfu, 1893; leg. APFELBECK; Paganetti, Kyllene im Peloponnes, leg. KRÜPER; Kleinasiens, Alem Dagh, Goek Dagh, leg. v. BODEMEYER; Transkaukasien, Talyschgebirge, leg. LEIDER, in Coll. REITTER; Ungarn, Banat, in Coll. REITTER, Szolnok, leg. HENSCH; Slavonien, Ruma, leg. HENSCH.
DEI: 1 Ex. Klein-Asien, Alem-Dagh, leg. v. BODEMEYER; 2 Ex. Herzegowina, Mostav; Coll. LEONHARD, Syntypen.

ganglbaueri APFELBECK, 1908 (*Synuchidius*)
(Anz. Akad. Wiss. Wien 1, 2)

Mehrere Syntypen, Ostalbanien, Schar-Dagh, 1906.
DEI: 1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Schar-Dagh, Ljuboten, Coll. MÜLLER.

ganglbaueri matějkai MAŘAN, 1939 (*Nebria*)
(Ent. listy, Brünn, 2, 21)

Mehrere Syntypen, Jugoslavia mer., Jakupica planina, 12. VI. 1937, leg. MATĚJKA, KODYM und PURKYNĚ; im Museum Prag.
DEI: 1 Syntypus, Jugoslavia mer., Jakupica, 12. VI. 1937, leg. KODYM, Coll. KULT.

gebhardti BOKOR, 1926 (*Duvalites*)
(Ann. Mus. Nat. Hung. 24, 40—48)

Mehrere Syntypen, Ungarn, Grotte Kecskebarlang im Tale Forrásbölgyn, Bükk-Gebirge, Komitat Borsod, 24. VII. 1924, leg. BOKOR und GEBHARDT.
DEI: 1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Ungarn, Com. Borsod, Kecskebarlang, M^o Bükk, 1925 (Jahreszahl in der Beschreibung nicht erwähnt!), leg. BOKOR.

georgii BASILEWSKY, 1932 (*Stictolefflus*)
(Ent. Bl. 28, 23)

♀ Holotypus, Mozambique; im DEI.

gestroi BATES, 1892 (*Mastax*)
(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 399)

Mehrere Syntypen, Burma, Karin Chebà, alt. 900—1100 m, leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, V.—XII. 1888, Coll. KRAATZ.

ghidinii GESTRO, 1909 (*Anophthalmus*)
(l.c. (3) 4 (1908), 202)

3 Syntypen, Italien, grotta del Monte Tre Crocette, 5. IX. 1907, leg. GHIDINI.
DEI: 2 Syntypen, Grotta tre Crocette, 1100, 13. IV. 1909 (Datum in der Beschreibung nicht erwähnt!), Coll. LEONHARD.

giganteum SAHLBERG, 1900 (*Bembidium*)
(Öfv. Finska Vet.-Soc. Förh. B. 42, 175—177)

Mehrere Syntypen, Turkestan, Tschu nahe Dschilarik, 17., 18. VII. 1896.
DEI: 1 Syntypus, Dschilarik, Coll. KRAATZ.

gilvipes EMDEN, 1935 (*Arthrostictus*)
(Rev. Ent. Rio do Janeiro 5, 309—311)

Syntypen: 1 ♀, Chaco, Villa Montes, V. 1926, leg. LINDNER, im Museum Dresden; 1 ♂, Tucuman, im DEI; 2 ♂♂, 1 ♀, Argentinien, Embaracion, ca. 10 km OSO von Oran, Prov. Salta, im Museum Hamburg; 1 ♂, Paraguay, Mbororo, Cordillera de Villarrica, XII. 1933, 1 ♀, Villarrica, II. 1934; leg. SCHADE.
DEI: 1 ♂, Syntypus, Tucuman, Coll. GERMAR-SCHAUM.

glabellus ANDREWES, 1923 (*Lissopogonus*)
(Ann. Mag. Nat. Hist. (9) 12, 214)

Sikkim: Holotypus, Namsoo, in Coll. ANDREWES; mehrere Paratypen: Gopaldhara, Birik und Gielle Khola, in der Tista Valley; leg. STEVENS; Assam: Rotung, 1400 ft., leg. KEMP, im Indischen Museum; Kumaon: West Almora, Tanakpur und River Sarda Gorge, leg. CHAMPION; Dehra Dun-Kali Gad, Mussoorie-Arni Gad und Siwaliks-Lachiwala, leg. CAMERON, im Forest Res. Inst.; Laos: Lak Mune, leg. DE SALVAZA.
DEI: 1 Paratypus, India, Kumaon, Haldwani Dist., leg. H.G.C.

göbli BREIT, 1914 (*Trechus*)
(Koleopter. Rundsch. 3, 166)

Mehrere Syntypen, Peristeri-Gebirge, bei Monastir, via REITTER an BREIT.
DEI: 2 Syntypen, Monastir, Peristeri alpin, Coll. LEONHARD.

goschi JEDLIČKA, 1930 (*Pterostichus*)
(Acta Soc. Ent. Čechosl. 27, 21)

8 Syntypen, Sibiria or., Nikolsk-Ussurijsk, leg. MANDL; in Coll. JEDLIČKA und Coll. MANDL.
DEI: 2 Syntypen, Nikolsk-Ussurijsk, Ussurigebiet, leg. MANDL.

gracilipes BATES, 1892 (*Epicosmus*)
(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 302)

Mehrere Syntypen, Burma, Bhamo, Noa Dehing, Sadiyd in Assam Valley; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Birmania, Bhamo, VII. 1886, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

hilaris TSCHITSCHERIN, 1899 (*Acupalpus*)

(L'abeille 29, 274)

4 Syntypen, Sibérie or.; Chabarowsk (Amur); Wladiwostok, Coll. KOLTZE, Coll. TSCHITSCHERIN.
DEI: 3 Syntypen, Amur, Nr. 1641, Coll. KOLTZE.*hirsutulus* BATES, 1892 (*Apotomus*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 287)

Mehrere Syntypen, Burma, Rangoon; Palon, Pegu; Calcutta; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Palon, Pegu, VIII. IX. 1887, leg. FEA, Coll. KRAATZ.*hirtus* DIECK, 1869 (*Scotodipnus*)

(Diagn. neuer blind. Käfer 4)

Mehrere Syntypen, Nordküste Marocco, Col di Tenda, Piemont, leg. DIECK.
DEI: 1 Syntypus, Col di Tenda, Coll. KRAATZ.*holbergi separandus* KRAATZ, 1881 (*Carabus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 25, 170)

Mehrere Syntypen, Caucasus.

Lectotypenfestlegung durch MANDL (im Druck).

DEI: Lectotypus, Caucas., Coll. KRAATZ; 1 Ex. Caucasus, Nr. 267; 1 Ex. Oestreich, Coll. STIERLIN (?); 1 Ex. Bohemani, Faw., Coll. KRAATZ; 1 Ex. dto. teste CHAUD.; 1 Ex. dto. etc. Caucas.; Paralectotypen.

holtzi SCHATZMAYR, 1909 (*Laemostenus*)

(Wien. Ent. Ztg. 28, 42)

Mehrere Syntypen, Makedonien, Vodena, leg. SCHATZMAYR.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.Syn. zu *stüssinieri* GANGLBÄUER, 1896.*hopffgarteni* HEYDEN, 1881 (*Molops*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 25, 247—248)

Mehrere Syntypen, Croatia, am See Plitvica, 1878, leg. v. HEYDEN, HOPFFGARTEN und REITTER.
Lectotypenfestlegung durch MLYNÁČ (soll in Acta Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden).

DEI: ♂ Lectotypus, Capela, 1 ♀, Paralectotypus, Croatia, Plitvica; leg. v. HEYDEN.

horni ANDREWES, 1923 (*Acupalpus*)

(Spol. Zeyl. 12, 237—238)

Holotypus, Burma, Mandalay, leg. ANDREWES, in Coll. ANDREWES; Ceylon, Anuradhapura, leg. HORN, im DEI; Tenasserim, leg. HELFER, im Museum Prag; India, Bombay, Belgaum, XII. 1886, leg. ANDREWES; United Provinces, Sitapur, leg. CHAMPION: mehrere Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, Ceylon, Anuradhapura, 1899, leg. HORN.*horni* JEDLIČKA, 1932 (*Agonotrechus*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. 29, 82)

♂ Holotypus, Formosa, Suisharyo, Exped. SAUTER; im DEI [X. 1911].

horni SCHAUBERGER, 1938 (*Anoplogenius*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 5, 58—54)

Holotypus, Paratypen (2 ♂♂, 2 ♀♀), Hinterindien, Cochinchina, leg. FRIEDEMICH, im DEI und in Coll. SCHAUBERGER.
DEI: Holotypus, 2 Paratypen, Cochinchina, leg. FRIEDEMICH.*horni* JEDLIČKA, 1931 (*Beckeria*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. 28, 27)

2 ♂♂, 2 ♀♀, Syntypen, China mer., Prov. Szetschuan, Chung-king, V.—VI. 1929.
DEI: 3 Syntypen, China, Szechuan, Tatsienlu, leg. REITTER.

[Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Szetschuan“ steht auf dem Etikett „Sze-chuan“.]

horni LIEBKÉ, 1934 (*Calleida*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 1, 279)

2 Syntypen, Peru, Coll. KRAATZ, im DEI und in Coll. LIEBKÉ.
DEI: 1 Syntypus, Peru, Coll. KRAATZ.*horni* JEDLIČKA, 1932 (*Catascopus*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. 29, 82—83)

♀ Holotypus, Formosa, Sokutsu, im DEI [Banshoryo-Distr., IX. 1912, leg. SAUTER].

horni LIEBKÉ, 1930 (*Colliuris*)

(Mitt. Zool. Mus. Berlin 15, 695—696)

Holotypus, Brasilien, Coll. KRAATZ, im DEI.

horni JEDLIČKA, 1928 (*Harpalus*)

(Wien. Ent. Ztg. 45, 92—94)

2 ♂♂, Syntypen, China, Tsingtau, in Coll. JEDLIČKA und im DEI.
DEI: 1 ♂, Syntypus, Tsingtau, II., durch HOFFMANN.Syn. zu *davidii* TSCHITSCHERIN, 1896—1900 (1897).

horni LIEBKE, 1934 (*Lebia*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 1, 277)

3 Syntypen, Peru, Callanga, Coll. KRAATZ; im DEI.
DEI: 2 Syntypen, Peru, Callanga, Coll. KRAATZ.***horni*** SCHAU BERGER, 1938 (*Oxycentrus*)

(l.c. 5, 38–39)

Holotypus, 1 Paratypus, Celebes, Makassar, Coll. GERMAR-SCHAUM, im DEI und in Coll. SCHAU BERGER.
DEI: Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung.***horni*** SLOANE, 1907 (*Pogonoglossus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 184–185)

Mehrere Syntypen, New Guinea, New Pomerania, Gazelle Peninsula, leg. v. BENNIGSEN.
DEI: 1 Syntypus, Gazelle, H. Insel, Coll. v. BENNIGSEN.***horni*** DUPUIS, 1913 (*Pentagonica*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. 57, 175–181)

Mehrere Syntypen, Ceylon, Weligama, leg. HORN.
DEI: 3 Syntypen, Ceylon, Weligama, 1899, leg. HORN.***horni*** JEDLIČKA, 1932 (*Risophilus*)

(Čas. Čsl. Spol. Ent. 29, 83–84)

Holotypus, Ostasien, Formosa, Kosempo; 3 Ex. dto., 1 Ex. Kankau, Exped. SAUTER; im DEI, in Coll. ANDREWES und in Coll. JEDLIČKA: Paratypen.
DEI: Holotypus, Formosa, Kosempo, 22. V. 1912, 1 Ex. dto. 7. IX. 1909, 1 Ex. Kankau (Koshun), 7. IV. 1912; leg. SAUTER, Paratypen.***horni*** DYKE, 1938 (*Scaphinotus*)

(Ent. Amer. 18, 116–117, Taf. 5, Fig. 10)

♂ Holotypus, Mexico, Coll. KRAATZ; im DEI.

horni STRANEO, 1938 (*Trichillinus*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 5, 243–244, Fig. 1)

Holotypus, Paratypen (1 ♂, 3 ♀♀), Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ; in Coll. STRANEO und im DEI.
DEI: ♂ Holotypus, 2 ♀♀, Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.***horni*** SCHAU BERGER, 1938 (*Trichotichnus*)

(l.c. 46–47)

Nord-Borneo, Coll. WATERSTRADT, 5 Ex.; Kinabalu, Coll. KRAATZ, 6 Ex.; Holotypus, Paratypen, in Coll. SCHAU BERGER und im DEI.
DEI: Holotypus, Kina Balu, 3 Ex. dto., 2 Ex. Nord- Borneo, Coll. WATERSTRADT; Coll. KRAATZ, Paratypen.***hornianus*** SCHAU BERGER, 1938 (*Calathomimus*)

(l. c. 43–44)

♂ Holotypus, Ceylon, Worlds-End, 1899, leg. HORN; im DEI.

horsti REITTER, 1888 (*Pristodactyla*)

(Wien. Ent. Ztg. 7, 88–89)

Mehrere Syntypen, Circassien, Schneefeldern des Fischt, 1887, leg. LEDER und HORST.
DEI: 1 Syntypus, Caucas. occ., Circassien, leg. LEDER-REITTER, Coll. KRAATZ.***hudsoni*** BROUN, 1904 (*Trichosternus*)

(Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 14, 44–45)

5 Syntypen (Nr. 192), New Zealand, Wellington, leg. LEWIS und HUDSON.
DEI: 2 Syntypen, New Zealand, Wellington, Kavori.***humboldti*** LIEBKE, 1930 (*Colliuris*)

(Mitt. Zool. Mus. Berl. 15, 661–689, Fig. 34)

Holotypus, 4 Ex. Brasilien, Cuyabá, im Museum Berlin; 1 Ex. Paraguay, S. Bernardino, leg. FIEBRIG, im DEI; Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, Paraguay, S. Bernardino, leg. FIEBRIG.***hummleri*** JEANNEL, 1927 (*Trechus*)

(L'Abeille 33, 559)

Mehrere Syntypen, Abruzzi.
DEI: 9 Syntypen, Mte. Graeco, Paganetti, Coll. FRANKLIN-MÜLLER.***hustachei*** ANTOINE, 1923 (*Bembidium*)

(Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc 3, 103–104)

6 Syntypen, Maroco, Timhadit, daya de Tidouit, 5. VII. 1922, leg. ANTOINE.
DEI: 1 Syntypus, Maroc, Lac Sidi Ali, V., leg. ANTOINE.***ibericus*** PANTEL, 1888 (*Harpalus*)

(Ann. Hist. Nat. Soc. Espan. 17, 219–223, Fig. 1b)

Mehrere Syntypen, Spanien, Rio Salado, circa Tarancón, Montalvo, II.–V.
DEI: 1 Syntypus, Spanien, Ucles, Coll. STIERLIN.

irakensis ANDREWES, 1927 (*Oodes*)

(Ent. Mitt. 16, Nr. 2, 144–145)

♀ Holotypus, Irak, Amara, 12. V. 1917, leg. BEESON, im Britischen Museum, 1 ♀, Paratypus, Basra, 13. VI. 1926, leg. SCHMIDT, im DEI.
DEI: 1 ♀, Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

iridea BATES, 1892 (*Dolichoctis*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 414–415)

Mehrere Syntypen; Burma, Karin Chebà, alt. 900–1100 m; Karin Asciuii Chebà, alt. 1200–1300 m; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Carin Chebà, 900–1100 m, V. XII. 1888, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

iridulus BATES, 1892 (*Ophoniscus*)

(l. c., 337)

Mehrere Syntypen; Burma, Karin Asciuii Ghecu, 1400–1500 m; Palon, Pegu; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Carin Asciuii, Ghecu, 1400–1500 m, III.–IV. 1888, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

ischioxanthus BATES, 1892 (*Colpodes*)

(l. c., 376)

Mehrere Syntypen, Burma, Karin Chebà, alt. 900–1100 m, leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 5. XII. 1888, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *cruralis* CHAUDOIR, 1878.

italicus DANIEL, 1898 (*Trechus*)

(Koleopter. Studien 2, 13)

Mehrere Syntypen, Gran Sasso d'Italia, leg. FIORI.
DEI: 1 Syntypus, G. Sasso, Abruzzi, leg. FIORI.

jacobsoni ANDREWES, 1926 (*Chlaenius*)

(Ann. Mag. Nat. Hist. (9) 18, 274–275)

Holotypus, 14 Paratypen, Sumatra, Fort de Kock, 3000 ft., leg. JACOBSON, im Britischen Museum.
DEI: 1 Paratypus, Sumatra, Fort de Kock, 920 M, 1925, leg. JACOBSON.

janthinus janthinus GANGLBAUER, 1887 (*Sphodristocarabus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 31, 140)

Mehrere Syntypen, westl. Caucasus, Dagomys, Atschischho, Kitschmaj, leg. STARCK.
Lectotypenfestlegung durch MANDL (im Druck).
DEI: 1 Paralectotypus, occid. Caucasus, Atschischho, leg. STARCK.

japonica BATES, 1893 (*Coptoderia*)

(Trans. Ent. Soc. London 3, 281, Taf. 13, Fig. 4)

Mehrere Syntypen, Japan, Kiuskuin.
DEI: 1 Syntypus, Japan, 1910–320, leg. LEWIS.

javonica EMDEN, 1937 (*Sarothrocrepis*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 4, 117–119)

Holotypus, 5 Paratypen, Java, Nongkodjadjar, in Coll. v. EMDEN, Coll. ANDREWES und im DEI.
DEI: 1 Paratypus, O-Java, Tengger, Nongkodjadjar, 1300 m, leg. WEGENER, Gesch. XII. 1935 von OVERBECK.

jezerensis APFELBECK, 1908 (*Trechus*)

(Glasn. Muz. Bosn. Herc. Sarajevo, 20, 525–526, Fig.)

Mehrere Syntypen, Bosnia centralis, Jezero, leg. APFELBECK.
DEI: 1 ♂, Syntypus, Jezero, 1902, leg. APFELBECK, Coll. LEONHARD.

joërini STIERLIN, 1890 (*Carabus*)

(Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 8, 239–240)

Mehrere Syntypen, in der Nähe von Zürich, leg. JOËRIN-GERBER, in Coll. STIERLIN.
DEI: 1 Syntypus, Zürich, Coll. STIERLIN.
Syn. zu *auronitens* FABRICIUS, 1792.

johnbeckeri BÄNNINGER, 1927 (*Cicindis*)

(Suppl. Ent. 16, 119–121)

♀ Holotypus, Bushere am Persischen Golf, 22. IV. 1927, leg. BECKER; im DEI.

jurečekii JEDLIČKA, 1928 (*Pseudophonus*)

(Ent. Mitt. 17, 45–46)

Syntypen: 7 ♂♂, 2 ♀♀, Sachalin, 1 ♀, Japan, im DEI; 12 ♂♂, 4 ♀♀, Ussuri-Sutschwan, durch STAUDINGER & BANG-HAAS.
DEI: 6 Ex. Sachalin, Coll. KRAATZ (1 Ex. ohne Caput); 1 Ex. Japan, Coll. KRAATZ; 1 Ex. ohne Fundort; Syntypen.

jurečkianus MAŘÁK, 1940 (*Pterostichus*)

(Cas. Cs. Spol. Ent. 37, 3–4)

♂ Holotypus, mehrere Paratypen, Sibiria occ. Barnaul in parte septentrionali montium Altaj; im Museum Prag und in Coll. JUREČEK.
DEI: 1 Paratypus, Sibiria occ., Barnaul Altaj.

juvenilis jedličkai BASILEWSKY, 1932 (*Tefflus*)

(Ent. Bl. 28, 21)

♀ Holotypus, D.O. Afrika, Usaramo, leg. v. BENNIGSEN; im DEI.

modestus KRAATZ, 1876 (*Procerus*)

(Bull. Soc. Nat. Moscou 51, 132, 137–138, Taf. 1, Fig. 10, 12)

Mehrere Syntypen, Amasia, leg. KINDERMANN und STAUDINGER, in Coll. KRAATZ, KINDERMANN und STAUDINGER.
 DEI: 2 Ex. Amasia, Coll. KRAATZ; 8 Ex. ohne Fundort, Coll. KRAATZ.
 Syn. zu *scabrosus* OLIVIER, 1795.

modigliani ANDREWES, 1929 (*Colpodes*)

(Ann. Mus. Genova 53, 434–435)

Syntypen, Sumatra: 1 Ex. Lubu Selassi, 1878, leg. BECCARI; 4 Ex. Si-Rambé, XII. 1890–III. 1891, leg. MODIGLIANI; 1 Ex. Mount Dempo, 4000 ft., leg. BROOKS, im Britischen Museum; im Museum Genoa und im DEI.
 DEI: 1 Syntypus, Sumatra, Si-Rambé, XII. 1890–III. 1891, leg. MODIGLIANI, Coll. KRAATZ.

monastirensis REITTER, 1913 (*Tapinopterus*)

(Ent. Bl. 9, 26)

Mehrere Syntypen, Monastir, Mazedonisches Hochgebirge, leg. WERNER.
 DEI: 1 Syntypus (Ex. verliehen, konnte nicht überprüft werden).

montanellus POPPIUS, 1907 (*Pterostichus*)

(Wien. Ent. Ztg. 26, 21–22)

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Nord-Amerika, White Mountains, in Coll. v. HEYDEN.
 DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

montoroi TREMOLERAS, 1931 (*Lachnophorus*)

(Rev. Soc. Ent. Argent. 3, 247–248)

Holotypus und mehrere Ex. Uruguay, Flores, Costa del Yi, Estancia „La Criolla“, 20. I. 1929; mehrere Ex. Florida, Yi y Timote, 15. I. 1930; in Coll. TREMOLERAS, Paratypen.
 DEI: 2 Paratypen, Flores, Costa del Yi, 20. I. 1929, A. Montoro, durch GUARCH.

morio serbicus WINKLER, 1933 (*Omphreus*)

(Koleopter. Rundsch. 19, 117)

Mehrere Syntypen, Südwest-Serben, Murtenica-planina, VI. 1923, leg. JEANNEL, MAGDELAINE und WINKLER.
 DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, Serbie occidentale, dép. d'Užice.

multisetosus BÄNNINGER, 1941 (*Scarites*)

(Ent. Bl. 37, 67)

Holotypus, Espírito Santo, im DEI (Geschlecht nicht bestimmbar, da Abdominalinhalt zerstört); [X. 1920–II. 1921, Coll. HOFFMANN, Arp. dedic. 1921].

mundula ANDREWES, 1923 (*Cymindoidea*)

(Spol. Zeyl. 12, 247–248)

Holotypus, India, Nilgiri Hills, leg. ANDREWES, in Coll. ANDREWES; 2 Paratypen, Ceylon, Bandarawela, leg. HORN; im DEI.
 DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, 1899.

mus ANDREWES, 1925 (*Tachys*)

(Ann. Mus. Genova 51, 380–381)

2 Syntypen, Java, Batavia, im Buitenzorg Museum.
 DEI: 1 Syntypus, Batavia, III. 1921, ex Museo Buitenzorg.

mustela ANDREWES, 1923 (*Clivina*)

(Spol. Zeyl. 12, 226–227)

Holotypus, 1 Paratypus, Ceylon, Anuradhapura, leg. HORN, in Coll. ANDREWES und im DEI.
 DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, 1899.

nannodes ANDREWES, 1925 (*Tachys*)

(Ann. Mus. Genova 51, 406, 447)

Mehrere Syntypen, Bombay, Belgaum; Madras, Nilgiri Hills, 3500 ft., leg. ANDREWES.
 DEI: 1 Syntypus, Nilgiri Hills, leg. ANDREWES.

nepalensis MANDL, 1965 (*Carabus*)

(Erg. Forsch.-Untern. Nepal Himalaya, Liegf. 2, 79)

♂ Holotypus, Thodung, 3100 m, 25.–30. V. 1961, leg. EBERT; mehrere Ex. dito.; mehrere Ex. Ting-Sang-La, 3800 m, 6., 7. V. 1962, leg. EBERT; in der Zoologischen Sammlung des Bayerischen Staates und in Coll. MANDL; Paratypen.
 DEI: 2 Paratypen, Nepal, Ting-Sang-La, 3800 m, 6., 7. V. 1962, leg. EBERT.

neresheimeri MÜLLER, 1929 (*Bembidion*)

(Coleopt. Centralbl. 4, 101–102, Fig. 2)

Mehrere Syntypen, Mark, Gr. Machnow, 1929, leg. NERESHEIMER.
 DEI: 1 Syntypus, Mark, Umgeb. Gr. Machnow, Coll. NERESHEIMER.

neresheimeri WAGNER, 1915 (*Dyschirius*)

(Ent. Mitt. 4, 241, 301, Fig. 1b, 2b)

Mehrere Syntypen, Forsthaus Bredow bei Finkenkrug, Ziegelei bei Birkenwerder, leg. FREYMUTH, LÜDERS, NERESHEIMER und WAGNER; zwischen Nauen und Brieselang, leg. MÜLLER.
 DEI: 10 Ex. Umgeb. Berlin, Bredow, Brieselang; 1 Ex. Mark, Ziegeleien bei Birkenwerder; leg. WAGNER; 2 Ex. Mark, Forst Bredow, Coll. NERESHEIMER; Syntypen.

notatum ANDREWES, 1922 (*Bembidium*)

(Ent. Monthly Mag. (3) 8 (58), 175—176)

Holotypus, mehrere Paratypen, United Provinces, Kumaon, Upper Gumti Valley, W. Almora, leg. CHAMPION, Binsar, 7700 ft., leg. IMMS, im Britischen Museum und For. Res. Inst.; Bihar, Pusa, leg. CAMERON, im For. Res. Inst. und Agric. Res. Inst.

DEI: 1 Paratype, India, H.G.C., W. Almora, Kumaon, U.P.

notulatus DEJEAN, 1826 (*Panageus*)(Spec. gen. Col. 2, 291—292; nom. praeocc. = *tenuipunctatus* LAFERTÉ, 1851, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) 9, 221)

Mehrere Syntypen, Cap de Bonne-Espérance, durch SCHÜPPEL.

DEI: 1 Syntypus, Afr. austr.

nuristanicus JEDLIČKA, 1956 (*Chlaenius*)

(Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 30 (1955), Nr. 452, 194)

9 Ex. Afghanistan, Nuristan, Bashgultal, 2 Ex. Pagmangebirge, Exped. KLAPPERICH, 1952—1953, Holotypus und Paratypen, in Coll. KLAPPERICH und Coll. JEDLIČKA.

DEI: 1 Paratype, Afghanistan, Bashgultal, 1100 m, Nuristan, 11. IV. 1953, leg. KLAPPERICH.

nuristanus JEDLIČKA, 1956 (*Harpalus*)

(l.c., 195)

Afghanistan, Nuristan: 8 Ex. Bashgultal, 1 Ex. Asmar; Exped. KLAPPERICH, 1952—1953, Holotypus und Paratypen, in Coll. KLAPPERICH und Coll. JEDLIČKA.

DEI: 1 Paratype, Afghanistan, Bashgultal, Nuristan, 1200 m, 3. V. 1953, leg. KLAPPERICH.

nyassicus banningeri BASILEWSKY, 1932 (*Tefflus*)

(Ent. Bl. 28, 25)

♂ Holotypus, N.E. Congo, leg. GRAUER; im DEI.

nyassicus schaubergeri BASILEWSKY, 1932 (*Tefflus*)

(l.c., 24)

♂ Holotypus, Angola, Bengwella, leg. v. BENNIGSEN; im DEI.

oberthürri GESTRO, 1892 (*Omophron*)

(Ann. Mus. Genova (2) 10 (30), 962—963)

2 Syntypen, Pedong, nel Sikkim, a 45 miglia inglesi a NNE di Dargiling, leg. DESGODINS, im Museum Civico.
DEI: 2 Syntypen, Pedong, leg. DESGODINS, Coll. BATES-Coll. v. HEYDEN.

obliquebasalis BREIT, 1914 (*Trechus*)

(Koleopter. Rundsch. 3, 165—166)

Mehrere Syntypen, Chinesisch-Turkestan, Aksu, durch STAUDINGER & BANG-HAAS.

DEI: 5 Ex. Chin. Turkest., Aksu Thal, Coll. LEONHARD; 2 Ex. Thianshan, Aksu Thal, Coll. STAUDINGER & BANG-HAAS; Syntypen.

Syn. zu *dichrous* REITTER, 1911.***obtusangulus cabuljensis*** MLYNÁŘ (1975?) (*Molops*)

(soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae No. 39, veröffentlicht werden)

DEI: 1 ♂, 2 ♀♀, Cabulja, Reis. 1906, Coll. F. MÜLLER; 1 ♂, dto. Marzebrina, leg. HENSCH, Coll. v. HEYDEN; Paratypen.

obtusangulus mendax APFELBECK, 1902 (*Molops*)

(Glaesn. Zem. Muz. Bosn.-Herz. 14, 544—545)

Mehrere Syntypen, südwestl. Bosnien, Vranica pl., Vakufa Berge.

Lectotypenfestlegung durch MLYNÁŘ (soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden).

DEI: 1 ♂, Paralectotypus, Vranica pl., 1902, leg. APFELBECK, Coll. FRANKLIN MÜLLER.

occultus SLOANE, 1907 (*Chlaenius*)

(Dttsch. Ent. Ztschr., 467)

Mehrere Syntypen, New Guinea, Herbertshöhe, leg. v. BENNIGSEN, in Coll. HORN.

DEI: 2 Syntypen, D.N. Guinea, Herbertshöhe, Coll. KRAATZ.

ochrias ANDREWES, 1925 (*Tachys*)

(Ann. Mus. Genova 51, 376—377)

Mehrere Syntypen: Eastern Duars, leg. STEVENS; Kumaon, West Almora, Tanakpur, River Sarda Gorge, Haldwani-Nandhaur River; leg. CHAMPION; Mussoorie, 6500 ft., Dehra Dun, leg. CAMERON und CHATTERJEE, im For. Res. Inst.; Burma, Moulmein, leg. FIEBER, im Vienna Mus.

DEI: 1 Syntypus, E. Dooars, leg. STEVENS.

[Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Eastern Duars“ steht auf dem Etikett „E. Dooars“.]

oertzeni KRAATZ, 1886 (*Elasmopterus*)

(Dttsch. Ent. Ztschr. 30, 431—432)

Holotypus, Griechenland, Parnassus, leg. v. OERTZEN; im DEI (Ex. verliehen, konnte nicht überprüft werden).

9*

opacus SCHMIDT-GÖBEL, 1846 (*Orthogonius*)

(Faun. Col. Birmaniae, 60—61)

Holotypus, Birma; im DEI (Ex. wurde an LIEBKE, Hamburg verliehen und ist dort 1943 vernichtet worden).

opacus KRAATZ, 1895 (*Tropidocerabus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 367—368)

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Südabhang des Himalaya, Rādjawar, leg. KLAEGER; im DEI [Kaschmir, Radjawar, Coll. KRAATZ].
Syn. zu *dardilius* BATES, 1889.***opalescens*** ANDREWES, 1925 (*Tachys*)

(Ann. Mus. Genova (1923—25), 51, 342, 352)

Holotypus, mehrere Paratypen, Ceylon, Negombo, leg. HORN; in Coll. ANDREWES, im Museum Brüssel und DEI.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, 1899.***orientalis*** DANIEL, 1900 (*Lionychus*)

(Soc. ent. 15, 139)

Mehrere Syntypen, Taurus cilicicus, leg. v. BODEMEYER.
DEI: 1 Syntypus, Asia minor, Bulghar Maaden, leg. v. BODEMEYER.***ottomanus*** APFELBECK, 1908 (*Pterostichus*)

(Akad. Anz. Wien 1, 2 (Separatabdruck))

Mehrere Syntypen, Ostalbanien, Schar-Dagh, 1906.
DEI: 1 Syntypus, Schar Dagh, Ljuboten, Coll. FRANKLIN MÜLLER.***ottonis*** REITTER, 1905 (*Anophthalmus*)

(Wien. Ent. Ztg. 24, 311)

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Bosnien, in der trockenen Höhle zwischen Volujak Lebešnik, leg. LEONHARD.
DEI: 1 ♂, Syntypus, Bosnien, Lebešnik, trockene Höhle, Coll. LEONHARD.***ovalipennis*** LIEBKE, 1934 (*Styphlomerus*)

(Mem. Soc. Ent. Belg. 24, 58—59)

Ost-Afrika: Holotypus, Ussandani bei Kwa (kathol. Missions-Anstalt), II. 1912, leg. OBST, Ost-Afrika-Expedition der Hamburgischen Geographischen Gesellschaft, im Museum Hamburg; 1 Ex. Djibuti, Somaliland, 4 Ex. Deutsch-Ost-Afrika, ex Coll. LANGENHAN, im Museum Dresden; 10 Ex. Nordwest-Rhodesien, Mwenga, leg. DOLLmann, 2 Ex. Nyassa-See, leg. NEAVE, 1 Ex. Nordost-Rhodesien, leg. NEAVE, 1 Ex. Deutsch-Ost-Afrika, leg. CARPENTIER; im Britischen Museum; 2 Ex. bez. Deutsch-Ost-Afrika, leg. METHNER, 2 Ex. Deutsch-Ost-Afrika, Kilwa, 9.—11. VI. 1908, leg. FROMM; im Museum Berlin; 1 Ex. Katanga, im Kongo-Museum, Tervuren, 1 Ex. Usambara; leg. WEISE, im DEI; Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, Usambara, leg. WEISE, Coll. KRAATZ.***overbecki*** EMDEN, 1936 (*Colpodes*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 3, 269—270)

Java, Nongkodjadjar: 3 Ex. 25. XI. 1933, 5 Ex. 12. III. 1934, 1 Ex. 14. III. 1934, 28 Ex. 15. III. 1934, 1 Ex. Tengger, 19. IX. 1920, leg. H. D. v. L., im Museum Buitenzorg; Holotypus, in Coll. v. EMDEN, Paratypen, dto., in Coll. ANDREWES und im DEI.

DEI: 2 Paratypen, O.-Java, Tengger, Nongkodjadjar, 1300 m, 15. III. 1934, leg. WEGENER, Gesch. VII. 1934 von OVERBECK.

overbecki EMDEN, 1936 (*Lesticus*)

(I.c., 277—279)

Holotypus, mehrere Paratypen, Java, Nongkodjadjar, 12. III. 1935, in Coll. v. EMDEN, Coll. ANDREWES, Coll. OBERTHÜR, im Museum Dresden und DEI.
DEI: 4 Paratypen, O.-Java, Tengger, Nongkodjadjar, 1300 m, 12. III. 1934 (nicht 1935!), leg. WEGENER, Gesch. VII. 1935 von OVERBECK.***ovipennis latiusculus*** KRAATZ, 1879 (*Molops*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 23, 154)

2 ♀, Syntypen, Croatia, Svica, leg. v. HEYDEN.
Lectotypenfestlegung durch MLYNÁŘ (soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden).
DEI: ♀ Lectotypus, 1 ♀, Paralectotypus, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. KRAATZ, Coll. v. HEYDEN.***ovipennis pseudoplanipennis*** MLYNÁŘ (1975?) (*Molops*)

(soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden).

DEI: ♂ Holotypus, 4 ♂♂, 1 ♀, Paratypen, Croatia, Plitvice, 10. VIII. 1935, durch LIEBMANN, Coll. LIEBMANN, Coll. KRAATZ, Coll. v. HEYDEN.

oxygonus meridionalis EMDEN, 1949 (*Brachynathus*)

(Ann. Mag. Nat. Hist. (12) 11, 868—869, Fig. 6)

Holotypus, 2 Paratypen, Paraguay, 1885, leg. DRAKE; im DEI [Coll. KRAATZ].

paganettii BREIT, 1923 (*Pterostichus*)

(Koleopter. Rundsch. 10, 144—146)

Mehrere Syntypen, Griechenland, Parnassos, leg. PAGANETTI-HUMMLER.
DEI: 1 Syntypus (Ex. verloren, konnte nicht überprüft werden).***paganettii*** MÜLLER, 1911 (*Scotodēpnum*)

(Soc. Ent. 29, 61)

Holotypus, Süd-Dalmatien, Krivošije, leg. PAGANETTI-HUMMLER, in Coll. MÜLLER.
(Laut Originalbeschreibung lag dem Autor nur 1 Ex. aus einer Serie vor.)
DEI: Holotypus, Krivosje, leg. PAGANETTI, Coll. LEONHARD.

pakistanus JEDLIČKA, 1963 (*Mastax*)
(Opusc. Zool., no. 68, 7, Fig. 10)

Holotypus, 31 Paratypen, West Pakistan, Umg. Rawalpindi, leg. LINDEMANN, in der Sammlung des Bayerischen Staates München und in Coll. JEDLIČKA.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, 20 km, O., 15. XII. 1955.

pala LIEBKKE, 1937 (*Agra*)
(Arb. morph. taxon. Ent. 4, 157–158, Fig. 1)

2 ♂♂, Syntypen, Peru, Callanga, in Coll. HORN und im DEI.

DEI: 1 ♂, Syntypus, Peru, Callanga, Coll. KRAATZ.

pallida LIEBKKE, 1937 (*Agra*)
(l.c., 159–160, Fig. 3)

♂ Holotypus, 1 ♂, Brasilien, Sta. Catharina, aus Lages, I.–III. 1887, leg. FRUHSTORFER, im Hamburger Museum; 1 ♀, Sta. Catharina, im DEI; Paratypen.
DEI: 1 ♀, Paratypus, St. Catharina, Coll. KRAATZ.

pandora HOLDHAUS, 1924 (*Reicheia*)
(L'Abéille 32, 173, 208–209)

Mehrere Syntypen, Sardinien, Dorgali, leg. DODERO.
DEI: 3 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, V. 1910, Coll. LEONHARD.

paradoxus APFELBECK, 1908 (*Paradeltomerus*)
(Akad. Anz. Wien 1, 1 (Separatabdruck))

Mehrere Syntypen, Ostalbanien, Schar-Dagh, 1906.
DEI: 1 Syntypus, Serb. Šar. pi. alpin, 7.–14., leg. RAMBOUSEK.

parnassicus BREIT, 1923 (*Scotodipnus*)
(Koleopter. Rundsch. 10, 143–144)

Mehrere Syntypen, Griechenland, Parnassos.
DEI: 4 Syntypen, Graecia, Parnassos, Coll. LEONHARD.

parreyssi KRAATZ, 1875 (*Molops*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 19, 373–374)

Mehrere Syntypen: Balkan, Rhilo Dagh; Montenegro, leg. ERBER; Dalmatien, leg. PARREYSS; in Coll. KRAATZ und Coll. v. HEYDEN. Lectotypenfestlegung durch MLYNAŘ (soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, Nr. 39, veröffentlicht werden).
DEI: Lectotypus, Montenegro, leg. ERBER; 1 Ex. Dalmatien, leg. PARREYSS, 1 Ex. Dalmatien, Coll. KRAATZ: Paralectotype.

parvicollis WINKLER, 1926 (*Neotrechus*)
(Koleopter. Rundsch. 12, 91)

Mehrere Syntypen, nordwestlich Trebinje, im Schacht bei Tukalska Bjelina, leg. WEIRATHER.
DEI: 1 Syntypus, Tukalska, Bjelina.

parvulus STRANEO, 1952 (*Metius*)
(Doriana 1, no. 28, 6)

Holotypus, 17 Paratypen, Bolivia, reg. Cochabamba, Massiccio di Tunari, 4000 m, leg. ZISCHKA, im Museum Genova.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, REITTER.

patruelis PUTZEY, 1847 (*Trechus*)
(Stett. Ent. Ztg. 8, 310)

♀ Holotypus, Carinthia, Mus. SCHAUM; im DEI.
Syn. zu *glacialis* HEER, 1837.

pearsoni ANDREWES, 1923 (*Gnophodes*)
(Spol. Zeyl. 12, 244–245)

1 ♂, Ceylon, Hakgala, im Colombo Museum, 2 ♂♂, 1 ♀, Horton Plains, leg. HORN, im DEI; 1 ♀, Ceylon, leg. THWAITES, im Oxford Museum; Paratypen, Holotypus, in Coll. ANDREWES.
DEI: 1 ♂, 1 ♀, Paratypen, Ceylon, Horton Plains, 1899, leg. HORN.

peccata LIEBKKE, 1940 (*Agra*)
(Fol. Zool. Hydrobiol. 10, 254, 257, Fig. 47, 88, 163–164)

Syntypen: 1 ♂, Paraguay, 1 ♀, Argentinien, Tucuman, leg. BRUCH, in Coll. LIEBKKE; 2 ♀♀, Paraguay, Hohenau, leg. JACOB; im DEI.
DEI: 1 ♀, Syntypus, Paraguay, Hohenau, 17. XI. 1935, leg. JACOB.

peleum JEDLIČKA, 1933 (*Bembidion*)
(Acta Soc. Ent. Čechosl. 30, 10 (Separatabdruck))

Holotypus, 57 Paratypen, China, Prov. Szetschuan-Tatsienlu, in Coll. JEDLIČKA, Coll. REITTER, Coll. ANDREWES und Coll. NETOLITZKY.
DEI: 4 Paratypen, China, Szechuan, Yülling Süd, Tatsienlu.

pentheri APFELBECK, 1918 (*Pterostichus*)
(Sitz. Akad. Wiss. Wien 127, 1, 166)

Mehrere Syntypen, nordalbanisch-montenegrinisches Grenzgebiet, Prokletijagebiet, in der Gegend von Vunšay, 1000–2000 m, 13.–16., 17.–22. VII. 1914, leg. PENTHER.
DEI: Syntypen: 1 Ex. Prokletija, Alban. montenegr. Grenze, 1 Ex. N-alban-alpen; leg. PENTHER, Coll. LEONHARD.

pentheri pseudonarentinus MLYNAŘ (1975?) (*Molops*)

(Soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden)

DEI: 2 Ex. Herzegovina, Plassa, 1901, 1 Ex. dto., Coll. LEONHARD; 1 Ex. Penther, Plasa, GANGLBURG, Nr. 16358; Paratypen.

peridus JEDLIČKA, 1934 (*Colpodes*)

(Sborn. ent. Mus. Praze 12, Nr. 103, 184)

Holotypus, 10 Paratypen, Philippinen, Insel Luzon-Baguio, in Coll. JEDLIČKA, Coll. ANDREWES und im DEI.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.***peristericus*** APFELBECK, 1901 (*Tapinopterus*)

(Glaßn. zem. muz. Sarajevo 13, 429)

Mehrere Syntypen, Berg Peristeri bei Janin (Epiros), leg. APFELBECK.
DEI: 1 Syntypus (Ex. verliehen, konnte nicht überprüft werden).***perpusillus*** ROTTENBERG, 1874 (*Microtyphlus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 18, 329—330)

Mehrere Syntypen, Griechenland, bei Saloniki, leg. RAYMOND.
DEI: 1 Syntypus, Saloniki, leg. RAYMOND, Coll. LETZNER-ROTTENBERG.***petersi kathleenae*** BALL, 1966 (*Scaphinotus*)

(Trans. Amer. Ent. Soc. 92, 714—716)

♂ Holotypus, Arizona, Santa Rita Mountains, Santa Cruz County, Osthang v. Mt. Wrightson, westlich zwischen Baldy und Florida Spring, ca. 1 Meile nördlich von Baldy Spring, 8400—8600', 16.—17. VIII. 1963; 6 ♂♂, 11 ♀♀, dto.; 3 ♂♂, Westhang v. Mt. Wrightson, 8400', nördlich vom oberen Bellow's Spring, 12.—13. VIII. 1963; 1 ♀, Florida Canyon, oberer Florida Spring, 7900', 15. VIII. 1963; leg. BALL; im Museum of Comparative Zoology, im American Museum of Natural History, in California Academy of Sciences, im DEI und in University of Arizona.
DEI: 1 Ex. Arizona, Sta. Cruz, Sta. Rita Mts., Florida Cr., 7000—8000', 15. VIII. 1963, 1 Ex. Sta. Cruz, Sta. Rita Mts., w. si. Mt. Wrightson on trail, 8400', 12.—13. VIII. 1963; leg. BALL; Paratypen.***pfeiffii*** DEJEAN, 1831 (*Bembidium*)

(Spec. Gen. Coleopt. 5, 128—129)

Mehrere Syntypen, il se trouve en Suède et en Laponie.
DEI: 1 Syntypus, Tschapoma, durch SAHLBERG.
Syn. zu *virens* Gyllenhal, 1827.***phaedrum*** ANDREWES, 1923 (*Bembidium*)

(Ent. Monthly Mag. 59, 97)

Kumaon, Central und West Almora, West Bhatkot, 4000 ft., Swal River Basin, Ranikhet, Garhwal, Siuni Gad, 4000 ft.; leg. CHAMPION; Paratypen, Holotypus, im Britischen Museum.
DEI: 1 Paratypus, W. Almora, Kumaon, leg. CHAMPION.***picea*** JEDLIČKA, 1956 (*Cymindis*)

(Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 30 (1955, Nr. 452, 203)

Afghanistan: 24 Ex. Sarekanda, 7 Ex. Bashgultal, 6 Ex. Faizabad, 1 Ex. Umg. Kabul; 1952—1953, Exped. KLAPPERICH: Holotypus, Paratypen, in Coll. KLAPPERICH und Coll. JEDLIČKA.
DEI: 1 Paratypus, NO-Afghanistan, Gebirge Badakhschan, Sarekanda, 4200 m, 21. VII. 1953, leg. KLAPPERICH.***piceus*** ROTTENBERG, 1870 (*Stenocephalus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 14, 16—17)

Mehrere Syntypen, Sicilien, Catania, 26. II. — 5. IV., 5.—9. V. 1869, Aderno, 26. III. 1869, Grgenti, 23. IV.—3. V. 1869; leg. ROTTENBERG.
DEI: 2 Syntypen, Catania, leg. ROTTENBERG.***piceus balcanicus*** MLYNAŘ (1975?) (*Molops*)

(soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae No. 39 veröffentlicht werden)

DEI: 1 Paratypus, Herzegovina, Vlasulja, Coll. LEONHARD.

picipes CHAUDOIR, 1868 (*Feronia*)

(L'Abeille 5, 228—229)

Mehrere Syntypen, Norditalien, Apennien.
DEI: 1 Syntypus, Apenn., Coll. KRAATZ.
Syn. zu *cristatus* DUFOUR, 1820.***pifflii*** JEDLIČKA, 1964 (*Cymindis*)

(Ent. Arb. Mus. FREY 15, 288—289, Fig. 4)

5 ♀♀, Holotypus, Paratypen, Pakistan, Satil, leg. PIFFL, Österr. Karakorum-Exp., in Coll. JEDLIČKA und Coll. MANDL.
DEI: 1 ♀, Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, 1958.***pileolata*** BATES, 1892 (*Clivina*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 278)

Mehrere Syntypen, Burma, Rangoon, Katha, Palon in Pegu; leg. FEA.
DEI: 1 Ex. Birmania, Rangoon, Coll. KRAATZ; 1 Ex. dto. X. 1887, leg. FEA; Syntypen.***pilosus*** BATES, 1892 (*Lynnastis*)

(l.c. 296—297)

Mehrere Syntypen, Burma, Bhamo, Katha, Palon, Pegu; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Palon, Pegu, VIII. IX. 1887, leg. FEA.

pinkeri GANGLBAUER, 1892 (*Trechus*)
(Käf. Mitteleur. 1, 197)

Mehrere Syntypen, Pyhriggass in den Haller Mauern, leg. PINKER, Gesäusealpen, Buchstein- und Hochthorgruppe, Grünauer Alpen, Kassberg, leg. GANGLBAUER.
DEI: 1 Syntypus, Phygass, Gesäuse Alp, 4. VIII. 1907, leg. PINKER.
[Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Pyhriggass“, steht auf dem Etikett „Phygass“.]

planifrons SLOANE, 1907 (*Clivina*)
(Proc. Linn. Soc. N.S. Wales 32, 347–348)

Mehrere Syntypen, Queensland, Brisbane, leg. HACKER, in Coll. HACKER und Coll. SLOANE.
DEI: 1 Syntypus, Brisbane, Coll. HACKER.

plaumanni LIEBKE, 1940 (*Agra*)
(Fol. Zool. Hydrobiol. 10, 244–245, Fig. 21, 82, 144, 145)

Syntypen: 8 Ex. Brasilien, Nova Teutonia, Sta. Catharina, 26–27 Grad s. Br. 52–53 Grad w. L. leg. PLAUMANN; 2 Ex. Argentinien, Misiones, leg. BRUCH; 5 Ex. Paraguay, Hohenau, leg. JACOB; in Coll. PLAUMANN, DEI, Museum Argent., Buenos Aires und Coll. LIEBKE.
DEI: 1 Syntypus, Paraguay, Hohenau, 11. XI. 1934, leg. JACOB.

plicicollis NICOLAI, 1822 (*Anchomenus*)
(Dissert. Col. spec. agri Halensis, 19)

Holotypus, Halle, leg. NICOLAI; im DEI [Coll. GERMAR-SCHAUM].
Syn. zu *mülleri* HERBST, 1785.

pluto ANDREWES, 1924 (*Bembidium*)
(Miss. BABAUT, Prov. Centr. Inde, 72, Taf. 1, Fig. 3)

Mehrere Syntypen, Indien, occ. Himalaya; Nima-Mud, Tsho-Moravi und Lac Salé; Ladack, Leh; 1914.
DEI: 1 Syntypus, Rukshu, Nima Mud, (Fronts Thibet), VII. 1914, leg. BABAUT.

politula MOTSCHULSKY, 1851 (*Tachys*)
(Bull. Soc. Nat. Moscou 24, 509)

Mehrere Syntypen, Ind. or.
DEI: 1 Syntypus, Ind. or. (Mandrstrn.), Coll. v. HEYDEN.

polyglyptus SCHAUM, 1862 (*Harpalus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 6, 110)

Mehrere Syntypen, Griechenland, auf Corfu, leg. KRUEPER.
DEI: 2 Syntypen, Graecia, Coll. KRAATZ.

ponticus APFELBECK, 1904 (*Aptinus*)
(Käferf. Balkanh. 1, 355–356)

Mehrere Syntypen: Türkei, Belgrader Wald bei Konstantinopel, leg. APFELBECK, 1900, leg. MERKL; Kleinasien, Smyrna, leg. KRÜGER, Alem-Dagh, Sabandja, leg. v. BODEMEYER.
DEI: 2 Syntypen, Asia-minor, Goek-Dagh, leg. v. BODEMEYER.

pradieri darlingtoni BÄNNINGER, 1940 (*Pamborus*)
(Novit. Zool. 42, 205)

ca. 60 Ex. (Holotypus, Paratypen), Australia, Barrington Tops Plateau, 5000 ft., leg. DARLINGTON, im Museum Comparative Zoology, Cambridge, Mass., in Coll. DARLINGTON und Coll. BÄNNINGER.
DEI: 1 Paratypus, Australia, Barrington Tops, 5000 ft., N.S.W., 8. II. 1932, Harvard Exp., leg. DARLINGTON.

praedator ANDREWES, 1930 (*Anchomenus*)
(Trans. Ent. Soc. London 78, 38–39)

1 Ex. Tibet, Yatang; 2 Ex. Sikkim, Darjeeling, 7 Ex. Karponang, 16 Ex. Gopaldhara, 3500 ft., Mirik, via STEVENS an ANDREWES; 1 Ex., „Sikkim“, leg. NEWTON, im Museum Prag, 5 Ex. dto., im DEI; 1 Ex. Sureil, leg. ALCOCK, 5000 ft.; 2 Ex. Ghoom, 7000 ft., leg. KEMP; 1 Ex. Pashok, 5000 ft., leg. GRAVELY; 1 Ex. Sitong Ridge, 4700 ft., leg. GRAVELY; 3 Ex. Kalimpang, 5500 ft., leg. MANN; im Museum Indian, Calcutta; 1 Ex. wahrscheinlich Sikkim, im Museum Madrid; 2 Ex. Assam, Shillong, via FLETCHER an ANDREWES, in Coll. PUSA; Syntypen.
DEI: 1 Ex. Sikkim, Coll. KRAATZ; 1 Ex. dto. Himalaya: Syntypen.

privatus BATES, 1892 (*Chlaenius*)
(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 315)

Mehrere Syntypen, Burma, Asciuii Chebà, alt. 1200–1300 m, leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Carin, Asciuii Chebà, 1200–1300 m, I. 1888, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

problematicus nicolasi VENET, 1932 (*Carabus*)
(Bull. Soc. Ent. Fr. 37, 171–172)

Mehrere Syntypen, forêts des environs du Bosc (Ariége), leg. NICOLAS.
DEI: 1 Syntypus, Forêt du Bosc, Ariège, durch VENET.

procerus SCHAUM, 1858 (*Stenolophus*)
(Wien. Ent. Monatschr. 2, 274)

Mehrere Syntypen, Syrien.
DEI: 1 Syntypus, Syria.

punctisternus STRANEO, 1938 (*Caelostomus*)
(Arb. morph. taxon. Ent. 5, 244–245)

Holotypus, mehrere Paratypen, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ, in Coll. STRANEO und im DEI.
DEI: Holotypus, 5 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

punctiventris SCHAUM, 1864 (*Zabrus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 8, 179–180)

Mehrere Syntypen, Griechenland, leg. KRUEPER.
DEI: 2 Syntypen, Athen, Coll. SCHAUM.

punctulicollis BATES, 1892 (*Colpodes*)
(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 375)

Mehrere Syntypen, Burma, Karin Asciuii Ghecù, alt. 1400–1500 m; Karin Chebà, alt. 900–1100 m; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Carin, Asciuii Ghecù, 1400–1500 m, III.–IV. 1888, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

purpureorutilans BARTHE, 1908 (*Carabus*)
(Misc. Ent. 16, 3)

Mehrere Syntypen, prov. d. forêts de la Montagne Noire.
DEI: 3 Syntypen, Montagne Noire, Forêt de Moutand, erhalten 1910 von KRAUSE, Coll. FRANKLIN MÜLLER.
Syn. zu *auronitens* FABRICIUS, 1792.

purpureus KRAATZ, 1876 (*Procerus*)

(Bull. Soc. Nat. Moscou 51, 139, 143–144)

♀ Holotypus, Krim, via SCHNEIDER an KRAATZ; im DEI [Taur., Coll. KRAATZ].
Syn. zu *scabrosus* OLIVIER, 1795.

pyrenaicus KRAATZ, 1863 (*Leistus*)

(In GRENIER, Cat. Coleopt. France, 126)

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, sur le Canigou, 1862, leg. NAU.
DEI: 1 Syntypus, Pyrenaea Canigou, Coll. KRAATZ.

pyroclopus KRAATZ, 1878 (*Coptolabrus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 22, 252)

Holotypus, Amur, leg. RADDE, Coll. KRAATZ; im DEI [Nr. 126].
Syn. zu *smaragdinus* FISCHER VON WALDHEIM, 1824.

[*pyroclopus* KRAATZ wurde in der l.c. 30, 241–242; 1886 als *pyrophorus* KRAATZ berichtet (Druckfehler).]

quadripunctatus DEJEAN, 1929 (*Harpalus*)

(Spec. Gen. Coleopt. 4, 326–327)

Mehrere Syntypen, Schweden, Frankreich, Dept. Basses-Alpes, Moskau, Steiermark, leg. DEJEAN; Coll. DEJEAN.
DEI: 1 Syntypus, V. Pellina, Coll. STIERLIN.
[Fundort ist nicht aufzufinden und stimmt mit der Originalbeschreibung nicht überein.]

quadrispinosa SLOANE, 1907 (*Loxocara*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 180)

Holotypus, New Guinea, Kaiser Wilhelm Land, Simbang, leg. v. BENNIGSEN, in Coll. HORN; im DEI [D. N. Guinea, Simbang, Coll. v. BENNIGSEN].
Syn. zu *quadrispinosa* CHAUDOIR, 1869.

radians ANDREWES, 1922 (*Bembidium*)

(Ent. Monthly Mag. (3) 8 (58), 177–178)

Holotypus, Sikkim, Gopaldhara, 10000 ft., leg. STEVENS, in Coll. ANDREWES, mehrere Paratypen: Lachung, Karponang und Tonglu, 10000 ft., leg. STEVENS; United Provinces: Kumaon, West Almora, Sunderdhunga, 8000–12000 ft.; Pindar Valley, 8000–11000 ft.; Nainital, Ranikhet, Bhatkot, leg. CHAMPION; Punjab: Simla Hills, Baghi, 8500 ft., Kufri, 8500 ft., Narkanda, 9000 ft., leg. KEMP, im Indischen Museum.
DEI: 2 Paratypen, Br. Sikkim, Gopaldhara, leg. STEVENS.

rambouseki JEDLIČKA, 1931 (*Bedeliolus*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. 28, 133)

2 Ex. Persia, Prov. Faristan, Kaserun; 1 Ex. Transcaspia, Tedschen; in Coll. HAUSER und Coll. JEDLIČKA: Syntypen.
DEI: 1 Syntypus, Persia, Pr. Faristan, Umg. Kaserun.

rectificatus BATES, 1891 (*Rhembus*)

(Compt. rend. Soc. Ent. Belg. sér. 4, Nr. 22, 329)

Syntypen: 1 Ex. Tetara und mehrere Ex. Burma.
DEI: 1 Syntypus, Birmania, Rangoon, Coll. KRAATZ.

reflexus SCHAUM, 1862 (*Zabrus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 6, 108–109)

7 Syntypen, nördl. Griechenland, leg. KRUEPER.
DEI: 1 Ex. Graecia, Coll. SCHAUM, 1 Ex. ohne Fundort, Coll. KRAATZ: Syntypen.

reichei KRAATZ, 1858 (*Percus*)

(Wien. Ent. Monatsschr. 2, 163)

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Insel Corsica, ex Coll. REICHE; im DEI. [Coll. KRAATZ].

roubali JEANNEL, 1927 (*Duvalius*)
(Bull. Soc. Sc. Cluj, 3, 14)

Mehrere Syntypen; Carpathen, Czorna Hora, leg. ROUBAL, Diener, mont Hoverla, Süd-Czorna Hora, leg. STOBIECKI; im Museum Vienne.
DEI: 2 Syntypen, Carpat. or., Hoverla, Coll. MAKOLSKI.

rubellus BATES, 1892 (*Pristomachaerus*)
(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 305)

Mehrere Syntypen, Burma, Karin Chebà, alt. 900–1100 m, Naga Hills, alt. 1300 m; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Carin Cheba, V. XII. 1888, 900–1100 m, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

rubidus ANDREWES, 1922 (*Aephnidius*)
(Ann. Mag. Nat. Hist. (9) 10, 169)

Mehrere Syntypen; Central Provinces, Nagpur, leg. D'ABREU; Bombay, Khandesh, leg. BELL; Belgaum, 1886–1887, leg. ANDREWES; Madras, Madura, leg. SOMERS-SMITH; in Coll. ANDREWES.
DEI: 1 Syntypus, Belgaum.

rudolphi GANGLBAUER, 1891 (*Trechus*)
(Wien. Ent. Ztg. 10, 122–123)

Mehrere Syntypen, Koralpe an der Grenze von Steiermark und Kärnten, leg. GANGLBAUER und STARKE.
DEI: 1 Syntypus, Koralpe, 1890, GGELB, Coll. KRAATZ.

ruficollis MOTSCHULSKY, 1851 (*Nestra*)
(Bull. Soc. Nat. Mosc. 24, 506–507)

Mehrere Syntypen, Ind. or.
DEI: 1 Syntypus, India or. (Mndrstrn.), Coll. v. HEYDEN.

rufipes klisuranus APFELBECK, 1902 (*Molops*)
(Glasn. Muz. Bosn. Herc. 14, 545)

Mehrere Syntypen, Bulgarien, Stava planina, Klisura, leg. MERKL.
Lectotypenfestlegung durch MLYNÁČ (soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden).
DEI: 1 ♂, ♀, Paralectotypen, Bulgaria, Klisura, leg. MERKL.

rugiceps ANDREWES, 1929 (*Oxylobus*)
(Faun. Brit. Ind. Coleopt. Carab. 1, 296, 310–311, Taf. 8, Fig. 5)

Bombay, Belgaum, leg. ANDREWES und KINNEAR; Kanara, leg. BELL; Holotypus, in Coll. ANDREWES, 2 Ex. im Britischen Museum, 1 Ex. in der Coll. Bombay Natural History Society: Paratypen.
DEI: 1 ♂, ♀, Paratypen, Belgaum.

rugulipennis BATES, 1892 (*Brachichila*)
(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 406)

Mehrere Syntypen, Burma, Thagata, Tenasserim, Palon, Pegu; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Tenasserim, Thagata, IV. 1887, leg. FEA.

rutilipennis BATES, 1892 (*Dolichoctis*)
(l.c., 412–413)

Mehrere Syntypen, Burma, Karin Chebà, alt. 900–1100 m, Karin Asciuii Chebà, alt. 1300–1400 m; leg. FEA.
DEI: 3 Syntypen, Carin Cheba, V. XII. 1888, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

sachtlebeni BASILEWSKY, 1942 (*Lobodontus*)
(Arb. morph. taxon. Ent. 9, 164–165, Fig. 8)

Holotypus, Cameroun, leg. CONRADT; im DEI [Coll. KRAATZ].

sagittaria BATES, 1892 (*Clivina*)
(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 275–276)

Mehrere Syntypen, Burma, Rangoon, leg. FEA.
DEI: 3 Syntypen, Birmania, Rangoon, VI. 1887, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

sauteri ROESCHKE, 1912 (*Carabus*)
(Suppl. Ent. 1, 4–6)

♀ Holotypus, Formosa, Suisharyo, 11. XII. 1911; im DEI [durch SAUTER].

sauteri DUPUIS, 1914 (*Catascopus*)
(Ann. Soc. Ent. Belg. 57, 419)

Mehrere Syntypen, Formosa, Hoozan, leg. SAUTER, im Museum Berlin und DEI.
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kosempo, 22. VII., leg. SAUTER.

sauteri DUPUIS, 1912 (*Hexagonia*)
(l.c., 56, 308–312)

10 Syntypen, Formosa, Kankau, leg. SAUTER.
DEI: 4 Syntypen, Formosa, Kankau, IV. 1909, leg. SAUTER.

scapularis SCHAUM, 1860 (*Cymindis*)
(In ERICHSON, Naturg. Ins. Deutschl. (1857) 1, 1, 299–300)

Mehrere Syntypen, Österreich, bei Wien und bei München; im Süden von Europa, von Spanien bis in die Krim, in den transcaucasischen russischen Provinzen.
DEI: 1 Syntypus, Austria, Coll. SCHAUM.

schaubergeri JEDLIČKA, 1931 (*Chydaeus*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. 28, 22–23)

ca. 70 Syntypen, China mer., Prov. Szetschuan-Chung-king, V.—VI. 1929, in Coll. SCHAUBERGER, Coll. ANDREWES, Coll. BECKER, Coll. JEDLIČKA und im DEI.
DEI: 1 Ex. Chung-king, Szetschuan, Coll. BECKER; 1 Ex. Szechuan, Giufu-Shan, leg. REITTER; 2 Ex. China, Szechuan, Tatsienlu, leg. REITTER: Syntypen.

scheibeii EIDAM, 1937 (*Carabus*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 4, 177–178)

♀ Holotypus, Hindukusch-Exped. 1935, Grama-Tal bei Paprok, 4. VIII. 1935; im DEI [Afghan, Nuristan, 1935, Exped. SCHEIBE].

scheidleri styriacus KRAATZ, 1887 (*Carabus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 31, 343)

Mehrere Syntypen, Styria, leg. KAHR.

Lectotypenfestlegung durch MANDL, 1965; Abb. Staatl. Mus. Tierk. Dresden 31/13, 431–433.
DEI: 2 Paralectotypen, ohne Fundort, Coll. KRAATZ.

schmidti ANDREWES, 1927 (*Brachinus*)

(Ent. Mitt. 16, Nr. 2, 147–148)

Holotypus, Arabia, El Hedjaz, leg. MILLINGEN, im Britischen Museum, 1 Ex. dto.; 1 ♂, Irak, Basra, 13. VI. 1926, leg. SCHMIDT, im DEI: Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, Basra, 13. VI. 1926, leg. SCHMIDT.

sectifrons BATES, 1892 (*Clivina*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 276)

Mehrere Syntypen, Burma, Palon in Pegu, Rangoon, Tikekee, Shemmaga; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Birmania, Rangoon, V.–VII. 1887, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

segnis SCHAUM, 1864 (*Zabrus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 8, 185)

Mehrere Syntypen, Kleinasien, bei Brussa.

DEI: 1 Syntypus, Anatolia, Brussa, Coll. SCHAUM.

seidlitzii SCHAUM, 1864 (*Zabrus*)

(l.c., 177–178)

Mehrere Syntypen, Guadarrama, leg. SEIDLITZ.

DEI: 1 Syntypus, Spanien, Coll. STIERLIN.

[*seidlitzii* ist offenbar ein Druckfehler; es muß heißen *seidlitzi*, wie aus der Originalbeschreibung p. 178, Zeile 9 hervorgeht.]*semilunium muchei* JEDLIČKA, 1965 (*Bembidion*)

(Ent. Abh. Mus. Tierk. Dresden 32, 122)

5 Syntypen, oberer Amur, in Coll. JEDLIČKA.

DEI: 1 Syntypus, oberer Amur.

semirubra ANDREWES, 1926 (*Coryza*)

(Ent. Monthly Mag. 62, 71–72)

Kumaon-Tibetan Frontier: 1 Ex. Sarju Valley, 5.000', leg. CHAMPION; mehrere Ex.; Upper Gumti Valley, Ranikhet, Swal River basin, Almora, Tanakpur, Nandhaur River bis Haldwani, leg. CHAMPION; Dehra Dun, Dwarahat, 5.000', Kanarichina, 4.000', Almora, leg. PARKER; Salya, 3.600', leg. CAMERON; Binal Gad, 3.500', leg. CHATTERJEE; Chakrata, Kali Gad, nahe Dehra Dun; Kohlu Khet Gad bis Mussorie; Aglar River, Tehri Garhwal; leg. CAMERON; in Forest Research Institute und Coll. CHAMPION; Syntypen.
DEI: 1 Syntypus, India, Kumaon, W. Almora, H.G.C.

semisuturalis DUPUIS, 1912 (*Pentagonica*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. 56, 314–316)

Holotypus, Formosa, Kosempo, leg. SAUTER; im DEI [VIII. 1903].

semiviridis HAUSER, 1914 (*Coptolabrus*)

(Stett. Ent. Ztg. 75, 137)

Mehrere Syntypen, China prov. Hunan, Siantang, Tao huaping, vallis Lokiang.

DEI: 1 Syntypus, China, Hunan.

Syn. zu *scheidleri* PANZER, 1799.*serbiclus* HOPFGARTEN, 1878 (*Carabus*)

(Ent. Nachr. 4, Nr. 8, 97)

Mehrere Syntypen, Serbien.

DEI: 1 Syntypus, Serbien, Coll. STIERLIN.

Syn. zu *scheidleri* PANZER, 1799.*seriatoporus* SCHAUM, 1864 (*Zabrus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 8, 181–182)

Mehrere Syntypen, Armenien, via CHAUDOIR und FAIRMAIRE an SCHAUM.

DEI: 2 Syntypen, Armenien, Coll. SCHAUM.

Syn. zu *spectabilis* HAMPE, 1852.

spectabilis SCHAUM, 1856–60 (*Amara*)

(Naturg. Ins. Deutschl. Col. 1, 1 (1958), 510)

Mehrere Syntypen, in den Alpen von Krain und Kroatien.
DEI: 5 Syntypen, Croatia, Carniol, Coll. GERMAR-SCHAUM.***spectans*** JEDLIČKA, 1933 (*Bembidion*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. 30, 9–10 (Separat))

Holotypus, 3 Paratypen, China, Prov. Szetschuan-Tatsienlu, in Coll. JEDLIČKA und in Coll. REITTER.
DEI: 1 Paratypus, China, Szechuan, Nitou Tatsienlu, leg. REITTER.***spinicollis*** BREIT, 1913 (*Anophthalmus*)

(Ent. Mitt. 2, Nr. 11, 351–352)

Mehrere Syntypen, Bosnien, Jahorina-planina, leg. SETNIK, in Coll. LEONHARD.
DEI: 1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Bosnien, Jahorina, Coll. LEONHARD.
Syn. zu *pfeifferi* APFELBECK, 1908.***spinulifer*** BATES, 1892 (*Colpodes*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 377)

Mehrere Syntypen, Burma, Karin Asciuii Ghecù, alt. 1400–1500 m; Karin Cheba, alt. 900–1100 m; leg. FEA.
DEI: 2 Syntypen, Carin Asciuii Ghecù, 1400–1500 m, III.–IV. 1888, leg. FEA, Coll. KRAATZ.***stenoderus*** CHAUDOIR, 1850 (*Agonum*)

(Bull. Soc. Nat. Mosc. 23, 3, 118–119)

Mehrere Syntypen, Umgebung von Tiflis; „partie inférieure du cours du Volga“.
DEI: 1 Syntypus, Caukasus, Coll. GERMAR-SCHAUM.
Syn. zu *extensem* MÉNÉTRIÉS, 1849.***steřbaj*** JEDLIČKA, 1964 (*Bembidion*)

(Ent. Abh. Mus. Tierk. Dresden 32, 138, Fig. 29)

Holotypus, China, Yunnan, Solingho; im DEI [Vallis flumin.].

sternbergi ROESCHKE, 1898 (*Curabus*)

(Ent. Nachr. 24, 121–122)

Mehrere Syntypen, Gensan, leg. STAUDINGER.
DEI: 1 Syntypus, Gensan, Coll. v. BENNINGSEN.***stevensi*** ANDREWES, 1925 (*Tachys*)

(Ann. Mus. Genova, 51, 406, 445–446)

Mehrere Syntypen, Sikkim, Gopaldhara; Eastern Duars; leg. STEVENS; Kumaon, West Almora, Nainital, Swal River basin, Haldwani-Nandhaur River, Khaula, 4500 ft.; leg. CHAMPION; Bhim Tal, 4500 ft.; Punjab, Simla Hills-Barogh, 5000 ft.; leg. ANNADALE, im Indischen Museum; Bajaura-Kanya district, leg. BABAUT; Chota Nagpur, Barway, leg. CARDON, im Museum BRÜSSEL; 2 Ex Karen Hills, durch FEA, im Britischen Museum.
DEI: 2 Syntypen, Br. Sikkim, Gopaldhara, leg. STEVENS.***stictus*** ANDREWES, 1933 (*Omophron*)

(Ann. Mag. Nat. Hist. (10) 11, 99–100)

Mehrere Syntypen, Tonkin, Hoa-Binh, leg. DE COOMAN; Laos, Hat Tiang, leg. VITALIS DE SALVAZA; in Coll. ANDREWES, Coll. BÄNNINGER, Coll. FLEUTIAUX und im DEI.
DEI: 1 Syntypus, Tonkin, Lac Thô, Hoa-Binh, leg. DE COOMAN, ex Coll. FLEUTIAUX.***striata*** DARLINGTON, 1934 (*Tachys*)

(Psyche 41, 82)

Cuba: ♂ Holotypus, no. 19502, 19 Ex. Soledad, nahe Cienfuegos, IV., 17., 20. X., 7. XI., im Museum Comparative Zoölogy; 1 Ex. Cayamas, Sta. Clara, 6. VI., leg. SCHWARZ, im United States National Museum; 1 Ex. Poey Collection no. 27, in Philadelphia Academy of Sciences; Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, Cuba, Soledad, Cienfuegos, 7. XI. 1926, leg. DARLINGTON, M.C.Z.***stricticeps*** BALIANI, 1932 (*Amara*)

(Mem. Soc. Ent. Ital. 11, 7–8, Taf. 1, Fig. 3)

2 ♂♂, 2 ♀♀, Syntypen, China centrale, Tatsienlu-Chiulung, prov. di Szechuan, durch REITTER.
DEI: 1 ♀, Syntypus, China, Tatsienlu-Kiulung, durch REITTER.***stricticollis*** BAUDI, 1864 (*Blechrus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 8, 203)

10 Syntypen, Cypern.

DEI: 2 Syntypen, Cypern, Coll. KRAATZ.

Syn. zu *infuscatus* MOTSCHULSKY, 1859.***strigitarsis*** STRANEO, 1939 (*Nebrioferonia*)

(Mem. Soc. Ent. Ital. 18, 119–121, Figs.)

Holotypus, mehrere Paratypen, Nova Guinea, Haiveri, leg. LORIA, im Museum Genova, DEI, in Coll. STRANEO und Coll. ANDREWES.
DEI: 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung, VII.–XI. 1893.

stübelae EMDEN, 1953 (*Anisotarsus*)

(Ann. Mag. Nat. Hist. (12) 6, 533–534)

♀ Holotypus (Lo.), Ecuador, Quito, leg. BOWRING; 1 ♂, Paratypus (Da.), dto., Coll. GERMAR-SCHAUM; im Britischen Museum.
DEI: 1 ♂, Paratypus, Quito, Coll. GERMAR-SCHAUM.

sturmii KRAATZ, 1875 (*Molops*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 19, 375)

2 Syntypen, Banat, leg. ZIEGLER, Wallachei, leg. STENTZ, in Coll. v. HEYDEN und Coll. KRAATZ.
Lectotypenfestlegung durch MLYNÁR (soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden).
DEI: ♂ Lectotypus, Banat, leg. ZIEGLER, Coll. KRAATZ; 1 ♂, Paralectotypus, Wallachia, leg. STENTZ, Coll. v. HEYDEN.
Syn. zu *piceus orthogonus* CHAUDOIR, 1868.

subaenea CHAUDOIR, 1850 (*Feronia*)

(Bull. Soc. Nat. Mosc. 23, 144–145)

Mehrere Syntypen, Berg Kuznetsk, leg. GEELER.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, Coll. KRAATZ, Nr. 11.

sublaevigatus TSCHITSCHERIN, 1898 (*Harpalus*)

(Ann. Soc. Ent. Fr. 67, 180–181)

Mehrere Syntypen, Province Transcaspienne, Dord-kuju, 5. V. 1888, leg. SÉMENOW; Turkestan russe occ., désert Kisilkum mér., 1892, leg. GLASUNOW; Turkestan russe mér., vallée du Zerawchan, V. 1893, leg. KOMAROW, montagnes d'Alaj, 5. VI. 1889, leg. GROMBCZEWSKI; in Coll. SÉMENOW und Coll. TSCHITSCHERIN.
DEI: 2 Syntypen, Margelan, Coll. KRAATZ.

subpurpureus REITTER, 1901 (*Chlaenites*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 65)

Mehrere Syntypen, Turkestan, Umgebung von Aulie-Ata.
DEI: 1 Syntypus, Aulie-Ata, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *spoliatus* ROSSI, 1790.

subrobustus SCHAU BERGER, 1938 (*Acupalpus*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 5, 47–48)

Java: Holotypus, M. Gede, in Coll. SCHAU BERGER, 8 Ex. dto., 2 Ex. Sukabumi, 1 Ex. ohne nähere Angabe; Sumatra: 4 Ex. Tebing-tinggi, 6 Ex. ohne nähere Angabe; 1 Ex. Borneo; Celebes: 1 Ex. Samanga, 1 Ex. Makassar, 2 Ex. ohne nähere Angabe; in Coll. SCHAU BERGER und im DEI: Paratypen.
DEI: 1 Ex. Java; 1 Ex. Borneo; 2 Ex. Celebes; 1 Ex. Makassar; 4 Ex. N.O. Sumatra, Tebing-tinggi, leg. SCHULTHEISS; Coll. KRAATZ; 1 Ex. Java occident., Mons Gede, 4000', VIII. 1892, leg. FRUHSTORFER: Paratypen.

subrugosus SCHAU BERGER, 1938 (*Platymetopus*)

(l.c., 39–40)

Holotypus, 3 Paratypen, Celebes, Makassar, Coll. GERMAR-SCHAUM, in Coll. SCHAU BERGER und im DEI.
DEI: Holotypus, Celebes, Makassar, Nr. 66, 1 Paratypus, Celebes; Coll. GERMAR-SCHAUM.

subtilis BATES, 1892 (*Hypolithus*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 338)

Mehrere Syntypen, Burma, Bhamo, leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Birmania, Bhamo, VI. 1885, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

subtilis BATES, 1892 (*Siagona*)

(l.c., 284)

6 ♀, Syntypen, Burma, Rangoon, Senmigion; Palon, Pegu; leg. FEA.
DEI: 3 Syntypen, Birmania, Rangoon, 1887, leg. FEA, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *obscuripes* CHAUDOIR, 1876.

successor REITTER, 1896 (*Araecarabus*)

(Verh. Nat. Ver. Brüm 34 (1895), 172)

Mehrere Syntypen, Thian-Schan, via HAUSER an REITTER.
DEI: 3 Syntypen, Thian-Schan, Musart, VI. 1894, Coll. HAUSER.

suensonii LINDROTH, 1956 (*Synuchus*)

(Trans. R. ent. Soc. Lond. 108, 525)

China, Prov. Fukien, Buong kā, N. Foochow, 28.–29. IV. 1935, ♂ Holotypus, 25 Ex. (many more or less teneral), leg. SUENSON; Kuatum, 1930, 1 ♀, leg. KLAPPERICH, MNP, 2300 m, 18. IV. 1938, 4 Ex. (all teneral), leg. KLAPPERICH; Prov. Chekiang, Hangchow, 23. IV. 1921, mehrere Ex. (teneral); Chekiang, 27. IV. 1920, 1 ♂, (teneral), 4. VI. 1920, 1 ♂; leg. SUENSON; Prov. Hupeh, Mts. Wushan, 2 ♂♂, Coll. HAUSER, BMNH: Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, China, Fukien, Buong kā, 28. IV. 1935, leg. SUENSON.

sulcata MOTSCHULSKY, 1851 (*Tachys*)

(Bull. Soc. Nat. Mosc. 24, 509)

Mehrere Syntypen, Ind. or.
DEI: 1 Syntypus, Ind. or. (Mndrstrn.), Coll. v. HEYDEN.

suturalis MOTSCHULSKY, 1851 (*Tachys*)

(l. c., 508)

Mehrere Syntypen, Ind. or.
DEI: 1 Syntypus, India or. (Mndrstrn.), Coll. v. HEYDEN.

szetschuanus JEDLIČKA, 1932 (*Andrewesius*)

(Ent. Nachrichtenbl. 6, 76)

Holotypus, 54 Paratypen, China, Prov. Szetschuan, Tatsienlu, in Coll. JEDLIČKA, Coll. ANDREWES, Coll. REITTER und im DEI.
DEI: 3 Ex. China, Tatsienlu-Kiulung, 2 Ex. Szechuan, Giufu-Shan; leg. REITTER, Paratypen.

szetschuanus JEDLIČKA, 1932 (*Diplous*)

(l.c., 107)

Holotypus, 10 Paratypen, China, Prov. Szetschuan-Tatsienlu, in Coll. JEDLIČKA und Coll. REITTER.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

szetschuanus JEDLIČKA, 1932 (*Eucalathus*)

(l.c., 73—74)

Holotypus, 55 Paratypen, China, Prov. Szetschuan, Tatsienlu, in Coll. JEDLIČKA und Coll. REITTER.
DEI: 4 Paratypen, China, Tatsienlu-Kiulung, durch REITTER.

tabularis STRANEO, 1941 (*Abacetodes*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 8, 14—15)

♂ Holotypus, Africa meridion., Kapstadt, 25. VI. 1916, leg. ANDREAE, im DEI; 1 ♀, Paratypus, dto., in Coll. STRANEO.
DEI: ♂ Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung.

tachypoda TSCHITSCHERIN, 1898 (*Amara*)

(Horae Soc. Ent. Ross. 32, 209)

♀ Holotypus, Transcaspienne, „Turcmenien, Leder“, ex Coll. REITTER; in Coll. v. HEYDEN, im DEI.

tagax ANDREWES, 1925 (*Tachys*)

(Ann. Mus. Genova 51, 444—445)

Mehrere Syntypen, Kumaon, West Almora, Nainital, Ranikhet, Haldwani-Nandhaur River, Upper Gumi Valley, leg. CHAMPION, Dehra Dun-Kaligad, Siwalik Hills, Musscoorie-Mossy Falls, Kemti Falls, Arni Gad, Tehri Garhwal-Aglar River; leg. CAMERON, im Forest Res. Inst.; Chaubattia, 6000—7000 ft., leg. ARCHER, im Britischen Museum; Sikkim, Tista Valley, Tarkhola, Rangit River, leg. STEVENS.
DEI: 2 Syntypen, W. Almora, Kumaon, leg. CHAMPION.

talyschensis REITTER, 1887 (*Platyderus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 31, 253)

2 ♂♂, Syntypen, Talyschgebirge bei Hamarat, leg. LEDER.
DEI: 1 ♂, Syntypus, Caspi-M. Gebiet, Hamarat, leg. LEDER-REITTER, Coll. KRAATZ (Ex. sehr schlecht erhalten).

taprobanae ANDREWES, 1923 (*Oodes*)

(Spol. Zeyl. 12, 231—232)

♂ Holotypus, Ceylon, Vavuniya, im Britischen Museum; 1 ♀, Paratypus, Anuradhapura, leg. HORN, im DEI.
DEI: 1 ♀, Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, Ceylon, 1899.

taygetana ROTTENBERG, 1874 (*Nebrria*)

(Berl. Ent. Ztschr. 18, 325—326)

Mehrere Syntypen, Griechenland, Taygetos, leg. RAYMOND.
DEI: 3 Syntypen, Taygetos, leg. RAYMOND, Coll. LETZNER-ROTTENBERG.

taygetanus HEYDEN, 1883 (*Zabrus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 27, 306—307)

♂ Holotypus, Griechenland, Taygeto, leg. RAYMOND; im DEI [Coll. v. HEYDEN].

taxianus BREIT, 1912 (*Anophthalmus*)

(Ent. Bl. 8, 210—211)

Mehrere Syntypen, Südgarn, obere Waldregion, Munte Sarco, leg. BREIT, KNIRSCH, TAX.
DEI: 3 Syntypen, Ungarn merid., Mt. Sarco, leg. BREIT.
Syn. zu *dacicus* FRIVALDSKY VON FRIVALD, 1883.

tenebrosus DEJEAN, 1929 (*Harpalus*)

(Spec. Gen. Coleopt. 4, 358—359)

Mehrere Syntypen, Frankreich, Spanien, Deutschland, Österreich, Dalmatien und Barbarie, Coll. DEJEAN.
DEI: 1 Syntypus, Jura, Coll. STIERLIN (Fundort ist nicht aufzufinden und stimmt mit der Originalbeschreibung nicht überein).

teodoroi GRIDELLI, 1930 (*Microdaccus*)

(Boll. Soc. Ent. Ital. 62, 63—65, Fig. 1—3)

Holotypus, Paratypen (ca. 30 Ex.); Insel Rodi, Broussali, 2 km v. d. Stadt Rodi entfernt, Sommer 1927, leg. TEODORO, im Museum Triest.
DEI: 1 Paratypus, Rodi, 1927, leg. TEODORO.

tetrastigma BATES, 1892 (*Amblystomus*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 334)

Mehrere Syntypen, Burma, Bhamo, Teinzò, Rangoon, Palon in Pegu; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Palon, Pegu, VIII. IX. 1887, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

vulcanicum DARLINGTON, 1934 (*Bembidion*)

(Occ. Pap. Boston, Soc. Nat. Hist. 8, 157—158)

♂ Holotypus, M.C.Z. no. 19.625, Südabhang, Vulkan, Irazú, 2800—3000 m, 15. I. 1926, leg. NEVERMANN, 12 Paratypen dto., in M.C.Z. und Coll. NEVERMANN.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

walteri REITTER, 1883 (*Pterostichus*)

(Wien. Ent. Ztg. 2, 224)

5 ♂♂, Syntypen, Montenegro, unfern der dalmatinischen Grenze, leg. WALTER.
DEI: 1 Syntypus, Dalmatien, Coll. FRANKLIN MÜLLER.

waltheri BASILEWSKY, 1932 (*Stictictefflus*)

(Ent. Bl. 28, 22)

D.O. Afrika: ♀ Holotypus, Songea, leg. v. BENNIGSEN; mehrere Paratypen, Upangwa, Lukuledi, Barikiwa (Donde-Gebiet); Zambezie; im Museum Stockholm, Museum Hamburg und in Coll. BASILEWSKY.
DEI: ♀ Holotypus, D.O. Afrika, Songea, leg. v. BENNIGSEN, Coll. v. BENNIGSEN.

whithillii HOPE, 1938 (*Catascopus*)

(The Coleopt. Manual, 164—165, Taf. 3, Fig. 2)

Mehrere Syntypen, Darpouillie.

DEI: 1 Syntypus, Ind. bor., Coll. SCHAUM.

[Der Fundort Darpouillie ist nicht aufzufinden!]

xanthochiton ANDREWES, 1922 (*Bembidium*)

(Ent. Monthly Mag. (3) 8 (58), 176—177)

Sikkim: Holotypus, Gopalghara, in Coll. ANDREWES; Rangit Valley; leg. STEVENS; United Provinces: Kumaon, Upper Gumti Valley, Ranikhet, W. Almora, leg. CHAMPION; Mussoorie, Mossy Falls, Kemti Falls, leg. CAMERON, im For. Res. Inst.; Punjab: Simla Hills, Theog, 7600 ft., leg. CHATTERJEE, im For. Res. Inst.; mehrere Ex.; 1 Ex. Yunnan-fou, in Coll. ANDREWES; Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, Kumaon, Ranikhet, leg. CHAMPION.

zebii SCHAUM, 1857 (*Feronia*)

(Berl. Ent. Ztschr. 1, 140)

Mehrere Syntypen, Creta, leg. ZEBE.

DEI: 1 Syntypus (Ex. verliehen, konnte nicht überprüft werden).

Syn. zu *creticus* FRIVALDSZKY, 1845.**ziegleri** KRAATZ, 1883 (*Carabus*)

(Cat. Col. Europ., 5)

Mehrere Syntypen, Italia borealis.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, Coll. KRAATZ, ex Mus. Vien.

Syn. zu *cancellatus* ILLIGER, 1798.**zimmermanni** PUTZEY, 1875 (*A mara*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. 18, Compt. rendus, 51)

Mehrere Syntypen, Japan, Nagasaki, 20. IV. 1874, Kioto, 7. V.—11. VI. 1874; leg. v. VOLXEM.

DEI: 2 Syntypen, ohne Fundort, Coll. KRAATZ.

Syn. zu *chalcites* DEJEAN, 1828.

Wahrscheinlich nicht beschriebene Arten:

alexanderi HEYDEN (*Callisthenes*)

DEI: 1 Type, Alexander-Gebirge, Coll. KRAATZ.

alpestris pedemontanus SCHWEIGER (*Trichotichnus*)

DEI: 5 Typen; Brenta, Coll. KRAATZ; Ct. Tessin Val Canaria, Coll. WAGNER.

andrewesi VAN EMDEN (*Taridius*)

DEI: 1 Type, O-Java, Tengger, Nonkodjadjar.

biguttatus MOTSCHULSKY (*Lachriophorus*)

DEI: 1 Type, Columbia (Mndrstrn?), Coll. v. HEYDEN.

bodoanus REITTER (*Amara*)

DEI: 1 Type, Ost-Sibirien, Schilka-Gebirge, leg. v. BODEMEYER, Coll. LEONHARD.

caesius BREIT (*Brachynus*)

DEI: 2 Typen, S. W. Thibet, Po-o, Coll. LEONHARD.

chalcopterus SCHAUM (*Catascopus*)

DEI: 1 Type, Penang, Coll. SCHAUM.

conradti ALLUAUD (*Coptoderina*)

DEI: 1 Type, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

conradti ALLUAUD (*Tachys*)

DEI: 2 Typen, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

corrusca DEJEAN (*Callida*)

DEI: 1 Type, Nov. Gran.

dalmatinus grecensis WINKLER (*Neotrechus*)

DEI: 1 Type, Kali pečina bei Grebči.

darlingtoni JEDLIČKA (*Clivina*)

DEI: 1 Type, Nose, Osaka, Coll. KULT.

dives guadaramensis WAGNER (*Chlaenius*)

DEI: 3 Ex. Hispania, Coll. KRAATZ; 1 Ex. La Granja, leg. BRUCK, Coll. v. HEYDEN: Typen.

dives kricheldorffi WAGNER (*Chlaenius*)

DEI: Asturien, Typen: 1 Ex. Puerto Pajares, leg. KRICHELDORFF, Coll. KRAATZ; 1 Ex. Getschmn., 1879, Coll. v. HEYDEN.

dyscolus ALLUAUD (*Thyreopterinus*)

DEI: 1 Type, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

expansus REITTER (*Pterostichus*)

DEI: 1 Type, Juldus, Kulascha, Coll. KRAATZ.

fasciolatum meridianum APFELBECK (*Bembidion*)

DEI: 2 Typen, Alb., Oroši.

favanus SCHAUM (*Rembus*)

DEI: 1 Type, Java.

flavipalpis SAHLBERG (*Pterostichus*)

DEI: 2 Typen, Dudinska, Tolstoinas, durch SAHLBERG, Coll. KRAATZ.

guttatus SCHAUFUSS (*Abacetus*)

DEI: 1 Type, Afrika, Habab, Coll. KRAATZ.

hyalinus ANDREWES, (*Tachys*)

DEI: 5 Typen, Ceylon, Nalanda, 1899, leg. HORN.

incertus SCHAUM? (*Pericalus*)

DEI: 1 Type, Sing., Coll. KRAATZ.

iridescens POPP (*Pterostichus*)

DEI: 1 Type, Schigansk, Lena inter., durch POPPIUS, Coll. LEONHARD, Mus. Zool. H: fors.

irregularis ottomanus APPFELBECK (*Pseudeocheirus*)

DEI: 2 Typen, Bosnien, Vereš, durch APPFELBECK.

juldussana REITTER (*Amara*)

DEI: 1 Type, Seminitschye, Pryewaski, durch v. BODEMEYER, Coll. LEONHARD.

kodymi KULT (*Clivina*)

DEI: 1 Type, La Caja, 8 km w. San José, C.R., 1934, leg. SCHMIDT.

koltzei REITTER (*Sphodrus*)

DEI: 2 Typen, Lappland, Tokmats, Coll. KOLTZE.

laevicollis transalpinus SCHWEIGER (*Harpaliscus*)

DEI: 1 Type, Bosnia, Kosicna, Coll. LEONHARD.

laevigatus venetus GRIDELLI (*Scarites*?)

DEI: 2 Typen, Lit. Albeconi, 15. VII. 1933, Venecia, durch GRIDELLI.

mandli JEDLIČKA (*Graniger*)

DEI: 1 Type, Uferwiesen der Dschaz Morian-Senke, 31. III. 1950, leg. LÖFFLER, Iran-Exped.

mesotincta LIEBKE (*Callida*)

DEI: 2 Typen, Paraguay, Hohenau, 5., 23. IX. 1937, leg. JACOB, Nr. 1752.

minima JEDLIČKA (*Rembus*)

DEI: 2 Typen, China, Szechuan, Nitou Tatsienlu, durch REITTER.

minor ALLUAUD (*Parastrigia*)

DEI: 1 Type, Moa, Coll. V. BENNIGSEN.

nebrioides POPP (*Pterostichus*)

DEI: 1 Type, Lena arct., Bulun, durch POPPIUS, Coll. LEONHARD, Mus. Zool. H: fors.

netolitzkyi DUPUIS (*Tachys*)

DEI: 13 Typen, Formosa, Akaau, XII. 1907, leg. SAUTER.

nigrina KRAATZ (*Siagona*)

DEI: 2 Typen, Aegypten, Coll. KRAATZ.

partita LECORDIER (*Siagona*)

DEI: 1 Type, Rhodesia, leg. BODONG, Coll. KRAATZ.

parvispinus REITTER (*Pseudotophoxenus*)

DEI: 1 Type, Jeldus, Kuldscha.

phila KOLBE (*Eccoptoptera*)

DEI: 1 Type, N.-Nyassa-See, Usafua, Beya-Berg, Sangwe-Fl., 9. VI. 1899, leg. GOETZE, Coll. KRAATZ.

platensis KULT (*Reicheia*)

DEI: 1 Type, ARG-La Plata, Rio Santiago, durch WEISER.

politus pseudinitidus WAGNER (*Dyschirius*)

DEI: 1 Type, Transcaspien, Merw, V. 1900, Coll. HAUSER.

polonicum MAKOLSKY (*Bembidion*)

DEI: 1 Type, Warszawa, Baniocha.

plaumannii LIEBKE (*Callida*)

DEI: 1 Typus, Paraguay, Hohenau, 29. IX. 1935, leg. JACOB, Nr. 1907.

priapus bulgaricus MEIXNER (*Trechus*)

DEI: 1 Ex. Bulgaria, Sofia, Vksa pl., 30. V. 1908, leg. RAMBOUSEK, 1 Ex. Rila Geb., 15. VII. 1911, Coll. LEONHARD, Typen.

priapus rhodopensis MEIXNER (*Trechus*)

DEI: 2 Ex. Bulg. Rhodope Geb., 27. VIII. 1911, 2 Ex. dto. Kuchia Tschan, 8. VIII. 1911, 2 Ex. Bulg. Rila Kloster, 10. VII. 1911, 1 Ex. Bulg. Tschamkorija, 18. VI. 1911; leg. HILF, Coll. LEONHARD, Typen.

pseudarchangelicum REITTER (*Agonum*)

DEI: 1 Type, Karagatan.

pusillus DANIEL (*Aptinus*)

DEI: 1 Type, Asia-minor, Gock-Dagh, leg. v. BODEMEYER.

rugatifrons banningeri KULT (*Mesus*)

DEI: 1 Type, Paraguay, S. Antonio, Staz. Ent. Fabre.

sauteri LIEBKE (*Colliuris*)

DEI: 1 Type, Chikutobi, V. 1911, leg. SAUTER.

simplex SCHAUM (*Tachys*)

DEI: 1 Type, Celebes, Coll. GERMAR-SCHAUM.

superba ZOLOTAREW (*Nebria*)

DEI: 1 Type, Kaukasus centr. bor., Kluchov, 1912.

suturalis ALLUAUD (*Polyaulacus*)

DEI: 1 Type, Usambara, leg. WEISE, Coll. KRAATZ.

tardiformis REITTER (*Harpalus*)

DEI: 1 Type, Quellgebiet des Irkut, Nr. 586, Coll. KOLTZE.

violaceus salisburgensis KRAATZ (*Megadontus*)

DEI: 2 Typen, Salzburg, Coll. KRAATZ.

virgulifera CHAUDOIR (*Lebia*)

DEI: 1 Type, Brasil, Coll. SCHAUM.

weiratherianus SCHAUBERGER (*Harpalus*)

DEI: 1 Type, Galatiens-Phrygien, Emir-Dagh-Gbg. Asm. c. leg. WEIRATHER, Innsbruck.

yunnanus SEMENOW (*Broscus*)

DEI: 2 Typen, China, Prov. Szechuan, Gbg. b. Ningyuenfu.

Zusammenfassung

Für die in den Sammlungen des ehemaligen Deutschen Entomologischen Instituts befindlichen Typenexemplare der Käferfamilie Carabidae wird ein Katalog veröffentlicht.

Summary

A catalogue of the type specimens of the family Carabidae in the collections of the former Deutsches Entomologisches Institut is published.

Резюме

Публикуется каталог типовых экземпляров семейства Carabidae, находящихся в коллекциях бывшего Германского Энтомологического Института.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Beiträge zur Entomologie = Contributions to Entomology](#)

Jahr/Year: 1975

Band/Volume: [25](#)

Autor(en)/Author(s): Döbler Helga

Artikel/Article: [Katalog der in den Sammlungen des ehemaligen Deutschen Entomologischen Institutes aufbewahrten Typen - XII \(Coleoptera: Carabidae\). 99-150](#)