©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

Beitr. Ent., Berlin **25** (1975) 1, S. 99–150

Institut für Pflanzenschutzforschung (BZA)
der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR zu Berlin
Zweigstelle Eberswalde
Abteilung Taxonomie der Insekten (ehem. DEI)
Eberswalde

HELGA DÖBLER

Katalog der in den Sammlungen des ehemaligen Deutschen Entomologischen Institutes[1] aufbewahrten Typen — XII

(Coleoptera: Carabidae)

abnormicollis HEYDEN, 1882 (*Tachypus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. **26**, 100, 118)
♂ Holotypus, Hochgebirge um Margelan, leg. HABERHAUER, in Coll. KRAATZ; im DEI.

acroglyptus BATES, 1892 (*Colpodes*)
(Ann. Mus. Genova (2) **12** (32), 374)
Mehrere Syntypen, Burma; Karin Asciuii Ghecù, alt. 1400–1500 m, leg. FEA; Naga Hills, alt. 4000–5000 ft., leg. CHENNELL.
DEI: 1 Syntypus, Carin Asciuii Ghecù, alt. 1400–1500 m, III.–IV. 1888, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

acutipennis BATES, 1892 (*Gnathaphanus*)
(l.c., 328)
Mehrere Syntypen, Burma, Rangoon, Mandalay, Toungoo, leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Birmania, Rangoon, 1887, leg. FEA.
Syn. zu *laevistriatus* STURM, 1818.

adamsi subcyaneus KRAATZ, 1878 (*Sphodristus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. **22**, 101)
Mehrere Syntypen, Kaukasus, Coll. LEDER.
Lectotypenfestlegung durch MANDL (im Druck).
DEI: Lectotypus, Kaukas., durch LEDER, Nr. 120, Coll. KRAATZ; 2 Ex. dto., 1 Ex. dto. KASBECK, 1 Ex. Coll. KRAATZ; Paralectotypen.

aegaeus APFELBECK, 1904 (*Zabrus*)
(Käferf. Balkanh. **1**, 312–313)
Mehrere Syntypen, Griechenland, Attika, Kykladen, Syra, Naxos, leg. KRÜPER und LEONIS; Kreta, leg. v. OERTZEN.
DEI: 1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Syra, leg. LEONIS, Coll. FRANKLIN MÜLLER.

aeneipennis BATES, 1889 (*Drypta*)
(Ann. Mus. Genova (2) **7** (27), 109)
Mehrere Syntypen, Burma, Bhamó, leg. FEA, in Coll. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Birmania, Bhamó, VII. 1885, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

aenescens CHAUDOIR, 1850 (*Feronia*)
(Bull. Soc. Nat. Moscou **23**, 142–143)
Mehrere Syntypen, parties orientales de la Sibérie, leg. GEBLER und SÉDAKOFF.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, durch CHAUDOIR, Coll. KRAATZ, Nr. 12.

aenigmaticus ALLUAUD, 1935 (*Hyperectenus*)
(Afra **9**, 15–16, Fig. 7–8)
Holotypus, Camerun, leg. CONRADT, ex Coll. KRAATZ; im DEI.

aequecostata STERNBERG, 1907 (*Anthia*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. **49**, 60)
3 ♂♂, Syntypen; Brit. Ostafrika, östlich vom Shire-Fluß, Blantyre; Deutsch-Ostafrika, Uhehe; in Coll. STERNBERG.
DEI: 1 ♂, Syntypus, Kigonsere, 1906, Coll. KRAATZ.

aetolica olympica MAŘAN, 1938 (*Nebria*)
(Sborn. Nar. Mus. Praze **1**, No. 4, 52, 55)
ca. 150 Syntypen; Thessalia, Berg Olympos, 2000–2700 m, 1. VI. 1937, im Museum Prag.
DEI: 1 Syntypus, Graecia albin, Olympos, 2200–2700 m.

[1] Jetzt: Institut für Pflanzenschutzforschung (BZA) der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR, Zweigstelle Eberswalde, Abteilung Taxonomie der Insekten.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

aetolus SCHAUM, 1864 (*Zabrus*)

(Berl. Ent. Ztschr. **8**, 186)

Mehrere Syntypen, Griechenland, am Velucchi, leg. KRUEPER.
DEI: 3 Syntypen, Velucchi, Coll. SCHAUM.

afgana JEDLIČKA, 1956 (*Cymindis*)

(Acta Ent. Mus. Pragae **30** (1955), Nr. 452, 203)

Holotypus, 20 Paratypen, Afghanistan, Badakshan, Anjuman Paß, 1952—1953, Exped. KLAPPERICH, in Coll. KLAPPERICH und Coll. JEDLIČKA.
DEI: 1 Paratypus, NO-Afghanistan, Badakshan, Anjuman-Paß, Anjuman-Geb., 4200 m, 18. VIII. 1952, leg. KLAPPERICH.

albanicus APFELBECK, 1904 (*Zabrus*)

(Käferf. Balkanh. **1**, 316)

♀ Holotypus, Albanien, bei Prisren, leg. DIECK, in Coll. v. HEYDEN; im DEI [Sweti Troitze][1].

albicornis KOLBE, 1889 (*Euleptus*)

(Stett. Ent. Ztg. **50**, 121)

Mehrere Syntypen, Kongo, im Gebiet des unteren Quango, Kwako bis Kimpoko, leg. BÜTTNER.
DEI: 1 Syntypus, Kongo, Kimpoko, leg. BÜTTNER, Coll. KRAATZ.

albicornis SCHAUM, 1860 (*Tachys*)

(Berl. Ent. Ztschr. **4**, 199)

Mehrere Syntypen, Honkong, leg. BOWRING.
DEI: 2 Syntypen, Honkong, Coll. GERMAR-SCHAUM.
Syn. zu *ovatus* MOTSCHULSKY, 1851.

alini JEDLIČKA, 1942 (*Amara*)

(Arb. morph. tax. Ent. **9**, 10—11)

♀ Holotypus, Mandschukuo, Gaolinzsy, leg. ALIN; im DEI. [14. VII. 1946]

alpestris kalofericus MLYNAŘ, ? (*Molops*)

(soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden)

DEI: 1 Paratypus, Kalofer-Balkan, VI. 1933, Mař. Táb.

alpestris rhilensis APFELBECK, 1904 (*Molops*)

(Käferf. Balkanh. **1**, 225)

Mehrere Syntypen, Bulgarien, Rhilo-Dagh.
Lectotypenfestlegung durch MLYNAŘ (soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden).
DEI: 1 ♂ Paralectotypus, Balkan, via KRAATZ.

alternans KUNTZEN, 1912 (*Dercylodes*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 583)

2 ♂♂, 2 ♀♀, Columbien, leg. MORITZ; 1 ♂, 1 ♀, bei Caracas, leg. THIEME, im Museum Berlin; Syntypen.
DEI: 1 Syntypus, Venezuela, Coll. SCHAUM-Coll. KRAATZ.

alveolatus BATES, 1892 (*Mastax*)

(Ann. Mus. Civ. Genova, (2) **12** (32), 398)

Mehrere Syntypen, Palon (Pegu), leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Palon (Pegu), VIII. IX. 1887, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *laeviceps* BATES, 1891.

amphibolus MÜLLER, 1922 (*Dyschirius*)

(Koleopter. Rundsch. **10**, 40, 57)

Mehrere Syntypen, Transkaspien, Gr.-Balachan, Dschebell, 1898, leg. HAUSER, im Wiener Museum.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

anatolica JEDLIČKA, 1965 (*Nebria*)

(Reichenbachia **5**, 213, Fig. 1b)

♂ Holotypus, mehrere Paratypen, Anatolien, Egribel-Paß südlich Giresun, ca. 2400 m Höhe, am Rande von Schneefeldern, VII., leg. HEINZ und KORGE, in Coll. JEDLIČKA, Coll. KORGE und HEINZ.
DEI: 1 Paratypus, Anatolia bor., Egribel-Paß, 2000—2400 m, 28. VII. 1963, leg. KORGE.

andreae TSCHITSCHERIN, 1898 (*Amara*)

(Horae Soc. Ent. Ross. **32**, 221—222)

3 ♂♂ Syntypen, Province de Semiretschje, Umgebung von Issyk-kul, durch KOLTZE.
DEI: 1 ♂ Syntypus, Issik-kul (nicht Issyk-kul!), leg. TSCHITSCHERIN, Coll. KOLTZE, Nr. 1837.

andreae polonicum MÜLLER, 1930 (*Bembidion*)

(Coleopt. Centralbl. **5**, 1)

Holotypus, Warschau, im Museum „Pietro Rossi" in Duino; 4 Ex. Umgeb. von Warschau; 1 Ex. N.-O. Polen, Wilno; 1 Ex. N.-W. Rußland, Peipus-See; durch MAKOLSKI: Paratypen.
DEI: 2 Paratypen, Warszawa, Baniocha.

[1] In [ ] wurden die Angaben gesetzt, die sich auf den Etiketten befanden, in der Originalbeschreibung aber fehlten.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

andreinii GESTRO, 1907 (*Anophthalmus*)

(Ann. Mus. Genova (3) **3**, 170–171)

Mehrere Syntypen, in der Nähe Castelnuovo di Garfagnana, 17. IV. 1907, leg. DODERO und GESTRO.
DEI: 1 Syntypus, Garfagnana, durch PAGANETTI, Coll. FRANKLIN MÜLLER.

andrewesi JEDLIČKA, 1932 (*Horniulus*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. **29**, 86)

Holotypus, 15 Paratypen, Formosa, Banshoryo, Distr. Sokutsu, SAUTERs Exp., im DEI, in Coll. ANDREWES und Coll. JEDLIČKA.
DEI: Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung, 7. VIII. 1912, leg. SAUTER; 11 Paratypen dto.

andrewesi JEDLIČKA, 1931 (*Pterostichus*)

(l.c. **28**, 23–24)

ca. 70 Syntypen, China mer., Prov. Szetschuan, Chung-king, V.–VI. 1929, in Coll. ANDREWES, Coll. BECKER, Coll. JEDLIČKA und im DEI.
DEI: 2 Syntypen, Szetschuan, Chung-king, Coll. BECKER.

andrewesi JEDLIČKA, 1932 (*Risophilus*)

(l.c. **29**, 84–85, Fig.)

Holotypus, Formosa, Suisharyo, Exp. SAUTER; im DEI.

andrewesi JEDLIČKA, 1932 (*Tachys*)

(l.c., 79–80)

Holotypus, 10 Paratypen, Formosa, Akau, Exp. SAUTER, im DEI, in Coll. ANDREWES und Coll. JEDLIČKA.
DEI: Holotypus, 6 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung, XII. 1907.

andrewesi EMDEN, 1937 (*Taridius*)

(Arb. morph. taxon. Ent. **4**, 123–125)

♂ Holotypus, 36 Paratypen, Java, Nongkodjadjar, in Coll. v. EMDEN, Coll. ANDREWES und im DEI.
DEI: 3 Paratypen, O.-Java, Tengger, Nongkodjadjar, 1300 m, leg. WEGENER, Gesch. XII. 1935 von OVERBECK.

angolensis BASILEWSKY, 1942 (*Hystrichopus*)

(l.c., **9**, 165–166)

Holotypus, Angola, Benguella, ex Coll. v. BENNIGSEN; im DEI [Portug. 90. A].

angulifrons BATES, 1892 (*Siagona*)

(Ann. Mus. Genova (2) **12** (32), 284–285)

Mehrere Syntypen, Burma, Rangoon, Mandalay, Palon (Pegu), leg. FEA.
DEI: 2 Ex. Palon, Pegu, 8. IX. 1887; 2 Ex. Birmania, Rangoon, 1886, leg. FEA, Coll. KRAATZ; Syntypen.

angusticollis BATES, 1892 (*Dolichoctis*)

(l.c., 413)

Mehrere Syntypen, Burma, Meetan, Moulmein (Tenasserim), leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Tenasserim, Moulmein, VII. 1887, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

apfelbecki GANGLBAUER, 1892 (*Molops*)

(Käfer Mitteleuropas **1**, 302, 305–306)

Mehrere Syntypen, Herzegowina, Volujak, leg. APFELBECK.
DEI: 1 Syntypus, Herzegowina, Montenegro, Volujak, leg. APFELBECK, Coll. FRANKLIN MÜLLER.

arctica SAHLBERG, 1880 (*Feronia*)

(Svensk. Akad. Handl. (2) **17**, nr. 4, 31)

Mehrere Syntypen, nordwestl. Sibirien, *Lapponia rossica*, im Thal des Jenisseensi, Exped. 1876–1877, im Museum Holm. und Museum Helsingf.
DEI: 1 Syntypus, Lapp. ross., leg. SAHLBERG, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *fastidiosus* MANNERHEIM, 1853.

arimao DARLINGTON, 1934 (*Schizogenius*)

(Psyche **41**, 71–72)

♂ Holotypus, no. 19492, 24 Ex. Cuba, Soledad, nahe Cienfuegos, aus dem Arimao River, VI., 19. X., 1., 3. XII., leg. DARLINGTON, im Museum Comparative Zoölogy; 1 Ex. Cumanayagua, Santa Clara, 10. VI., leg. DE ZAYAS, in Coll. Estación E. Agronómica, Cuba; Paratypen.
DEI: 2 Paratypen, Cuba, Soledad, Cienfuegos, 1. XII. 1926, leg. DARLINGTON.

armeniacus repletus REITTER, 1884 (*Carabus*)

(Wien. Ent. Ztg. **3**, 143)

Mehrere Syntypen, Kaukasus, Swanetien, leg. LEDER.
DEI: 1 Syntypus, Kaukasus, Swanetien, LEDER-REITTER, Coll. KRAATZ, Nr. 462.

armeniacus scintillus REITTER, 1884 (*Carabus*)

(l.c., 143)

Mehrere Syntypen, Kaukasus, Swanetien, leg. LEDER.
DEI: 1 Syntypus, Kaukasus, Swanetien, durch LEDER-REITTER, Coll. KRAATZ.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

armeniacus subincatenatus KRAATZ, 1878 (*Sphodristus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. **22**, 108)

♂ Holotypus, ex Coll. SCHAUM; im DEI.

articulatoides JEDLIČKA, 1932 (*Bembidion*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. **29**, 79)

Holotypus, China, Prov. Schantung, im DEI; 2 Ex. dto.; 7 Ex. Tientsin: Paratypen.
DEI: Holotypus, 1 Ex. China, Schant., Jentschoufu, 1911—1912, leg. KREYENBERG, 6 Ex. Tientsin, Ross commut: Paratypen.

asper JEDLIČKA, 1936 (*Platynus*)

(Čas. Čs. Spol. Ent. **33**, 17)

Holotypus, China, Yunnan fou; 18 Paratypen, dto., in Coll. JEDLIČKA, Coll. ANDREWES und im DEI.
DEI: 2 Paratypen, China merid., Provincia Yunnan.

auropunctata alaiensis LAPOUGE, 1930 (*Campalita*)

(Misc. Ent. **32**, 85—86)

Mehrere Syntypen, Alai.
DEI: 1 Syntypus, Alai, Jspajran, Coll. LEONHARD.

babaulti ANDREWES, 1924 (*Bembidium*)

(Miss. BABAULT, Prov. Centr. Inde, 80—81, Tafel 1, Fig. 7)

Indien, occ. Himalaya, 1914: 1 Ex. Kulu, Mandi, leg. BABAULT; mehrere Ex. Kumaon, W. Almora und Nainital, leg. CHAMPION; Syntypen.
DEI: 1 Syntypus, W. Almora, Divn, Kumaon, U.P. III. 1917, leg. CHAMPION.

badakschanus JEDLIČKA, 1955 (*Harpalus*)

(Acta Ent. Mus. Nat. Pragae **30**, Nr. 452, 196)

♂ Holotypus, 4 ♂♂ Paratypen, Afghanistan, Badakschan, Shiwa, Exped. KLAPPERICH, 1952—1953, in Coll. KLAPPERICH und Coll. JEDLIČKA.
DEI: 1 ♂, Paratypus, NO-Afghanistan, Badakschan, Schiwa, Hochsteppe, 2900 m, 11. VII. 1953, leg. KLAPPERICH.

bakeri DUPUIS, 1913 (*Casnoidea*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. **57**, 270—277)

3 Syntypen, Philipinnes, Los Banos, leg. BAKER.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, P.J.

balcanicus HEYDEN, 1883 (*Zabrus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. **27**, 309)

♂ Holotypus, Balkangebirge, leg. HABERHAUER, in Coll. v. HEYDEN; im DEI.

bänningeri JEDLIČKA, 1931 (*Pterostichus*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. **28**, 24—25)

11 ♂♂, Syntypen, China mer.; Prov. Szetschuan, Chung-king, V.—VI. 1929, in Coll. ANDREWES, Coll. JEDLIČKA und im DEI.
DEI: 1 Syntypus, Chung-king, Szetschuan, Coll. BECKER.

basalis SLOANE, 1907 (*Phloeocarabus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 182)

Mehrere Syntypen, New Guinea, New Pommerania (N. Britain), Gazelle, Peninsula, leg. v. BENNIGSEN, in Coll. HORN und Coll. v. BENNIGSEN.
DEI: 1 Syntypus, Gazelle, M. Insel, Coll. v. BENNIGSEN.

batesii CHAUDOIR, 1861 (*Hiletus*)

(Bull. Soc. Nat. Mosc. **34** (1), 508—510)

Mehrere Syntypen, Region des Amazonas, Ega, leg. BATES.
DEI: 1 Syntypus, Ega, ex Museo BATES 1892 — ex Coll. v. HEYDEN.

beckeri JEDLIČKA, 1931 (*Dolichus*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. **28**, 28—29)

11 Syntypen, China mer.; Prov. Szetschuan, Chung-king, V.—VI. 1929, in Coll. JEDLIČKA.
DEI: 1 Syntypus, Chung-king, Szetschuan, Coll. BECKER.

beesoni ANDREWES, 1927 (*Pterostichus*)

(Ent. Mitt. **16**, Nr. 2, 145—146)

Holotypus, Irak, Amara, 13.—15. XI. 1916, leg. BEESON, im Britischen Museum; 3 Ex. dto., 6 Ex. Basra, 16.—22. IV., 13. VI. 1926, leg. SCHMIDT, im DEI; Paratypen.
DEI: 4 Paratypen, Basra, 16.—22. IV., 13. VI. 1926, leg. SCHMIDT.

belli ANDREWES, 1925 (*Tachys*)

(Ann. Mus. Genova **51**, 411—412)

14 Syntypen, Sind, Karachi, leg. BELL.
DEI: 1 Syntypus, Karachi, leg. BELL.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

bennigseni STERNBERG, 1906 (*Anthia*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 164–165)

6 ♂♂, Syntypen, Afrika, in Coll. STERNBERG.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, Coll. v. BENNIGSEN.

bennigseni SLOANE, 1907 (*Colpodes*)

(l.c., 177–178)

Mehrere Syntypen, New Guinea, Kaiser Wilhelm Land, Sattelberg, leg. v. BENNIGSEN, in Coll. HORN.
DEI: 1 Syntypus, D.N. – Guinea, Sattelberg, Coll. v. BENNIGSEN.

bennigseni SLOANE, 1907 (*Lesticus*)

(l.c., 471–472)

♀ Holotypus, New Guinea, Gazelle Peninsula, Herbertshöhe, leg. v. BENNIGSEN, in Coll. HORN; im DEI [Hinterland von Herbertshöhe].

bennigseni ALLUAUD, 1935 (*Rhopalomelus*)

(Afra **9**, 11–12)

Holotypus, Afrique, N.-E. Nyassa, Uhéhé, Coll. v. BENNIGSEN, im DEI.

bhamoensis BATES, 1892 (*Ophionea*)

(Ann. Mus. Genova (2) **12** (32), 380)

Mehrere Syntypen, Burma, Bhamó, leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Birmania, Bhamó, VI. 1885, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

biangulata DUPUIS, 1912 (*Pentagonica*)

(Bull. & Ann. Soc. Ent. Belg. **56**, 312–314)

Holotypus, Formosa, Kosempo, leg. SAUTER; im DEI [VIII. 1909].

bicolor BASILEWSKY, 1942 (*Pseudolebia*)

(Arb. morph. taxon. Ent. **9**, 164, Fig. 1)

4 Syntypen, Madagascar, Coll. KRAATZ, im DEI.
DEI: 1 Ex. Madagascar, Coll. KRAATZ, 1 Ex. ohne Fundort; Syntypen.

bifasciata SCHAUM, 1860 (*Pericatus*)

(Berl. Ent. Ztschr. **4**, 191–192, Tab. 3, Fig. 4; nom. praeocc. = *schaumii* CHAUDOIR, 1861, l.c., **5**, 123)

Mehrere Syntypen, Costarica, leg. WAGNER.
DEI: 1 Syntypus, Costa Rica, Coll. SCHAUM.

biharicus BREIT, 1912 (*Pterostichus*)

(Koleopter. Rundsch. **1**, 153–154)

Mehrere Syntypen, Ungarn, Südbihar, Waldregion des Cucurbetastockes, leg. BREIT.
DEI: 2 Syntypen, Hungaria, Biharförde, Bihar.-Com., Coll. LEONHARD.
Syn. zu *sacheri* FRIVALDSKY, 1865.

binoculus BATES, 1892 (*Creagris*)

(Ann. Mus. Genova (2) **12** (32), 390)

Mehrere Syntypen, Burma, Bhamò, Khasia Hills, leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Birmania, Bhamò, VIII. 1885, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

birmanica BATES, 1892 (*Galerita*)

(Ann. Mus. Genova (2) **12** (32), 385–386)

Mehrere Syntypen, Birmania, Bhamò, leg. FEA.
DEI: 2 Syntypen, Birmania, Bhamò, VIII., IX. 1886, leg. FEA, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *peregrina* DOHRN, 1880.

birmanicus BATES, 1892 (*Megalonychus*)

(l.c., 369)

Mehrere Syntypen, Burma, Bhamò, Teinzò, Karin Asciuii Chebà, alt. 1200–1300 m; Noa Dehing in Assam, Khasia Hills, alt. 2000 ft.; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Carin Asciuii Chebà, 1200–1300 m, III. 1888, leg. FEA.

birmanicus BATES, 1892 (*Trechus*)

(l.c., 297–298)

Mehrere Syntypen, Burma, Karin Asciuii Ghecù, alt. 1400–1500 m, leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Carin Asciuii Ghecù, 1400–1500 m, III.–IV. 1888, leg. FEA.

blandulum NETOLITZKY, 1910 (*Bembidion*)

(Wien. Ent. Ztg. **29**, 221–223)

Holotypus, „Persia sett. Doria 62", ex Museo Civ. Genova, in Coll. v. HEYDEN; im DEI.

blandus ANDREWES, 1924 (*Tachys*)

(Miss. BABAULT, Prov. Centr. Inde, 85–87, Taf. 1, Fig. 8)

Indien, occ. Himalaya, 1914; 1 Ex. Provinces Centrales, Montinala, leg. BABAULT; mehrere Ex.: Nagpur, Hoshangabad, Mandla, Fluß Nerbudda, leg. D'ABREU; Chota Nagpur, Ranchi, leg. IRVINE, im Indischen Museum; Bombay, Khandesh, leg. BELL; Syntypen.
DEI: 1 Syntypus, Ranchi, leg. IRVINE, Indian-Museum Calcutta.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

blumenthali HEINZ, 1965 (*Pterostichus*)

(Reichenbachia **6**, 18—20)

♂ Holotypus, Kleinasien, Abant-Gebirge, 8. VIII. 1963, ca. 1100 m, leg. HEINZ, in Coll. HEINZ; Paratypen: 5 Ex. dto., in Coll. HEINZ und Coll. JEDLIČKA; 16 Ex. dto., 20., 21. VIII. 1964, in Coll. HEINZ; 13 Ex. dto., 8. VIII. 1963/30. V. 1964, leg. KORGE, in Coll. KORGE.
DEI: 1 Paratypus, Anatolia bor., Abant-Geb. bei Bolu, 30. V. 1964, leg. KORGE.

bodemeyeri REITTER, 1907 (*Agonum*)

(Wien. Ent. Ztg. **26**, 66)

Mehrere Syntypen, Kleinasien, Sabandja, Karakeny, leg. v. BODEMEYER; Syrien, Kaukasus.
DEI: 1 Syntypus, Asia minor, Sabandja, leg. v. BODEMEYER, Coll. LEONHARD.

bodemeyeri DANIEL, 1902 (*Bembidium*)

(Münch. Kol. Ztschr. **1**, 101)

Mehrere Syntypen, Asiae minoris provinciae, Phrygia und Bithynia, Biledschik, Eskischehir, 1899, leg. v. BODEMEYER.
DEI: 1 Syntypus, Asia minor, Biledjek, leg. v. BODEMEYER, Coll. LEONHARD.

bodemeyeri APFELBECK, 1904 (*Brachynus*)

(Käferf. Balkanh. **1**, 347, 352—353, Fig. 4)

Mehrere Syntypen, Ost-Rumelien, Burgas, am Ufer des Salzsee's von Athanaskenj, 1892; Türkei, Konstantinopel, am Meeresstrand bei San Stefano, Floria und Kütschük Tschekmedjé, 1900; Griechenland, Korfu, Salzsumpf bei Kalichiopoulo, 1893; leg. APFELBECK; Missolonghi, leg. LEONIS; Albanien, Valona, leg. PATSCH; Kleinasien, Ak Chéhir, Konia, Burna, Bulghar Maadén, 1899, leg. v. BODEMEYER; Kaukasus; Algerien, Zeïtoun; in Coll. REITTER; Andalusien, Chiclana, 1890, leg. KORB, im Museum Wien.
DEI: 2 Syntypen, Asia-Minor, Bulghar-Maaden, Konia, leg. v. BODEMEYER.

bodemeyeri GANGLBAUER, 1900 (*Laemostenus*)

(In BODEMEYER, Quer durch Klein-Asien, 134—135)

1 ♂, 2 ♀♀, Syntypen, bei Bulghar-Magara, Nordseite des cilicischen Taurus.
DEI: 2 Syntypen, Asia minor, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. LEONHARD.

bodemeyeri FLEISCHER, 1915 (*Tachys*)

(Ent. Mitt. **4**, Nr. 4/6, 130)

Mehrere Syntypen, Nordpersien, Iran, Elbursgebirge, leg. v. BODEMEYER.
DEI: 2 Ex. mit den Angaben der Beschreibung, Coll. LIEBMANN, 1 Ex. dto. Dörwögh-Dagh, Coll. LEONHARD; Syntypen.

bodemeyeri GANGLBAUER, 1914 (*Zabrus*)

(Münch. Kol. Ztschr. **4**, 95, 129)

♂ Holotypus, Bos Dagh bei Eski Schehir, leg. v. BODEMEYER; im DEI [Asia minor, Bos-Dagh].

bodoanus REITTER, 1913 (*Trechus*)

(Ent. Bl. **9**, 172—173)

Mehrere Syntypen, Chinesisch-Turkestan, Thian-Schan, leg. v. BODEMEYER.
DEI: 1 Syntypus, China, Thian-Schan, leg. v. BODEMEYER, Coll. LEONHARD.

bodongi STERNBERG, 1910 (*Tefflus*)

(Stett. Ent. Ztg. **71**, 139)

Wenige Syntypen, Rhodesia, Manika-Land, Umtali, leg. BODONG, Zomba, Brit. S.-O. Afrika.
DEI: 1 Syntypus, Rhodesia, Umtali, leg. BODONG, Coll. KRAATZ.

bombycinus ANDREWES, 1925 (*Tachys*)

(Ann. Mus. Genova **51**, 385—386)

Mehrere Syntypen, Kumaon, Tanakpur, Swal River Basin, River Sarda Gorge, Haldwani-Nandhauer River; leg. CHAMPION; Dehra Dun, leg. CAMERON, im Forest. Res. Inst.; Eastern Duars; Sikkim, Gopaldhara; leg. STEVENS.
DEI: 1 Syntypus, E. Dooars, leg. STEVENS.
[Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Eastern Duars" steht auf dem Etikett „E. Dooars".]

bradycelloides REITTER, 1900 (*Harpalus*)

(Verh. naturf. Ver. Brünn **38** (1899), 113)

Mehrere Syntypen, Ostsibirien, Irkut; Nördliche Mongolei, Urga, Changai; Turkestan, Thian-Schan.
DEI: 1 Syntypus, Quell. d. Irbut, leg. REITTER.
Syn. zu *pusillus* MOTSCHULSKY, 1850.
[Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Irkut" steht auf dem Etikett „Irbut".]

breiti montisgrappae AGAZZI, 1960 (*Duvalius*)

(Boll. Soc. Ent. Ital. **90**, 78—80, Fig. 1—3)

Veneto, M. Grappa (Vicenza): in una cannoniera lungo la S. S. Cadorna (N. 141), il 1. VII. 1951, leg. MAGISTRETTI, 4 Ex.; Valle di Cancell' alto, sotto pietre infossata, tra il terriccio delle dolinette e di un piccolo cañon di origine glaciale e sotto pietre vicino le pozze di neve: 9 Ex. 20. VI. 1957, leg. GIACOMAZZO; 7 Ex. 17. VII. 1957, leg. RAFFONE; 28 Ex. (di cui una ♀ molto immatura), 15. VIII. 1957, leg. CADAMURO; 13 Ex. 15. VI. 1958, leg. BUCCIARELLI; 38 Ex. 10. VIII. 1958, leg. AGGAZI; 75 Ex. 15. VIII. 1958, leg. CADAMURO; 10 Ex. 28. V. 1959, leg. CADAMURO; 34 Ex. 5. VI. 1960, leg. AGAZZI; Holotypus und Paratypen, in Coll. AGAZZI; altri paratypi nelle Coll. CADAMURO, BUCCIARELLI und MAGISTRETTI.
DEI: 1 ♀, Paratypus, M. Grappa, Cancell' alto, 5. VI. 1960, leg. AGAZZI, Col. AGAZZI.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

bremii GERMAR, 1817 (*Nebria*)

(Fauna Ins. Eur. **14**, Nr. 1, Tab. 1)

Mehrere Syntypen, Helvetiae alpibus, im Museum GERMAR.
DEI: 1 Syntypus, Helvetia Alp., Coll. GERMAR-SCHAUM.

brevicostatus forticostis BASILEWSKY, 1932 (*Tefflus*)

(Bull. Soc. Ent. Fr., 203)

D.O. Afrika: ♀ Holotypus, Usegua, 1 ♂, Usambara; im Britischen Museum; 2 Ex. Bagamoyo, im Museum Paris; Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, D.O. Afrika, Bagamoyo.

breviformis BATES, 1892 (*Epicosmus*)

(Ann. Mus. Genova (2) **12** (32), 299)

Mehrere Syntypen, Burma, Karin Chebà, alt. 900—1100 m, Palon in Pegu, Thagata in Tenasserim; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Palon, Pegu, VII.—IX. 1887, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

brevimarginatus STRANEO, 1941 (*Caelostomus*)

(Ann. Mus. Stor. nat. Genova **61**, 12—13)

Holotypus, mehrere Paratypen; Kenya, Budongo, Kaimosi, leg. TURNER; N. Kavirondo, Osiri, leg. TURNER; Kamerun; Togo; Is. Fernando Poo, Basilé, leg. FEA; Congo Belga, Elisabethville, leg. RICHARD; in Coll. STRANEO.
DEI: 4 Paratypen, Togo, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

breviuscula SAHLBERG, 1844 (*Feronia*)

(In Faun. Insect. Rossicam Symbola, 31)

Mehrere Syntypen, Ochotsk.
DEI: 1 Ex. Ochotsk, 1 Ex. ohne Fundort; Coll. KRAATZ, Syntypen.

breviusculus KRAATZ, 1876 (*Procerus*)

(Bull. Moscou **51**, 132, 135—137, Taf. 1, Fig. 2, 3)

Mehrere Syntypen, Kleinasien, Brussa.
DEI: Syntypen: 1 Ex. Brussa, leg. KRAATZ; 1 Ex. Brussa, leg. FRIWALD; 5 Ex. ohne Fundort; Coll. KRAATZ.
Syn. zu *scabrosus* OLIVIER, 1795.

brucei ANDREWES, 1923 (*Amara*)

(Ann. Mag. Nat. Hist. (9) **11**, 276)

Mehrere Syntypen, Tibet, in der Nähe Base Camp, Upper Rombuk, 16.500 ft., V., leg. LONGSTAFF, Mount Everest Expedition.
DEI: 1 Syntypus, Tibet, Everest base camp, Bougbuk Glacier, 16.500 ft., 17.—20. V. 1922, leg. LONGSTAFF.

bruckii SCHAUM, 1859 (*Pterostichus*)

(Berl. Ent. Ztschr. **3**, 47)

Mehrere Syntypen, Serbien, leg. ZEBE.
DEI: 1 Ex. Serbia, 2 Ex. ohne Fundort; Coll. GERMAR-SCHAUM, Syntypen.

bucculentus KRAATZ, 1874 (*Harpalus*)

(l.c. **18**, 299)

Mehrere Syntypen, bei Sarepta, leg. BECKER.
DEI: 2 Syntypen, Sarepta, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *servus* DUFTSCHMIDT, 1812.

bucharica TSCHITSCHERIN, 1898 (*Amara*)

(Horae Soc. Ent. Ross. **32**, 211)

♀ Holotypus, Buchara occid., Karakum, Prov. Transcaspienne, leg. HAUSER, Coll. v. HEYDEN; im DEI.

bucharicus TSCHITSCHERIN, 1898 (*Harpalus*)

(L'Abeille **29**, 94—95)

Mehrere Syntypen, Emirat de Buchara, durch STAUDINGER, in Coll. TSCHITSCHERIN.
DEI: 1 Syntypus, Buchara, Coll. KRAATZ.

bucolica KOLBE, 1894 (*Anthia*)

(Stett. Ent. Ztg. **55**, 201)

Mehrere Syntypen, Central-Afrika, Bukoba, Westufer des Victoria-Njansa, 19. XI. 1890, leg. STUHLMANN.
DEI: 1 Syntypus, N. Victoria-Nyassa, Ussoga u. Uganda, V.—VIII. 1894, durch NEUMANN.

burgeoni STRANEO, 1941 (*Caelostomus*)

(Ann. Mus. Stor. nat. Genova **61**, 9—10)

Holotypus, mehrere Paratypen, Is. Fernando Poo, Basilé, 400—600 m, leg. FEA; Camerun, Reg. Lolodorf, leg. VADON; Victoria, leg. FEA; Congo, Ogooué, Sam Kita; Lambaréné; leg. ELLENBERGER; im Museum Civio di Genova, in Coll. STRANEO und im Museum di Parigi.
DEI: 2 Paratypen, Kamerun, durch CONRADT, Coll. KRAATZ.

bureši KNIRSCH, 1923 (*Pheggomisetes*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. **20**, 1—5, Fig. 1)

Mehrere Syntypen, Bulgariae, in der Nähe Vratca, leg. BUREŠ.
DEI: 1 Syntypus, Levlenik b. Vratca, Balkan, Bulgarien, Coll. LEONHARD-Coll. KNIRSCH.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

byzantinus APFELBECK, 1901 (*Trechus*)

(Glasn. zem. muz. Sarajevo **13**, 426)

Mehrere Syntypen, Bujuk-Dere (Zarigrad), leg. APFELBECK.
DEI: 1 Syntypus, Constantinopel, Belgrader-Wald, durch v. BODEMEYER.

caligatus BATES, 1889 (*Brachinus*)

(Ann. Mus. Genova (27) **7** (2), 109—110)

Mehrere Syntypen, Burma, Bhamò, leg. FEA, in Coll. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Birmania, Bhamò, VIII. 1886, leg. FEA, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *melancholicus* SCHMIDT-GOEBEL, 1846.

calva STERNBERG, 1907 (*Anthia*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 59)

7 ♂♂, 2 ♀♀, Syntypen, Region des Tanganjika, ex Coll. OBERTHÜR, in Coll. STERNBERG und OBERTHÜR.
DEI: 1 ♂, Syntypus, Region du Tanganika, 1900—, leg. DEPAILLAT, Coll. KRAATZ.

camerunus breuningi BASILEWSKY, 1932 (*Heteroteffus*)

(Ent. Bl. **28**, 24)

♀ Holotypus, Cameroun, Joko; im DEI.

caprai STRANEO, 1938 (*Caelostomus*)

(Ann. Mus. Stor. nat. Genova **60**, 66—67)

Holotypus, mehrere Paratypen (ca. 100 Ex.), Java: Mons Gede, Pengalengang, leg. FRUHSTORFER; Tangkoeban Prahoe, leg. DRESCHER und JACOBSON; Preanger, M. Boetangrang, G. Patoeha-Preanger, G. Oengaran, Zuid-Banjoemas, Koebangkang Koeng, G. Slamat, Batoerraden; leg. DRESCHER; Toegoe, Gounod Gedeh, Radja Mendala; leg. LEDRU; G. Raoang, Bajoe Kidoel, leg. LUCHT; Tcibodas, leg. BECCARI, etc.; in Coll. STRANEO, Coll. ANDREWES, Coll. DRESCHER, Coll. OBERTHÜR, im Museum Civ. Genova, Museum Amsterdam, Museum Buitenzorg und im Museum Paris.
DEI: 1 Paratypus, Java, Preanger, G. Tangkoeban Prahoe, 4000—5000 ft., XII. 1937, leg. DRESCHER.

castaniventris BATES, 1892 (*Colpodes*)

(Ann. Mus. Genova (2) **12** (32), 374)

Mehrere Syntypen, Burma, Karin Asciuii Ghecu, alt. 1400—1500 m, leg. FEA.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, III.—IV. 1888, Coll. KRAATZ.

catenulatus rattii MANDL, 1966 (*Carabus*)

(Koleopter. Rundsch. **43/44** (1965), 48—49)

♂ Holotypus, Italien, Erber, Mte. Palanzone (Como), ca. 1000 m, 20. III. 1966; Paratypen: 1 ♀, dto., 26 Ex. Mte. Palanzone; leg. RATTI; 2 Ex. Lombardia, Canzo, Gajum, in der Nähe Mte. Palanzone, leg. BARI; in Coll. MANDL.
DEI: 2 Paratypen, Italia, Prealpi Lombarde, Mt. Palanzone (Co.), 800—1000 m, 11. V. 1966, leg. RATTI.

celebensis SCHAUFUSS, 1885 (*Miscelus*)

(Horae Soc. Ent. Ross. **19**, 184)

Mehrere Syntypen, Süd-Celebes, Macassar, leg. HOECK, im Museum LUDWIG SALVATOR, in Coll. SCHAUFUSS oder Coll. KLOCKE.
DEI: 1 Syntypus, Macassar, Coll. SCHAUFUSS.
Syn. zu *javanus* KLUG, 1834.

cephalonicus WINKLER, 1914 (*Trechus*)

(Koleopter. Rundsch. **3**, 171)

Mehrere Syntypen, Cephalonia, Megalo Vuno, IV. 1905, ca. 1200 m, leg. LEONHARD, MOCZARSKI und WINKLER.
DEI: 1 Syntypus, Kephallenia, Gleutherios-Paß, 1905, leg. LEONHARD, Coll. LEONHARD.

ceylanensis STRANEO, 1938 (*Caelostomus*)

(Ann. Mus. Stor. nat. Genova **60**, 28—29, Fig. 31)

Holotypus, mehrere Paratypen, Ceylon, Vavuniya, Anuradhapura, leg. HORN; Hiwaite; in Coll. ANDREWES, Coll. STRANEO, Coll. OBERTHÜR, im Museum Oxford und im DEI.
DEI: 1 Paratypus, Anuradhapura, 1899, leg. HORN, Coll. KRAATZ.

charis ANDREWES, 1925 (*Tachys*)

(Ann. Mus. Genova **51**, 407, 454—455)

Holotypus, Central Provinces, Nagpur, leg. D'ABREU; mehrere Paratypen: Ceylon, leg. NIETNER, HORN und HENRY; Bombay, Belgaum, leg. ANDREWES; Chota Nagpur, Konbir, leg. CARDON; Orissa, Kallikote, leg. ANNANDALE; Bengal, Galatea Expedition-Copenhagen Mus.; Madras, Nilgiri Hills, leg. ANDREWES und MAINDRON, Vizagapatam, leg. PATUCK; Mysore, leg. ANDREWES und CAMPBELL.
DEI: 2 Paratypen, Ceylon, Anuradhapura, 1899, leg. HORN.

chinadensis JEDLIČKA, 1932 (*Harpalus*)

(Ent. Nachr.bl. **6**, 69—70)

Holotypus, 89 Paratypen, China, Prov. Szetschuan, Tatsienlu, in Coll. JEDLIČKA, Coll. SCHAUBERGER und Coll. REITTER.
DEI: Paratypen: 4 Ex. China, Tatsienlu-Kiulung, leg. REITTER; 1 Ex. China merid. Tatsienlu, Prov. Szetschuan.

chinensis JEDLIČKA, 1932 (*Tachys*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. **29**, 81—82)

Holotypus, China, Prov. Schantung, Jentschoufu, im DEI; 3 Ex. dto.; 1 Ex. Tientsin; Paratypen.
DEI: Holotypus, 1 Ex. Jentschoufu, Schantung, 22. V. 1911—12, leg. KREYENBERG; 1 Ex. China, Tientsin, Ross commut.; Paratypen.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

chinnada ANDREWES, 1921 (*Dioryche*)

(Rec. Ind. Mus. **22**, 342–343)

Holotypus, Bombay, Belgaum, leg. ANDREWES, (?) Ex. Kanara, leg. BELL; 5 Ex. Madras, Bangalore, Malabar, Pondicherry, Bombay, Ceylon, Trincomali, leg. BAKER; im Britischen Museum; 1 Ex. Madras, Ganjam Dist., Chilka Lake, Barkuda, leg. ANNANDALE, 1 Ex. „at light", U.P., Gorakhpur; 1 Ex. Bombay, Satara, Medha, 1 Ex. Ratnagiri, Pimpli, Rashishti Valley, leg. GRAVELY; im Ind. Museum; 2 Ex. Madras, leg. PATTON, im Bombay Nat. Hist. Soc.; 1 Ex. Bengal, Pusa, 2 Ex. Bombay, Belgaum, 1 Ex. C.P., Bilaspur, Janjgir, 1 Ex. Madras, Coimbatore; im Agric. Res. Inst. Pusa; 1 Ex. Madras, Coimbatore, im Agric. Coll. Res. Inst. Coimbatore; mehrere Ex. C.P., Nagpur, Raipur Dist., Tumgaon, leg. D'ABREU, im Centr. Mus. Nagpur; 1 Ex. Mysore State, leg. CAMPBELL, 3 Ex. BUTLER coll. PONDICHERRY; im Oxford University Museum (Hope Dept.); Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, C.P. India, Tumgaon, Raipur Distr., 21. II. 1917, leg. D'ABREU, Central Mus. Nagpur, C.P.

chitra ANDREWES, 1923 (*Dolichoctis*)

(Spol. Zeyl. **12**, 246–247)

Ceylon, leg. GREEN, in Coll. ANDREWES (Holotypus), Nalanda, Negombo und Kandy, leg. HORN, im DEI, Ceylon, leg. NIETNER, im Museum Stettin; mehrere Paratypen.
DEI: 2 Paratypen, Ceylon, Kandy, Negombo, 1899, leg. HORN.

circassicus GANGLBAUER, 1886 (*Tribax*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. **30**, 334, 336)

6 ♂♂, 9 ♀♀, Syntypen, west. Kaukasus, Atchischho, Pseaschha, leg. STARCK.
DEI: 2 Syntypen, Caucasus, durch GANGLBAUER, Nr. 344, Coll. KOLTZE.

circumtinctus BATES, 1892 (*Brachinus*)

(Ann. Mus. Genova (2) **12** (32), 396)

Mehrere Syntypen, Burma, Sennigion, leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Birmania, Sennigion, 28. II. 1886, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

clandestinum STURM, 1824 (*Agonum*)

(Deutschl. Fauna, Insekt. **5**, 212, Taf. 137, Fig. c, C)

Mehrere Syntypen, Oesterreich, leg. MEGERLE VON MÜHLFELD.
DEI: 1 Syntypus, Oesterreich, Coll. GERMAR-SCHAUM.
Syn. zu *mülleri* HERBST, 1785.

clarum ANDREWES, 1923 (*Bembidium*)

(Ent. Monthly Mag. **59**, 98–99)

Holotypus, Sikkim, Gopaldhara, mehrere Ex. dto. und Gielle Khola in der Tisla Valley; leg. STEVENS, in Coll. ANDREWES; mehrere Ex.: Assam, Yambung und Janakhmukh, Bank von Dihong River, leg. KEMP, Abor Expedition, im Indischen Museum; Kumaon, W. Almora, Chakrata, Khaula, Ranikhet, Tanakpur, Nainital, Upper Gumti Valley, River Sarda Gorge; Garhwal, Siuni Gad; leg. CHAMPION; Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, Br. Sikkim, Gopaldhara, leg. STEVENS.

coelestis BALIANI, 1932 (*Amara*)

(Mem. Soc. Ent. Ital. **11**, 16, Taf. 2, Fig. 12)

11 ♂♂, 15 ♀♀, Syntypen, China centrale, Tatsienlu-Chiulung, prov. di Szechuan, durch REITTER.
DEI: 1 Syntypus, China, Tatsienlu Kiulung, durch REITTER.

coelestis buchi HAUSER, 1913 (*Coptolabrus*)

(Stett. Ent. Ztg. **74**, 304–306)

Mehrere Syntypen, Prov. Tschekiang, ad urb. Wenchow und Haimen.
DEI: 1 Syntypus, Tschekiang, Wentschan.

coeruleiceps BATES, 1892 (*Chlaenius*)

(Ann. Mus. Genova (2) **12** (32), 320–321)

Mehrere Syntypen, Burma, Karin Chebà, alt. 900–1100 m, leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Carin Chebà, 900–1100 m, V. XII. 1888, leg. FEA, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *pudicus* FABRICIUS, 1801.

coeruleipennis HAUSER, 1913 (*Coptolabrus*)

(Stett. Ent. Ztg. **74**, 304)

Mehrere Syntypen, Yuyao.
DEI: 1 Syntypus, Chekiang, Yuyao.
Syn. zu *lafossei* FEISTHAMEL, 1845.

colchicum CHAUDOIR, 1850 (*Bembidium*)

(Bull. Soc. Nat. Moscou 23, 175–176)

Mehrere Syntypen, Armenien, am Ufer des Rion, in Mingrélie und bei Koutaïs in Imérétie, leg. CHAUDOIR.
DEI: 1 Syntypus, Armenien, Coll. SCHAUM.

compactum ANDREWES, 1922 (*Bembidium*)

(Ent. Monthly Mag. **58**, 240–241)

Holotypus, mehrere Paratypen, United Provinces, Kumaon, West Almora, Ranikhet, Bhatkot, Swal R. basin, R. Sarda gorge, leg. CHAMPION, Dehra Dun, leg. CAMERON, im For. Res. Inst. und Britischen Museum.
DEI: 1 Paratypus, W. Almora, Kumaon, leg. CHAMPION.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

concinna ZIMMERMANN, 1832 (*Amara*)

(Faunus, Gistl, **1**, 32)

Mehrere Syntypen, Deutschland.
Neotypenfestlegung durch FASSATI, 1858; Acta Ent. Mus. Nat. Pragae **32**, 519–532 (aller Wahrscheinlichkeit nach existiert die *Amara*-Sammlung ZIMMERMANNS nicht mehr).
DEI: ♀ Neotypus, Freienwalde, Coll. KRAATZ; 1 ♂, Küstrin, STIERLIN, 1 ♂, Saxonia, leg. WEHNCKE; Coll. HEYDEN; 1 ♀, Coll. STIERLIN; 1 ♀, Hyéres, Coll. GERMAR-SCHAUM; 2 Ex. Le Plansag (?), Coll. LEONHARD; 1 ♀, Zürich, Coll. LETZNER; 1 ♂, Zaleszany, K. Sandomierza, 9. III. 1891, leg. und Coll. STOBIECKI, teste MAKOLSKII und FASSATII, ex Coll. Zool. Mus. Warszawa, 57, Coll. FASSATI, Nr. 824; 1 Ex. Coll. GERMAR-SCHAUM, 1 Ex. St. Quentin, leg. SCHULZ, Coll. KÜNNEMANN (in der Beschreibung nicht erwähnt!); Neoparatypen.
Syn. zu *lepida* ZIMMERMANN, l. c. (♀).

congoensis BURGEON, 1928 (*Graphipterus*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. **68**, 114)

Mehrere Syntypen; Katanga, Dilolo, 14. X. 1920, leg. OVERLAET; Kasai, Luluabourg, Hemptinne Saint-Benoît, leg. CALLEWAERT und HAAS, im Musée du Congo und Bruxelles.
DEI: 1 Syntypus, Katanga, Tschibobe, 25. IX. 1921, leg. OVERLAET.
[Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Dilolo" steht auf dem Etikett „Tschibobe".]

constricticollis KRAATZ, 1886 (*Coptolabrus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. **30**, 241–242, **Fig. 1**, 3)

3 Syntypen, Suyfun (Amur), leg. DÖRRIES, via STAUDINGER an KRAATZ, in Coll. KRAATZ.
DEI: 2 Syntypen, Suyfun, Coll. KRAATZ.

constrictus SCHAUM, 1860 (*Trechus*)

(Nat. Ins. Deutschl. Col. **1**, 1 (1856–60), 651)

Mehrere Syntypen, in den Alpen von Steiermark, leg. MILLER, in Kärnthen, leg. KAHR.
DEI: 1 Syntypus, Styria, Coll. SCHAUM.

constrictus franzi SCHWEIGER, 1950 (*Trechus*)

(Proc. 8th int. Congr. Ent. Stockholm (1948), 492–493, Fig. 3, 4)

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Tappenkar, westliche Radstätter Tauern, leg. LEDER, in Coll. SCHWEIGER.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

convexus bucciarellii MANDL, 1966 (*Carabus*)

(Koleopter. Rundsch. **43/44**, 30–31)

♂ Holotypus, Monte San Giorgio, 29. XI. 1964, Ligurischer Appennin (nördlich von Savona), leg. BUCCIARELLI; 1 ♀, dto.; mehrere Ex. vom Monte San Giorgio; in Coll. MANDL, Coll. BUCCIARELLI und Coll. RAVIZZA: Paratypen.
DEI: 1 Ex. APP. Ligurg, Montenatle (SV), m 450/600, 677-XII. 1964 (nicht lesbar!); 1 Ex. APP. Lig./Emiliano, Pey (Pe) Mtc Lesima, 29. IV. 1962, m 1400; leg. RAVIZZA: Paratypen.

corax REITTER, 1889 (*Pterostichus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. **33**, 52–54; nom. praeocc. = *epiroticus* CSIKI, 1930, Coleopt. Cat., 694)

Mehrere Syntypen, Griechenland, Koraxgebirge, westlich vom Parnass, 1887, leg. v. OERTZEN.
DEI: 1 Syntypus, Griechenland, Korax Geb., leg. v. OERTZEN, Coll. KRAATZ.

cordatus LETZNER, 1841 (*Pterostichus*)

(Übers. Arb. Veränder. schles. Ges., 101)

4 Syntypen, Schlesien, Altvater, 4200 ft. über der Ostsee, E. VII. 1840, leg. LETZNER.
DEI: 4 Syntypen, Altvater, leg. LETZNER (4 weitere Ex. vom gleichen Fundort aus der Coll. LETZNER werden nicht in der Beschreibung genannt).

cordicollis SLOANE, 1907 (*Promecoderus*)

(In LEA, Proc. Roy. Soc. Victoria **20**, 147–148)

Mehrere Syntypen, nordwestl. Tasmanien, King Island.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. HACKER,

cordipenne SLOANE, 1897 (*Carenum*)

(Proc. Linn. Soc. N.S. Wales **22**, 196–197)

♂ Holotypus, 5 ♂♂, Paratypen, Victoria, North-western District, via FRENCH an SLOANE.
DEI: 1 ♂, Paratypus, Sl Mallie (nicht lesbar!), V. (C.F.Jr.), Coll. v. BENNIGSEN.

corinna HOLDHAUS, 1924 (*Reicheia*)

(L'Abeille **32**, 171, 183–184)

Mehrere Syntypen; Umgeb. von Rom: Berg Albani, nahe Lago Albano, Exkursion von LUIGIONI und RAFFRAY; Subiaco leg. RAFFRAY; Marino, leg. MÜNSTER; Oriolo Romano, Lago di Nemi, leg. LUIGIONI.
DEI: 3 Syntypen, Roma, 1899, leg. MÜNSTER, Coll. LEONHARD.

corpulentus SCHAUM, 1864 (*Zabrus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 8, 182–183)

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Vorderasien, Syrien oder Rhodus, leg. KINDERMANN, via LEDERER an SCHAUM.
DEI: 1 Syntypus, Orient, Coll. SCHAUM.

costaricensis LIEBKE, 1930 (*Calophaena*)

(Mitt. Zool. Mus. Berlin **15**, 677, 715, Fig. 54)

40 Syntypen, Costarica, Farm „Hamburg", Reventazon, 15. III., 10. IX. 1923/1. X., 7. XI. 1924/5. XI., 3. XII. 1925/3. VI. 1926, leg. NEVERMANN, in Coll. NEVERMANN.
DEI: 1 Syntypus, Costa Rica, Hamburgfarm, Reventazon, Ebene Limon, 6. XI. 1925, leg. NEVERMANN.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

crassipes SLOANE, 1904 (*Morio*)

(Proc. Linn. Soc. N.S. Wales **29**, 533–534)

Mehrere Syntypen, Australien, Cairns District, Kuranda, leg. DODD, in Coll. SLOANE.
DEI: 1 Syntypus, Kuranda, durch HACKER.

cribripennis SCHAUBERGER, 1938 (*Lamprophcnus*)

(Arb. morph. tax. Ent. **5**, 41–42)

Holotypus, Paratypen (3 ♂♂, 2 ♀♀), Annam, Phuc-Son, leg. FRUHSTORFER, in Coll. ANDREWES, Coll. SCHAUBERGER und im DEI.
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Annam, Phuc-Son, XI. XII., leg. FRUHSTORFER, Coll. KRAATZ.

croaticus KRAATZ, 1875 (*Molops*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. **19**, 371–372)

Mehrere Syntypen, Croatia, leg. HAMPE.
Lectotypenfestlegung durch MLYNAŘ (soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden).
DEI: Lectotypus, Croatia, leg. HAMPE, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *simplex* CHAUDOIR, 1868.

cubanus BÄNNINGER, 1937 (*Taeniolobus*)

(Ent. Bl. **33**, 321–322)

Mehrere Syntypen, Cuba, Buenos Aires, Trinidad Mts., 2500–3500 Fuß, leg. DARLINGTON, im Museum of Comparative Zoölogy, Cambridge, Mass., U.S.A.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 8.–14. V. 1936.

cupricollis KRAATZ, 1886 (*Eutelocarabus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. **30**, 263)

Mehrere Syntypen, Suyfun-Mündung, leg. DÖRRIES, Amur, leg. CHRISTOPH; via STAUDINGER an KRAATZ.
DEI: 1 Ex. Askold, durch KRAATZ, Nr. 572; 1 Ex. Ussuri, leg. DORRIES; Coll. KOLTZE; 1 Ex. Suyfun, Coll. KRAATZ, Nr. 174; Syntypen.
Syn. zu *billbergi* MANNERHEIM, 1827.

curvatus SAHLBERG, 1880 (*Trechus*)

(Svenska Akad. Handl. (2) **17**, nr. 4, 20)

Mehrere Syntypen, nordwest. Sibirien, im bergigen und waldigen Gebiet des Jenisseensi, von Krasnojarsk bis Fatjanovsk, Exped. 1876–1877, im Museum Holm., Museum Helsingf., in Coll. HAGL. und Coll. SAHLBERG.
DEI: 1 Syntypus, Jeniseisk, leg. SAHLBERG, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *montanus* MOTSCHOLSKY, 1844.

cyanellus KRAATZ, 1874 (*Harpalus*)

(Berl. Ent. Ztschr. **18**, 300)

Mehrere Syntypen, Sarepta und Astrachan, leg. BECKER.
DEI: 2 Ex. Sarepta, 1 Ex. ohne Fundort; Coll. KRAATZ.
Syn. zu *fuscicornis* MÉNÉTRIÉS, 1832.

cyanellus BATES, 1889 (*Stenolophus*)

(Ann. Mus. Genova (2) **7** (27), 103–104)

Mehrere Syntypen, Burma, Teinzò, Bhamò, Mandalay, Rangoon, leg. FEA, in Coll. FEA.
DEI: 2 Syntypen, Birmania, Teinzò, V. 1886, leg. FEA, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *smaragdulus* FABRICIUS, 1798.

dalmatinum levantinum VŠETEČKA, 1941 (*Bembidium*)

(Sborn. ent. odd. Zemsk. Praze **19**, 89–90)

Mehrere Syntypen, Syrien, Damaskus, Libanon, Chtaura, Hamana und Palästina, Haifa.
DEI: 1 Syntypus, Syrien, Chtaura, Coll. KULT.

damascenus REICHE & SAULCY, 1855 (*Zabrus*)

(Ann. Soc. Ent. France (3) **3**, 624–625)

♂ Holotypus, Umgebung von Damas in Syrie, X.–III. 1851, leg. SAULCY; im DEI [Syria, Coll. SCHAUM].

debilicostis STERNBERG, 1910 (*Tefflus*)

(Stett. Ent. Ztg. **71**, 114–117)

Mehrere Syntypen, Ht. Congo, Leopoldville (Unterer Congo), Kisantu (Congo), Manghai (Kassai), Beni Bendi (Sankurru), Lulua, Luluaberg, Kassai, Kuango, Malange, Mukenge.
DEI: 1 ♂, Syntypus, Kassai-Fluss.

debilis BATES, 1892 (*Clivina*)

(Ann. Mus. Genova (2) **12** (32), 278; nom. praeocc. = *invalida* ANDREWES, 1919, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) **3**, 470)

Mehrere Syntypen, Birmania, Rangoon, leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Birmania, Rangoon, 1886, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

deceptor DARLINGTON, 1934 (*Pseudaptinus*)

(Psyche **41**, 128, Taf. 5, Fig. 12)

Holotypus, no. 19545, 55 Paratypen, Cuba, Soledad, nahe Cienfuegos, VI., 21. X.–7. XI., im Museum of Comparative Zoölogy.
DEI: 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung, 21. X. 1926, leg. DARLINGTON.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

declivis LIEBKE, 1934 (*Lebia*)

(Arb. morph. taxon. Ent. **1**, 277–278)

4 Syntypen, Peru, Callanga, Coll. KRAATZ, im DEI.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

delectum LIEBKE, 1933 (*Zuphium*)

(Rev. Ent. Rio de Janeiro **3**, 469–470)

2 Syntypen, U.S.A., Massachusetts, Framingham, XII. 1911, leg. FROST, im DEI und in Coll. LIEBKE.
DEI: 1 Syntypus, Framingham (Mass), 13. XII. 1911–12, leg. FROST.

demessus ANDREWES, 1923 (*Microlestes*)

(Spol. Zeyl. **12**, 248–249)

Mehrere Exemplare, Ceylon: Kanthalay, Trincomalee und Anuradhapura, leg. HORN, im DEI; Holotypus, in Coll. ANDREWES und Paratypen, im DEI.
DEI: Ceylon, 1899, leg. HORN: 3 Ex. Anuradhapura, 2 Ex. Kanthalay: Paratypen.

dentatus ANDREWES, 1925 (*Tachys*)

(Ann. Mus. Genova **51**, 343–344, Taf. 3, Fig. 1)

Mehrere Syntypen: 3 Ex. Malay States, Singapore, leg. SAUNDERS, in Coll. SAUNDERS; 1 Ex. Siam, Renong, leg. DOHERTY, im Britischen Museum; 1 Ex. Cambodia, Kompong Kedey, leg. VITALIS DE SALVAZA; 1 Ex. Cambodia, im Museum Brüssel; 1 Ex. Cochin-China, Long Xuyen, leg. DORR, in Coll. FLEUTIAUX; 1 Ex. Java, Batavia, leg. GRABOWSKY, in Coll. SLOANE, 1 Ex. Soekaboemi, leg. WALSH, im Britischen Museum, 1 Ex. Princes Island, leg. DAMMERMANN, im Museum Buitenzorg, 1 Ex. Java, leg. KOLLER, im Museum Brüssel; ? Ex. Sumatra, Medan, leg. CORPORAAL.
DEI: 1 Syntypus, Prinsen Eil., 21. I. 1922, leg. DAMMERMANN, ex Mus. Buitenzorg.

depressus MEIXNER, 1922 (*Trechus*)

(Koleopter. Rundsch. **10**, 30, Fig.; nom. praeocc. = *meixneri* JEANNEL, 1924, Cat. Col. reg. palaearct. **1**, 100)

♂ Holotypus, Bosnia, Bosna-Tal, VIII. 1900, ex Coll. LEONHARD; im DEI.

deubeli REITTER, 1896 (*Carabus*)

(Wiener Ent. Ztg. **15**, 225)

Mehrere Syntypen, Transsylvanische Alpen, leg. DEUBEL.
DEI: 1 Syntypus, Transsylv. Alpen, m. 1896, Coll. REITTER, 5. IX. 1906, Coll. ROESCHKE.

diaphanus ROTTENBERG, 1874 (*Trechus*)

(Berl. Ent. Ztschr. **18**, 328–329)

Mehrere Syntypen, Taygetos, leg. RAYMOND.
DEI: 1 Syntypus, Taygetos, leg. RAYMOND, Coll. LETZNER-ROTTENBERG.

dichroma ANDREWES, 1923 (*Lebia*)

(Spol. Zeyl. **12**, 249–250)

Ceylon: Hambegamuwa, im Colombo Museum, Anuradhapura, leg. HORN, im DEI; Madras, Nilgiri Hills, leg. HAMPSON, im Britischen Museum; Haidarabad, Sikandarabad, leg. BUTLER, in Coll. BUTLER; Bombay, Khandesh, leg. BELL, in Coll. ANDREWES (Holotypus), Stadt Bombay, leg. KINNEAR, im Bomb. Nat. Hist. Soc.; Bengal, Chapra, leg. MACKENZIE, im Agric. Res. Inst., Pusa; mehrere Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, Ceylon, Anuradhapura, 1899, leg. HORN.

diegana ALLUAUD, 1897 (*Lebia*)

(Ann. Soc. Ent. France **66**, 169)

Mehrere Syntypen, Madagascar, Diego-Suarez, XI. en Juni 1893 montangne d'Ambre, 1.000 m, d'altitude.
DEI: 1 Syntypus, Madagascar, Diego-Suarez, 1893, leg. ALLUAUD.

diffinis pseudoquadricollis SCHAUBERGER, 1932 (*Harpalus*)

(Koleopter. Rundsch. **18**, 62–63)

♂ Holotypus, Sardinien, mehrere Paratypen, Korsika, Sizilien, Balearen und im westlichen Nordafrika.
DEI: 2 Paratypen, Maroc, Casablanca, durch ANTOINE.

dilatatus ROTTENBERG, 1870 (*Tachys*)

(Berl. Ent. Ztschr. **14**, 18)

Mehrere Syntypen, Sicilien, bei Palermo, am Oreto, 7. XII.–20. II. 1868, leg. v. ROTTENBERG.
DEI: 3 Syntypen, Sizilien, Palermo, Coll. LETZNER-v. ROTTENBERG.
Syn. zu *algiricus* LUCAS, 1846.

diligens STURM, 1824 (*Platysma*)

(Deutschl. Faune, Insekt. **5**, 81–83, Taf. 117, Fig. a, A)

Mehrere Syntypen, in Mauer bei Wien, leg. MEGERLE VON MÜHLFELD.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort.

dilutus DANIEL, 1902 (*Trechus*)

(Münch. Koleopt. Ztschr. **1**, 63; nom. praeocc. = *validipes* DANIEL, 1902–1903 (1902), Münch. Kol. Ztschr. **1**, 62)

Mehrere Syntypen, Herzegowina, Cvrstnica, 18. VIII. 1901, durch LEONHARD.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

distigma LIEBKE, 1934 (*Lebia*)

(Arb. morph. taxon. Ent. **1**, 278, Fig. 1)

2 Syntypen, Peru, Callanga, Coll. KRAATZ, im DEI.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

distinctum BÄNNINGER, 1918 (*Omophron*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 108)

Syntypen: 2 ♂♂, Kondué, 1904, leg. LUJA, 1 ♀, „Haut Soudan, Oswald"; im DEI.
DEI: 1 ♂, Syntypus, Belg. Congo, Kondué, 1904, leg. LUJA.

diversus PÉRINGUEY, 1898 (*Abacetus*)

(Trans. South Afr. Phil. Soc. **10**, 360–361)

Mehrere Syntypen, Salisbury, Zambesia.
DEI: 1 Syntypus, S. Rhodesia, leg. BODONG.

dives guadarramensis WAGNER, 1932 (*Chlaenius*)

(Coleopter. Centralbl. **6**, 9)

Spanien, Südhang der Sierra Guaderrama, bei El Escorial, Puerto Navacerrada, Madrid; Sierra de Gredos, Coll. LAUFFER; Holotypus und mehrere Paratypen, im Museum Berlin, im DEI und in Coll. WAGNER.
DEI: 9 Ex. Escorial, leg. v. HEYDEN, Coll. STERN und Coll. v. HEYDEN; 2 Ex. Gallia mer., Coll. KRAATZ und Coll. LETZNER; 1 Ex. Gudalusia, Coll. LEONHARD; 4 Ex. Hispania, Coll. KRAATZ, Coll. ROLPH und Coll. v. ROTTENBERG; 1 Ex. Madrid, Coll. v. ROTTENBERG; 1 Ex. Deñalara, leg. v. HEYDEN; Paratypen.

dochii APFELBECK, 1906 (*Pterostichus*)

(Sitz. Akad. Wiss. Wien, **115**, 1663)

Mehrere Syntypen, Albanien, Gebirge der Merdita, Mal Shêit, 1905, leg. APFELBECK und LATIF.
DEI: 1 Syntypus (Ex. verliehen, konnte nicht überprüft werden).

doderoi HOLDHAUS, 1924 (*Reicheia*)

(L'Abeille **32**, 172, 209–210)

12 Syntypen, Umgebung Dorgali in Sardinien, leg. DODERO.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, V. 1910, Coll. LEONHARD.

dohrni KRAATZ, 1887 (*Coptolabrus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. **31**, 148)

Mehrere Syntypen, Amur.
DEI: 1 Syntypus, Amur, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *smaragdinus* FISCHER v. WALDHEIM, 1824.

eccoptopterus KRAATZ, 1894 (*Apotomopterus*)

(l.c. 138–139, Taf. 1, Fig. 17–18)

Mehrere Syntypen, Central-China, Omei-Shan.
DEI: 2 Syntypen, Omei-Shan, Coll. KRAATZ.

edwardsii BATES, 1872 (*Amarotypus*)

(Ent. Monthly Mag. **9**, 51)

3 Syntypen, New Zealand, leg. EDWARDS.
DEI: 2 Syntypen, New Zealand, ex Museo, BATES, 1892.

eichhoffi KRAATZ, 1888 (*Pseudolimnaeum*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. **32**, 365)

2 Syntypen, Lothringen, leg. EICHHOFF, ex. Coll. SCHILSKY und Coll. FISCHER, in Coll. KRAATZ.
DEI: 2 Syntypen, Lothringen, 1888, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *inustum* JACQUELIN, 1857.

elatus plitvicensis HEYDEN, 1880 (*Pterostichus*)

(Verh. zool.-bot. Ges. Wien **29** (1879), 37)

Mehrere Syntypen, Ljescovac am See Plivica Croatiae, an der Grenze Bosniae, leg. v. HEYDEN, HOPFFGARTEN und REITTER.
Lectotypenfestlegung durch MLYNAŘ (soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden).
DEI: ♂ Lectotypus, Ljescovac, 1 Paralectotypus, Original; Coll. v. HEYDEN.

elegans ANDREWES, 1929 (*Colpodes*)

(Ann. Mus. Genova **53**, 437–438)

9 Syntypen, Sumatra: 3 Ex. Mount Singalang, VII. 1878, leg. BECCARI; 6 Ex. Si-Rambé, XII. 1890–III. 1891, leg. MODIGLIANI; im Museum Genova und im DEI.
DEI: 1 Syntypus, Sumatra, Si-Rambé, XII. 1890–III. 1891, leg. MODIGLIANI, Coll. KRAATZ.

elegans SLOANE, 1907 (*Dendrocellus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 473)

2 Syntypen, New Guinea, Baining Berge, Gazelle Peninsula, leg. v. BENNIGSEN, in Coll. HORN.
DEI: 1 Syntypus, Baining Berge, Coll. v. BENNIGSEN.

ellipticus BURGEON, 1928 (*Graphipterus*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. **68**, 115–116)

Mehrere Syntypen; Katanga, Tschibobe, 25. XI. 1921, leg. OVERLAET, Sankisia und Tekanini, 6. X., 16. XI. 1911, leg. BEQUAERT, Kundelungu, leg. Mme. TINANT; im Museum Tervuren.
DEI: 1 Syntypus, Katanga, Tshibobe, 25. IX. 1921, leg. OVERLAET, Museé du Congo.

elongata DUPUIS, 1913 (*Hexagonia*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. **57**, 263–269)

Holotypus, Formosa, Suisharyo, leg. SAUTER; im DEI [X. 1911].

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

emmerichi BALIANI, 1932 (*Amara*)

(Mem. Soc. Ent. Ital. **11**, 14—15, Taf. 2, Fig. 10)

18 ♂♂, 16 ♀♀, Syntypen, China centrale, Tatsienlu-Chiulung, Prov. di Szechuan, durch REITTER.
DEI: 2 Syntypen, China, Tatsienlu-Kiulung, durch REITTER.

emmerichi JEDLIČKA, 1932 (*Colpodes*)

(Ent. Nachrichtenbl. **6**, 108)

Holotypus, 8 Paratypen, China, Prov. Szetschuan-Tatsienlu, in Coll. JEDLIČKA und Coll. REITTER.
DEI: 2 Paratypen, China, Tatsienlu-Kiulung, Coll. REITTER.

eous TSCHITSCHERIN, 1902 (*Harpalus*)

(Horae Soc. Ent. Ross. **35**, 236)

Mehrere Syntypen, Mantschurie, Japon.
DEI: 1 Syntypus, Japon, Coll. KRAATZ.

ericae WOLLASTON, 1854 (*Olisthopus*)

(Insect. Maderensia, 37, Tab. 1, Fig. 8)

Mehrere Syntypen, Madeira, Region Fanalensi bei Cruzinhas, unter der Rinde von *Erica scoparia* L. und *E. arborea* L., 4000′—5000′ s.m., VII. 1850, leg. WOLLASTON.
DEI: 4 Syntypen, Madeira, Coll. KRAATZ.

erosus karascharensis EIDAM, 1931 (*Zoocarabus*)

(Wien. Ent. Ztg. **48**, 80)

4 ♂♂, 1 ♀, Syntypen, China septentr.-occid., Kurla, Bagratsch-Kul, Karaschar, V. 1902, Coll. HAUSER-LEONHARD, im DEI.
DEI: 4 Syntypen, Ost-Turkestan, Bagratsch-Kul, Hurla, V. 1902, Coll. HAUSER—Coll. LEONHARD.

esau HEYDEN, 1885 (*Sabienus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. **29**, 285)

♀ Holotypus, Turkestan, Namagan, durch STAUDINGER, in Coll. v. HEYDEN; im DEI.

eucharis BATES, 1892 (*Pristomachaerus*)

(Ann. Mus. Genova (2) **12** (32), 305—306)

Mehrere Syntypen, Burma, Bhamò, Karin Chebà, alt. 900—1100 m, Palon, Pegu; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Palon, Pegu, VIII. IX. 1887, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

eucnemis BATES, 1892 (*Colpodes*)

(l.c., 376)

Mehrere Syntypen, Burma, Karin Chebà, alt. 900—1100 m, leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 5. XII. 1888, Coll. KRAATZ.

eulamprus BATES, 1892 (*Hypolithus*)

(l.c., 340)

Syntypen: 2 Ex. Palon, Pegu, 1 Ex. Kawkareet, Tenasserim; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Palon, Pegu, VIII. IX. 1887, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

eutherum ANDREWES, 1923 (*Bembidium*)

(Ent. Monthly Mag. **59**, 96)

Holotypus, Eastern Duars, leg. STEVENS, in Coll. ANDREWES; mehrere Paratypen: Sikkim, Tista Valley, Gielle Khola, 600 ft., leg. STEVENS; Assam, Pasighat und Kobo, Bank von Dihong River, leg. KEMP, Abor Expedition, im Indischen Museum; Punjab: Simla Hills States, Matiana, leg. KEMP, im Indischen Museum; Kumaon, Nainital, Jalaban, im Indischen Museum; West Almora, River Sarda Gorge, Tanakpur, Ranikhet, leg. CHAMPION; Dehra Dun, Mussoorie, Mossy Falls, Kemti Falls, leg. CAMERON, im Forest Res. Inst.
DEI: 1 Paratypus, Kobo, 400′.

exaratus BATES, 1892 (*Gnathaphanus*)

(Ann. Mus. Genova (2) **12** (32), 329)

Mehrere Syntypen, Burma, Karin Chebà, alt. 900—1100 m, leg. FEA.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, V. XII. 1888.

exiguus ANDREWES, 1933 (*Oodes*)

(Ent. Monthly Mag. **69**, 56—57)

Holotypus, 1 Paratypus (♂, ♀), Sumatra, im DEI und in Coll. ANDREWES.
DEI: Holotypus, Sumatra, Coll. KRAATZ.

exilis SCHAUM, 1857 (*Blechrus*)

(Berl. Ent. Ztschr. **1**, 132; nom. praeocc. = *apterus* HOLDHAUS, 1904, in APFELB. Käferf. Balk. **1**, 330)

5 Syntypen, Griechenland, Zante, leg. v. KIESENWETTER.
DEI: 1 Syntypus, Zante.

extensus HEYDEN, 1884 (*Antisphodrus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. **28**, 1, 220—221)

♂ Holotypus, Turkestan, Osch, Coll. KRAATZ, im DEI.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

fabulosa LIEBKE, 1939 (*Calleida*)

(Festschr. STRAND **5**, 100)

1 Ex. Brasilien, Rio de Janeiro, Petropolis, XII. 1926, leg. OHAUS, in Coll. LIEBKE, 3 Ex. Sta. Catharina, Nova Teutonia, 27 Grad 11 Min. südl. Breite, 52 Grad 23 Min. westl. Länge, leg. PLAUMANN, in Coll. LIEBKE und Coll. PLAUMANN; 1 Ex. Paraguay, Hohenau, leg. JAKOB, im DEI: Syntypen.
DEI: 1 Syntypus, Paraguay, Hohenau, 3. IX. 1935, leg. JACOB, Nr. 1752.

fasciatus MOTSCHULSKY, 1851 (*Trechus*)

(Bull. Soc. Nat. Moscou **24**, 4, 506)

Mehrere Syntypen, Ind. or.
DEI: 1 Syntypus, Ind. or. (Mndrstrn.)

fassatii KULT, 1947 (*Clivina*)

(Cas. Čsl. Spol. Ent. **44**, 35—37)

Holotypus, Paratypen (ca. 50 Ex.), Brasilia, Corumba, Matto Grosso, in Coll. KULT, Coll. BÄNNINGER, im Museum Brüssel, Museum Prag, DEI, etc.; 4 Ex. Brasilia, Santos, leg. METZ, Coll. KRAATZ, im DEI; 1 Ex. Argentina, Missiones, S. Anna, in Coll. KULT; 2 Ex. Paraguay, leg. FIEBRIG, im DEI.
DEI: 2 Ex. Paraguay, leg. FIEBRIG, 1 Ex. Corumba, Matto Grosso, 4 Ex. Santos, leg. METZ, Coll. KRAATZ; Paratypen.

feae BATES, 1889 (*Epicosmus*)

(Ann. Mus. Genova (2) **7** (27), 101)

Mehrere Syntypen, Burma, Bhamò, Teinzò, Thigyam, Prome, leg. FEA, in Coll. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Bhamò, Birmania, VII—VIII. 1885, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

feae BATES, 1892 (*Nanochlaenius*)

(l.c. (2) **12** (32), 322)

Mehrere Syntypen, Burma, Rangoon, Kathà, Palon, Pegu; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Palon, Pegu, VIII. IX. 1887, Coll. KRAATZ.

feae BATES, 1889 (*Pirantillus*)

(Ann. Mus. Genova (2) **7** (27), 109)

Mehrere ♀♀, Syntypen, Burma, Tenasserim, Meetan, leg. FEA, in Coll. FEA.
DEI: 1 ♀, Syntypus, Tenasserim, Meetan, IV. 1887, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

ferdinandikoburgi BREIT, 1912 (*Trechus*)

(Ent. Mitt. **1**, 199)

Mehrere Syntypen, Rhodopegebirge, Xuchia Tschan, Schendemo, Schmerdele, leg. HILF, in Coll. LEONHARD und Coll. BREIT.
DEI: Syntypen, Rhodopegebirge, leg. HILF, Coll. LEONHARD: 2 Ex. Xuchia Tschan, 2 Ex. Schmerdele, 10. VIII. 1911, 1 Ex. Schendemo, 20. VIII.

ferrugatus REITTER, 1902 (*Ophonus*)

(Wien. Ent. Ztg. **21**, 191—192)

Mehrere Syntypen, Algier, Bou-Berak, bei Dellys.
DEI: 1 Syntypus, Algeria, Bou-Berak, leg. REITTER, Coll. KRAATZ.

fissuralis REITTER, 1900 (*Blechrus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 376)

Mehrere Syntypen, Griechenland, Syrien, Kaukasus, Transcaspien.
DEI: 1 Syntypus, Attica, Coll. KRAATZ.

flavipes MOTSCHULSKY, 1858 (*Hispalis*)

(Etudes Ent. **7**, 24)

Mehrere Syntypen, Ostindien.
DEI: 1 Syntypus, India orient., Mariderstjrna (Ex. beschädigt).

fokiensis SCHAUBERGER, 1930 (*Harpalus*)

(Coleopt. Centr.bl. **4**, 175—177, 195)

Holotypus und mehrere Paratypen, südwest- und südliche Provinzen Chinas: Fokien, wahrscheinlich Futschou, ex Museum Hamburg; Szetschuan, Kwanhien, Mts. Yunling, ex Coll. HAUSER; Yunnan, Gebirge bei Mengtze, ex Coll. HAUSER.
DEI: 1 Paratypus, Szechuan, Giufu Shan, 1500—2000 m, leg. REITTER.

formosana DUPUIS, 1912 (*Diorycha*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. **56**, 324—328)

2 Syntypen, Formosa, Anping, leg. SAUTER; im DEI [11. V.].
Syn. zu *flavilabris* FABRICIUS, 1798.

formosana DUPUIS, 1912 (*Coptodera*)

(l.c., 328—334)

16 Syntypen, Formosa, Hoozan, leg. SAUTER.
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Hoozan, IX. 1910, leg. SAUTER.
Syn. zu *japonica* BATES, 1883.

formosana DUPUIS, 1912 (*Pentagonica*)

(l.c., 316—319)

Holotypus, Formosa, Kosempo, leg. SAUTER; im DEI [VIII. 1909].

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

formosanus DUPUIS, 1912 (*Cillenus*)

(l.c., 334–338)

Holotypus, Formosa, Anping, leg. SAUTER; im DEI [22. VII. 1911].

formosanus DUPUIS, 1912 (*Mastax*)

(l. c., 282–285)

5 Syntypen, Formosa, Anping, leg. SAUTER.
DEI: 3 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, VI. 1911.

formosanus DUPUIS, 1913 (*Pericallus*)

(l. c., **57**, 83–87)

Mehrere Syntypen, Formosa, Hoozan, 7. VI. 1911, Sokutsu, 1912, leg. SAUTER.
DEI: 1 Ex. Formosa, Chip Chip, 1907–1909, 4 Ex. Hoozan, IX. 1910; leg. SAUTER, Syntypen.

formosanus JEDLIČKA, 1932 (*Tachys*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. **29**, 81)

Holotypus, Formosa, Anping, SAUTERs Expedition; im DEI.

formosum BATES, 1892 (*Zyphium*)

(Ann. Mus. Genova (2) **12** (32), 386–387)

Mehrere Syntypen, Burma, Palon, Pegu, leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Palon, Pegu, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

forticostis LIEBKE, 1934 (*Brachynus*)

(Mem. Soc. Ent. Belg. **24**, 35)

Holotypus, Freistaat, Reddenburg, Orange, leg. BRAUNS, Coll. LANGENHAN, im Museum Dresden; 1 Ex. dto.; 1 Ex. Caffraria, leg. v. VAHRENDORFF, im Museum Stettin; 1 Ex. Transvaal, im DEI; 7 Ex. Freistaat, Bloemfontein, Orange, im Imperial Institut of Entomology und in Coll. SCHAUBERGER; Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, Transvaal.

foveella LIEBKE, 1937 (*Agra*)

(Arb. morph. taxon. Ent. **4**, 158–159, Fig. 2)

♂ Holotypus, Mexiko, in Coll. LIEBKE; 1 ♂, Paratypus, dto., im DEI.
DEI: 1 ♂, Paratypus, Mexiko, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *obscuripes* CHAUDOIR, 1854.

foveolatus KOLBE, 1889 (*Euleptus*)

(Stett. Ent. Ztg. **50**, 121)

Mehrere Syntypen, Kongo, im Gebiet des unteren Quango, Kwako bis Kimpoko, leg. BÜTTNER.
DEI: 2 Syntypen, Kongo, Kimpoko, leg. BÜTTNER, Coll. KRAATZ.

fulvibasis REITTER, 1900 (*Blechrus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 377)

Mehrere Syntypen, Calabrien, Istrien (Ins. Veglia), Griechenland, Araxesthal, Talysch, Transcaspien, Turkestan.
DEI: 1 Syntypus, Attica, Coll. KRAATZ.

fumatus SCHAUM, 1853 (*Peronomerus*)

(Ann. Soc. Ent. France (3) **1**, 440–441)

Mehrere Syntypen, Hongkong, leg. BOWRING.
DEI: 1 Syntypus, Hongkong.

fumicata MOTSCHULSKY, 1851 (*Tachys*)

(Bull. Soc. Nat. Moscou **24**, 509)

Mehrere Syntypen, Ind. or.
DEI: 1 Syntypus, Ind. or. (Mndrstrn.) Coll. v. HEYDEN.

furcatula LIEBKE, 1934 (*Lebia*)

(Arb. morph. taxon. Ent. **1**, 278–279, Fig. 2)

2 Syntypen, Peru, Callanga, Coll. KRAATZ, im DEI.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

fuscitarsis SCHAUM, 1857 (*Chlaenius*)

(Berl. Ent. Ztschr. **1**, 135)

Syntypen: 1 Ex. Creta, leg. ZEBE, 1 Ex. Zante (Griechenland), leg. v. KIESENWETTER.
DEI: 1 Syntypus, Graecia, Coll. SCHAUM.
Syn. zu *nigricornis* FABRICIUS, 1787.

fusiforme NETOLITZKY, 1914 (*Bembidion*)

(Ent. Mitt. **3**, 168–169)

Mehrere Syntypen, Formosa, Botanwan, Paiwandistr., VII. 1912, leg. SAUTER, im DEI.
DEI: 5 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

gaedikei JEDLIČKA, 1965 (*Nebria*)

(Reichenbachia **5**, 213)

♂ Holotypus, Westkaukasus, Umgebung Dombai, 1900–2200 m Höhe, leg. GAEDIKE, in Coll. GAEDIKE; 2 Paratypen, dto., leg. BRAASCH, in Coll. BRAASCH.
DEI: ♂ Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung, 11.–12. VIII. 1963.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

ganglbaueri APFELBECK, 1904 (*Brachynus*)

(Käferf. Balkanh. **1**, 348–349, Fig. 8)

Mehrere Syntypen: Bosnien, Dervent, Sarajevo, D. Unac; Herzegowina, Sumpfgebiet der unteren Narenta bei Gabela und Dracévo, Utovo blato, Mostarsko blato bei Mostav; Serbien, Požarevac, Bela Palanka, leg. HILF; Epirus, Chani Driskos bei Jannina, 1900; Griechenland, Korfu, 1893; leg. APFELBECK; Paganetti, Kyllene im Peloponnes, leg. KRÜPER; Kleinasien, Alem Dagh, Goek Dagh, leg. v. BODEMEYER; Transkaukasien, Talyschgebirge, leg. LEDER, in Coll. REITTER; Ungarn, Banat, in Coll. REITTER, Szólnok, leg. HENSCH; Slavonien, Ruma, leg. HENSCH.
DEI: 1 Ex. Klein-Asien, Alem-Dagh, leg. v. BODEMEYER; 2 Ex. Herzegovina, Mostav; Coll. LEONHARD, Syntypen.

ganglbaueri APFELBECK, 1908 (*Synuchidius*)

(Anz. Akad. Wiss. Wien **1**, 2)

Mehrere Syntypen, Ostalbanien, Schar-Dagh, 1906.
DEI: 1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Schar-Dagh, Ljuboten, Coll. MÜLLER.

ganglbaueri matějkai MAŘAN, 1939 (*Nebria*)

(Ent. listy, Brünn, **2**, 21)

Mehrere Syntypen, Jugoslavia mer., Jakupica planina, 12. VI. 1937, leg. MATĚJKA, KODYM und PURKYNĚ; im Museum Prag.
DEI: 1 Syntypus, Jugoslavia mer., Jakupica, 12. VI. 1937, leg. KODYM, Coll. KULT.

gebhardti BOKOR, 1926 (*Duvalites*)

(Ann. Mus. Nat. Hung. **24**, 40–48)

Mehrere Syntypen, Ungarn, Grotte Kecskebarlang im Tale Forrásvölgy, Bükk-Gebirge, Komitat Borsod, 24. VII. 1924, leg. BOKOR und GEBHARDT.
DEI: 1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Ungarn, Com. Borsod, Kecskebarlang, M^s Bükk, 1925 (Jahreszahl in der Beschreibung nicht erwähnt!), leg. BOKOR.

georgii BASILEWSKY, 1932 (*Stictotefflus*)

(Ent. Bl. **28**, 23)

♀ Holotypus, Mozambique; im DEI.

gestroi BATES, 1892 (*Mastax*)

(Ann. Mus. Genova (2) **12** (32), 399)

Mehrere Syntypen, Burma, Karin Chebà, alt. 900–1100 m, leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, V.–XII. 1888, Coll. KRAATZ.

ghidinii GESTRO, 1909 (*Anophthalmus*)

(l.c. (3) 4 (1908), 202)

3 Syntypen, Italien, grotta del Monte Tre Crocette, 5. IX. 1907, leg. GHIDINI.
DEI: 2 Syntypen, Grotta tre Crocette, 1100, 13. IV. 1909 (Datum in der Beschreibung nicht erwähnt!), Coll. LEONHARD.

giganteum SAHLBERG, 1900 (*Bembidium*)

(Öfv. Finska Vet.-Soc. Förh. B. **42**, 175–177)

Mehrere Syntypen, Turkestan, Tschu nahe Dschilarik, 17., 18. VII. 1896.
DEI: 1 Syntypus, Dschilarik, Coll. KRAATZ.

gilvipes EMDEN, 1935 (*Arthrostictus*)

(Rev. Ent. Rio de Janeiro **5**, 309–311)

Syntypen: 1 ♀, Chaco, Villa Montes, V. 1926, leg. LINDNER, im Museum Dresden; 1 ♂, Tucuman, im DEI; 2 ♂♂, 1 ♀, Argentinien, Embarcacion, ca. 10 km OSO von Oran, Prov. Salta, im Museum Hamburg; 1 ♂, Paraguay, Mborero, Cordillera de Villarrica, XII. 1933, 1 ♀, Villarrica, II. 1934; leg. SCHADE.
DEI: 1 ♂, Syntypus, Tucuman, Coll. GERMAR-SCHAUM.

glabellus ANDREWES, 1923 (*Lissopogonus*)

(Ann. Mag. Nat. Hist. (9) **12**, 214)

Sikkim: Holotypus, Namsoo, in Coll. ANDREWES; mehrere Paratypen: Gopaldhara, Birik und Gielle Khola, in der Tista Valley; leg. STEVENS; Assam: Rotung, 1400 ft., leg. KEMP, im Indischen Museum; Kumaon: West Almora, Tanakpur und River Sarda Gorge, leg. CHAMPION; Dehra Dun-Kali Gad, Mussoorie-Arni Gad und Siwaliks-Lachiwala, leg. CAMERON, im Forest Res. Inst.; Laos: Lak Mune, leg. DE SALVAZA.
DEI: 1 Paratypus, India, Kumaon, Haldwani Dist., leg. H.G.C.

göbli BREIT, 1914 (*Trechus*)

(Koleopter. Rundsch. **3**, 166)

Mehrere Syntypen, Peristeri-Gebirge, bei Monastir, via REITTER an BREIT.
DEI: 2 Syntypen, Monastir, Peristeri alpin, Coll. LEONHARD.

goschi JEDLIČKA, 1930 (*Pterostichus*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. **27**, 21)

8 Syntypen, Sibiria or., Nikolsk-Ussurijsk, leg. MANDL; in Coll. JEDLIČKA und Coll. MANDL.
DEI: 2 Syntypen, Nikolsk-Ussurijsk, Ussurigebiet, leg. MANDL.

gracilipes BATES, 1892 (*Epicosmus*)

(Ann. Mus. Genova (2) **12** (32), 302)

Mehrere Syntypen, Burma, Bhamò, Noa Dehing, Sadiyd in Assam Valley; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Birmania, Bhamò, VII. 1886, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

gracilis KRAATZ, 1883 (*Goniognathus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. **27**, 361—362; nom. praeocc. = *sogdianus* SEMENOV, 1898, Horae Soc. Ent. Ross. **30**, 218)

♂ Holotypus, Samarkand; im DEI [STDGR. 81].

grandis STERNBERG, 1906 (*Anthia*)

(l.c., 169—170)

2 ♂♂, 7 ♀♀, Syntypen: D.-Südwest-Afrika, Okahandja, Windhuk; Natal (?); in Coll. STERNBERG.
DEI: 1 ♀, Syntypus, D.S.W.-Afrika, Okahandja, X. 1902, Coll. STERNBERG.
Syn. zu *homoplata* LEQUIEN, 1832.

gratiosus MANNERHEIM, 1853 (*Elaphrus*)

(Bull. Moscou **26**, 118)

Mehrere Syntypen, Alaska, ostia fl. Kaktnu peninsulae Kenai, M. VI., leg. HOLMBERG.
DEI: 1 Syntypus, Amerika bor., Nak. Rod. (nicht lesbar!), Coll. LEONHARD.
Syn. zu *riparius* LINNÉ, 1758.

gravis DEJEAN, 1928 (*Zabrus*)

(Spec. Gen. Coleopt. **3**, 442—443)

Mehrere Syntypen, Spanien, leg. DEJEAN; bei Guadarama, leg. GOUDOT, Coll. DEJEAN.
DEI: 1 Syntypus, Hispan., Coll. KRAATZ.

grossepunctata BASILEWSKY, 1953 (*Leleupidia*)

(Rev. Zool. Bot. Afr. **47**, 270, Fig. 9)

52 Ex., dont l'Holotypus, Kivu, Territoire de Fizi, Itombwe Sud, galerie forestiére de la Mukera, 1.000 m, II. 1952; 29 Ex. dto., 800—900 m, IV. 1951; leg. LELEUP; im Museé du Congo, Tervuren: Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, Kivu, Terr. Fizi, Bas Itombwe, 1000 m (Gal. for. Mukera), II. 1952, leg. LELEUP, I.R.S.A.C.-Mus. Congo, Récolté dans l'humus.

gundlachi DARLINGTON, 1934 (*Colliuris*)

(Psyche **41**, 122—123)

Holotypus, no. 19539, 34 Paratypen, Cuba, Soledad, nahe Cienfuegos, VI., 19. X.—7. XI., im Museum of Comparative Zoölogy.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, 21. X. 1926, durch DARLINGTON, ex M.C.Z.

guttiger SCHAUM, 1860 (*Thyreopterus*)

(Berl. Ent. Ztschr. **4**, 189, Taf. 3, Fig. 5)

Mehrere Syntypen, Borneo, leg. WALLACE.
DEI: 2 Syntypen, Borneo, Coll. SCHAUM.

guttiger SCHAUBERGER, 1938 (*Acupalpus*)

(Arb. morph. taxon. Ent. **5**, 50—51)

Holotypus, 15 Paratypen, Hinterindien, Kambodja, Pnom-penh, leg. FRIEDERICHS, in Coll. SCHAUBERGER und im DEI.
DEI: Holotypus, 9 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

habilis SLOANE, 1907 (*Colpodes*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 178—179)

Mehrere Syntypen, New Guinea, Kaiser Wilhelm Land, Sattelberg, leg. v. BENNIGSEN, in Coll. HORN.
DEI: 1 Syntypus, D.N. Guinea, Sattelberg.

halli BROUN, 1917 (*Tarastethus*)

(Bull. New Zealand Inst. **5**, Nr. 1, 367)

5 Syntypen, New Zealand, Mount Kiwi und Moa Basin, nahe Mount Algidus, 20. X. 1914, via HALL an BROUN.
DEI: 2 Syntypen, New Zealand, Canterbury, Mt. Hurr.

hanši JEDLIČKA, 1932 (*Bembidion*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. **29**, 40)

Holotypus, 11 Paratypen, China merd., Prov. Yunnan, in Coll. ANDREWES, Coll. NETOLITZKY, Coll. JEDLIČKA und im DEI.
DEI: 1 Paratypus, Yunnan fou.

harpaloides BATES, 1892 (*Arsenoxenus*)

(Ann. Mus. Genova (2) **12** (32), 365)

Mehrere Syntypen, Burma, Bhamò, Palon, Pegu, leg. FEA.
DEI: 2 Syntypen, Palon, Pegu, VIII. IX. 1887, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

hasurada ANDREWES, 1924 (*Bembidium*)

(Miss. BABAULT, Prov. Centr. Inde, 77—78)

Syntypen, Indien, occ. Himalaya, 1914: 1 Ex. Ladack, Mulbeck; 1 Ex. Spiti, Pulga, leg. BABAULT; mehrere Ex. W. Almora, Kumaon, Nainital, leg. CHAMPION.
DEI: 1 Syntypus, W. Almora, Kumaon, leg. CHAMPION.

hasurada pagmanicum FASSATI, 1956 (*Bembidion*)

(Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, **33**, 487—488)

♂ Holotypus, O.-Afghanistan, Pagmangebirge, 2300 m, 30. V. 1952, leg. KLAPPERICH (es müssen aber zu der Originalbeschreibung mehrere Ex. vorgelegen haben, da erwähnt wird: „Die Gesamtgröße schwankt zwischen 5,0 und 6,0 mm").
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

hauseri JEDLIČKA, 1931 (*Colpodes*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. **28**, 105)

4 Syntypen, China, Prov. Szetschuan-Chung-king, in Coll. ANDREWES und Coll. JEDLIČKA.
DEI: 1 Syntypus, China, Tatsienlu, Szechuan, Vüling Süd, Coll. REITTER.
[Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Szetschuan" steht auf dem Etikett „Szechuan".]

hauseri JEDLIČKA, 1931 (*Kanoldia*)

(l.c. 62)

2 ♀♀, Syntypen, China, Prov. Yunnan-Soling-ho, in Coll. HAUSER und Coll. JEDLIČKA.
DEI: 1 ♀, Syntypus, Yunnan.

heinzi JEDLIČKA, 1965 (*Calathus*)

(Reichenbachia **5**, 218, Fig. 5)

♂ Holotypus, mehrere Paratypen, in den Gebirgen am Schwarzen Meer: Zigana-Paß, Egribel-Paß, Soganli-Paß, Kulakkaya bei Giresun, 2000 m und 2700 m, leg. HEINZ und KORGE, in Coll. HEINZ und Coll. KORGE.
DEI: 1 Paratypus, Anatolien bor., Soganli-Paß bei Bayburt, 2. VIII. 1963, 2000—2600 m, leg. KORGE.

heinzi JEDLIČKA, 1965 (*Nebria*)

(l.c. 211—212, Fig. 1a)

♂ Holotypus, mehrere Paratypen, Anatolien, Soganli-Paß bei Bayburt, 2600—2700 m, in der Nähe von Schneefeldern, VII., VIII., leg. HEINZ und KORGE, in Coll. HEINZ, Coll. JEDLIČKA und Coll. KORGE.
DEI: 1 Paratypus, Anatolien bor., Soganli-Paß bei Bayburt, 2700 m, 1. VIII. 1963, leg. KORGE.

heinzi JEDLIČKA, 1965 (*Pterostichus*)

(l.c. 216—217, Fig. 4)

♂ Holotypus, mehrere Paratypen, Anatolien, Zigana-Paß südlich Trabzon, 2200—2300 m Höhe, VII., leg. KORGE und Heinz, in Coll. HEINZ und Coll. JEDLIČKA.
DEI: 1 Paratypus, Anatolien bor., Zigana-Paß bei Macka, ca. 2200 m, 31. VII. 1963, leg. KORGE.

heinzi JEDLIČKA, 1965 (*Zabrus*)

(l.c. 215—216)

Holotypus, mehrere Paratypen, Anatolien, Egribel-Paß südlich Giresun, ca 2400 m Höhe, leg. HEINZ und KORGE, in Coll. HEINZ, Coll. JEDLIČKA und Coll. KORGE.
DEI: 1 Paratypus, Anatolien bor., Egribel-Paß, 2000—2400 m, 28. VII. 1963, leg. KORGE.

hemicalosoma SEMENOV, 1903 (*Carabus*)

(Rev. Russe d'Ent. **3**, 231—232)

2 ♂♂, 1 ♀, Syntypen, Persia septentr., Prov. Astrabad, montes Budshnurd, IV. 1902, leg. SAARO, in Coll. SEMENOV und Coll. JAKOVLEV.
DEI: 2 Syntypen, Persia, Ala-Dagh, Budshnurd, 1033 m, V. 1902 (nicht IV. 1902!), Coll. HAUSER-Coll. LEONHARD.

henryi ANDREWES, 1923 (*Abacetus*)

(Spol. Zeyl. **12**, 238—239)

Holotypus, Ceylon, Kala-oya river, im Britischen Museum, mehrere Ex. Colombo, Negombo, Matale, Kandy und Anuradhapura, leg. HORN, im DEI; 1 Ex. Madras, Trichinopoly; Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, Ceylon, Negombo, 1899, leg. HORN.
Syn. zu *rufopiceus* NIETNER, 1858.

herlanti BASILEWSKY, 1951 (*Lymnastis*)

(Rev. Zool. Bot. Afr. **45**, 85—86, Fig. 1)

Holotypus, 196 Paratypen, Congo Belge, Kivu, Territoire de Kabare contreforts Sud-Est du Kahuzi, savaneà Hagenia, alt. 2080 m, 10.—26. VIII. 1951, leg. LELEUP, im Museé du Congo Belge à Tervuren.
DEI: 1 Paratypus, Kivu, Terr. Kabare, contref. S. E. Kahuzi, 2080 m, 13. VIII. 1951, leg. LELEUP, ex I.R.S.A.C.-Mus. Congo.

heydeni GANGLBAUER, 1915 (*Zabrus*)

(Münch. Koleopt. Ztschr. 4, 93, 123)

♂ Holotypus, Kabylia, in Coll. v. HEYDEN; im DEI.

heydenii KRAATZ, 1875 (*Molops*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. **19**, 374)

Mehrere Syntypen, Balkan, Rhilo-Dagh, leg. HABERHAUER. Lectotypenfestlegung durch MLYNAŘ (soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden).
DEI: Lectotypus, Rhilo Dagh; 5 Ex. dto., 1 Ex. Balkan; Coll. KRAATZ; Paralectotypen.
Syn. zu *dilatatus* CHAUDOIR, 1868.

heyrovskyi JEDLIČKA, 1932 (*Bembidion*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. **29**, 38)

Holotypus, 7 Paratypen, China mer., Prov. Yunnan, in Coll. ANDREWES, Coll. NETOLITZKY, Coll. JEDLIČKA und im DEI.
DEI: 1 Paratypus, Yunnan fou.

hexagonus modiglianii EMDEN, 1936 (*Colpodes*)

(Arb. morph. taxon. Ent. **3**, 270—271)

♂ Holotypus, Java, Nongkodjadjar, 25. XI. 1933, in Coll. v. EMDEN, 4 Ex. dto.; 2 Ex. Gedeh, 4. IV. 1909, leg. BRYANT; 31 Ex. Preanger, G. Tangkoeban, Prahoe, 4000—5000 ft., III., V. 1934, leg. DRESCHER; Paratypen, in Coll. v. EMDEN, Coll. ANDREWES, im Museum Buitenzorg und im DEI.
DEI: 1 Paratypus, O.-Java, Tengger Nongkodjadjar, 1300 m, leg. WEGENER, Gesch. XII. 1935 von OVERBECK.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

hilaris TSCHITSCHERIN, 1899 (*Acupalpus*)

(L'Abeille **29**, 274)

4 Syntypen, Sibérie or.; Chabarowsk (Amur); Wladiwostok, Coll. KOLTZE, Coll. TSCHITSCHERIN.
DEI: 3 Syntypen, Amur, Nr. 1641, Coll. KOLTZE.

hirsutulus BATES, 1892 (*Apotomus*)

(Ann. Mus. Genova (2) **12** (32), 287)

Mehrere Syntypen, Burma, Rangoon; Palon, Pegu; Calcutta; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Palon, Pegu, VIII. IX. 1887, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

hirtus DIECK, 1869 (*Scotodipnus*)

(Diagn. neuer blind. Käfer 4)

Mehrere Syntypen, Nordküste Marocco, Col di Tenda, Piemont, leg. DIECK.
DEI: 1 Syntypus, Col di Tenda, Coll. KRAATZ.

hollbergi separandus KRAATZ, 1881 (*Carabus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. **25**, 170)

Mehrere Syntypen, Caucasus.
Lectotypenfestlegung durch MANDL (im Druck).
DEI: Lectotypus, Caucas., Coll. KRAATZ; 1 Ex. Caucasus, Nr. 267; 1 Ex. Oestreich, Coll. STIERLIN (?); 1 Ex. Bohemani, Faw., Coll. KRAATZ; 1 Ex. dto. teste CHAUD.; 1 Ex. dto. etc. Caucas.; Paralectotypen.

holtzi SCHATZMAYR, 1909 (*Laemostenus*)

(Wien. Ent. Ztg. **28**, 42)

Mehrere Syntypen, Makedonien, Vodena, leg. SCHATZMAYR.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
Syn. zu *stussineri* GANGLBAUER, 1896.

hopffgarteni HEYDEN, 1881 (*Molops*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. **25**, 247—248)

Mehrere Syntypen, Croatien, am See Plitvica, 1878, leg. v. HEYDEN, HOPFFGARTEN und REITTER.
Lectotypenfestlegung durch MLYNAŘ (soll in Acta Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden).
DEI: ♂ Lectotypus, Capela, 1 ♀, Paralectotypus, Croatia, Plitvica; leg. v. HEYDEN.

horni ANDREWES, 1923 (*Acupalpus*)

(Spol. Zeyl. **12**, 237—238)

Holotypus, Burma, Mandalay, leg. ANDREWES, in Coll. ANDREWES; Ceylon, Anuradhapura, leg. HORN, im DEI; Tenasserim, leg. HELFER, im Museum Prag; India, Bombay, Belgaum, XII. 1886, leg. ANDREWES; United Provinces, Sitapur, leg CHAMPION: mehrere Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, Ceylon, Anuradhapura, 1899, leg. HORN.

horni JEDLIČKA, 1932 (*Agonotrechus*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. **29**, 82)

♂ Holotypus, Formosa, Suisharyo, Exped. SAUTER; im DEI [X. 1911].

horni SCHAUBERGER, 1938 (*Anoplogenius*)

(Arb. morph. taxon. Ent. **5**, 53—54)

Holotypus, Paratypen (2 ♂♂, 2 ♀♀), Hinterindien, Cochinchina, leg. FRIEDERICHS, im DEI und in Coll. SCHAUBERGER.
DEI: Holotypus, 2 Paratypen, Cochinchina, leg. FRIEDERICHS.

horni JEDLIČKA, 1931 (*Beckeria*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. **28**, 27)

2 ♂♂, 2 ♀♀, Syntypen, China mer., Prov. Szetschuan, Chung-king, V.—VI. 1929.
DEI: 3 Syntypen, China, Szechuan, Tatsienlu, leg. REITTER.
[Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Szetschuan" steht auf dem Etikett „Szechuan".]

horni LIEBKE, 1934 (*Calleida*)

(Arb. morph. taxon. Ent. **1**, 279)

2 Syntypen, Peru, Coll. KRAATZ, im DEI und in Coll. LIEBKE.
DEI: 1 Syntypus, Peru, Coll. KRAATZ.

horni JEDLIČKA, 1932 (*Catascopus*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. **29**, 82—83)

♀ Holotypus, Formosa, Sokutsu, im DEI [Banshoryo-Distr., IX. 1912, leg. SAUTER].

horni LIEBKE, 1930 (*Colliuris*)

(Mitt. Zool. Mus. Berlin **15**, 695—696)

Holotypus, Brasilien, Coll. KRAATZ, im DEI.

horni JEDLIČKA, 1928 (*Harpalus*)

(Wien. Ent. Ztg. **45**, 92—94)

2 ♂♂, Syntypen, China, Tsingtau, in Coll. JEDLIČKA und im DEI.
DEI: 1 ♂, Syntypus, Tsingtau, II., durch HOFFMANN.
Syn. zu *davidi* TSCHITSCHERIN, 1896—1900 (1897).

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

horni LIEBKE, 1934 (*Lebia*)

(Arb. morph. taxon. Ent. **1**, 277)

3 Syntypen, Peru, Callanga, Coll. KRAATZ; im DEI.
DEI: 2 Syntypen, Peru, Callanga, Coll. KRAATZ.

horni SCHAUBERGER, 1938 (*Oxycentrus*)

(l.c. 5, 38—39)

Holotypus, 1 Paratypus, Celebes, Makassar, Coll. GERMAR-SCHAUM, im DEI und in Coll. SCHAUBERGER.
DEI: Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung.

horni SLOANE, 1907 (*Pogonoglossus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 184—185)

Mehrere Syntypen, New Guinea, New Pomerania, Gazelle Peninsula, leg. v. BENNIGSEN.
DEI: 1 Syntypus, Gazelle, H. Insel, Coll. v. BENNIGSEN.

horni DUPUIS, 1913 (*Pentagonica*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. **57**, 175—181)

Mehrere Syntypen, Ceylon, Weligama, leg. HORN.
DEI: 3 Syntypen, Ceylon, Weligama, 1899, leg. HORN.

horni JEDLIČKA, 1932 (*Risophilus*)

(Čas. Čsl. Spol. Ent. **29**, 83—84)

Holotypus, Ostasien, Formosa, Kosempo; 3 Ex. dto., 1 Ex. Kankau, Exped. SAUTER; im DEI, in Coll. ANDREWES und in Coll. JEDLIČKA: Paratypen.
DEI: Holotypus, Formosa, Kosempo, 22. V. 1912, 1 Ex. dto. 7. IX. 1909, 1 Ex. Kankau (Koshun), 7. IV. 1912; leg. SAUTER, Paratypen.

horni DYKE, 1938 (*Scaphinotus*)

(Ent. Amer. **18**, 116—117, Taf. 5, Fig. 10)

♂ Holotypus, Mexico, Coll. KRAATZ; im DEI.

horni STRANEO, 1938 (*Trichillinus*)

(Arb. morph. taxon. Ent. **5**, 243—244, Fig. 1)

Holotypus, Paratypen (1 ♂, 3 ♀♀), Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ; in Coll. STRANEO und im DEI.
DEI: ♂ Holotypus, 2 ♀♀, Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

horni SCHAUBERGER, 1938 (*Trichotichnus*)

(l.c. 46—47)

Nord-Borneo, Coll. WATERSTRADT, 5 Ex.; Kinabalu, Coll. KRAATZ, 6 Ex.; Holotypus, Paratypen, in Coll. SCHAUBERGER und im DEI.
DEI: Holotypus, Kina Balu, 3 Ex. dto., 2 Ex. Nord- Borneo, Coll. WATERSTRADT; Coll. KRAATZ, Paratypen.

hornianus SCHAUBERGER, 1938 (*Calathomimus*)

(l. c. 43—44)

♂ Holotypus, Ceylon, Worlds-End, 1899, leg. HORN; im DEI.

horsti REITTER, 1888 (*Pristodactyla*)

(Wien. Ent. Ztg. **7**, 88—89)

Mehrere Syntypen, Circassien, Schneefeldern des Fischt, 1887, leg. LEDER und HORST.
DEI: 1 Syntypus, Caucas. occ., Circassien, leg. LEDER-REITTER, Coll. KRAATZ.

hudsoni BROUN, 1904 (*Trichosternus*)

(Ann. Mag. Nat. Hist. (7) **14**, 44—45)

5 Syntypen (Nr. 192), New Zealand, Wellington, leg. LEWIS und HUDSON.
DEI: 2 Syntypen, New Zealand, Wellington, Kavori.

humboldti LIEBKE, 1930 (*Colliuris*)

(Mitt. Zool. Mus. Berl. **15**, 661—689, Fig. 34)

Holotypus, 4 Ex. Brasilien, Cuyabá, im Museum Berlin; 1 Ex. Paraguay, S. Bernardino, leg. FIEBRIG, im DEI; Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, Paraguay, S. Bernardino, leg. FIEBRIG.

hummleri JEANNEL, 1927 (*Trechus*)

(L'Abeille **33**, 559)

Mehrere Syntypen, Abruzzes.
DEI: 9 Syntypen, Mte. Graeco, Paganetti, Coll. FRANKLIN-MÜLLER.

hustachei ANTOINE, 1923 (*Bembidium*)

(Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc **3**, 103—104)

6 Syntypen, Maroco, Timhadit, daya de Tidouit, 5. VII. 1922, leg. ANTOINE.
DEI: 1 Syntypus, Maroc, Lac Sidi Ali, V., leg. ANTOINE.

ibericus PANTEL, 1888 (*Harpalus*)

(Ann. Hist. Nat. Soc. Espan. **17**, 219—223, Fig. 1b)

Mehrere Syntypen, Spanien, Rio Salado, circa Tarancón, Montalvo, II.—V.
DEI: 1 Syntypus, Spanien, Ucles, Coll. STIERLIN.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

ibericus HOLDHAUS, 1912 (*Microlestes*)

(Denkschr. Akad. Wiss. Wien., Math.-Naturw. Kl., 88, 486—487, 523, Fig. 26)

Syntypen, Spanien: 1 ♀, Lageciras, 1 ♂, 1 ♀, Andalusia; ex Coll. REITTER; 1 ♂, Valencia, ex Coll. LEONHARD.
DEI: 1 ♂, Syntypus, Valencia, Coll. LEONHARD.

ignitus KRAATZ, 1875 (*Pterostichus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. **19**, 417—418)

Mehrere Syntypen, Balkan, Rhilo Dagh, leg. HABERHAUER.
DEI: 1 Syntypus, Balkan, Rhilo Dagh, Coll. KRAATZ.

imbricatum löffleri MANDL, 1953 (*Calosoma*)

(S.B. öst. Akad. Wiss. Abt. I, **162**, 57)

♂ Holotypus, 12 ♂♂, 8 ♀♀, Paratypen, Südostiran, Rigmati, westlich des Dschas Morian, E. III., A. IV. 1950, leg. LÖFFLER.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, III. 1950.

immarginatus STRANEO, 1938 (*Caelostomus*)

(Arb. morph. taxon. Ent. **5**, 245—246)

♂ Holotypus, 1 ♀, Paratypus, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ; in Coll. STRANEO und im DEI.
DEI: ♂ Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung.

imperfecta LIEBKE, 1934 (*Lebia*)

(l.c. **1**, 275—276)

Syntypen: 2 Ex. Amazonas, Itaituba, Coll. KRAATZ, im DEI; 1 Ex. Ceara, Serra de Baturilé, im Museum Paris.
DEI: 1 Syntypus, Fundort nicht lesbar.

impressa MOTSCHULSKY, 1851 (*Tachys*)

(Bull. Soc. Nat. Mosc. **24**, 508)

Mehrere Syntypen, Ind. or.
DEI: 1 Syntypus, Ind. or. (Mndrstrn.), Coll. v. HEYDEN.

incultus KRAATZ, 1875 (*Pterostichus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. **19**, 417)

Mehrere Syntypen, Balkan, Rhilo Dagh.
DEI: 6 Ex. Balkan, Coll. KRAATZ, 1 Ex. dto. Rhilo Dagh; Syntypen.

inermis BATES, 1892 (*Stomonaxus*)

(Ann. Mus. Genova (2) **12** (32), 352)

Mehrere ♀♀, Syntypen, Burma, Teinzò, Thagata, Tenasserim, leg. FEA.
DEI: 1 ♀, Syntypus, Tenasserim, Meetan, IV. 1887, leg. FEA, Coll. KRAATZ (Ex. ohne Caput).

infissa ANDREWES, 1937 (*Tritrichis*)

(Ann. Mag. Nat. Hist. (10) **19**, 492—493)

♂ Holotypus, Assam, Khasi Hills, im DEI; 1 ♂, dto.; 1 ♂, 1 ♀, Shillong, leg. GODWIN-AUSTEN; im Indischen Museum und in Coll. ANDREWES.
DEI: Holotypus, Khasis, 1898, Coll. KRAATZ.

ingusch ZOLOTAREV, 1913 (*Tribax*)

(Rev. Russe d'Ent. **13**, 151—152)

10 Syntypen, Kaukasus, im Lande der Inguschen, am oberen Terek, ca. 7000 ft., leg. ZOLOTAREV.
DEI: 1 Syntypus, Terek, 6500, leg. ZOLOTAREV.

inschanicus BREIT, 1914 (*Harpalus*)

(Koleopter. Rundsch. **3**, 167—168)

Mehrere Syntypen, Mongolei, In-Schan (nördlichstes Flußknie des Hwang-ho), durch STAUDINGER & BANG-HAAS.
DEI: 2 Syntypen, Mongolei, Inn Shan, Coll. LEONHARD.
[Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „In-Schan" steht auf dem Etikett „Inn Shan".]

insularis MUTCHLER, 1934 (*Pseudaptinus*)

(Ann. Mus. Nov. Nr. 686, 4)

Holotypus, Mayaguez, Puerto Rico, 22. IX. 1916, leg. v. ZWALUWENBURG; 1 Ex. dto. 11. V. 1917; 17 Ex. Cuba, Soledad, Cienfuegos, 21. X.—3. XI. 1926/VI. 1929, leg. DARLINGTON; im Museum of Comparative Zoölogy und im Amerikanischen Museum; Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, Cuba, Soledad, Cienfuegos, 3. XI. 1926, leg. DARLINGTON.

insulindae LIEBKE, 1934 (*Galerita*)

(Arb. morph. taxon. Ent. **1**, 280)

Holotypus, 5 Paratypen, Ost-Java, Pradjekan, in Coll. LIEBKE und im DEI.
DEI: 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung, leg. HEYNE.

integra ANDREWES, 1929 (*Clivina*)

(Ann. Mag. Nat. Hist. (10) 4, 354—355)

Mehrere Syntypen, Medan, Bandar Baroe, Sibolangit, leg. CORPORAAL; Manna; Palembang; leg. KNAPPERT; Liangagas, Coll. DOHRN, im Museum Stettin; Tebing Tinggi, leg. SCHULTHEISS, im DEI; Medan, Tjinta Radja und Kota Tjane, leg. MJÖBERG, im Museum Stockholm, Kaju Tanam, leg. BECCARI, im Museum Genoa.
DEI: 1 Syntypus, N.O. Sumatra, Tebing-tinggi, leg. SCHULTHEISS, Coll. KRAATZ.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

irakensis ANDREWES, 1927 (*Oodes*)

(Ent. Mitt. **16**, Nr. 2, 144–145)

♀ Holotypus, Irak, Amara, 12. V. 1917, leg. BEESON, im Britischen Museum, 1 ♀, Paratypus, Basra, 13. VI. 1926, leg. SCHMIDT, im DEI.
DEI: 1 ♀, Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

iridea BATES, 1892 (*Dolichoctis*)

(Ann. Mus. Genova (2) **12** (32), 414–415)

Mehrere Syntypen; Burma, Karin Chebà, alt. 900–1100 m; Karin Asciuii Chebà, alt. 1200–1300 m; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Carin Chebà, 900–1100 m, V. XII. 1888, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

iridulus BATES, 1892 (*Ophoniscus*)

(l. c., 337)

Mehrere Syntypen; Burma, Karin Asciuii Ghecu, 1400–1500 m; Palon, Pegu; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Carin Asciuii, Ghecu, 1400–1500 m, III.–IV. 1888, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

ischioxanthus BATES, 1892 (*Colpodes*)

(l.c., 376)

Mehrere Syntypen, Burma, Karin Chebà, alt. 900–1100 m, leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 5. XII. 1888, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *cruralis* CHAUDOIR, 1878.

italicus DANIEL, 1898 (*Trechus*)

(Koleopter. Studien **2**, 13)

Mehrere Syntypen, Gran Sasso d'Italia, leg. FIORI.
DEI: 1 Syntypus, G. Sasso, Abruzzes, leg. FIORI.

jacobsoni ANDREWES, 1926 (*Chlaenius*)

(Ann. Mag. Nat. Hist. (9) **18**, 274–275)

Holotypus, 14 Paratypen, Sumatra, Fort de Kock, 3000 ft., leg. JACOBSON, im Britischen Museum.
DEI: 1 Paratypus, Sumatra, Fort de Kock, 920 M, 1925, leg. JACOBSON.

janthinus janthinus GANGLBAUER, 1887 (*Sphodristocarabus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. **31**, 140)

Mehrere Syntypen, westl. Caucasus, Dagomys, Atschischho, Kitschmaj, leg. STARCK.
Lectotypenfestlegung durch MANDL (im Druck).
DEI: 1 Paralectotypus, occid. Caucasus, Atschischho, leg. STARCK.

japonica BATES, 1893 (*Coptodera*)

(Trans. Ent. Soc. London **3**, 281, Taf. 13, Fig. 4)

Mehrere Syntypen, Japan, Kiuskiu.
DEI: 1 Syntypus, Japan, 1910–320, leg. LEWIS.

javanica EMDEN, 1937 (*Sarothrocrepis*)

(Arb. morph. taxon. Ent. **4**, 117–119)

Holotypus, 5 Paratypen, Java, Nongkodjadjar, in Coll. v. EMDEN, Coll. ANDREWES und im DEI.
DEI: 1 Paratypus, O.-Java, Tengger, Nongkodjadjar, 1300 m, leg. WEGENER, Gesch. XII. 1935 von OVERBECK.

jezerensis APFELBECK, 1908 (*Trechus*)

(Glasn. Muz. Bosn. Herc. Sarajevo, **20**, 525–526, Fig.)

Mehrere Syntypen, Bosnia centralis, Jezero, leg. APFELBECK.
DEI: 1 ♂, Syntypus, Jezero, 1902, leg. APFELBECK, Coll. LEONHARD.

joërini STIERLIN, 1890 (*Carabus*)

(Mitt. Schweiz. Ent. Ges. **8**, 239–240)

Mehrere Syntypen, in der Nähe von Zürich, leg. JOËRIN-GERBER, in Coll. STIERLIN.
DEI: 1 Syntypus, Zürich, Coll. STIERLIN.
Syn. zu *auronitens* FABRICIUS, 1792.

johnbeckeri BÄNNINGER, 1927 (*Cicindis*)

(Suppl. Ent. **16**, 119–121)

♀ Holotypus, Bushere am Persischen Golf, 22. IV. 1927, leg. BECKER; im DEI.

jurečeki JEDLIČKA, 1928 (*Pseudophonus*)

(Ent. Mitt. **17**, 45–46)

Syntypen: 7 ♂♂, 2 ♀♀, Sachalin, 1 ♀, Japan, im DEI; 12 ♂♂, 4 ♀♀, Ussuri-Sutschan, durch STAUDINGER & BANG-HAAS.
DEI: 6 Ex. Sachalin, Coll. KRAATZ (1 Ex. ohne Caput); 1 Ex. Japan, Coll. KRAATZ; 1 Ex. ohne Fundort; Syntypen.

jurečekianus MAŘAN, 1940 (*Pterostichus*)

(Cas. Cs. Spol. Ent. **37**, 3–4)

♂ Holotypus, mehrere Paratypen, Sibiria occ. Barnaul in parte septentrioni montium Altaj; im Museum Prag und in Coll. JUREČEK.
DEI: 1 Paratypus, Sibiria occ., Barnaul Altaj.

juvenilis jedličkai BASILEWSKY, 1932 (*Tefflus*)

(Ent. Bl. **28**, 21)

♀ Holotypus, D.O. Afrika, Usaramo, leg. v. BENNIGSEN; im DEI.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

kaninensis POPPIUS, 1906 (*Cryob ius*)

(Acta Soc. Faun. Flora Fenn. **28** (1905), nr. 5, 20, 143—146)
Mehrere Syntypen, Nord-Rußland, Halbinsel Kanin, Sommer 1903, leg. POPPIUS, im Museum Helsingfors.
DEI: 1 Syntypus, Kanin, leg. POPPIUS, Coll. LEONHARD.

kara ANDREWES, 1921 (*Bembidium*)

(Ent. Monthly Mag. (3) **7** (57), 250)

Holotypus, mehrere Paratypen; Tonkin, Chapa; Laos, Ban Sop Vi, Lak Mune, Sop Soup, Ban Nong, Sala Nam Chan Chin, Ban Samang, Pak Seng und Don Khoua; leg. VITALIS DE SALVAZA; Cochin China, Cap St. Jacques, Coll. FLEUTIAUX; India, United Provinces; West Almora und in Swal River Basin, leg. CHAMPION; Sikkim, Namsu, 2100 ft. und Gopaldhara, 4720 ft., leg. STEVENS.
DEI: 3 Paratypen, Br. Sikkim, Gopaldhara, leg. STEVENS.

kineli MAKÓLSKI, 1952 (*Badister*)

(Ann. Mus. Zool. Pol. **15**, 14—16, Taf. 3, Fig. 3)

Polen: ♂ Holotypus, Gocławek, nahe Warszaw, 23. III. 1947, leg. MAKÓLSKI; 96 Ex. dto.; 17 Ex. Warszaw, leg. MAKÓLSKI, Szczecin, leg. ?; Gdańsk, leg. KNIEPHOFF, Torun, leg. BARTOSZYŃSKI, Elk, leg. BIELAWSKI, Miedzyrzec Podlaski, leg. MAKÓLSKI und BURAKOWSKI, Kazimierz Dolny, leg. MROCZKOWSKI, Nowa Sol, leg. ? Wrocław, leg. POLENTZ; Ukrainian S.S.R. Babińce und Krzywcze an der Dniester, leg. TOLL, Dvinogrod an der Dniester, leg. TENENBAUM; Yugoslavia, Zagreb, leg. WEINGARTNER; Austria, Neusiedlersee, leg. HOFFMAN; im Polnischen Museum of Zoology in Warszaw.
DEI: 2 Paratypen, Polonia centr., distr. Warszawa, Gostawek, 23., 25. III. 1947, leg. MAKÓLSKI, Mus. Zool. Polonikum, Warszawa, 2/47.

klapperichi JEDLIČKA, 1956 (*Amara*)

(Acta Ent. Mus. Nat. Pragae **30** (1955), Nr. 452, 196—197)

Afghanistan, Badakschan: 26 Ex. Sarekanda, 1 Ex. Kandahar; 1952—1953, Exped. KLAPPERICH; Holotypus, Paratypen, in Coll. KLAPPERICH und in Coll. JEDLIČKA.
DEI: 1 Paratypus, N.O.-Afghanistan, Sarekanda, Gebirge Badakschan, 4100 m, 28. VII. 1953, durch KLAPPERICH.

klapperichi JEDLIČKA, 1956 (*Brachynus*)

(l.c., 204)

21 Ex. Afghanistan, Bashgultal, 1952—1953, Exped. KLAPPERICH; Holotypus, Paratypen, in Coll. JEDLIČKA und Coll. KLAPPERICH.
DEI: 1 Paratypus, Afghanistan, Bashgultal, 1200 m, Nuristan, 15. IV. 1953, leg. KLAPPERICH.

klapperichi JEDLIČKA, 1956 (*Chlaenius*)

(l.c., 208—209)

Holotypus, 3 Paratypen, China, Prov. Fukien, Kuatun, 1952—1953, Exped. KLAPPERICH, in Coll. JEDLIČKA und Coll. KLAPPERICH.
DEI: 1 Paratypus, China, Tschung Sen, Kuatun, Fukien, 1. VI. 1946.

klapperichi JEDLIČKA, 1956 (*Glycia*)

(l.c., 203)

Afghanistan: 9 Ex. Nuristan, Bashgultal, 3 Ex. Kutian, 1 Ex. Asmar; 1952—1953, Exped. KLAPPERICH; Holotypus, Paratypen, in Coll. JEDLIČKA und Coll. KLAPPERICH.
DEI: 1 Paratypus, Afghanistan, Nuristan, Bashgultal, 1100 m, 6. IV. 1953, leg. KLAPPERICH.

klapperichi JEDLIČKA, 1956 (*Harpalus*)

(l.c., 194—195)

Afghanistan: 30 Ex. Sarekanda, Badakschan, 6 Ex. Bashgultal; 1952—1953, Exped. KLAPPERICH; Holotypus, Paratypen, in Coll. JEDLIČKA und Coll. KLAPPERICH.
DEI: 2 Paratypen, NO-Afghanistan, Gebirge Badakschan, Sarekanda, 4200 m, 31. VII. 1953, leg. KLAPPERICH.

klapperichi JEDLIČKA, 1956 (*Zabrus*)

(l.c., 197)

Afghanistan: 61 Ex. Kandahar Kuna; 1 Ex. Badakschan; 4 Ex. Pagmangebirge; 1 Ex. Turkestan, Osch; 1952—1953, Exped. KLAPPERICH; Holotypus, Paratypen, in Coll. KLAPPERICH und Coll. JEDLIČKA.
DEI: 1 Paratypus, S-Afghanistan, Kandahar-Kuna, 950 m, 28. I. 1953, leg. KLAPPERICH.

kličkai JEDLIČKA, 1934 (*Colpodes*)

(Sborn. ent. Mus. Praze **12**, Nr. 103, 197)

Holotypus, 4 Paratypen, China, Szetschuan, Nitou-Tatsienlu, in Coll. JEDLIČKA und Coll. REITTER.
DEI: 2 Paratypen, China, Szechuan, Nitou Tatsienlu, Wassuland, Chunghwa, Coll. REITTER.

knauthi GANGLBAUER, 1904 (*Trechus*)

(Münch. Kol. Ztschr. **2**, 189—190)

Mehrere Syntypen, Judicarien, Monte Pari, 1991 m, leg. GANGLBAUER.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, 1903.

knirschi JEDLIČKA, 1931 (*Brachynus*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. **28**, 107—108)

1 Ex. China, Prov. Yunnan-Soling-ho, 2 Ex. Bougt, leg. DONCKIER, 1 Ex. Szetschuan-Kiating; in Coll. ANDREWES, Coll. BREUNING und Coll. JEDLIČKA; Syntypen.
DEI: 1 Syntypus, China merid., Provincia Yunnan.

kokeilii MILLER, 1850 (*Pterostichus*)

(Stett. Ent. Ztg. **11**, 11)

Mehrere Syntypen, Obersteiermark, Seethal-Alpe bei Judenburg.
DEI: 1 Syntypus, Steiermark, Coll. STIERLIN.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

kolariensis MAINDRON, 1898 (*Chlaenius*)

(Bull. Soc. Ent. Fr. **5**, 130–131, Fig.)

2 ♂♂, 4 ♀♀, Syntypen, Inde orientale, Chotia Nagpore, Nawafully, XI. 1896, leg. CARDON, via OBERTHÜR an MAINDRON.
DEI: 1 Syntypus, Chota Nagpore, Nowatoli, XI.–XII. 1896, leg. CARDON, Coll. LEONHARD.

koltzei REITTER, 1900 (*Bradycellus*)

(Verh. Nat. Ver. Brünn **38** (1899), 133)

Mehrere Syntypen, Thibet, Kuku-noor.
DEI: 1 Syntypus, Kuku-noor, durch REITTER, Nr. 1648, Coll. KOLTZE.
Syn. zu *grandiceps* BATES, 1873.

komarowi SEMENOW, 1889 (*Discoptera*)

(Horae Soc. Ent. Ross. **23**, 397–398)

Mehrere Syntypen, Prov. Transcaspica, Repetek, V. 1888, in Coll. KOMAROW; 1 ♂, 1 ♀, in collect. nostra, 1887, leg. EYLAND, detecta.
DEI: 1 Syntypus, Transcasp., Coll. KRAATZ.

korbi TSCHITSCHERIN, 1893 (*Feronia*)

(l.c. **27**, 482–483)

2 ♀♀, Syntypen, Asie Mineure, Amasia, im Museum Vienne und in Coll. TSCHITSCHERIN.
DEI: 1 Syntypus, Amasia, Coll. KRAATZ.

korschefskyi KULT, 1950 (*Aspidoglossa*)

(Arthropoda **1**, 318–319)

Holotypus und 1 Ex. Argentina, S. Pedro de Colalao, ex Coll. JEDLIČKA, in Coll. KULT, 1 Ex. Tucumán, ex Coll. STAUDINGER, in Coll. KULT, 12 Ex. Tucumán, leg. VÉZENYI, im Museum Budapest und in Coll. KULT; 2 Ex. Paraguay, leg. FIEBRIG, im DEI; 3 Ex. Brasilia, 1889, leg. MERKL, im Museum Budapest; Paratypen.
DEI: 2 Paratypen, Paraguay, leg. FIEBRIG.

korschefskyi EIDAM, 1931 (*Diocarabus*)

(Wien. Ent. Ztg. **48**, 79)

1 ♂, 2 ♀♀, Syntypen; Sibiria meridionalis, Semirjetschensk, Terskeitau, VI. 1902, Coll. HAUSER–Coll. LEONHARD, im DEI.
DEI: 1 ♂, 1 ♀, Turk. Issyk-kul, Terski-tau, VI. 1902, Coll. HAUSER, 1 ♀, Turkestan, Kok-teke Gebirge, Coll. LEONHARD; Syntypen.

kraatzi MÜLLER, 1889 (*Nebria*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 424; nom. praeocc. = *diaphana* DANIEL, 1890, l.c., 130)

Mehrere Syntypen; Kärnthen auf dem Obir, 6750 ft.; Vertazha-Sattel, 5770 ft., E. VI.; Lombardei, Monte Grigna, VI.; leg. MÜLLER.
DEI: 1 Syntypus, Carinthia, Vertazha-Sattel, Coll. KRAATZ.

kraatzi SCHAUBERGER, 1938 (*Oxycentropsis*)

(Arb. morph. taxon. Ent. **5**, 44–46)

Holotypus und 16 Ex. Südost-Sumatra, Tebing-Tinggi, leg. SCHULTHEISS, Coll. KRAATZ, im DEI, in Coll. ANDREWES und Coll. SCHAUBERGER; 1 Ex. Celebes, Makassar, Coll. GERMAR-SCHAUM, im DEI: Paratypen.
DEI: Holotypus, Sumatra, T. T., Coll. KRAATZ; 9 Ex. dto.; 1 Ex. N.O. Sumatra, Tebing tinggi, leg. SCHULTHEISS, Coll. KRAATZ; 1 Ex. Celebes, Makassar, Coll. GERMAR-SCHAUM; Paratypen.

kraatzi HEYDEN, 1882 (*Pseudotaphoxenus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. **26**, 309–310)

♂ Holotypus, Samarkand, leg. HABERHAUER, in Coll. KRAATZ; im DEI.

kraatzii HEYDEN, 1882 (*Derus*)

(l.c., 311)

Mehrere Syntypen, Samarkand, leg. HABERHAUER.
DEI: 3 Syntypen, Namonigan (Fundort ist nicht aufzufinden und stimmt mit der Originalbeschreibung nicht überein), Coll. KRAATZ.

kricheldorffi WAGNER, 1913 (*Trechus*)

(Ent. Mitt. **2**, 19–21)

Holotypus, mehrere Ex., Nord-Spanien, Picos de Europa, südwestl. v. Santander, im östl. Teil des Gebirges, im Bezirk La Liebana, ca. 2000 m Höhe, Sommer 1911, leg. KRICHELDORFF, in Coll. WAGNER, mehrere Ex. Andara, Picos d. Europa, 1911, leg. E. & H. HOPP, in Coll. HOPP und im DEI: Paratypen.
DEI: 2 ♂♂, 1 ♀, Picos de Europa, La Libana, leg. KRICHELDORFF, Coll. WAGNER, 1 ♂, Picos de Europa, VI. 1911, leg. HOPP; Paratypen.

kubanicus REITTER, 1896 (*Pterostichus*)

(Wien. Ent. Ztg. **15**, 202)

Mehrere Syntypen, Cirkassien.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *caucasicus* MÉNÉTRIÉS, 1832.

kulti STRANEO, 1952 (*Feroniola*)

(Doriana, **1**, Nr. 28, 3–4, Fig. 1)

Holotypus, 21 Paratypen, Bolivia, Cochabamba, Massiccio di Tunari, 4000 m, leg. ZISCHKA; im Museum Genova.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, Tunari-Massiv, durch REITTER.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

kurdistanicus EIDAM, 1931 (*Cylocarabus*)

(Wien. Ent. Ztg. **48**, 78)

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Armenia turcica orientalis meridionalis, Wan 1912, leg. KULZER, Coll. LEONHARD, im DEI.

laetus SCHAUM, 1860 (*Pericalus*)

(Berl. Ent. Ztschr. **4**, 190–191)

Mehrere Syntypen, ohne Fundort.
DEI: 1 Syntypus, Celebes, Coll. SCHAUM.

laeviceps BATES, 1892 (*Clivina*)

(Ann. Mus. Genova (2) **12**, 277)

Mehrere Syntypen; Burma, Rangoon, Palon in Pegu; leg. FEA.
DEI: 1 Ex. Palon, Pegu, 8. IX. 1887; 1 Ex. Birmania, Bhamó, VII. 1886; 5 Ex. Rangoon, 1886/1887/XII. 1888; leg. FEA, Syntypen.

lagaroides REITTER, 1887 (*Haptoderus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. **31**, 249)

Mehrere Syntypen, Abchasien, Circassien, leg. KÖNIG.
DEI: 1 Syntypus, Caucas. occ., Circassien, Coll. LEDER-REITTER-KRAATZ.
Syn. zu *quadricollis* CHAUDOIR, 1846.

lamprotus BATES, 1892 (*Hypolithus*)

(Ann. Mus. Genova (2) **12** (32), 338–339)

Mehrere Syntypen; Burma, Teinzò; Karin Ghecu, alt. 1300–1400 m; Karin Chebà, alt. 900–1100 m; Bhamo; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Carin-Chebà, V. XII. 1888, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

laotinus ANDREWES, 1919 (*Chlaenius*)

(Ann. Mag. Nat. Hist. (9) **4**, 14–15)

Holotypus, mehrere Paratypen, Laos, Provinces of Luang Prabang, Haut Mekong, 1915–18, leg. DE SALVAZA; im Britischen Museum.
DEI: 2 Paratypen, Luang Prabang, Muong Hien, 30. XI. 1917, leg. DE SALVAZA.

lapidicola BOKOR, 1913 (*Anophthalmus*)

(Ann. Mus. Nat. Hung. **11**, 586–588)

2 ♂♂, 2 ♀♀, Syntypen, ein Tal in der Gemeinde Aranyosfö, Komitat Torda-Aranyos, Ungarn.
DEI: 1 Syntypus, Vall. Ordinkus (Fundort ist nicht aufzufinden und stimmt mit der Originalbeschreibung nicht überein), durch BOKOR, Coll. LEONHARD.
Syn. zu *hickeri* KNIRSCH, 1913.

lata GUÉRIN, 1841 (*Antarctia*)

(Rev. Zool. Paris, 190)

Mehrere Syntypen, H. le Port Famine, détroit de Magellan.
DEI: 1 Syntypus, Magellan St., Coll. SCHAUM.

latefasciatum LIEBKE, 1931 (*Mastax*)

(Ent. Anz. **11**, 262–263, Fig.)

Holotypus, 3 Paratypen, Annam, Phuc-Son, leg. FRUHSTORFER, in Coll. LIEBKE und im DEI.
DEI: 1 Paratypus, Phuc-Son, XI.–XII., leg. FRUHSTORFER, Coll. KRAATZ.

laticollis KRAATZ, 1876 (*Procerus*)

(Bull. Soc. Nat. Moscou **51**, 127, 130–131, Taf. 1, Fig. 6–8)

Mehrere Ex. bei Külek, leg. HABERHAUER; 1 Ex. Karl-Boghd, ex Coll. LEDERER; Syntypen.
DEI: 2 Syntypen, ohne Fundort, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *scabrosus* OLIVIER, 1795.

latipennis BURGEON, 1930 (*Craspedophorus*)

(Rev. Zool. Bot. Afr. **19**, 164–165)

Mehrere Syntypen, Camerun, Mukonge Farm, leg. ROHDE, im Museé du Congo, Museé de Bruxelles und DEI.
DEI: 1 Syntypus, Kamerun, CONRADT, Coll. KRAATZ.

lebioides BATES, 1892 (*Pristomachaerus*)

(Ann. Mus. Genova (2) **12** (32), 306)

Mehrere Syntypen, Burma, Karin Chebà, alt. 800–1100 m; Karin Asciuii Chebà, 1200–1300 m; leg. FEA.
DEI: 2 Syntypen, Carin Chebà, 900–1100 m, V. XII. 1888, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

lentus STURM, 1818 (*Harpalus*)

(Deutschl. Ins. **4**, 28, Taf. 82, Fig. a, A; nom. praeocc. = *flavicornis* DEJEAN, 1829, Spec. gén. Col. 4, 366)

Mehrere Syntypen, Österreich, ex Coll. MEGERLE VON MÜHLFELD in Wien.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort.

leonhardi NETOLITZKY, 1909 (*Bembidium*)

(Wien. Ent. Ztg. **28**, 43–44)

Mehrere Syntypen; Bosnien, am Ramafluß bei Prosor; Herzegowina, Doljankatale bei Jablanice, leg. LEONHARD.
DEI: 3 Ex. Bosnia, Prosor, 1902, 1 Ex. dto. Wassermoosgesiebe am Ramafluß; 1 Ex. Herzegovina, Jablanica, Doljanka Thal, Wassermoosgesiebe; leg. LEONHARD, Syntypen.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

leonhardi BREIT, 1911 (*Laemostenus*)

(Wien. Ent. Ztg. **30**, 112–113)

2 ♀♀, Syntypen, Kephalonia, am Eingang zur Drachenhöhle, Arythos-See, leg. HILF, in Coll. LEONHARD und Coll. BREIT.
DEI: 1 ♀, Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 1. IV. 1905, Coll. LEONHARD.

leonhardi BREIT, 1914 (*Pterostichus*)

(Koleopter. Rundsch. **3**, 53, 56)

4 ♂♂, 1 ♀, Syntypen, Kephalonia, Megalo Vunó, 1200–1400 m, E. III., leg. MOCZARSKI und WINKLER.
DEI: 2 Syntypen (Ex. verliehen, konnten nicht überprüft werden).

leonhardi BREIT, 1913 (*Setnikia*)

(Ent. Mitt. **2**, 13–14)

3 Syntypen, bosnisch-herzegowinische Höhlenfauna, im Bjelasničagebiet in Südbosnien, leg. SETNIK, an LEONHARD.
DEI: 3 Syntypen, Herzegovenia, Vysosiča, Coll. LEONHARD.

leonhardi REITTER, 1901 (*Trechus*)

(Wien. Ent. Ztg. **20**, 143)

Mehrere Syntypen: Herzegowina; Jablanica, leg. REITTER; Rana, leg. HILF; Komadina-Quelle, Tovarnica, VI., leg. LEONHARD.
DEI: Herzegowina: 1 Ex. Jablanica, 1901, 1 Ex. dto., Wassersieseln in der Tovarnica; 1 Ex. Komadina, VI. 1901; Coll. LEONHARD, Syntypen.

lepitrei KRAUSE, 1909 (*Carabus*)

(Int. Ent. Ztschr. Guben **3**, 171)

Mehrere Syntypen, Marokko, Ebene Angad, via LEPITRE an KRAUSSE.
DEI: 2 Syntypen, Marokko, Ebene der Angad, KRAUSSE 1910 erhalten, Coll. FRANKLIN MÜLLER.
Syn. zu *morbillosus* FABRICIUS, 1792.

lesnei STERNBERG, 1906 (*Anthia*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 454)

4 ♂♂, 6 ♀♀, Syntypen, Congo français, Haute Sanga, Nebenfluß des unteren Congo, im Museum Paris und in Coll. STERNBERG.
DEI: 1 ♀, Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. KRAATZ.

leus ANDREWES, 1927 (*Pterostichus*)

(Ent. Mitt. **16**, Nr. 2, 146)

Holotypus, Irak, Mudelil, 2. III. 1917, leg. BEESON, im Britischen Museum, 5 Ex. Basra, 13. VI. 1926, leg. SCHMIDT, im DEI, 1 Ex. Amara, 12. VI. 1916, leg. BEESON; Paratypen.
DEI: 3 Paratypen, Basra, 13. VI. 1926, leg. SCHMIDT.

leveille DEVILLE, 1914 (*Bembidion*)

(Cat. Col. Corse, 498)

Mehrere Syntypen, Corsika, durch RAYMOND-Coll. LÉVEILLE.
DEI: 1 Syntypus, Corsica, Coll. NETOLITZKY.

lineatopunctatus MILLER, 1850 (*Pterostichus*)

(Stett. Ent. Ztg. **11**, 10–11)

Mehrere Syntypen, Obersteiermark, Haller Alpe, hoch'schen Alpenhütte, leg. MILLER.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, Coll. STIERLIN.

lineella SLOANE, 1907 (*Agonochila*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 182–183; nom. praeocc. = *papuana* SLOANE, 1917, Proc. Linn. Soc. N.S. Wales **42**, 433)

Mehrere Syntypen, New Guinea, New Pomerania, Herbertshöhe, leg. v. BENNIGSEN, in Coll. HORN.
DEI: 1 Syntypus, D.N. Guinea, Herbertshöhe, leg. v. BENNIGSEN.

löffleri JEDLIČKA, 1963 (*Amara*)

(S. B. Österr. Akad. Wiss., Mathem.-naturw. Kl., Abt. 1, **172**, 174–175, Fig. 6)

Holotypus, 6 Paratypen, Iran, Kührang, Talwiesen, durch MANDL, Österreichische Iran-Expedition 1949/50, in Coll. JEDLIČKA.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, leg. LÖFFLER.

longicollis slovenicus SCHWEIGER, 1950 (*Trechus*)

(Proc. 8th int. Congr. Ent. Stockholm (1948), 491–492)

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Slov. Bachergebirge, leg. BERNHAUER, in Coll. SCHWEIGER.
DEI: 1 Syntypus, Bachergebirge, GANGLBAUER.

longicornis SCHAUM, 1857 (*Stenolophus*)

(Berl. Ent. Ztschr. **1**, 145)

Mehrere Ex. Griechenland, Nauplia, leg. v. KIESENWETTER; 2 Ex. Oestreich, in Coll. SCHAUM: Syntypen.
DEI: 1 Syntypus, Austria.

longipes DANIEL, 1902 (*Bembidium*)

(Münch. Kol. Ztschr. **1**, 10, 29)

Mehrere Syntypen: bei Bozen im Sarntal am Talferufer, VI., IX. 1885, auf der Seiseralpe, 13. IX. 1885, am Sustenpaß, Meiental im Canton Uri, 15. VIII. 1891, bei Macugnaga am Monte Rosa, 11. VIII. 1886, auf der Spitze des Monte Bego in den Seealpen, 31. VII. 1894, 2873 m, am oberen Pesio in Ligurien, 31. VII. 1890 und bei Blégiers, Basses-Alpen am

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

Ufer der Bléone, 9. VIII. 1898; Styria sup., Schladming, Coll. SCHUSTER, Wien; Karawanken, Stou, GGLBR., Wiener Hofmuseum; Carniola, Kot-Thal, durch STUSSINER, Wiener Hofmuseum; Carinthia sup., Ober-Vellach, durch APFELBECK, Bosn.-herzegow. Landesmuseum; Salzburg, Lofer a. d. Saalach, Coll. SCHNEIDER, Dresden; Nord-Tirol, Niederthai im Oetzthal, 22. VII. 1899, Coll. KURZ, München; Allgäu, durch JÄGER, Coll. DORMEYER, Stettin; Meran, Coll. LEONHARD, Dresden; Val Bregaglia, Castasegna bei Chiavenna, durch RÖTTGEN, Coll. DORMEYER, Stettin; Savoie, La Giettaz, Coll. DEVILLE, Nizza; Alp. marit., Siruol, Coll. DEVILLE, Nizza; Hautes-Pyrenées, Coll. SAHLBERG, Helsingfors; Eaux-Chaudes, Hautes -Pyr., Coll. DORMEYER, Stettin.
DEI: 2 Syntypen, Sustenpaß.

lucens BATES, 1889 (*Lamprophonus*)

(Ann. Mus. Genova (2) **7** (27), 102)

Mehrere Syntypen, Burma, Teinzo, leg. FEA, in Coll. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Birmania, Teinzo, V. 1886, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

lucidissima BALIANI, 1932 (*Amara*)

(Mem. Soc. Ent. Ital. **11**, 10—11, Taf. 1, Fig. 6)

1 ♂, 6 ♀♀, Syntypen, China Centrale, Tatsienlu-Chiulung, prov. di Szechuan, durch REITTER.
DEI: 1 Syntypus, China, Tatsienlu-Kiulung, durch REITTER.

lucidulum SCHAUM, 1857 (*Agonum*)

(Berl. Ent. Ztschr. **1**, 138—139)

3 Syntypen, Griechenland, am Phalereus bei Athen.
DEI: 1 Syntypus, Attica, Coll. GERMAR-SCHAUM.
Syn. zu *extensum* MÉNÉTRIÉS, 1849.

lüdersi WAGNER, 1915 (*Dyschirius*)

(Ent. Mitt. **4**, Nr. 10/12, 304—306, Fig. 1)

Mehrere Syntypen: Mark Brandenburg, am Ufer der Havel bei Caputh, Nieder-Neuendorf bei Salzbrunn, Papenberge, Schlachtensee, Paulsborn am Grunewaldsee, leg. WAGNER; Forsthaus Bredow bei Finkenkrug, Zeestow, Ziegeleien von Velten und Birkenwerder, am Ufer der Briese, Briesental bei Birkenwerder, am Ufer der Oder bei Fürstenberg, leg. FREYMUTH, LÜDERS, MÜLLER, NERESHEIMER und WAGNER; Pankow, Tegel, Borgsdorf (Havel), Kolberg (Ostsee), leg. MÜLLER; im DEI.
DEI: 10 Ex. Mark Salzlöcher bei Salzbrunn; 24 Ex. Umgeb. Berlin, Bredow; 4 Ex. Mark, Umg. Beelitz; 5 Ex. Mark, Oder bei Fürstenberg; 1 Ex. Umg. Berlin, Schlachtensee, 1 Ex. Wannseegebiet, 1 Ex. dto. Griebnitzsee; 1 Ex. Mark, Havelufer bei Nd.-Neuendorf; leg. WAGNER; 2 Ex. Mark, Forst Bredow, in Coll. NERESHEIMER: Syntypen.

lunigera ANDREWES, 1926 (*Dolichoctis*)

(Ann. Mag. Nat. Hist. (9) **18**, 288—289)

Mehrere Ex. Sumatra, Gunong Singgalang, 6000 ft., leg. JACOBSON; 1 Ex. Medan, leg. MJÖBERG, im Museum Stockholm; Paratypen, Holotypus, im Britischen Museum.
DEI: 1 Paratypus, Sumatra's Westkust, Gunung Singgalang, 1800 m, 1925, leg. JACOBSON.

luntaka ANDREWES, 1924 (*Bembidium*)

(Miss. BABAULT, Prov. Centr. Inde, 75—76)

Mehrere Syntypen, Indien, occ. Himalaya, 1914: Ladack, Leh, Muhlbeck, Nuria; Cachemire, Baltal, Sonemarg; Kulu, Koty; Rukshu, Nima-Mud; Lahoul, Keiling, Sumdéo, Sisu, Zingzinbar.
DEI: 1 Syntypus, Ladack, Mulbeck (Frontᵉ Thibet), Aout 1914, leg. BABAULT.

lutshnikianus BOGAČEV & KURNAKOV, 1958 (*Pterostichus*)

(Rev. d'Ent. de l'URSS, **37**, 174, Fig. 4, 419, Taf. 1, 417)

♂ Holotypus, Berg Chalaca, leg. BOGAČEV, im Zool. Inst. Ad. W. der UdSSR; mehrere Paratypen dto., Roksker Pass/ Osetien, leg. KURNAKOV.
DEI: 2 ♂♂, 1 ♀, Paratypen, jug. Rokskij, Ossetia, Cauc. centr., 11. VII. 1949, leg. KURNAKOV.

lutshnikianus ordinatoides KURNAKOV, 1958 (*Pterostichus*)

(l.c., 423, Taf. 1, 417)

Mehrere Syntypen: Mamisonsker Paß, leg. LUČNEK und KURNAKOV u. a.; Lecchumsker Kette (zwischen Dorf Glol und Osetinsker Heerstrasse), 1846, leg. CHAUDOIR; Paß Chal'madzara, leg. KURNAKOV.
DEI: 1 ♂, 1 ♀, Syntypen: Cauc. centr.; jug. Marnisson, 15. VII. 1949; 1 ♂, jug. Zchalmatsenara, mont Letschchumenses, 20. VII. 1949; leg. KURNAKOV.

maculatus STRANEO, 1949 (*Abacetus*)

(Bull. Inst. roy. Sc. nat. Belg. **25**, nr. 21, 4)

♀ Holotypus, Cambodge, leg. VITALIS, im Istituto reale di Scienze naturali del Belgio; wahrscheinlich ist nach der Beschreibung 1 Paratypus im DEI.
DEI: 1 Paratypus, Kambodja.

maderensis WOLLASTON, 1854 (*Olisthopus*)

(Ins. Maderensia, 35, Tab. 1, Fig. 7)

Mehrere Syntypen, Madeira, unter Steinen im Gebirge, 2000′ s. m., leg. WOLLASTON.
DEI: 5 Syntypen, Madeira, Coll. KRAATZ.

mahratta ANDREWES, 1929 (*Dyschirius*)

(Faun. Brit. Ind. Col. Carab., 392, 396)

Holotypus, Bombay, Belgaum, XII. 1886, leg. ANDREWES, in Coll. ANDREWES; 1 Ex. dto.; 2 Ex. Ceylon, Anuradhapura, 1899, leg. HORN, im DEI; Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

mäklini POPPIUS, 1906 (*Cryobius*)

(Acta Soc. Faun. Flora Fenn. **28** (1905–06), nr. 5, 22, 113–115; nom. praeocc. = *jenisseicus* CSIKI, 1930, in JUNK & SCHENKLING, Cat. Col. **2**, 654)

Mehrere Syntypen, Nord-Sibirien, westl. vom Jenissej-Gebiet bis zum Lena-Gebiet, Fl. Jenissej: Sopotschnaja Korga!, (71° 40′ n. Br.), (STUXBERG, im Mus. Helsingf.); Taimyr-Halbinsel!, (BIRULJA, Mus. P:burg); Fl. Olenek: Tundra am Flusse Kolymaka!, 16. VIII. 1876; Abhänge des Flusses Tschonkogor!, 31. VII.–1. VIII. 1876; am Flusse Alyrkan!, 4.–5. VIII. 1876; Tundra bei Tyria!, 6.–7. VIII. 1876; Alakit!, 4. VIII. 1876; Kolby!, 11.–12. VIII. 1876, (CZEKANOWSKI, Mus. P:burg); Fl. Lena: Insel Tit-ary!, (ca. 72° n. Br.), 4. IX. 1901, (ipse, Mus. Helsingf.); Ajakit!, 29.–30. VIII. 1876 (CZEKANOWSKI, Mus. P:burg); Kypsaraj!, 9. IX; Bulun!, 2. IX; Durnoj!, 12. IX.; Buru! 26. VIII.; südl. bei Nachimhaja!, (ca. 66° 40′), 3. VIII. 1901, (ipse, Mus. Helsingf.).
DEI: 1 Syntypus, Ust Aldan, Lena med., leg. POPPIUS, Coll. LEONHARD, Mus. Zool. H:fors.

makolskii ROUBAL, 1935 (*Agonum*)

(Fol. Zool. Hydrob. **8**, 276–277, Fig. 2)

Mehrere Syntypen, Slovakia meridionalis, Rossia subcarpathica, leg. ROUBAL, in Coll. MAKÓLSKI-VARSOVIE und Coll. ROUBAL.
DEI: 1 Syntypus, Slov., Ipel, Kiarov, IV. 1928, leg. ROUBAL.

makolskii MÜLLER, 1934 (*Dyschirius*)

(Koleopter. Rundsch. **20**, 54)

Mehrere Syntypen, Polen, Goclawek bei Warschau, VI., VIII. 1931, leg. MAKOLSKI.
DEI: 3 Syntypen, Warszawa, Goclawek, leg. MAKOLSKI.

mandarina BALIANI, 1932 (*Amara*)

(Mem. Soc. Ent. Ital. **11**, 15–16, Taf. 2, Fig. 11)

17 ♂♂, 26 ♀♀, Syntypen, China centrale, Tatsienlu-Chiulung prov. di Szechuan, durch REITTER.
DEI: 1 Syntypus, China, Tatsienlu Kiulung, durch REITTER.

mandli JEDLIČKA, 1933 (*Agonum*)

(Ent. Nachr. **7**, 86–87)

Holotypus, Sibiria or., Sutschan-Ussuri, 1 Ex. Wladiwostok, 1 Ex. Sotkagora, in Coll. JEDLIČKA; 3 Ex. Nikolsk Ussurijsk, in Coll. MANDL: Paratypen.
DEI: 4 Paratypen, Ussurigeb., Nikolsk Ussurijsk, leg. MANDL.

mandli NETOLITZKY, 1932 (*Bembidium*)

(Coleopt. Centrabl. **6**, 2–3)

Holotypus, Tschita, leg. FRIEB; mehrere Paratypen; Werchne-Udinsk, leg. MANDL, Nikolsk-Ussurigeb., leg. MANDL; Ussuri, Kassakewitsch, leg. KORB, Tipolti, Baikal, leg. MÜLLER, Sutschan, Ussuri, Coll. STAUDINGER, Krasnaja Rietschka bei Chabarowsk, leg. BABIY, Tibet, Kuku-Nor, 3200 m, Coll. HAUSER, Peking, 1898, Coll. PLASON.
DEI: 1 Paratypus, Trsbaikal, Werchne-Udinsk, leg. MANDL.

mandli JEDLIČKA, 1963 (*Graniger*)

(Sitzungsber. Österr. Akad. Wiss., Mathem.-naturw. Kl., Abt. 1, 172, Bd. 3, 173–174, Fig. 5)

Holotypus, 3 Paratypen, Iran, Uferwiesen der Dschas-Morian-Senke, durch LÖFFLER, Iran-Exped. 1949/50.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, 31. III. 1950.

mandschuricus JEDLIČKA, 1942 (*Anisodactylus*)

(Arb. morph. taxon. Ent. **9**, 11)

♂ Holotypus, Mandschukuo, Charbin; im DEI [Manshukuo, 15. VIII. 1939, leg. ALIN].

mařani JEDLIČKA, 1932 (*Tachys*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. **29**, 81)

Holotypus, Formosa, Kankau, Exped. SAUTER; im DEI [Koshun, 2. IX].

margellanicus KRAATZ, 1884 (*Craspedonotus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. **28**, 1, 229)

Mehrere Syntypen, Turkestan, Margellan.
DEI: 4 Syntypen, Margelan, Coll. KRAATZ.
[Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Margellan" steht auf dem Etikett „Margelan".]

marginalis SCHAUM, 1862 (*Trechus*)

(Berl. Ent. Ztschr. **6**, 264)

Mehrere Syntypen, Siebenbürgen, Banat, durch HAMPE und FRIVALDSKY.
DEI: 2 Syntypen, Banat, Coll. SCHAUM.

marginicollis REITTER, 1891 (*Acupalpus*)

(Wien. Ent. Ztg. **10**, 221–222)

Mehrere Syntypen, Rußland, Syr-Darja, leg. WITTBERG.
DEI: 1 Syntypus, Turkestan, Coll. KRAATZ.

matchai JEDLIČKA, 1929 (*Duvalites*)

(Ent. Nachrichtenbl. **3**, 14–15)

22 Syntypen, Karpathen, Hoverla, leg. MATCHA, in Coll. JEDLIČKA.
DEI: 1 Syntypus, Carp. orient., Hoverla, VII. 1922, leg. MATCHA.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

melanostolus BROOKES, 1926 (*Pterostichus*)

(Trans. Proc. New Zealand Inst. **56**, 443)

Holotypus, 5 Paratypen, New Zealand, Waitati, nahe Dunedin, in Coll. BROOKES.
DEI: 1 Paratypus, Waitati Hills, Dunedin, 12. IX. 1926, Coll. CLAAKE, Nr. 4326.

melanoticum WAGNER, 1915 (*Bembidium*)

(Ent. Mitt. **4**, Nr. 10/12, 306—307)

Mehrere Syntypen, Mark Brandenburg, zwischen Finkenkrug und Nauen, Brieselang, leg. MÜLLER, DORMEYER, LÜDERS, NERESHEIMER und WAGNER.
DEI: 1 Ex. Umgeb. Berlin, Brieselang, leg. WAGNER; 1 Ex. Brieselang bei Nauen, IX. 1915; 2 Ex. Mark Umgeb. Brieselang, Coll. NERESHEIMER: Syntypen.
Syn. zu *litorale* OLIVIER, 1791.

melzeri LIEBKE, 1934 (*Calleida*)

(Arb. morph. taxon. Ent. **1**, 279—280)

2 Syntypen, Brasilien, S. Paulo, leg. MUUS und MELZER; im DEI.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

merditana APFELBECK, 1906 (*Nebria*)

(Sitz. Berl. Acad. Wiss. Wien **1**, 115, 1664)

Mehrere Syntypen, Albanien, Merdita, in den Hochgebirgen bei Fandi: Munela und Zebia, 1905.
Lectotypenfestlegung durch MLYNAŘ (soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden).
DEI: 1 ♂, 1 ♀, Merdita, Zebia, Coll. FRANKLIN MÜLLER, 1 Ex. Merdita, durch SCHEIT: Paralectotypen.

meuseli REITTER, 1910 (*Trechus*)

(Wien. Ent. Ztg. **29**, 163)

Mehrere Syntypen, Südkroatien (Lika) bei Stirovača, Dundovici, 14., 20. VI. 1910, 1100 m Höhe, leg. MEUSEL.
DEI: 3 Syntypen, Croatia, Dundovici, 20. VI. 1910, 1412 m, leg. MEUSEL, Coll. FRANKLIN MÜLLER.
Syn. zu *priapus* DANIEL, 1902—03.

meyeri JEDLIČKA, 1935 (*Stenolophus*)

(Čas. Čs. Spol. Ent. **32**, 114)

Holotypus, Yunnan, Valis flumin.-Solingho, in Coll. JEDLIČKA; 1 Ex. dto., in Coll. MEYER in Darmstadt; 13 Ex. Yunnan, in Coll. ANDREWES und im DEI: Paratypen.
DEI: 2 Paratypen, Yunnan fou.

micans SCHAUM, 1860 (*Trechus*)

(Nat. Ins. Deutschl. Col. **1**, 1 (1956—60), 644; nom. praeocc. = *splendens* GEMMINGER & HAROLD, 1868, Cat. Col. **1**, 394)

Mehrere Syntypen; bei Glatz, leg. ZEBE; Schlesien, leg. LETZNER; Steiermark, leg. MILLER.
DEI: 2 Ex. Silesia, Karlsbrunn; 1 Ex. Styria; Coll. SCHAUM: Syntypen.

micrangulus REITTER, 1913 (*Trechus*)

(Ent. Bl. **9**, 174)

♀ Holotypus, Chinesisch Thian-Schan, leg. v. BODEMEYER; im DEI [Coll. LEONHARD].

micraulax ANDREWES, 1924 (*Tachys*)

(Rec. Ind. Mus. **26**, 115—116)

15 Ex. Assam, Garo Hills, Siju Cave, 300—400 ft., leg. KEMP und CHOPRA, im Indischen Museum; mehrere Ex. Sikkim, Gopaldhara, leg. STEVENS; 1 Ex. Kumaon, Chakrata Dist., Chulli Khud, 6500 ft., leg. CHATTERJEE, im Forest Res. Ins.; Paratypen, Holotypus in Coll. ANDREWES.
DEI: 6 Paratypen, Br. Sikkim, Gopaldhara, leg. STEVENS.

micros SCHAUBERGER, 1938 (*Oxycentrus*)

(Arb. morph. taxon. Ent. **5**, 37—38)

Holotypus, Celebes, Coll. KRAATZ, im DEI.

milleri kulti FASSATI, 1942 (*Bembidion*)

(Čas. Čs. Spol. Ent. **39**, 121—123, Fig.)

Syntypen: mehrere Ex. Bohemia, Semily, loc. class.; 1 Ex. Nové Hrady, leg. BENDL; 1 Ex. Polonia, Kazimierza.
DEI: 1 Ex. Semily, 12. IX. 1942, 1 Ex. dto. Bohemia sept.: Syntypen.

mirabilis BATES, 1892 (*Catascopus*)

(Ann. Mus. Genova (2) **12** (32), 409)

Mehrere Syntypen, Burma, Karin Asciuii Chebà, alt. 1200—1300 m; Karin Chebà, alt. 900—1100 m; leg. FEA.
DEI: 2 Ex. Carin, Asciuii Chebà, 1200—1300 m, I. 1888, 1 Ex. Carin Chebà, 900—1100 m, V. XII. 1888; leg. FEA: Syntypen.

mirandus DUPUIS, 1913 (*Tachys*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. **57**, 170—174)

Mehrere Syntypen, Formosa, Akau, leg. SAUTER.
DEI: 6 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, XII. 1907.
Syn. zu *ovatus* MOTSCHULSKY, 1851.

miridita jacupicensis JEDLIČKA, 1935 (*Tapinopterus*)

(Arb. morph. taxon. Ent. **2**, 187)

♀ Holotypus, seb. Jacupica planina, leg. RAMBOUSEK, ex Coll. LEONHARD; im DEI (Ex. verliehen, konnte nicht überprüft werden).

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

modestus KRAATZ, 1876 (*Procerus*)

(Bull. Soc. Nat. Moscou **51**, 132, 137—138, Taf. 1, Fig. 10, 12)

Mehrere Syntypen, Amasia, leg. KINDERMANN und STAUDINGER, in Coll. KRAATZ, KINDERMANN und STAUDINGER.
DEI: 2 Ex. Amasia, Coll. KRAATZ; 8 Ex. ohne Fundort, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *scabrosus* OLIVIER, 1795.

modigliani ANDREWES, 1929 (*Colpodes*)

(Ann. Mus. Genova **53**, 434—435)

Syntypen, Sumatra: 1 Ex. Lubu Selassi, 1878, leg. BECCARI; 4 Ex. Si-Rambé, XII. 1890—III. 1891, leg. MODIGLIANI; 1 Ex. Mount Dempo, 4000 ft., leg. BROOKS, im Britischen Museum; im Museum Genoa und im DEI.
DEI: 1 Syntypus, Sumatra, Si-Rambé, XII. 1890—III. 1891, leg. MODIGLIANI, Coll. KRAATZ.

monastirensis REITTER, 1913 (*Tapinopterus*)

(Ent. Bl. **9**, 26)

Mehrere Syntypen, Monastir, Mazedonisches Hochgebirge, leg. WERNER.
DEI: 1 Syntypus (Ex. verliehen, konnte nicht überprüft werden).

montanellus POPPIUS, 1907 (*Pterostichus*)

(Wien. Ent. Ztg. **26**, 21—22)

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Nord-Amerika, White Mountains, in Coll. v. HEYDEN.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

montoroi TREMOLERAS, 1931 (*Lachnophorus*)

(Rev. Soc. Ent. Argent. **3**, 247—248)

Holotypus und mehrere Ex. Uruguay, Flores, Costa del Yi, Estancia „La Criolla", 20. I. 1929; mehrere Ex. Florida, Yi y Timote, 15. I. 1930; in Coll. TREMOLERAS, Paratypen.
DEI: 2 Paratypen, Flores, Costa del Yi, 20. I. 1929, A. Montoro, durch GUARCH.

morio serbicus WINKLER, 1933 (*Omphreus*)

(Koleopter. Rundsch. **19**, 117)

Mehrere Syntypen, Südwest-Serbien, Murtenica-planina, VI. 1923, leg. JEANNEL, MAGDELAINE und WINKLER.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, Serbie occidentale, dép. d'Užice.

multisetosus BÄNNINGER, 1941 (*Scarites*)

(Ent. Bl. **37**, 67)

Holotypus, Espirito Santo, im DEI (Geschlecht nicht bestimmbar, da Abdominalinhalt zerstört); [X. 1920—II. 1921, Coll. HOFFMANN, Arp. dedic. 1921].

munda ANDREWES, 1923 (*Cymindoidea*)

(Spol. Zeyl. **12**, 247—248)

Holotypus, India, Nilgiri Hills, leg. ANDREWES, in Coll. ANDREWES; 2 Paratypen, Ceylon, Bandarawela, leg. HORN; im DEI.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, 1899.

mus ANDREWES, 1925 (*Tachys*)

(Ann. Mus. Genova **51**, 380—381)

2 Syntypen, Java, Batavia, im Buitenzorg Museum.
DEI: 1 Syntypus, Batavia, III. 1921, ex Museo Buitenzorg.

mustela ANDREWES, 1923 (*Clivina*)

(Spol. Zeyl. **12**, 226—227)

Holotypus, 1 Paratypus, Ceylon, Anuradhapura, leg. HORN, in Coll. ANDREWES und im DEI.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, 1899.

nannodes ANDREWES, 1925 (*Tachys*)

(Ann. Mus. Genova **51**, 406, 447)

Mehrere Syntypen, Bombay, Belgaum; Madras, Nilgiri Hills, 3500 ft., leg. ANDREWES.
DEI: 1 Syntypus, Nilgiri Hills, leg. ANDREWES.

nepalensis MANDL, 1965 (*Carabus*)

(Erg. Forsch.-Untern. Nepal Himalaya, Liefg. 2, 79)

♂ Holotypus, Thodung, 3100 m, 25.—30. V. 1961, leg. EBERT; mehrere Ex. dto.; mehrere Ex. Ting-Sang-La, 3800 m, 6., 7. V. 1962, leg. EBERT; in der Zoologischen Sammlung des Bayerischen Staates und in Coll. MANDL; Paratypen.
DEI: 2 Paratypen, Nepal, Ting-Sang-La, 3800 m, 6., 7. V. 1962, leg. EBERT.

neresheimeri MÜLLER, 1929 (*Bembidion*)

(Coleopt. Centralbl. **4**, 101—102, Fig. 2)

Mehrere Syntypen, Mark, Gr. Machnow, 1929, leg. NERESHEIMER.
DEI: 1 Syntypus, Mark, Umgeb. Gr. Machnow, Coll. NERESHEIMER.

neresheimeri WAGNER, 1915 (*Dyschirius*)

(Ent. Mitt. **4**, 241, 301, Fig. 1b, 2b)

Mehrere Syntypen, Forsthaus Bredow bei Finkenkrug, Ziegelei bei Birkenwerder, leg. FREYMUTH, LÜDERS, NERESHEIMER und WAGNER; zwischen Nauen und Brieselang, leg. MÜLLER.
DEI: 10 Ex. Umgeb. Berlin, Bredow, Brieselang; 1 Ex. Mark, Ziegeleien bei Birkenwerder; leg. WAGNER; 2 Ex. Mark, Forst Bredow, Coll. NERESHEIMER: Syntypen.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

nevermanni LIEBKE, 1930 (*Calophaena*)

(Mitt. Zool. Mus. Berlin **15**, 677, 714, Fig. 53)

Syntypen, Costarica: 1 Ex. Las Mercedes, Sta. Clara, 200–300 m, I. 1921; 6 Ex. Farm „Hamburg" am Reventazon, Ebene Limon, 15. IX., 24. IV. 1924/6. XI. 1925/3. VI., 28. VII. 1926/26. III. 1928; leg. NEVERMANN, in Coll. NEVERMANN.
DEI: 1 Syntypus, Costa Rica, Hamburgfarm, Reventazon, Ebene Limon, 3. VI. 1926, leg. NEVERMANN.

nevermanni DARLINGTON, 1934 (*Tachys*)

(Occ. Pap. Boston Soc. Nat. Hist. **8**, 160–161)

Holotypus, M.C.Z. no. 19.629 und 28 Ex., Costa Rica, Hamburg Farm, near Port Limon, 25. III. 1928; 3 Ex. dto. 9. II., 5. V., VII. 1925; leg. NEVERMANN, in M.C.Z. und Coll. NEVERMANN; Paratypen.
DEI: 5 Paratypen, Costa Rica, Hamburgfarm, Reventazon Ebene Limon, 25. III. 1928, leg. NEVERMANN.

nietneri SCHAUM, 1863 (*Tachys*)

(Berl. Ent. Ztschr. **7**, 88)

Mehrere Syntypen, Ins. Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: Syntypen: 1 Ex. Ceylon, 1 Ex. Banda, Coll. GERMAR-SCHAUM.
Syn. zu *umbrosus* MOTSCHULSKY, 1851.

nigellus laticeps EMDEN, 1936 (*Colpodes*)

(Arb. morph. taxon. Ent. **3**, 273–275)

Holotypus, 9 Paratypen, Java, Nongkodjadjar, in Coll. v. EMDEN, Coll. ANDREWES und im DEI.
DEI: 1 Paratypus, O.-Java, Tengger, Nongkodjadjar, 1300 m, leg. WEGENER, Gesch. VII. 1935 von OVERBECK.

niger KRAATZ, 1886 (*Eutelocarabus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. **30**, 263)

Mehrere Syntypen, Suyfun-Mündung, leg. DÖRRIES, Amur, leg. CHRISTOPH; via STAUDINGER an KRAATZ.
DEI: 2 Ex. Suyfun, 1 Ex. Amur; Coll. KRAATZ: Syntypen.
Syn. zu *billbergi* MANNHEIMER, 1827.

nigriceps STURM, 1824 (*Platysma*)

(Deutschl. Fauna, Insekt. **5**, 84–85, Taf. 117, Fig. c, C)

Mehrere Syntypen, im Prater bei Wien, leg. MEGERLE VON MÜHLFELD.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, Coll. GERMAR-SCHAUM.
Syn. zu *strenuus* PANZER, 1797.

nigritulus KRAATZ, 1876 (*Procerus*)

(Bull. Soc. Nat. Moscou **51**, 139, 144)

2 Syntypen, Landenge von Arabad, via SCHMIDT an KRAATZ.
DEI: 1 Syntypus, Landenge Arabat (nicht Arabad!), Coll. KRAATZ.

nigrocyaneum WAGNER, 1916 (*Bembidium*)

(Ent. Mitt. **5**, 223)

Mehrere Syntypen, Brieselang bei Finkenkrug, VII., VIII., leg. LÜDERS, MÜLLER, NERESHEIMER und WAGNER.
DEI: 2 Syntypen, Mark, Umgeb. Brieselang, Coll. NERESHEIMER.
Syn. zu *varium* OLIVIER, 1795.

nila ANDREWES, 1924 (*Amara*)

(Miss. BABAULT, Prov. Centr. Inde, 96, Taf. 3, Fig. 2)

Mehrere Ex. Indien, occ. Himalaya, Spiti, Manikarn, Tchary-Djoni, Pulga, Tsho-ti, Kulu, Kaadi, Koty, Bajaura, Kangra dist., leg. BABAULT; 1 Ex. Dehra Dun, Mundali, 9000 ft., leg. TYTLER, im Indischen Museum; 1 Ex. Chamba, leg. SOMERS-SMITH, 1914: Syntypen.
DEI: 1 Syntypus, Indes, Angl., Spiti, Tchary-Djoni, VI. 1914, leg. BABAULT.

nilgiricus ANDREWES, 1925 (*Tachys*)

(Ann. Mus. Genova (1923–25) **51**, 446)

Mehrere Syntypen; Madras, Nilgiri Hills, Bhavani Valley, 1500 ft., Kallar, 1000 ft.; South Mysore, Teppukadu; leg. ANDREWES.
DEI: 1 Syntypus, South Mysore, Teppukadu, leg. ANDREWES.

nitescens SLOANE, 1907 (*Lesticus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 470–471)

♀ Holotypus, New Guinea, Simbang; mehrere Paratypen, Gazelle Peninsula, Herbertshöhe; leg. v. BENNIGSEN, in Coll. HORN.
DEI: ♀ Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. v. BENNIGSEN.

nitidus BATES, 1892 (*Sinurus*)

(Ann. Mus. Genova (2) **12** (32), 407)

Mehrere Syntypen, Burma, Karin Chebà, alt. 900–1100 m; Asciuii Chebà, 1200–1300 m; Karin Ghecù, 1300–1400 m; leg. FEA.
DEI: 2 Syntypen, Carin Chebà, V. XII. 1888, 900–1100 m, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

noguchii BATES, 1873 (*Chlaenius*)

(Trans. Ent. Soc. London, 251–252)

Mehrere Syntypen, Japan, Kawachi, leg. LEWIS, in Coll. LEWIS.
DEI: 1 Syntypus, Japan, Kawachi, Coll. v. HEYDEN.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

notatum ANDREWES, 1922 (*Bembidium*)

(Ent. Monthly Mag. (3) 8 (58), 175—176)

Holotypus, mehrere Paratypen, United Provinces, Kumaon, Upper Gumti Valley, W. Almora, leg. CHAMPION, Binsar, 7700 ft., leg. IMMS, im Britischen Museum und For. Res. Inst.; Bihar, Pusa, leg. CAMERON, im For. Res. Inst. und Agric. Res. Inst.
DEI: 1 Paratypus, India, H.G.C., W. Almora, Kumaon, U.P.

notulatus DEJEAN, 1826 (*Panageus*)

(Spec. gen. Col. **2**, 291—292; nom. praeocc. = *tenuipunctatus* LAFERTÉ, 1851, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) 9, 221)

Mehrere Syntypen, Cap de Bonne-Espérance, durch SCHÜPPEL.
DEI: 1 Syntypus, Afr. austr.

nuristanicus JEDLIČKA, 1956 (*Chlaenius*)

(Acta Ent. Mus. Nat. Pragae **30** (1955), Nr. 452, 194)

9 Ex. Afghanistan, Nuristan, Bashgultal, 2 Ex. Pagmangebirge, Exped. KLAPPERICH, 1952—1953, Holotypus und Paratypen, in Coll. KLAPPERICH und Coll. JEDLIČKA.
DEI: 1 Paratypus, Afghanistan, Bashgultal, 1100 m, Nuristan, 11. IV. 1953, leg. KLAPPERICH.

nuristanus JEDLIČKA, 1956 (*Harpalus*)

(l.c., 195)

Afghanistan, Nuristan: 8 Ex. Bashgultal, 1 Ex. Asmar; Exped. KLAPPERICH, 1952—1953, Holotypus und Paratypen, in Coll. KLAPPERICH und Coll. JEDLIČKA.
DEI: 1 Paratypus, Afghanistan, Bashgultal, Nuristan, 1200 m, 3. V. 1953, leg. KLAPPERICH.

nyassicus bänningeri BASILEWSKY, 1932 (*Tefflus*)

(Ent. Bl. **28**, 25)

♂ Holotypus, N.E. Congo, leg. GRAUER; im DEI.

nyassicus schaubergeri BASILEWSKY, 1932 (*Tefflus*)

(l.c., 24)

♂ Holotypus, Angola, Bengwella, leg. v. BENNIGSEN; im DEI.

obenbergeri JEDLIČKA, 1928 (*Harpalus*)

(Wien. Ent. Ztg. **45**, 95)

♀ Holotypus, Baical; im DEI [Coll. FRANKLIN MÜLLER-Coll. WEISE].

oberthürii GESTRO, 1892 (*Omophron*)

(Ann. Mus. Genova (2) **10** (30), 962—963)

2 Syntypen, Pedong, nel Sikkim, a 45 miglia inglesi a NNE di Dargiling, leg. DESGODINS, im Museum Civico.
DEI: 2 Syntypen, Pedong, leg. DESGODINS, Coll. BATES-Coll. v. HEYDEN.

obliquebasalis BREIT, 1914 (*Trechus*)

(Koleopter. Rundsch. **3**, 165—166)

Mehrere Syntypen, Chinesisch-Turkestan, Aksu, durch STAUDINGER & BANG-HAAS.
DEI: 5 Ex. Chin. Turkest., Aksu Thal, Coll. LEONHARD; 2 Ex. Thianshan, Aksu Thal, Coll. STAUDINGER & BANG-HAAS; Syntypen.
Syn. zu *dichrous* REITTER, 1911.

obtusangulus cabuljensis MLYNAŘ (1975 ?) (*Molops*)

(soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae. No. 39, veröffentlicht werden)

DEI: 1 ♂, 2 ♀♀, Cabulja, Reis. 1906, Coll. F. MÜLLER; 1 ♂, dto. Marzebbrina, leg. HENSCH, Coll. v. HEYDEN; Paratypen.

obtusangulus mendax APFELBECK, 1902 (*Molops*)

(Glasn. Zem. Muz. Bosn.-Herz. **14**, 544—545)

Mehrere Syntypen, südwestl. Bosnien, Vranica pl., Vakufa Berge.
Lectotypenfestlegung durch MLYNAŘ (soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden).
DEI: 1 ♂, Paralectotypus, Vranica pl., 1902, leg. APFELBECK, Coll. FRANKLIN MÜLLER.

occultus SLOANE, 1907 (*Chlaenius*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 467)

Mehrere Syntypen, New Guinea, Herbertshöhe, leg. v. BENNIGSEN, in Coll. HORN.
DEI: 2 Syntypen, D.N. Guinea, Herbertshöhe, Coll. KRAATZ.

ochrias ANDREWES, 1925 (*Tachys*)

(Ann. Mus. Genova **51**, 376—377)

Mehrere Syntypen: Eastern Duars, leg. STEVENS; Kumaon, West Almora, Tanakpur, River Sarda Gorge, Haldwani-Nandhaur River; leg. CHAMPION; Mussoorie, 6500 ft., Dehra Dun, leg. CAMERON und CHATTERJEE, im For. Res. Inst.; Burma, Moulmein, leg. FIEBER, im Vienna Mus.
DEI: 1 Syntypus, E. Dooars, leg. STEVENS.
[Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Eastern Duars" steht auf dem Etikett „E. Dooars".]

oertzeni KRAATZ, 1886 (*Elasmopterus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. **30**, 431—432)

Holotypus, Griechenland, Parnassus, leg. v. OERTZEN; im DEI (Ex. verliehen, konnte nicht überprüft werden).

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

opacus SCHMIDT-GÖBEL, 1846 (*Orthogonius*)

(Faun. Col. Birmaniae, 60—61)

Holotypus, Birma; im DEI (Ex. wurde an LIEBKE, Hamburg verliehen und ist dort 1943 vernichtet worden).

opacus KRAATZ, 1895 (*Tropidocarabus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 367—368)

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Südabhang des Himalaya, Râdjawar, leg. KLAEGER; im DEI [Kaschmir, Radjawar, Coll. KRAATZ]. Syn. zu *dardiellus* BATES, 1889.

opalescens ANDREWES, 1925 (*Tachys*)

(Ann. Mus. Genova (1923—25), **51**, 342, 352)

Holotypus, mehrere Paratypen, Ceylon, Negombo, leg. HORN; in Coll. ANDREWES, im Museum Brüssel und DEI.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, 1899.

orientalis DANIEL, 1900 (*Licinychus*)

(Soc. ent. **15**, 139)

Mehrere Syntypen, Taurus cilicicus, leg. v. BODEMEYER.
DEI: 1 Syntypus, Asia minor, Bulghar Maaden, leg. v. BODEMEYER.

ottomanus APFELBECK, 1908 (*Pterostichus*)

(Akad. Anz. Wien **1**, 2 (Separatabdruck))

Mehrere Syntypen, Ostalbanien, Schar-Dagh, 1906.
DEI: 1 Syntypus, Schar Dagh, Ljuboten, Coll. FRANKLIN MÜLLER.

ottonis REITTER, 1905 (*Anophthalmus*)

(Wien. Ent. Ztg. **24**, 311)

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Bosnien, in der trockenen Höhle zwischen Volujak Lebešnik, leg. LEONHARD.
DEI: 1 ♂, Syntypus, Bosnien, Lebešnik, trockene Höhle, Coll. LEONHARD.

ovalipennis LIEBKE, 1934 (*Styphlomerus*)

(Mem. Soc. Ent. Belg. **24**, 58—59)

Ost-Afrika: Holotypus, Ussandani bei Kwa (kathol. Missions-Anstalt), II. 1912, leg. OBST, Ost-Afrika-Expedition der Hamburgischen Geographischen Gesellschaft, im Museum Hamburg; 1 Ex. Djibuti, Somaliland, 4 Ex. Deutsch-Ost-Afrika, ex Coll. LANGENHAN, im Museum Dresden; 10 Ex. Nordwest-Rhodesien, Mwenga, leg. DOLLMANN, 2 Ex. Nyassa-See, leg. NEAVE, 1 Ex. Nordost-Rhodesien, leg. NEAVE, 1 Ex. Deutsch-Ost-Afrika, leg. CARPENTIER; im Britischen Museum; 2 Ex. bez. Deutsch-Ost-Afrika, leg. METHNER, 2 Ex. Deutsch-Ost-Afrika, Kilwa, 9.—11. VI. 1908, leg. FROMM; im Museum Berlin; 1 Ex. Katanga, im Kongo-Museum, Tervueren, 1 Ex. Usambara; leg. WEISE, im DEI; Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, Usambara, leg. WEISE, Coll. KRAATZ.

overbecki EMDEN, 1936 (*Colpodes*)

(Arb. morph. taxon. Ent. **3**, 269—270)

Java, Nongkodjadjar: 3 Ex. 25. XI. 1933, 5 Ex. 12. III. 1934, 1 Ex. 14. III. 1934, 28 Ex. 15. III. 1934, 1 Ex. Tengger, 19. IX. 1920, leg. H. D. v. L., im Museum Buitenzorg; Holotypus, in Coll. v. EMDEN, Paratypen, dto., in Coll. ANDREWES und im DEI.
DEI: 2 Paratypen, O.-Java, Tengger, Nongkodjadjar, 1300 m, 15. III. 1934, leg. WEGENER, Gesch. VII. 1934 von OVERBECK.

overbecki EMDEN, 1936 (*Lesticus*)

(l.c., 277—279)

Holotypus, mehrere Paratypen, Java, Nongkodjadjar, 12. III. 1935, in Coll. v. EMDEN, Coll. ANDREWES, Coll. OBERTHÜR, im Museum Dresden und DEI.
DEI: 4 Paratypen, O.-Java, Tengger, Nongkodjadjar, 1300 m, 12. III. 1934 (nicht 1935!), leg. WEGENER, Gesch. VII. 1935 von OVERBECK.

ovipennis latiusculus KRAATZ, 1879 (*Molops*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. **23**, 154)

2 ♀♀, Syntypen, Croatien, Svica, leg. v. HEYDEN.
Lectotypenfestlegung durch MLYNAŘ (soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden).
DEI: ♀ Lectotypus, 1 ♀, Paralectotypus, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. KRAATZ, Coll. v. HEYDEN.

ovipennis pseudoplanipennis MLYNAŘ (1975?) (*Molops*)

(soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden).

DEI: ♂ Holotypus, 4 ♂♂, 1 ♀, Paratypen, Croatia, Plitvice, 10. VIII. 1935, durch LIEBMANN, Coll. LIEBMANN, Coll. KRAATZ, Coll. v. HEYDEN.

oxygonus meridionalis EMDEN, 1949 (*Brachygnathus*)

(Ann. Mag. Nat. Hist (12) **11**, 868—869, Fig. 6)

Holotypus, 2 Paratypen, Paraguay, 1885, leg. DRAKE; im DEI [Coll. KRAATZ].

paganettii BREIT, 1923 (*Pterostichus*)

(Koleopter. Rundsch. **10**, 144—146)

Mehrere Syntypen, Griechenland, Parnassos, leg. PAGANETTI-HUMMLER.
DEI: 1 Syntypus (Ex. verliehen, konnte nicht überprüft werden).

paganettii MÜLLER, 1911 (*Scotodipnus*)

(Soc. Ent. **29**, 61)

Holotypus, Süd-Dalmatien, Krivošije, leg. PAGANETTI-HUMMLER, in Coll. MÜLLER.
(Laut Originalbeschreibung lag dem Autor nur 1 Ex. aus einer Serie vor.)
DEI: Holotypus, Krivosije, leg. PAGANETTI, Coll. LEONHARD.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

pakistanus JEDLIČKA, 1963 (*Mastax*)

(Opusc. Zool., no. 68, 7, Fig. 10)

Holotypus, 31 Paratypen, West Pakistan, Umg. Rawalpindi, leg. LINDEMANN, in der Sammlung des Bayerischen Staates München und in Coll. JEDLIČKA.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, 20 km, O., 15. XII. 1955.

pala LIEBKE, 1937 (*Agra*)

(Arb. morph. taxon. Ent. **4**, 157—158, Fig. 1)

2 ♂♂, Syntypen, Peru, Callanga, in Coll. HORN und im DEI.
DEI: 1 ♂, Syntypus, Peru, Callanga, Coll. KRAATZ.

pallida LIEBKE, 1937 (*Agra*)

(l.c., 159—160, Fig. 3)

♂ Holotypus, 1 ♂, Brasilien, Sta. Catharina, aus Lages, I.—III. 1887, leg. FRUHSTORFER, im Hamburger Museum; 1 ♀, Sta. Catharina, im DEI; Paratypen.
DEI: 1 ♀, Paratypus, St. Catharina, Coll. KRAATZ.

pandora HOLDHAUS, 1924 (*Reicheia*)

(L'Abeille **32**, 173, 208—209)

Mehrere Syntypen, Sardinien, Dorgali, leg. DODERO.
DEI: 3 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, V. 1910, Coll. LEONHARD.

paradoxus APFELBECK, 1908 (*Paradeltomerus*)

(Akad. Anz. Wien **1**, 1 (Separatabdruck))

Mehrere Syntypen, Ostalbanien, Schar-Dagh, 1906.
DEI: 1 Syntypus, Serb. Šar. pl. alpin, 7.—14., leg. RAMBOUSEK.

parnassicus BREIT, 1923 (*Scotodipnus*)

(Koleopter. Rundsch. **10**, 143—144)

Mehrere Syntypen, Griechenland, Parnassos.
DEI: 4 Syntypen, Graecia, Parnassos, Coll. LEONHARD.

parreyssii KRAATZ, 1875 (*Molops*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. **19**, 373—374)

Mehrere Syntypen: Balkan, Rhilo Dagh; Montenegro, leg. ERBER; Dalmatien, leg. PARREYSS; in Coll. KRAATZ und Coll. v. HEYDEN. Lectotypenfestlegung durch MLYNAŘ (soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, Nr. 39, veröffentlicht werden).
DEI: Lectotypus, Montenegro, leg. ERBER; 1 Ex. Dalmatien, leg. PARREYSS, 1 Ex. Dalmatien, Coll. KRAATZ: Paralectotypen.

parvicollis WINKLER, 1926 (*Neotrechus*)

(Koleopter. Rundsch. **12**, 91)

Mehrere Syntypen, nordwestlich Trebinje, im Schacht bei Tukalska Bjelina, leg. WEIRATHER.
DEI: 1 Syntypus, Tukalska, Bjelina.

parvulus STRANEO, 1952 (*Metius*)

(Doriana **1**, no. 28, 6)

Holotypus, 17 Paratypen, Bolivia, reg. Cochabamba, Massiccio di Tunari, 4000 m, leg. ZISCHKA, im Museum Genova.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, REITTER.

patruelis PUTZEY, 1847 (*Trechus*)

(Stett. Ent. Ztg. **8**, 310)

♀ Holotypus, Carinthia, Mus. SCHAUM; im DEI.
Syn. zu *glacialis* HEER, 1837.

pearsoni ANDREWES, 1923 (*Gnophodes*)

(Spol. Zeyl. **12**, 244—245)

1 ♂, Ceylon, Hakgala, im Colombo Museum, 2 ♂♂, 1 ♀, Horton Plains, leg. HORN, im DEI; 1 ♀, Ceylon, leg. THWAITES, im Oxford Museum; Paratypen, Holotypus, in Coll. ANDREWES.
DEI: 1 ♂, 1 ♀, Paratypen, Ceylon, Horton Plains, 1899, leg. HORN.

peccata LIEBKE, 1940 (*Agra*)

(Fol. Zool. Hydrobiol. **10**, 254, 257, Fig. 47, 88, 163—164)

Syntypen: 1 ♂, Paraguay, 1 ♀, Argentinien, Tucuman, leg. BRUCH, in Coll. LIEBKE; 2 ♀♀, Paraguay, Hohenau, leg. JACOB; im DEI.
DEI: 1 ♀, Syntypus, Paraguay, Hohenau, 17. XI. 1935, leg. JACOB.

peleum JEDLIČKA, 1933 (*Bembidion*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. **30**, 10 (Separatabdruck))

Holotypus, 57 Paratypen, China, Prov. Szetschuan-Tatsienlu, in Coll. JEDLIČKA, Coll. REITTER, Coll. ANDREWES und Coll. NETOLITZKY.
DEI: 4 Paratypen, China, Szechuan, Yülling Süd, Tatsienlu.

pentheri APFELBECK, 1918 (*Pterostichus*)

(Sitz. Akad. Wiss. Wien **127**, 1, 166)

Mehrere Syntypen, nordalbanisch-montenegrisches Grenzgebiet, Prokletijagebiet, in der Gegend von Vunšay, 1000—2000 m, 13.—16., 17.—22. VII. 1914, leg. PENTHER.
DEI: Syntypen: 1 Ex. Prokletija, Alban. montenegr. Grenze, 1 Ex. N-alban-alpen; leg. PENTHER, Coll. LEONHARD.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

pentheri pseudonarentinus MLYNAŘ (1975?) (*Molops*)

(Soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden)

DEI: 2 Ex. Herzegovina, Plassa, 1901, 1 Ex. dto., Coll. LEONHARD; 1 Ex. Penther, Plasa, GANGLBR., Nr. 16358; Paratypen.

peridus JEDLIČKA, 1934 (*Colpodes*)

(Sborn. ent. Mus. Praze **12**, Nr. 103, 184)

Holotypus, 10 Paratypen, Philippinen, Insel Luzon-Baguio, in Coll. JEDLIČKA, Coll. ANDREWES und im DEI.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

peristericus APFELBECK, 1901 (*Tapinopterus*)

(Glasn. zem. muz. Sarajevo **13**, 429)

Mehrere Syntypen, Berg Peristeri bei Janin (Epiros), leg. APFELBECK.
DEI: 1 Syntypus (Ex. verliehen, konnte nicht überprüft werden).

perpusillus ROTTENBERG, 1874 (*Microtyphlus*)

(Berl. Ent. Ztschr. **18**, 329—330)

Mehrere Syntypen, Griechenland, bei Saloniki, leg. RAYMOND.
DEI: 1 Syntypus, Saloniki, leg. RAYMOND, Coll. LETZNER-ROTTENBERG.

petersi kathleenae BALL, 1966 (*Scaphinotus*)

(Trans. Amer. Ent. Soc. **92**, 714—716)

♂ Holotypus, Arizona, Santa Rita Mountains, Santa Cruz County, Osthang v. Mt. Wrightson, westlich zwischen Baldy und Florida Spring, ca. 1 Meile nördlich von Baldy Spring, 8400—8600′, 16.—17. VIII. 1963; 6 ♂♂, 11 ♀♀, dto.; 3 ♂♂, Westhang v. Mt. Wrightson, 8400′, nördlich vom oberen Bellow's Spring, 12.—13. VIII. 1963; 1 ♀, Florida Canyon, oberer Florida Spring, 7900′, 15. VIII. 1963; leg. BALL; im Museum of Comparative Zoology, im American Museum of Natural History, inCalifornia Academy of Sciences, im DEI und in University of Arizona.
DEI: 1 Ex. Arizona, Sta. Cruz, Sta. Rita Mts., Florida Cn., 7000—8000′, 15. VIII. 1963, 1 Ex. Sta. Cruz, Sta. Rita Mts., w. si. Mt. Wrightson on trail, 8400′, 12.—13. VIII. 1963; leg. BALL; Paratypen.

pfeiffii DEJEAN, 1831 (*Bembidium*)

(Spec. Gen. Coleopt. **5**, 128—129)

Mehrere Syntypen, il se trouve en Suéde et en Laponie.
DEI: 1 Syntypus, Tschapoma, durch SAHLBERG.
Syn. zu *virens* Gyllenhal, 1827.

phaedrum ANDREWES, 1923 (*Bembidium*)

(Ent. Monthly Mag. **59**, 97)

Kumaon, Central und West Almora, West Bhatkot, 4000 ft., Swal River Basin, Ranikhet, Garhwal, Siuni Gad, 4000 ft.; leg. CHAMPION; Paratypen, Holotypus, im Britischen Museum.
DEI: 1 Paratypus, W. Almora, Kumaon, leg. CHAMPION.

picea JEDLIČKA, 1956 (*Cymindis*)

(Acta Ent. Mus. Nat. Pragae **30** (1955, Nr. 452, 203)

Afghanistan: 24 Ex. Sarekanda, 7 Ex. Bashgultal, 6 Ex. Faizabad, 1 Ex. Umg. Kabul; 1952—1953, Exped. KLAPPERICH: Holotypus, Paratypen, in Coll. KLAPPERICH und Coll. JEDLIČKA.
DEI: 1 Paratypus, NO-Afghanistan, Gebirge Badakschan, Sarekanda, 4200 m, 21. VII. 1953, leg. KLAPPERICH.

piceus ROTTENBERG, 1870 (*Stenolophus*)

(Berl. Ent. Ztschr. **14**, 16—17)

Mehrere Syntypen, Sicilien, Catania, 26. II. —5. IV., 5.—9. V. 1869, Aderno, 26. III. 1869, Girgenti, 23. IV.—3. V. 1869; leg. ROTTENBERG.
DEI: 2 Syntypen, Catania, leg. ROTTENBERG.

piceus balcanicus MLYNAŘ (1975?) (*Molops*)

(soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae No. 39 veröffentlicht werden)

DEI: 1 Paratypus, Herzegovina, Vlasulja, Coll. LEONHARD.

picipes CHAUDOIR, 1868 (*Feronia*)

(L'Abeille **5**, 228—229)

Mehrere Syntypen, Norditalien, Apennien.
DEI: 1 Syntypus, Apen., Coll. KRAATZ.
Syn. zu *cristatus* DUFOUR, 1820.

piffli JEDLIČKA, 1964 (*Cymindis*)

(Ent. Arb. Mus. FREY **15**, 288—289, Fig. 4)

5 ♀♀, Holotypus, Paratypen, Pakistan, Satil, leg. PIFFL, Österr. Karakorum-Exp., in Coll. JEDLIČKA und Coll. MANDL.
DEI: 1 ♀, Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, 1958.

pileolata BATES, 1892 (*Clivina*)

(Ann. Mus. Genova (2) **12** (32), 278)

Mehrere Syntypen, Burma, Rangoon, Katha, Palon in Pegu; leg. FEA.
DEI: 1 Ex. Birmania, Rangoon, Coll. KRAATZ; 1 Ex. dto. X. 1887, leg. FEA; Syntypen.

pilosus BATES, 1892 (*Lymnastis*)

(l.c. 296—297)

Mehrere Syntypen, Burma, Bhamò, Kathà, Palon, Pegu; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Palon, Pegu, VIII. IX. 1887, leg. FEA.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

pinkeri GANGLBAUER, 1892 (*Trechus*)

(Käf. Mitteleur. **1**, 197)

Mehrere Syntypen, Pyhrgass in den Haller Mauern, leg. PINKER, Gesäusealpen, Buchstein- und Hochthorgruppe, Grünauer Alpen, Kassberg, leg. GANGLBAUER.
DEI: 1 Syntypus, Phyrgass, Gesäuse Alp, 4. VIII. 1907, leg. PINKER.
[Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Pyhrgass", steht auf dem Etikett „Phyrgass".]

planifrons SLOANE, 1907 (*Clivina*)

(Proc. Linn. Soc. N.S. Wales **32**, 347–348)

Mehrere Syntypen, Queensland, Brisbane, leg. HACKER, in Coll. HACKER und Coll. SLOANE.
DEI: 1 Syntypus, Brisbane, Coll. HACKER.

plaumanni LIEBKE, 1940 (*Agra*)

(Fol. Zool. Hydrobiol. **10**, 244–245, Fig. 21, 82, 144, 145)

Syntypen: 8 Ex. Brasilien, Nova Teutonia, Sta. Catharina, 26–27 Grad s. Br. 52–53 Grad w. L. leg. PLAUMANN; 2 Ex. Argentinien, Misiones, leg. BRUCH; 5 Ex. Paraguay, Hohenau, leg. JACOB; in Coll. PLAUMANN, DEI, Museum Argent., Buenos Aires und Coll. LIEBKE.
DEI: 1 Syntypus, Paraguay, Hohenau, 11. XI. 1934, leg. JACOB.

plicicolle NICOLAI, 1822 (*Anchomenus*)

(Dissert. Col. spec. agri Halensis, 19)

Holotypus, Halle, leg. NICOLAI; im DEI [Coll. GERMAR-SCHAUM].
Syn. zu *müllerі* HERBST, 1785.

pluto ANDREWES, 1924 (*Bembidium*)

(Miss. BABAULT, Prov. Centr. Inde, **72**, Taf. 1, Fig. 3)

Mehrere Syntypen, Indien, occ. Himalaya; Nima-Mud, Tsho-Moravi und Lac Salé; Ladack, Leh; 1914.
DEI: 1 Syntypus, Rukshu, Nima Mud, (Front^e Thibet), VII. 1914, leg. BABAULT.

polita MOTSCHULSKY, 1851 (*Tachys*)

(Bull. Soc. Nat. Moscou **24**, 509)

Mehrere Syntypen, Ind. or.
DEI: 1 Syntypus, Ind. or. (Mndrstrn.), Coll. v. HEYDEN.

polyglyptus SCHAUM, 1862 (*Harpalus*)

(Berl. Ent. Ztschr. **6**, 110)

Mehrere Syntypen, Griechenland, auf Corfu, leg. KRUEPER.
DEI: 2 Syntypen, Graecia, Coll. KRAATZ.

ponticus APFELBECK, 1904 (*Aptinus*)

(Käferf. Balkanh. **1**, 355–356)

Mehrere Syntypen: Türkei, Belgrader Wald bei Konstantinopel, leg. APFELBECK, 1900, leg. MERKL; Kleinasien, Smyrna, leg. KRÜGER, Alem Dagh, Sabandja, leg. v. BODEMEYER.
DEI: 2 Syntypen, Asia-minor, Goek-Dagh, Alem-Dagh, leg. v. BODEMEYER.

pradieri darlingtoni BÄNNINGER, 1940 (*Pamborus*)

(Novit. Zool. **42**, 205)

ca. 60 Ex. (Holotypus, Paratypen), Australia, Barrington Tops Plateau, 5000 ft., leg. DARLINGTON, im Museum Comparative Zoology, Cambridge, Mass., in Coll. DARLINGTON und Coll. BÄNNINGER.
DEI: 1 Paratypus, Australia, Barrington Tops, 5000 ft., N.S.W., 8. II. 1932, Harvard Exp., leg. DARLINGTON.

praedator ANDREWES, 1930 (*Anchomenus*)

(Trans. Ent. Soc. London **78**, 38–39)

1 Ex. Tibet, Yatang; 2 Ex. Sikkim, Darjeeling, 7 Ex. Karponang, 16 Ex. Gopaldhara, 3500 ft., Mirik, via STEVENS an ANDREWES; 1 Ex. „Sikkim", leg. NEWTON, im Museum Prag, 5 Ex. dto., im DEI; 1 Ex. Sureil, leg. ALCOCK, 5000 ft.; 2 Ex. Ghoom, 7000 ft., leg. KEMP; 1 Ex. Pashok, 5000 ft., leg. GRAVELY; 1 Ex. Sitong Ridge, 4700 ft., leg. GRAVELY; 3 Ex. Kalimpong, 5500 ft., leg. MANN; im Museum Indian, Calcutta; 1 Ex. wahrscheinlich Sikkim, im Museum Madrid; 2 Ex. Assam, Shillong, via FLETCHER an ANDREWES, in Coll. PUSA; Syntypen.
DEI: 1 Ex. Sikkim, Coll. KRAATZ; 1 Ex. dto. Himalaya: Syntypen.

privatus BATES, 1892 (*Chlaenius*)

(Ann. Mus. Genova (2) **12** (32), 315)

Mehrere Syntypen, Burma, Asciuii Chebà, alt. 1200–1300 m, leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Carin, Asciuii Chebà, 1200–1300 m, I. 1888, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

problematicus nicolasi VENET, 1932 (*Carabus*)

(Bull. Soc. Ent. Fr. **37**, 171–172)

Mehrere Syntypen, foréts des environs du Bosc (Ariége), leg. NICOLAS.
DEI: 1 Syntypus, Foret du Bosc, Ariege, durch VENET.

procerus SCHAUM, 1858 (*Stenolophus*)

(Wien. Ent. Monatschr. **2**, 274)

Mehrere Syntypen, Syrien.
DEI: 1 Syntypus, Syria.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

promissus HEYDEN, 1875 (*Molops*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. **19**, 380—381)

1 Ex. Dalmatien, ex Coll. ZIEGLER; 1 Ex. von WALTL; Syntypen.
Lectotypenfestlegung durch MLYNAŘ (soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden).
DEI: Lectotypus, Dalmatien, WALTL, Coll. v. HEYDEN; 1 Paralectotypus, Dalmatien, ex Coll. ZIEGLER-Coll. KRAATZ.

propagator REITTER, 1901 (*Odontocarus*)

(Wien. Ent. Ztg. **20**, 112—113)

Mehrere Syntypen, Buchara.
DEI: 3 Ex. Ost-Buchara, Tschitschantan, 2 Ex. Karatag, 916 m, 1 Ex. Turkestan, Mts. Ghissar; 1898, leg. HAUSER: Syntypen.

protensa SCHAUM, 1857 (*Feronia*)

(Berl. Ent. Ztschr. **1**, 139; nom. praeocc. = *zezeae* CSIKI, 1930, Col. Catal. **112**, 709)

Mehrere Syntypen; Griechenland, Parnass, leg. HELDREICH; Parnes bei Athen.
DEI: 1 Syntypus (Ex. verliehen, konnte nicht überprüft werden).

pseudonothus KRAATZ, 1878 (*Carabus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. **22**, 144)

1 Ex. ohne Fundort, leg. BIRNBAUMER, via SCHMIDT an KRAATZ; 1 Ex. als *Carniolia*, seltene var. !!! bezettelt; Syntypen; im DEI [Coll. KRAATZ].

pseudopedius REITTER, 1887 (*Pterostichus*)

(l.c. **31**, 247—248)

Mehrere Syntypen, Westcaucasus, Utsch-Dere, leg. STARCK.
DEI: 1 Syntypus, Caucas. occ., Circassien, LEDER-REITTER, Coll. KRAATZ.

pseudoserripes REITTER, 1900 (*Harpalus*)

(Verh. Nat. Ver. Brünn **38** (1899), 121)

Mehrere Syntypen, Turkestan, Margelan, Samarkand, Alai, Kokand.
DEI: 1 Syntypus, Karagaitau, Coll. KRAATZ (Fundort ist nicht aufzufinden und stimmt mit der Originalbeschreibung nicht überein).

pulcher extrarius SCHAUBERGER, 1935 (*Gnathaphanus*)

(Ent. Anz. **15**, 33—34)

Mehrere Syntypen, austral.-melanes., Saumlaki, Tenimber Ins.
DEI: 2 Syntypen, Saumlaki, Tenimber Ins.

pulvinatus MÉNÉTRIÉS, 1847 (*Harpalus*)

(Sc. nat. Acad. St. Petersburg **6**, 40—41)

2 Syntypen, Bakali-tau avril.
DEI: 1 Syntypus, Baku, Nr. 4, Coll. KRAATZ.

pumilio KOLBE, 1889 (*Chlaenius*)

(Stett. Ent. Ztg. **50**, 118)

Mehrere Syntypen, Kongo, im Gebiet des unteren Quango, Kwako bis Kimpoko, leg. BÜTTNER.
DEI: 1 Syntypus, Kongo, Kimpoko, leg. BÜTTNER, Coll. KRAATZ.

pumilus KRAATZ, 1886 (*Eutelocarabus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. **30**, 263)

Mehrere Syntypen, am Fluß Suyfun, leg. DÖRRIES, Amur, leg. CHRISTOPH; via STAUDINGER an KRAATZ.
DEI: 1 Ex. ohne Fundort, 1 Ex. Suyfun; Coll. KRAATZ; 1 Ex. Suifun, Mdg., durch KRAATZ, Nr. 576; 1 Ex. ohne Fundort; Coll. KOLTZE: Syntypen.
Syn. zu *billbergi* MANNHEIMER, 1827.

punctata DEJEAN, 1825 (*Clivina*)

(Spec. Gen. Coleopt. **1**, 424—425)

Mehrere Ex. Umg. Paris, Südfrankreich, Spanien; 1 Ex. Kaukasus, durch STEVENS; Coll. DEJEAN: Syntypen.
DEI: 3 Syntypen, Nizza (SCHAUM), Coll. GERMAR-SCHAUM.

punctatissima BALIANI, 1932 (*Amara*)

(Mem. Soc. Ent. Ital. **11**, 13—14, Taf. 2, Fig. 9)

2 ♂♂, 4 ♀♀, Syntypen, China centrale, Tatsienlu-confine Tibet orientale, durch REITTER.
DEI: 1 ♀, Syntypus, China, Szechuan, Tatsienlu, durch REITTER.

punctatus REITTER, 1885 (*Leistus*)

(Wien. Ent. Ztg. **4**, 214)

Mehrere Syntypen, Attica, Euboea, Montenegro.
DEI: 1 Syntypus, Attica, Coll. BRENSKE-Coll. REITTER-Coll. FRANKLIN MÜLLER.
Syn. zu *spinibarbis* FABRICIUS, 1775.

punctipennis REITTER, 1901 (*Cychrus*)

(l.c. **20**, 141)

♀ Holotypus, Herzegowina, auf der Cerstnica, leg. HILF, via LEONHARD an REITTER; im DEI.
Syn. zu *hampei* GESTRO, 1874.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

punctisternus STRANEO, 1938 (*Caelostomus*)

(Arb. morph. taxon. Ent. **5**, 244–245)

Holotypus, mehrere Paratypen, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ, in Coll. STRANEO und im DEI.
DEI: Holotypus, 5 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

punctiventris SCHAUM, 1864 (*Zabrus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 8, 179–180)

Mehrere Syntypen, Griechenland, leg. KRUEPER.
DEI: 2 Syntypen, Athen, Coll. SCHAUM.

punctulicollis BATES, 1892 (*Colpodes*)

(Ann. Mus. Genova (2) **12** (32), 375)

Mehrere Syntypen, Burma, Karin Asciuii Ghecù, alt. 1400–1500 m; Karin Chebà, alt. 900–1100 m; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Carin, Asciuii Ghecù, 1400–1500 m, III.–IV. 1888, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

purpureorutilans BARTHE, 1908 (*Carabus*)

(Misc. Ent. **16**, 3)

Mehrere Syntypen, prov. d. forêts de la Montagne Noire.
DEI: 3 Syntypen, Montagne Noire, Forêt de Moutand, erhalten 1910 von KRAUSE, Coll. FRANKLIN MÜLLER.
Syn. zu *auronitens* FABRICIUS, 1792.

purpureus KRAATZ, 1876 (*Procerus*)

(Bull. Soc. Nat. Moscou **51**, 139, 143–144)

♀ Holotypus, Krim, via SCHNEIDER an KRAATZ; im DEI [Taur., Coll. KRAATZ].
Syn. zu *scabrosus* OLIVIER, 1795.

pyrenaeus KRAATZ, 1863 (*Leistus*)

(In GRENIER, Cat. Coleopt. France, 126)

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, sur le Canigou, 1862, leg. NAU.
DEI: 1 Syntypus, Pyrenaeen Canigou, Coll. KRAATZ.

pyroclopus KRAATZ, 1878 (*Coptolabrus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. **22**, 252)

Holotypus, Amur, leg. RADDE, Coll. KRAATZ; im DEI [Nr. 126].
Syn. zu *smaragdinus* FISCHER VON WALDHEIM, 1824.
[*pyroclopus* KRAATZ wurde in der l.c. **30**, 241–242; 1886 als *pyrophorus* KRAATZ berichtigt (Druckfehler).]

quadripunctatus DEJEAN, 1929 (*Harpalus*)

(Spec. Gen. Coleopt. **4**, 326–327)

Mehrere Syntypen, Schweden, Frankreich, Dept. Basses-Alpes, Moskau, Steiermark, leg. DEJEAN; Coll. DEJEAN.
DEI: 1 Syntypus, V. Pellina, Coll. STIERLIN.
[Fundort ist nicht aufzufinden und stimmt mit der Originalbeschreibung nicht überein.]

quadrispinosa SLOANE, 1907 (*Loxocara*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 180)

Holotypus, New Guinea, Kaiser Wilhelm Land, Simbang, leg. v. BENNIGSEN, in Coll. HORN; im DEI [D. N. Guinea, Simbang, Coll. v. BENNIGSEN].
Syn. zu *quadrispinosa* CHAUDOIR, 1869.

radians ANDREWES, 1922 (*Bembidium*)

(Ent. Monthly Mag. (3) 8 (58), 177–178)

Holotypus, Sikkim, Gopaldhara, 10000 ft., leg. STEVENS, in Coll. ANDREWES, mehrere Paratypen: Lachung, Karponang und Tonglu, 10000 ft., leg. STEVENS; United Provinces: Kumaon, West Almora, Sunderdhunga, 8000–12000 ft.; Pindar Valley, 8000–11000 ft.; Nainital, Ranikhet, Bhatkot, leg. CHAMPION; Punjab: Simla Hills, Baghi, 8500 ft., Kufri, 8500 ft., Narkanda, 9000 ft., leg. KEMP, im Indischen Museum.
DEI: 2 Paratypen, Br. Sikkim, Gopaldhara, leg. STEVENS.

rambouseki JEDLIČKA, 1931 (*Bedeliolus*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. **28**, 133)

2 Ex. Persia, Prov. Faristan, Kaserun; 1 Ex. Transcaspia, Tedschen; in Coll. HAUSER und Coll. JEDLIČKA: Syntypen.
DEI: 1 Syntypus, Persia, Pr. Fariatan, Umg. Kaserun.

rectificatus BATES, 1891 (*Rhembus*)

(Compt. rend. Soc. Ent. Belg. sér. 4, Nr. 22, 329)

Syntypen: 1 Ex. Tetara und mehrere Ex. Burma.
DEI: 1 Syntypus, Birmania, Rangoon, Coll. KRAATZ.

reflexus SCHAUM, 1862 (*Zabrus*)

(Berl. Ent. Ztschr. **6**, 108–109)

7 Syntypen, nördl. Griechenland, leg. KRUEPER.
DEI: 1 Ex. Graecia, Coll. SCHAUM, 1 Ex. ohne Fundort, Coll. KRAATZ: Syntypen.

reichei KRAATZ, 1858 (*Percus*)

(Wien. Ent. Monatsschr. **2**, 163)

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Insel Corsica, ex Coll. REICHE; im DEI. [Coll. KRAATZ].

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

rektořiki KULT, 1953 (*Amara*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. **50**, 119—121, Fig.)

Holotypus, South Slovakia, Kamenica nad Hronom! 20. V. 1950,' in Coll. KULT; 21 Ex. dto.; 15 Ex. dto. 15 V. 1951; 1 Ex. Hegyfárok! prope Parkan (= Štúrovo), 10. V. 1952; 2 Ex. Chlaba! (= Helemba), 15. V. 1952; im Britischen Museum, Nemzeti Museum Budapest, Museum Warszawa, Museum Prag, DEI, in Coll. LINDROTH, Coll. JEDLIČKA, Coll. PUCHOLT, Coll. HAVELKA, Coll. REKTOŘIK, Coll. DVOŘAK, Coll. KULT, etc.: Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, Slovakia, Štúrovo, leg. REKTOŘIK.

retowskii REITTER, 1887 (*Harpalus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. **31**, 246; nom. praeocc. = *retowskianus* REITTER, 1887, l. c., 500)

Mehrere Syntypen, Circassien, Theodosia, Berg Atschischho, X. 1884, leg. RETOWSKI und STARCK.
DEI: 1 Syntypus, Caucas. occid., Atschischho, leg. STARCK, Coll. STIERLIN.

retrospinosa HEYDEN, 1885 (*Nebria*)

(Wien. Ent. Ztg. **4**, 186—187)

♀ Holotypus, tscherkessischen Kaukasus, Atchischho, leg. STARCK, in Coll. v. HEYDEN; im DEI [Caucasus occ., Circassien, durch LEDER-REITTER].

rhodopensis APFELBECK, 1904 (*Molops*)

(Käferf. Balkanh. **1**, 217—223, 224)

Mehrere Ex. Bulgarien, West-Rhodope, am Musallâ, 1 Ex. Bellova, in Coll. v. HEYDEN: Syntypen.
Lectotypenfestlegung durch MLYNAŘ (soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden).
DEI: 1 Paralectotypus, Balkan, Bellova, durch HOPFFGARTNER.

rhodopensis APFELBECK, 1904 (*Zabrus*)

(l.c., 315)

Mehrere Syntypen: Bulgarien, West-Rhodope bei Samakov und Demir Kapú, 1892, leg. APFELBECK, Rhilo Dagh, leg. MERKL, südlichen Serbien, Surdulica, 1899, leg. REITTER.
DEI: 2 Syntypen, W. Rhodope, Musalâ, Coll. FRANKLIN MÜLLER.

rhodopus BATES, 1892 (*Oodes*)

(Ann. Mus. Genova (2) **12** (32), 324)

Mehrere Syntypen, Burma, Bhamò, Karin Chebà, alt. 900—1100 m, Malewoon, Tenasserim, Palon, Pegu; leg. FEA.
DEI: 2 Ex. Palon, Pegu, 1887/VIII. IX. 1887, leg. FEA; 1 Ex. Carin Chebà, 900—1100 m, V. XII. 1888; leg. FEA, Coll. KRAATZ: Syntypen.

rhombophorus ANDREWES, 1925 (*Tachys*)

(l.c. **51**, 390—391)

Mehrere Syntypen: Eastern Duars; Sikkim: Gopaldhara, Namsoo, Gielle Khola, Tarkhola in the Tista Valley; leg. STEVENS; Kumaon: West Almora, Ranikhet, Tanakpur, River Sarda Gorge, Haldwani-Nandhaur River, Hardwar-River Ganges, 200 ft., leg. CHAMPION; Dehra Dun, Lachiwala, Siwalik Hills, leg. CAMERON; River Song, leg. CHATTERJEE; im Forest Res. Inst.
DEI: 1 Syntypus, E.-Dooars, leg. STEVENS.
[Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Eastern Duars", steht auf dem Etikett „E.-Dooars".]

rivalis GERMAR, 1924 (*Molops*)

(Ins. Spec. Nov., 21—22)

Mehrere Syntypen, Brasilia.
DEI: 1 Syntypus, Buenos Ayr., Coll. SCHAUM.

riversi DYKE, 1925 (*Nebria*)

(Pan-Pacific **1**, 115—116)

♂ Holotypus (No. 1619), 1 ♀ (No. 1620, im Museum Calif. Acad. Sci.) und mehrere Ex. California, Mt. Lyell, Lyell Glacier, 11.500 ft., 13. VII. 1921, leg. v. DYKE und LAMBERT, via RIVERS an ROESCHKE; im DEI und in Coll. v. DYKE: Paratypen.
DEI: 1 ♀, Paratypus, Snow Mt. Lyell, Coll. v. DYKE.

roborowskii SEMENOV, 1889 (*Nebria*)

(Horae Soc. Ent. Ross. **23**, 350—351)

Mehrere Syntypen, Thibet sept.-orient., montes Burchanbudda, VI. 1884, leg. PRZEWALSKY.
DEI: 1 Syntypus, Amdo, 1884, leg. PRZEWALSKY.
[Fundort ist nicht aufzufinden und stimmt mit der Originalbeschreibung nicht überein.]

robusta BALIANI, 1932 (*Amara*)

(Mem. Soc. Ent. Ital. **11**, 6—7, Taf. 1, Fig. 2)

5 ♂♂, 4 ♀♀, Syntypen, China centrale, Tatsienlu-Chiulung, prov. di Szechuan, durch REITTER.
DEI: 2 Syntypen, China, Tatsienlu-Kiulung, durch REITTER.

robustus SLOANE, 1907 (*Stenolopus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 469)

2 ♀♀, Syntypen, New Guinea, Gazelle Peninsula, leg. v. BENNIGSEN, in Coll. HORN.
DEI: 1 ♀, Syntypus, Gazelle, H. Insel, Coll. v. BENNIGSEN.
Syn. zu *vestigialis* ERICHSON, 1842.

robustus parallelus MLYNAŘ (1975?) (*Molops*)

(soll in Acta Ent. Mus. Pragae, Nr. 39, veröffentlicht werden)

DEI: 5 Paratypen, Bulg. Tschamkorija, Samakov, 1911, durch HILF, Coll. LEONHARD.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

roubali JEANNEL, 1927 (*Duvalius*)

(Bull. Soc. Sc. Cluj, **3**, 14)

Mehrere Syntypen; Carpathen, Czorna Hora, leg. ROUBAL, Diener, mont Hoverla, Süd-Czorna Hora, leg. STOBIECKI; im Museum Vienne.
DEI: 2 Syntypen, Carpat. or., Hoverla, Col. MAKOLSKI.

rubellus BATES, 1892 (*Pristomachaerus*)

(Ann. Mus. Genova (2) **12** (32), 305)

Mehrere Syntypen, Burma, Karin Chebà, alt. 900—1100 m, Naga Hills, alt. 1300 m; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Carin Cheba, V. XII. 1888, 900—1100 m, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

rubidus ANDREWES, 1922 (*Aephnidius*)

(Ann. Mag. Nat. Hist. (9) **10**, 169)

Mehrere Syntypen; Central Provinces, Nagpur, leg. D'ABREU; Bombay, Khandesh, leg. BELL; Belgaum, 1886—1887, leg. ANDREWES; Madras, Madura, leg. SOMERS-SMITH; in Coll. ANDREWES.
DEI: 1 Syntypus, Belgaum.

rudolphi GANGLBAUER, 1891 (*Trechus*)

(Wien. Ent. Ztg. **10**, 122—123)

Mehrere Syntypen, Koralpe an der Grenze von Steiermark und Kärnten, leg. GANGLBAUER und STARKE.
DEI: 1 Syntypus, Koralpe, 1890, GGLB., Coll. KRAATZ.

ruficollis MOTSCHULSKY, 1851 (*Nestra*)

(Bull. Soc. Nat. Mosc. **24**, 506—507)

Mehrere Syntypen, Ind. or.
DEI: 1 Syntypus, India or. (Mndrstrn.), Coll. v. HEYDEN.

rufipes klisuranus APFELBECK, 1902 (*Molops*)

(Glasn. Muz. Bosn. Herc. **14**, 545)

Mehrere Syntypen, Bulgarien, Stava planina, Klisura, leg. MERKL.
Lectotypenfestlegung durch MLYNAŘ (soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden).
DEI: 1 ♂, ♀, Paralectotypen, Bulgaria, Klisura, leg. MERKL.

rugiceps ANDREWES, 1929 (*Oxylobus*)

(Faun. Brit. Ind. Coleopt. Carab. **1**, 296, 310—311, Taf. 8, Fig. 5)

Bombay, Belgaum, leg. ANDREWES und KINNEAR; Kanara, leg. BELL; Holotypus, in Coll. ANDREWES, 2 Ex. im Britischen Museum, 1 Ex. in der Coll. Bombay Natural History Society: Paratypen.
DEI: 1 ♂, ♀, Paratypen, Belgaum.

rugulipennis BATES, 1892 (*Brachichila*)

(Ann. Mus. Genova (2) **12** (32), 406)

Mehrere Syntypen, Burma, Thagata, Tenasserim, Palon, Pegu; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Tenasserim, Thagata, IV. 1887, leg. FEA.

rutilipennis BATES, 1892 (*Dolichoctis*)

(l.c., 412—413)

Mehrere Syntypen, Burma, Karin Chebà, alt. 900—1100 m, Karin Asciuii Chebà, alt. 1300—1400 m; leg. FEA.
DEI: 3 Syntypen, Carin Chebà, V. XII. 1888, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

sachtlebeni BASILEWSKY, 1942 (*Lobodontus*)

(Arb. morph. taxon. Ent. **9**, 164—165, Fig. 8)

Holotypus, Caméroun, leg. CONRADT; im DEI [Coll. KRAATZ].

sagittaria BATES, 1892 (*Clivina*)

(Ann. Mus. Genova (2) **12** (32), 275—276)

Mehrere Syntypen, Burma, Rangoon, leg. FEA.
DEI: 3 Syntypen, Birmania, Rangoon, VI. 1887, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

sauteri ROESCHKE, 1912 (*Carabus*)

(Suppl. Ent. **1**, 4—6)

♀ Holotypus, Formosa, Suisharyo, 11. XII. 1911; im DEI [durch SAUTER].

sauteri DUPUIS, 1914 (*Catascopus*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. **57**, 419)

Mehrere Syntypen, Formosa, Hoozan, leg. SAUTER, im Museum Berlin und DEI.
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kosempo, 22. VII., leg. SAUTER.

sauteri DUPUIS, 1912 (*Hexagonia*)

(l.c., **56**, 308—312)

10 Syntypen, Formosa, Kankau, leg. SAUTER.
DEI: 4 Syntypen, Formosa, Kankau, IV. 1909, leg. SAUTER.

scapularis SCHAUM, 1860 (*Cymindis*)

(In ERICHSON, Naturg. Ins. Deutschl. (1857) **1**, 1, 299—300)

Mehrere Syntypen, Österreich, bei Wien und bei München; im Süden von Europa, von Spanien bis in die Krim, in den transcaucasischen russischen Provinzen.
DEI: 1 Syntypus, Austria, Coll. SCHAUM.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

schaubergeri JEDLIČKA, 1931 (*Chydaeus*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. **28**, 22—23)

ca. 70 Syntypen, China mer., Prov. Szetschuan-Chung-king, V.—VI. 1929, in Coll. SCHAUBERGER, Coll. ANDREWES, Coll. BECKER, Coll. JEDLIČKA und im DEI.
DEI: 1 Ex. Chung-king, Szetschuan, Coll. BECKER; 1 Ex. Szechuan, Giufu-Shan, leg. REITTER; 2 Ex. China, Szechuan, Tatsienlu, leg. REITTER: Syntypen.

scheibei EIDAM, 1937 (*Carabus*)

(Arb. morph. taxon. Ent. **4**, 177—178)

♀ Holotypus, Hindukusch-Exped. 1935, Grama-T'al bei Paprok, 4. VIII. 1935; im DEI [Afghan, Nuristan, 1935, Exped. SCHEIBE].

scheidleri styriacus KRAATZ, 1887 (*Carabus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. **31**, 343)

Mehrere Syntypen, Styria, leg. KAHR.
Lectotypenfestlegung durch MANDL, 1965; Abh. Staatl. Mus. Tierk. Dresd. **31**/13, 431—433.
DEI: 2 Paralectotypen, ohne Fundort, Coll. KRAATZ.

schmidti ANDREWES, 1927 (*Brachinus*)

(Ent. Mitt. **16**, Nr. 2, 147—148)

Holotypus, Arabia, El Hedjaz, leg. MILLINGEN, im Britischen Museum, 1 Ex. dto.; 1 ♂, Irak, Basra, 13. VI. 1926, leg. SCHMIDT, im DEI: Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, Basra, 13. VI. 1926, leg. SCHMIDT.

sectifrons BATES, 1892 (*Clivina*)

(Ann. Mus. Genova (2) **12** (32), 276)

Mehrere Syntypen, Burma, Palon in Pegu, Rangoon, Tikekee, Shenmaga; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Birmania, Rangoon, V.-VII. 1887, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

segnis SCHAUM, 1864 (*Zabrus*)

(Berl. Ent. Ztschr. **8**, 185)

Mehrere Syntypen, Kleinasien, bei Brussa.
DEI: 1 Syntypus, Anatolia, Brussa, Coll. SCHAUM.

seidlitii SCHAUM, 1864 (*Zabrus*)

(l.c., 177—178)

Mehrere Syntypen, Guadarrama, leg. SEIDLITZ.
DEI: 1 Syntypus, Spanien, Coll. STIERLIN.
[*seidlitii* ist offenbar ein Druckfehler; es muß heißen *seidlitzi*, wie aus der Originalbeschreibung p. 178, Zeile 9 hervorgeht.]

semilunium muchei JEDLIČKA, 1965 (*Bembidion*)

(Ent. Abh. Mus. Tierk. Dresden **32**, 122)

5 Syntypen, oberer Amur, in Coll. JEDLIČKA.
DEI: 1 Syntypus, oberer Amur.

semirubra ANDREWES, 1926 (*Coryza*)

(Ent. Monthly Mag. **62**, 71—72)

Kumaon-Tibetan Frontier: 1 Ex. Sarju Valley, 5.000′, leg. CHAMPION; mehrere Ex.; Upper Gumti Valley, Ranikhet, Swal River basin, Almora, Tanakpur, Nandhaur River bis Haldwani, leg. CHAMPION; Dehra Dun, Dwarahat, 5.000′, Kanarichina, 4.000′, Almora, leg. PARKER; Saiya, 3.600′, leg. CAMERON; Binal Gad, 3.500′, leg. CHATTERJEE; Chakrata, Kali Gad, nahe Dehra Dun; Kolhu Khet Gad bis Mussoorie; Aglar River, Tehri Garhwal; leg. CAMERON; in Forest Research Institute und Coll. CHAMPION; Syntypen.
DEI: 1 Syntypus, India, Kumaon, W. Almora, H.G.C.

semisuturalis DUPUIS, 1912 (*Pentagonica*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. **56**, 314—316)

Holotypus, Formosa, Kosempo, leg. SAUTER; im DEI [VIII. 1903].

semiviridis HAUSER, 1914 (*Coptolabrus*)

(Stett. Ent. Ztg. **75**, 137)

Mehrere Syntypen, China prov. Hunan, Siantang, Tao huaping, vallis Lokiang.
DEI: 1 Syntypus, China, Hunan.
Syn. zu *augustus* BATES, 1888.

serbicus HOPFFGARTEN, 1878 (*Carabus*)

(Ent. Nachr. **4**, Nr. **8**, 97)

Mehrere Syntypen, Serbien.
DEI: 1 Syntypus, Serbien, Coll. STIERLIN.
Syn. zu *scheidleri* PANZER, 1799.

seriatoporus SCHAUM, 1864 (*Zabrus*)

(Berl. Ent. Ztschr. **8**, 181—182)

Mehrere Syntypen, Armenien, via CHAUDOIR und FAIRMAIRE an SCHAUM.
DEI: 2 Syntypen, Armenien, Coll. SCHAUM.
Syn. zu *spectabilis* HAMPE, 1852.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

sericea MOTSCHULSKY, 1851 (*Tachys*)

(Bull. Soc. Nat. Mosc. **24**, 507)

Mehrere Syntypen, Ind. or.
DEI: 1 Syntypus, Ind. or. (Mndrstrna.), Coll. v. HEYDEN.

sexmaculata LIEBKE, 1930 (*Calophaena*)

(Mitt. Zool. Mus. Berlin **15**, 672, 719, Fig. 59)

10 Syntypen, Costarica; Siquirres, 11. I. 1922, Farm „Hamburg" am Reventazón, Ebene Limon, 15. X. 1922/22. VII., 3. XII. 1925/8., 25. III. 1928; leg. NEVERMANN, in Coll. NEVERMANN.
DEI: 1 Syntypus, Costarica, Hamburgfarm, Reventazon, Ebene Limon, 3. XII. 1925, leg. NEVERMANN.

silvanoides DIECK, 1869 (*Typhlocharis*)

(Diagn. neuer blind. Käfer, 6)

Mehrere Syntypen, Nordküste Marocco bei Tanger, leg. DIECK.
DEI: 1 Syntypus, Tanger, leg. DIECK, Coll. SCHNEIDER-KELCH.

similis KRAATZ-KOSCHLAU, 1885 (*Ceroglossus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. **29**, 435—436)

3 Syntypen, Chile, Arauco.
DEI: 2 Syntypen, ohne Fundort, Coll. KRAATZ, Nr. 11.

simplex breviformis MLYNAŘ (1975 ?) (*Molops*)

(soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden)

DEI: 3 Paratypen, Herzegovina, Tisovica, leg. ZOUFAL, Coll. FRANKLIN MÜLLER (2 ♂♂, 1 ♀).

sinicum ANDREWES, 1938 (*Cillenus*)

(Proc. Roy. Ent. Soc. London, Ser. B, **7**, 191)

Holotypus, China, Foochow, leg. YANG, im Britischen Museum; mehrere Paratypen, dto.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, 1935—36.

sjoestedti ANDREWES, 1926 (*Anisodactylus*)

(Ann. Mag. Nat. Hist. (9) **18**, 276—277)

Holotypus, Sumatra, Fort de Kock, leg. JACOBSON, im Britischen Museum; 20 Ex. dto.; 4 Ex. Medan, leg. MJÖBERG, im Museum Stockholm; 34 Ex. Holland. Indien, ? Java, im Museum Buitenzorg; 1 Ex. Philippine Is., Los Baños, leg. BAKER; Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, Sumatra, Fort de Kock, 920 M, XII. 1921, leg. JACOBSON.

socialis SCHAUM, 1864 (*Zabrus*)

(Berl. Ent. Ztschr. **8**, 187)

Mehrere Syntypen, Kleinasien, bei Brussa.
DEI: 1 Syntypus, Brussa, Coll. SCHAUM.

sodalis LAPOUGE, 1925 (*Carabus*)

(Misc. Ent. **29**, 193—194)

Mehrere Syntypen, Juldus, im Thian Chan Gebirge.
DEI: 1 Syntypus, Juldus, Coll. v. BENNIGSEN.

solinfectum JÄNICHEN, 1914 (*Calosoma*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 298)

Holotypus, Mark Brandenburg, Bärwalde (Neumark), 1869 oder 1870, leg. JÄNICHEN; im DEI.
Syn. zu *sycophanta* LINNÉ, 1758.

spartanus SCHAUM, 1862 (*Pterostichus*)

(Berl. Ent. Ztschr. **6**, 106—107)

Mehrere Syntypen, Süden von Morea, leg. KRUEPER.
Lectotypenfestlegung durch MLYNAŘ (soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden).
DEI: ♂ Lectotypus, Morea, Coll. KRAATZ, 1 ♂, 2 ♀♀, Paralectotypen, ex Coll. SCHAUM.

spartanus chelmosensis MAŘAN, 1940 (*Molops*)

(Sborn. ent. odd. Nar. Mus. Praze, **18**, 193)

Mehrere Syntypen, Morea septemtr., mons Chelmos ad oppidum Kalavrita, leg. 15.—25. IV. 1936.
DEI: 2 Syntypen, Chelmos Pelop., Mař. et Táb., IV. 1936, Coll. BARTON.

spartanus parnassicola KRAATZ, 1875 (*Molops*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. **19**, 372)

2 Syntypen, Parnassus, leg. ZEBE, in Coll. KRAATZ und Coll. v. KIESENWETTER.
Lectotypenfestlegung durch MLYNAŘ (soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden).
DEI: ♂ Lectotypus, mit den Angaben der Beschreibung.

speciense JEDLIČKA, 1932 (*Bembidion*)

(Wien. Ent. Ztg. **49**, 325)

Holotypus, 6 Paratypen, China, Prov. Szetschuan-Tatsienlu, in Coll. JEDLIČKA und Coll. REITTER.
DEI: 1 Paratypus, China, Szechuan, Tatsienlu, leg. REITTER.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

spectabilis SCHAUM, 1856–60 (*Amara*)

(Naturg. Ins. Deutschl. Col. **1**, 1 (1958), 510)

Mehrere Syntypen, in den Alpen von Krain und Kroatien.
DEI: 5 Syntypen, Croatien, Carniol, Coll. GERMAR-SCHAUM.

spectans JEDLIČKA, 1933 (*Bembidion*)

(Acta Soc. Ent. Čechosl. **30**, 9–10 (Separat))

Holotypus, 3 Paratypen, China, Prov. Szetschuan-Tatsienlu, in Coll. JEDLIČKA und in Coll. REITTER.
DEI: 1 Paratypus, China, Szechuan, Nitou Tatsienlu, leg. REITTER.

spinicollis BREIT, 1913 (*Anophthalmus*)

(Ent. Mitt. **2**, Nr. 11, 351–352)

Mehrere Syntypen, Bosnien, Jahorina-planina, leg. SETNIK, in Coll. LEONHARD.
DEI: 1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Bosnien, Jahorina, Coll. LEONHARD.
Syn. zu *pfeifferi* APFELBECK, 1908.

spinulifer BATES, 1892 (*Colpodes*)

(Ann. Mus. Genova (2) **12** (32), 377)

Mehrere Syntypen, Burma, Karin Asciuii Ghecù, alt. 1400–1500 m; Karin Cheba, alt. 900–1100 m; leg. FEA.
DEI: 2 Syntypen, Carin Asiuii Ghecù, 1400–1500 m, III.–IV. 1888, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

stenoderus CHAUDOIR, 1850 (*Agonum*)

(Bull. Soc. Nat. Mosc. **23**, 3, 118–119)

Mehrere Syntypen, Umgebung von Tiflis; „partie inférieure du cours du Volga".
DEI: 1 Syntypus, Caukasus, Coll. GERMAR-SCHAUM.
Syn. zu *extensum* MÉNÉTRIÉS, 1849.

šteřbai JEDLIČKA, 1964 (*Bembidion*)

(Ent. Abh. Mus. Tierk. Dresden **32**, 138, Fig. 29)

Holotypus, China, Yunnan, Solingho; im DEI [Vallis flumin.].

šteřbai RAMBOUSEK, 1909 (*Penetretus*)

(Acta Soc. Ent. Bohemia, **6**, 116, Fig.)

2 ♂♂, 1 ♀, Syntypen, Macedonien, Gebirge Perister, Bitolja (Monastére), 2000 m, leg. RAMBOUSEK.
DEI: 3 Syntypen, Macedonien, Perister alpin, 14. VII., leg. RAMBOUSEK, Coll. FRANKLIN MÜLLER-Coll. LEONHARD.

sternbergi ROESCHKE, 1898 (*Carabus*)

(Ent. Nachr. **24**, 121–122)

Mehrere Syntypen, Gensan, leg. STAUDINGER.
DEI: 1 Syntypus, Gensan, Coll. v. BENNIGSEN.

stevensi ANDREWES, 1925 (*Tachys*)

(Ann. Mus. Genova, **51**, 406, 445–446)

Mehrere Syntypen, Sikkim, Gopaldhara; Eastern Duars; leg. STEVENS; Kumaon, West Almora, Nainital, Swal River basin, Haldwani-Nandhaur River, Khaula, 4500 ft.; leg. CHAMPION; Bhim Tal, 4500 ft.; Punjab, Simla Hills-Barogh, 5000 ft.; leg. ANNANDALE, im Indischen Museum; Bajaura-Kanyra district, leg. BABAULT; Chota Nagpur, Barway, leg. CARDON, im Museum BRÜSSEL; 2 Ex. Karen Hills, durch FEA, im Britischen Museum.
DEI: 2 Syntypen, Br. Sikkim, Gopaldhara, leg. STEVENS.

stictus ANDREWES, 1933 (*Omophron*)

(Ann. Mag. Nat. Hist. (10) **11**, 99–100)

Mehrere Syntypen, Tonkin, Hoa-Binh, leg. DE COOMAN; Laos, Hat Tiang, leg. VITALIS DE SALVAZA; in Coll. ANDREWES, Coll. BÄNNINGER, Coll. FLEUTIAUX und im DEI.
DEI: 1 Syntypus, Tonkin, Lac Thô, Hoa-Binh, leg. DE COOMAN, ex Coll. FLEUTIAUX.

striax DARLINGTON, 1934 (*Tachys*)

(Psyche **41**, 82)

Cuba: ♂ Holotypus, no. 19502, 19 Ex. Soledad, nahe Cienfuegos, IV., 17., 20. X., 7. XI., im Museum Comparative Zoölogy; 1 Ex. Cayamas, Sta. Clara, 6. VI., leg. SCHWARZ, im United States National Museum; 1 Ex. Poey Collection no. 27, in Philadelphia Academy of Sciences; Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, Cuba, Soledad, Cienfuegos, 7. XI. 1926, leg. DARLINGTON, M.C.Z.

stricticeps BALIANI, 1932 (*Amara*)

(Mem. Soc. Ent. Ital. **11**, 7–8, Taf. **1**, Fig. 3)

2 ♂♂, 2 ♀♀, Syntypen, China centrale, Tatsienlu-Chiulung, prov. di Szechuan, durch REITTER.
DEI: 1 ♀, Syntypus, China, Tatsienlu-Kiulung, durch REITTER.

stricticollis BAUDI, 1864 (*Blechrus*)

(Berl. Ent. Ztschr. **8**, 203)

10 Syntypen, Cypern.
DEI: 2 Syntypen, Cypern, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *infuscatus* MOTSCHULSKY, 1859.

strigitarsis STRANEO, 1939 (*Nebrioferonia*)

(Mem. Soc. Ent. Ital. **18**, 119–121, Figs.)

Holotypus, mehrere Paratypen, Nova Guinea, Haveri, leg. LORIA, im Museum Genova, DEI, in Coll. STRANEO und Coll. ANDREWES.
DEI: 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung, VII.–XI. 1893.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

stübele EMDEN, 1953 (*Anisotarsus*)

(Ann. Mag. Nat. Hist (12) **6**, 533—534)

♀ Holotypus (Lo.), Ecuador, Quito, leg. BOWRING; 1 ♂, Paratypus (Da.), dto., Coll. GERMAR-SCHAUM; im Britischen Museum.
DEI: 1 ♂, Paratypus, Quito, Coll. GERMAR-SCHAUM.

sturmii KRAATZ, 1875 (*Molops*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. **19**, 375)

2 Syntypen, Banat, leg. ZIEGLER, Wallachei, leg. STENTZ, in Coll. v. HEYDEN und Coll. KRAATZ.
Lectotypenfestlegung durch MLYNAŘ (soll in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, No. 39, veröffentlicht werden).
DEI: ♂ Lectotypus, Banat, leg. ZIEGLER, Coll. KRAATZ; 1 ♂, Paralectotypus, Wallachia, leg. STENTZ, Coll. v. HEYDEN.
Syn. zu *piceus orthogonus* CHAUDOIR, 1868.

subaenea CHAUDOIR, 1850 (*Feronia*)

(Bull. Soc. Nat. Mosc. **23**, 144—145)

Mehrere Syntypen, Berg Kuznetsk, leg. GEBLER.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, Coll. KRAATZ, Nr. 11.

sublaevigatus TSCHITSCHERIN, 1898 (*Harpalus*)

(Ann. Soc. Ent. Fr. **67**, 180—181)

Mehrere Syntypen, Province Transcaspienne, Dort-kuju, 5. V. 1888, leg. SÉMENOW; Turkestan russe occ., désert Kisilkum mér., 1892, leg. GLASUNOW; Turkestan russe mér., vallée du Zerawschan, V. 1893, leg. KOMAROW, montagnes d'Alaj, 5. VI. 1889, leg. GROMBCZEWSKIJ; in Coll. SÉMENOW und Coll. TSCHITSCHERIN.
DEI: 2 Syntypen, Margelan, Coll. KRAATZ.

subpurpureus REITTER, 1901 (*Chlaenites*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 65)

Mehrere Syntypen, Turkestan, Umgebung von Aulie-Ata.
DEI: 1 Syntypus, Aulie-Ata, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *spoliatus* ROSSI, 1790.

subrobustus SCHAUBERGER, 1938 (*Acupalpus*)

(Arb. morph. taxon. Ent. **5**, 47—48)

Java: Holotypus, M. Gede, in Coll. SCHAUBERGER, 8 Ex. dto., 2 Ex. Sukabumi, 1 Ex. ohne nähere Angabe; Sumatra: 4 Ex. Tebing-tinggi, 6 Ex. ohne nähere Angabe; 1 Ex. Borneo; Celebes: 1 Ex. Samanga, 1 Ex. Makassar, 2 Ex. ohne nähere Angabe; in Coll. SCHAUBERGER und im DEI: Paratypen.
DEI: 1 Ex. Java; 1 Ex. Borneo; 2 Ex. Celebes; 1 Ex. Makassar; 4 Ex. N.O. Sumatra, Tebing-tinggi, leg. SCHULTHEISS; Coll. KRAATZ; 1 Ex. Java occident., Mons Gede, 4000', VIII. 1892, leg. FRUHSTORFER: Paratypen.

subrugosus SCHAUBERGER, 1938 (*Platymetopus*)

(l.c., 39—40)

Holotypus, 3 Paratypen, Celebes, Makassar, Coll. GERMAR-SCHAUM, in Coll. SCHAUBERGER und im DEI.
DEI: Holotypus, Celebes, Makassar, Nr. 66, 1 Paratypus, Celebes; Coll. GERMAR-SCHAUM.

subtilis BATES, 1892 (*Hypolithus*)

(Ann. Mus. Genova (2) **12** (32), 338)

Mehrere Syntypen, Burma, Bhamò, leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Birmania, Bhamò, VI. 1885, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

subtilis BATES, 1892 (*Siagona*)

(l.c., 284)

6 ♀♀, Syntypen, Burma, Rangoon, Senmigion; Palon, Pegu; leg. FEA.
DEI: 3 Syntypen, Birmania, Rangoon, 1887, leg. FEA, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *obscuripes* CHAUDOIR, 1876.

successor REITTER, 1896 (*Araecarabus*)

(Verh. Nat. Ver. Brünn **34** (1895), 172)

Mehrere Syntypen, Thian-Schan, via HAUSER an REITTER.
DEI: 3 Syntypen, Thian-Schan, Musart, VI. 1894, Coll. HAUSER.

suensoni LINDROTH, 1956 (*Synuchus*)

(Trans. R. ent. Soc. Lond. **108**, 525)

China, Prov. Fukien, Buong kă, N. Foochow, 28.—29. IV. 1935, ♂ Holotypus, 25 Ex. (many more or less teneral), leg. SUENSON; Kuatun, 1930, 1 ♀, leg. KLAPPERICH, MNP, 2300 m, 18. IV. 1938, 4 Ex. (all teneral), leg. KLAPPERICH; Prov. Chekiang, Hangchow, 23. IV. 1921, mehrere Ex. (teneral); Chekiang, 27. IV. 1920, 1 ♂, (teneral), 4. VI. 1920, 1 ♂; leg. SUENSON; Prov. Hupeh, Mts. Wushan, 2 ♂♂, Coll. HAUSER, BMNH: Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, China, Fukien, Buong kă, 28. IV. 1935, leg. SUENSON.

sulcata MOTSCHULSKY, 1851 (*Tachys*)

(Bull. Soc. Nat. Mosc. **24**, 509)

Mehrere Syntypen, Ind. or.
DEI: 1 Syntypus, Ind. or. (Mndrstrn.), Coll. v. HEYDEN.

suturalis MOTSCHULSKY, 1851 (*Tachys*)

(l. c., 508)

Mehrere Syntypen, Ind. or.
DEI: 1 Syntypus, India or. (Mndrstrn.), Coll. v. HEYDEN.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

szetschuanus JEDLIČKA, 1932 (*Andrewesius*)

(Ent. Nachrichtenbl. 6, 76)

Holotypus, 54 Paratypen, China, Prov. Szetschuan, Tatsienlu, in Coll. JEDLIČKA, Coll. ANDREWES, Coll. REITTER und im DEI.
DEI: 3 Ex. China, Tatsienlu-Kiulung, 2 Ex. Szechuan, Giufu-Shan; leg. REITTER, Paratypen.

szetschuanus JEDLIČKA, 1932 (*Diplous*)

(l.c., 107)

Holotypus, 10 Paratypen, China, Prov. Szetschuan-Tatsienlu, in Coll. JEDLIČKA und Coll. REITTER.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

szetschuanus JEDLIČKA, 1932 (*Eucalathus*)

(l.c., 73—74)

Holotypus, 55 Paratypen, China, Prov. Szetschuan, Tatsienlu, in Coll. JEDLIČKA und Coll. REITTER.
DEI: 4 Paratypen, China, Tatsienlu-Kiulung, durch REITTER.

tabularis STRANEO, 1941 (*Abacetodes*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 8, 14—15)

♂ Holotypus, Africa meridion., Kapstadt, 25. VI. 1916, leg. ANDREAE, im DEI; 1 ♀, Paratypus, dto., in Coll. STRANEO.
DEI: ♂ Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung.

tachypoda TSCHITSCHERIN, 1898 (*Amara*)

(Horae Soc. Ent. Ross. 32, 209)

♀ Holotypus, Transcaspienne, „Turcmenien, Leder", ex Coll. REITTER; in Coll. v. HEYDEN, im DEI.

tagax ANDREWES, 1925 (*Tachys*)

(Ann. Mus. Genova 51, 444—445)

Mehrere Syntypen, Kumaon, West Almora, Nainital, Ranikhet, Haldwani-Nandhaur River, Upper Gumti Valley, leg. CHAMPION, Dehra Dun-Kaligad, Siwalik Hills, Mussoorie-Mossy Falls, Kemti Falls, Arni Gad, Tehri Garhwal-Aglar River; leg. CAMERON, im Forest Res. Inst.; Chaubattia, 6000—7000 ft., leg. ARCHER, im Britischen Museum; Sikkim, Tista Valley, Tarkhola, Rangit River, leg. STEVENS.
DEI: 2 Syntypen, W. Almora, Kumaon, leg. CHAMPION.

talyschensis REITTER, 1887 (*Platyderus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 31, 253)

2 ♂♂, Syntypen, Talyschgebirge bei Hamarat, leg. LEDER.
DEI: 1 ♂, Syntypus, Caspi-M. Gebiet, Hamarat, leg. LEDER-REITTER, Coll. KRAATZ (Ex. sehr schlecht erhalten).

taprobanae ANDREWES, 1923 (*Oodes*)

(Spol. Zeyl. 12, 231—232)

♂ Holotypus, Ceylon, Vavuniya, im Britischen Museum; 1 ♀, Paratypus, Anuradhapura, leg. HORN, im DEI.
DEI: 1 ♀, Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, Ceylon, 1899.

taygetana ROTTENBERG, 1874 (*Nebria*)

(Berl. Ent. Ztschr. 18, 325—326)

Mehrere Syntypen, Griechenland, Taygetos, leg. RAYMOND.
DEI: 3 Syntypen, Taygetos, leg. RAYMOND, Coll. LETZNER-ROTTENBERG.

taygetanus HEYDEN, 1883 (*Zabrus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 27, 306—307)

♂ Holotypus, Griechenland, Taygeto, leg. RAYMOND; im DEI [Coll. v. HEYDEN].

taxianus BREIT, 1912 (*Anopthalmus*)

(Ent. Bl. 8, 210—211)

Mehrere Syntypen, Südungarn, obere Waldregion, Munte Sarco, leg. BREIT, KNIRSCH, TAX.
DEI: 3 Syntypen, Ungarn merid., Mt. Sarco, leg. BREIT.
Syn. zu *dacicus* FRIVALDSKY VON FRIVALD, 1883.

tenebrosus DEJEAN, 1929 (*Harpalus*)

(Spec. Gen. Coleopt. 4, 358—359)

Mehrere Syntypen, Frankreich, Spanien, Deutschland, Österreich, Dalmatien und Barbarie, Coll. DEJEAN.
DEI: 1 Syntypus, Jura, Coll. STIERLIN (Fundort ist nicht aufzufinden und stimmt mit der Originalbeschreibung nicht überein).

teodoroi GRIDELLI, 1930 (*Microdaccus*)

(Boll. Soc. Ent. Ital. 62, 63—65, Fig. 1—3)

Holotypus, Paratypen (ca. 30 Ex.); Insel Rodi, Broussali, 2 km v. d. Stadt Rodi entfernt, Sommer 1927, leg. TEODORO, im Museum Triest.
DEI: 1 Paratypus, Rodi, 1927, leg. TEODORO.

tetrastigma BATES, 1892 (*Amblystomus*)

(Ann. Mus. Genova (2) 12 (32), 334)

Mehrere Syntypen, Burma, Bhamò, Teinzò, Rangoon, Palon in Pegu; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Palon, Pegu, VIII. IX. 1887, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

theanus REITTER, 1895 (*Carabus*)

(Wien. Ent. Ztg. **14**, 110)

Mehrere Syntypen, Turkestan, Kulab, durch STAUDINGER & BANG-HAAS.
DEI: 4 Ex. OST-Buchara, Tschitschantan; 1 Ex. Prov. Kuliab, Ak-sou-Thal; Coll. HAUSER, 1898—Coll. LEONHARD: Syntypen.
[Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Kulab" steht auf dem Etikett „Kuliab".]

thomae SCHAUM, 1853 (*Panagaeus*)

(Ann. Soc. Ent. Fr. (3) **1**, 441)

Mehrere Syntypen, Insel Saint-Thomas, leg. MORITZ.
DEI: 1 Syntypus, St. Thomas, Coll. SCHAUM.
Syn. zu *quadrisignatus* CHEVROLAT, 1835.

thoracicus GERMAR, 1824 (*Carabus*)

(Ins. Spec. Nov., 8)

Mehrere Syntypen, Sibiria.
DEI: 1 Syntypus, Sibiria, Nr. 247.
Syn. zu *cribellatus* ADAMS, 1812.

thulensis SAHLBERG, 1885 (*Feronia*)

(Vega-Exped. Vetensk. Arb., 18)

Mehrere Syntypen, Tschuktsch-Halföns, Vega-Expet. von Halföns Norra und Östra Kust: Jrkajpi, 68° 55′, 179° 25°, 12. IX. 1878; Pitlekaj, 66° 30′—67° 10′, 174° 20′—173°, 28. IX. 1878/3. VII. 1879; Jinretlen, 66° 30′—67° 10′, 174° 20′ bis 173°, 22., 25. VI., 5.—7., 7., 12. VII. 1879.
DEI: 1 Syntypus, Terra Tschuchtschorum, Pitlekaj, Vega-Expet., Nr. 261, Coll. KRAATZ.

tibeticus hsifanicus SCHAUBERGER, 1932 (*Harpalus*)

(Wien. Ent. Ztg. **49**, 32—34)

Szetschuan: Holotypus, Kwanshien, mehrere Paratypen, Omisien, Sumpanting, Tatsienlu und Wassekou; leg. STÖTZNER, im Museum Dresden und in Coll. SCHAUBERGER.
DEI: Szetschuan: 1 Ex. Tatsienlu, Exp. STÖTZNER, 3 Ex. Wassuland, Chunghwa, 1 Ex. Nitou Tatsienlu; durch REITTER, Paratypen.

tieffenbachii SCHAUM, 1862 (*Pterostichus*)

(Berl. Ent. Ztschr. **6**, 106—107)

Mehrere Syntypen, Morea, leg. KRUEPER.
DEI: 1 Syntypus (Ex. verliehen, konnte nicht überprüft werden).
Syn. zu *rebellis* REICHE, 1855.

tigridis ANDREWES, 1927 (*Anchomenus*)

(Ent. Mitt. **16**, Nr. 2, 146—147)

♂ Holotypus, Irak, Qualat, Saleh Amara, 20. III. 1917, leg. BEESON, im Britischen Museum, 1 ♀, Paratypus, Basra, 14. IV. 1926, leg. SCHMIDT, im DEI.
DEI: 1 ♀, Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

tinctus STRANEO, 1940 (*Abacetus*)

(Mem. Soc. Ent. Ital. **19**, 171)

7 Ex. Alto Senegal, Badoumbé, leg. NODIER, via CLERMONT an STRANEO; mehrere Ex. Costa, d'Avorio, Leraba, leg. ALLUAUD: Paratypen, Holotypus, in Coll. STRANEO.
DEI: 1 Paratypus, Ht. Senegal, Badoumbé, leg. NODIER, Coll. CLERMONT-Coll. STRANEO.

torquata ANDREWES, 1930 (*Dolichoctis*)

(Ann. Mag. Nat. Hist. (10) **6**, 667)

Holotypus, 2 Paratypen, Sumatra, im DEI.
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Sumatra, Coll. KRAATZ.

trachys ANDREWES, 1929 (*Auchmerus*)

(Ann. Mus. Genova **53** (3) 13, 439—440)

Syntypen: 8 Ex. Sumatra, Si-Rambé, XII. 1890—III. 1891, leg. MODIGLIANI (2 Ex. im DEI); 1 Ex. Singapore, X. 1875, leg. D'ALBERTIS, im Museum Genoa.
DEI: 1 Syntypus, Sumatra, Si-Rambé, XII. 1890—III. 1891, leg. MODIGLIANI.

trachys ANDREWES, 1930 (*Clivina*)

(Ark. Zool. **21A**, 1—2)

Holotypus, 2 Ex. Sumatra, Medan und Tjinta Radja, leg. MJÖBERG, im Museum Stockholm; 1 Ex. Soekaranda, im Museum Stettin; 1 Ex. Sumatra, im DEI: Paratypen.
DEI: 1 ♀, Paratypus, Sumatra, Coll. KRAATZ.

transversalis SCHAUM, 1862 (*Stenolophus*)

(Berl. Ent. Ztschr. **6**, 111)

Mehrere Syntypen, nördl. Griechenland, leg. KRUEPER.
DEI: 1 Syntypus, Graecia.

trimaculata LIEBKE, 1930 (*Colliuris*)

(Mitt. Zool. Mus. Berl. **15**, 694—695)

Holotypus, Brasilien, St. Catharina, Joinville, leg. SCHMALZ, im Museum Berlin, 1 Ex. St. Catharina, Coll. FELSCHE, im Museum Dresden, 2 Ex. Rio de Janeiro, Iry, leg. BESCHKE, im Britischen Museum, 1 Ex. Brasilien, in Coll. ANDREWES, 1 Ex. Provinz Buenos Aires, leg. BRUCH, in Coll. BRUCH, Olivos, 4 Ex. Brasilien, Coll. KRAATZ, im DEI, 1 Ex. St. Catharina, im Museum Stettin: Paratypen.
DEI: 3 Paratypen, Brasilien, Coll. KRAATZ.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

tropica LIEBKE, 1934 (*Lebia*)

(Arb. morph. taxon. Ent. **1**, 276—277)

2 Syntypen, Brasilien, Coll. SCHAUM, im DEI.
DEI: 1 Syntypus, Brasilien, Coll. SCHAUM.

truncatum NIETNER, 1858 (*Bembidium*)

(Ann. Mag. Nat. Hist. (3) **2**, 421)

Mehrere Syntypen, Ceylon, prov. occid. varius.
DEI: 1 Syntypus Ceylon, Coll. GERMAR-SCHAUM. (Das 1 Ex. hat einen 2. Fundortzettel mit „Celebes".)

trybomi SAHLBERG, 1880 (*Amara*)

(Svensk. Vet. Acad. Handl. (2) **17**, nr. 4, 34, Taf. 1, Fig. 11)

Mehrere Syntypen, nordwest Sibirien, Tolstoinos, 27. VIII.—7. IX., leg. TRYBOM und SAHLBERG, zwischen Verschininsk und Dudinka, 27. VII., leg. TRYBOM; Exped. 1876—1877, im Museum Holm., Museum Helsingf., in Coll. HAGLUND, Coll. KRAATZ, Coll. SAHLBERG, etc.
DEI: 4 Syntypen, Tolstoinos, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *glacialis* MANNHEIMER, 1853.

undulipennis BATES, 1892 (*Colpodes*)

(Ann. Mus. Genova (2) **12** (32), 375)

Mehrere Syntypen, Burma, Bhamò, Katha; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Birmania, Bhamò, IX. 1886, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

unicolor EMDEN, 1937 (*Dolichoctis*)

(Arb. morph. taxon. Ent. **4**, 121—123)

Java: ♂ Holotypus, 1 ♂, 1 ♀, Kamodjan, V. 1935/IX. 1936, in Coll. v. EMDEN und im DEI; mehrere Ex. Preanger, G. Tangkoeban Prahoe, 4000—5000 ft., 7. VIII., XI. 1929; 2 ♂♂, Batoerraden, G. Slamat, 1.—12. IX. 1927/9. VII. 1929; leg. DRESCHER; in Coll. ANDREWES und Coll. DRESCHER: Paratypen.
DEI: 1 ♂, Paratypus, Preanger, Garoet Kamodjan, IX. 1936, leg. OVERBECK, Gesch. II. 1936 von OVERBECK.

urengaicus JUREČEK, 1924 (*Pterostichus*)

(Jub. Sborn. Čechosl. ent. Spol. 144, Figs.)

Mehrere Syntypen, Rußland, Ural merid., Gebirge Urengai, Prov. Orenburgensis, Katav-Ivanosvkij Zavod.
DEI: 1 Syntypus, Ural Katav, Urengai Mont.

urophthalmoides KULT, 1947 (*Clivina*)

(Čas. Čsl. Spol. Ent. **44**, 34—35)

Brasilia, Matto Grosso, Corumba, ca. 30 Ex.; Holotypus, Paratypen, in Coll. KULT, Coll. BÄNNINGER, im Museum Paris, Museum Brüssel, DEI, etc.
DEI: 1 Paratypus, Corumba, Matt. Grosso.

usambaranus BASILEWSKY, 1948 (*Anchomenus*)

(Mem. Soc. Ent. Belg. **25**, 63—64)

7 (♂♂, ♀♀) Syntypen, Tanganyika Territory, Usambara, ex Coll. KRAATZ, im DEI.
DEI: 1 Syntypus, Usambara, Coll. KRAATZ.

uzokensis OBENBERGER, 1922 (*Nebria*)

(Arch. Naturg. **82**, A 4, 9)

Mehrere Syntypen, Zentralkarpathen, Dorf Sugó, am Rande eines Karpathenbaches, V. 1915, leg. OBENBERGER.
DEI: 1 Syntypus, Užok. Carpathes o., Guerre, 1915, leg. OBENBERGER.
Syn. zu *brevicollis* FABRICIUS, 1792.

vagemaculata BREIT, 1914 (*Cymindis*)

(Koleopter. Rundsch. **3**, 57—58)

Mehrere Syntypen, Krim, Jaila-Gebirge, Anfang VI., leg. WINKLER und MOCZARSKI.
DEI: 1 Syntypus, Krim, Jaila-Gebirge, leg. MOCZARSKI, Coll. LEONHARD.

validus SCHAUM, 1862 (*Zabrus*)

(Berl. Ent. Ztschr. **6**, 107—108)

Mehrere Syntypen, nördl. Griechenland, leg. KRUEPER.
DEI: 3 Syntypen, Graecia bor., Coll. SCHAUM.

vandykei DARLINGTON, 1930 (*Nebria*)

(Psyche, **37**, 104—105)

♂ Holotypus und 1 Ex., Mount Rainer, Washington, nahe Paradise Valley, 6000 ft., 13., 18. VII. 1927, leg. DARLINGTON, in Coll. DARLINGTON; mehrere Ex. dto., 13.—20. VII. 1927: Paratypen.
DEI: 2 Paratypen, Mount Rainer, Washington, 13. VII. 1927, leg. DARLINGTON.

van emdeni SCHAUBERGER, 1932 (*Harpalus*)

(Wien. Ent. Ztg. **49**, 34—36)

Holotypus, mehrere Paratypen, China, Peking, leg. STÖTZNER, im Museum Dresden, in Coll. STAUDINGER & BANG-HAAS, Coll. SCHAUBERGER, Coll. ANDREWES und Coll. JEDLIČKA.
DEI: 1 Ex. China, Peking, 2 Ex. Peking, Westberg, Exp. STÖTZNER: Paratypen.

variabilis ANDREWES, 1929 (*Dyschirius*)

(Faun. Brit. Ind. Coleopt. Carab. **1**, 393, 405)

Bengal: Calcutta, leg. GRAVELY, im Indischen Museum; Sardah, leg. CHAMPION; United Provinces: West Almora, Ranikhet, Haldwani, Sitapur, leg. CHAMPION; Dehra Dun, leg. CAMERON; mehrere Paratypen, Holotypus, im Britischen Museum.
DEI: 1 Paratypus, India, Haldwani Dist., Kumaon, leg. CHAMPION.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

vegetus ANDREWES, 1924 (*Mastax*)

(Miss. Babault, Prov. Centr. Inde, Carab. 110–111, Taf. 4, Fig. 5)

Indien, occ. Himalaya, 1914, Syntypen: mehrere Ex. Bajaura, Kangra distr., leg. BABAULT; mehrere Ex. Provinces Unies, Kumaon, W. Almora, leg. CHAMPION, 1 Ex. Nainital distr. Jalaban, im Indischen Museum, 2 Ex. Kumaon, Khairna und Phanduwala, im Forest Res. Inst. Dehra Dun; mehrere Ex. Sikkim, Great Raajit Valley, Badantam, 2500 ft., Tista Bridge, 710 ft., Tista Valley, Birik, 625 ft., am Fluß Tista, leg. STEVENS.
DEI: 3 Syntypen, Br. Sikkim, Gopaldhara, leg. STEVENS (1 Ex. sehr schlecht erhalten).

vilcanota LIEBKE, 1934 (*Lebia*)

(Arb. morph. taxon. Ent. **1**, 276)

2 Syntypen, Peru, Vilcanota, Coll. KRAATZ, im DEI.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

vilcanotanus BÄNNINGER, 1931 (*Taeniolobus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. **4**, 198–199)

♂ Holotypus, Peru, Vilcanota, 1 ♀, 1 Ex. dto., 1 ♂, ex Coll. BOILEAU, ohne Fundort, wahrscheinlich von STAUDINGER; im DEI, und in Coll. BÄNNINGER; Paratypen.
DEI: ♂ Holotypus, 1 ♀, Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

villae KRAATZ, 1858 (*Percus*)

(Wien. Ent. Monatsch. **2**, 164)

Mehrere Syntypen; Piemont; Colombel, leg. KRAATZ; an den Quellen der Trebia, leg. SPINOLA, im Museum Berlin.
DEI: 1 Syntypus, Pedemont, Coll. KRAATZ.
[Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Piemont", steht auf dem Etikett „Pedemont".]

violacea SLOANE, 1907 (*Loxocara*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 181)

Holotypus, New Guinea, Kaiser Wilhelm Land, Sattelberg, leg. v. BENNIGSEN, in Coll. HORN; im DEI.

viridanus staudingerianus SCHAUBERGER, 1932 (*Harpalus*)

(Wien. Ent. Ztg. **49**, 42–44)

50 Syntypen, Westchina, Min-tschou, ex Coll. STAUDINGER & BANG-HAAS.
DEI: 1 Syntypus, China, Minchow.
[Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Min-tschou" steht auf dem Etikett „Minchow".]

viridescens REITTER, 1887 (*Agonum*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. **31**, 256)

Mehrere Syntypen, Attica, leg. EMGE.
DEI: 3 Syntypen, Attica, leg. EMGE, Coll. BRENSKE-Coll. FRANKLIN MÜLLER.
Syn. zu *extensum* MÉNÉTRIÉS, 1849.

viridicollis KRAATZ, 1886 (*Eutelocarabus*)

(l.c. **30**, 263)

Mehrere Syntypen, Suyfun-Mündung, leg. DÖRRIES, Amur, leg. CHRISTOPH; via STAUDINGER an KRAATZ.
DEI: 1 Ex. ohne Fundort, 2 Ex. Suyfun; Coll. KRAATZ, Syntypen.
Syn. zu *billbergi* MANNHEIMER, 1827.

viridipennis BLEUZE, 1896 (*Carabus*)

(Misc. Ent. **4**, 19)

Mehrere Syntypen, forêts des Côtes du Nord und du Finistére.
DEI: 1 Syntypus, Forêt de Lorges, Côtes du Nord, durch BLEUZE, Coll. LEONHARD.
Syn. zu *auronitens* FABRICIUS, 1792.

viridis ANDREWES, 1933 (*Stilboma*)

(Ann. Mag. Nat. Hist. (10) **11**, 410)

♂ Holotypus, Sumatra; im DEI [Coll. KRAATZ].

viridissimus KRAATZ, 1876 (*Procerus*)

(Bull. Soc. Nat. Mosc. **51**, 139, 143)

3 Syntypen, Krim, via KRETSCHMAR an KRAATZ mitgeteilt; im DEI [Coll. KRAATZ].
Syn. zu *scabrosus* OLIVIER, 1795.

viriditinctus SCHAUBERGER, 1938 (*Acupalpus*)

(Arb. morph. taxon. Ent. **5**, 49–50)

Holotypus, Java, Semarang, in Coll. SCHAUBERGER, 2 Ex. dto., 2 Ex. Tjilatjap; 1 Ex. Vorderindien, Calcutta; 1 Ex. Hinterindien, Kambodja, leg. FRIEDERICHS; 1 Ex. Sumatra, ohne nähere Angabe: Paratypen, in Coll. SCHAUBERGER und im DEI.
DEI: 1 Ex. Semarang, leg. DRESCHER, 1 Ex. Kambodja, leg. FRIEDERICHS: Paratypen.

vittatus BAUDI, 1864 (*Blechrus*)

(Berl. Ent. Ztschr. **8**, 203; nom. praeocc. = *baudi* FAIRMAIRE, 1892, Rev. d'Ent. 84)

Mehrere Syntypen, Cypern.
DEI: 1 Syntypus, Cypern, Coll. KRAATZ.

vranensis BREIT, 1904 (*Trechus*)

(Münch. Kol. Ztschr. **2**, 28–29)

4 Syntypen, Herzegovina, Höhle des Vran-Gebirges, via v. BACHOFEN an BREIT.
DEI: 1 Syntypus, Herzegovina, Vran-plania, Coll. LEONHARD.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

vulcanicum DARLINGTON, 1934 (*Bembidion*)

(Occ. Pap. Boston, Soc. Nat. Hist. 8, 157—158)

♂ Holotypus, M.C.Z. no. 19.625, Südabhang, Vulkan, Irazú, 2800—3000 m, 15. I. 1926, leg. NEVERMANN, 12 Paratypen dto., in M.C.Z. und Coll. NEVERMANN.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

walteri REITTER, 1883 (*Pterostichus*)

(Wien. Ent. Ztg. 2, 224)

5 ♂♂, Syntypen, Montenegro, unfern der dalmatinischen Grenze, leg. WALTER.
DEI: 1 Syntypus, Dalmatien, Coll. FRANKLIN MÜLLER.

waltheri BASILEWSKY, 1932 (*Stictotefflus*)

(Ent. Bl. 28, 22)

D.O. Afrika: ♀ Holotypus, Songea, leg. v. BENNIGSEN; mehrere Paratypen, Upangwa, Lukuledi, Barikiwa (Donde-Gebiet); Zambezie; im Museum Stockholm, Museum Hamburg und in Coll. BASILEWSKY.
DEI: ♀ Holotypus, D.O. Afrika, Songea, leg. v. BENNIGSEN, Coll. v. BENNIGSEN.

whithillii HOPE, 1938 (*Catascopus*)

(The Coleopt. Manual, 164—165, Taf. 3, Fig. 2)

Mehrere Syntypen, Darpouillie.
DEI: 1 Syntypus, Ind. bor., Coll. SCHAUM.
[Der Fundort Darpouillie ist nicht aufzufinden!]

xanthochiton ANDREWES, 1922 (*Bembidium*)

(Ent. Monthly Mag. (3) 8 (58), 176—177)

Sikkim: Holotypus, Gopaldhara, in Coll. ANDREWES; Rangit Valley; leg. STEVENS; United Provinces: Kumaon, Upper Gumti Valley, Ranikhet, W. Almora, leg. CHAMPION; Mussoorie, Mossy Falls, Kemti Falls, leg. CAMERON, im For. Res. Inst.; Punjab: Simla Hills, Theog, 7600 ft., leg. CHATTERJEE, im For. Res. Inst.; mehrere Ex.; 1 Ex. Yunnan-fou, in Coll. ANDREWES: Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, Kumaon, Ranikhet, leg. CHAMPION.

zebii SCHAUM, 1857 (*Feronia*)

(Berl. Ent. Ztschr. 1, 140)

Mehrere Syntypen, Creta, leg. ZEBE.
DEI: 1 Syntypus (Ex. verliehen, konnte nicht überprüft werden).
Syn. zu *creticus* FRIVALDSZKY, 1845.

ziegleri KRAATZ, 1883 (*Carabus*)

(Cat. Col. Europ., 5)

Mehrere Syntypen, Italia borealis.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, Coll. KRAATZ, ex Mus. Vien.
Syn. zu *cancellatus* ILLIGER, 1798.

zimmermanni PUTZEY, 1875 (*Amara*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. 18, Compt. rendus, 51)

Mehrere Syntypen, Japan, Nagasaki, 20. IV. 1874, Kioto, 7. V.—11. VI. 1874; leg. v. VOLXEM.
DEI: 2 Syntypen, ohne Fundort, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *chalcites* DEJEAN, 1828.

Wahrscheinlich nicht beschriebene Arten:

alexanderi HEYDEN (*Callisthenes*)

DEI: 1 Type, Alexander-Gebirge, Coll. KRAATZ.

alpestris pedemontanus SCHWEIGER (*Trichotichnus*)

DEI: 5 Typen; Brenta, Coll. KRAATZ; Ct. Tessin Val Canaria, Coll. WAGNER.

andrewesi VAN EMDEN (*Taridius*)

DEI: 1 Type, O-Java, Tengger, Nonkodjadjar.

biguttatus MOTSCHULSKY (*Lachnophorus*)

DEI: 1 Type, Columbia (Mndrstrn?), Coll. v. HEYDEN.

bodoanus REITTER (*Amara*)

DEI: 1 Type, Ost-Sibirien, Schilka-Gebirge, leg. v. BODEMEYER, Coll. LEONHARD.

caesius BREIT (*Brachynus*)

DEI: 2 Typen, S. W. Thibet, Po-o, Coll. LEONHARD.

chalcopterus SCHAUM (*Catascopus*)

DEI: 1 Type, Penang, Coll. SCHAUM.

conradti ALLUAUD (*Coptoderina*)

DEI: 1 Type, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

conradti ALLUAUD (*Tachys*)

DEI: 2 Typen, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

corrusca DEJEAN (*Callida*)

DEI: 1 Type, Nov. Gran.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

dalmatinus grebcensis WINKLER (*Neotrechus*)
DEI: 1 Type, Kali pečina bei Grebči.

darlingtoni JEDLIČKA (*Clivina*)
DEI: 1 Type, Nose, Osaka, Coll. KULT.

dives guadaramensis WAGNER (*Chlaenius*)
DEI: 3 Ex. Hispania, Coll. KRAATZ; 1 Ex. La Granja, leg. BRUCK, Coll. v. HEYDEN: Typen.

dives kricheldorffi WAGNER (*Chlaenius*)
DEI: Asturien, Typen: 1 Ex. Puerto Pajares, leg. KRICHELDORFF, Coll. KRAATZ; 1 Ex. Getschnn., 1879, Coll. v. HEYDEN.

dyscolus ALLUAUD (*Thyreopterinus*)
DEI: 1 Type, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

expansus REITTER (*Pterostichus*)
DEI: 1 Type, Juldus, Kulascha, Coll. KRAATZ.

fasciolatum merditanum APFELBECK (*Bembidion*)
DEI: 2 Typen, Alb., Oroši.

favanus SCHAUM (*Rembus*)
DEI: 1 Type, Java.

flavipalpis SAHLBERG (*Pterostichus*)
DEI: 2 Typen, Dudinska, Tolstoinas, durch SAHLBERG, Coll. KRAATZ.

guttatus SCHAUFUSS (*Abacetus*)
DEI: 1 Type, Afrika, Habab, Coll. KRAATZ.

hyalinus ANDREWES, (*Tachys*)
DEI: 5 Typen, Ceylon, Nalanda, 1899, leg. HORN.

incertus SCHAUM? (*Pericalus*)
DEI: 1 Type, Sing., Coll. KRAATZ.

iridescens POPP (*Pterostichus*)
DEI: 1 Type, Schigansk, Lena inter., durch POPPIUS, Coll. LEONHARD, Mus. Zool. H: fors.

irregularis ottomanus APFELBECK (*Pseudocechenus*)
DEI: 2 Typen, Bosnien, Vereš, durch APFELBECK.

juldussana REITTER (*Amara*)
DEI: 1 Type, Seminitschye, Prysewaski, durch v. BODEMEYER, Coll. LEONHARD.

kodymi KULT (*Clivina*)
DEI: 1 Type, La Caja, 8 km w. San José, C.R., 1934, leg. SCHMIDT.

koltzei REITTER (*Sphodrus*)
DEI: 2 Typen, Lappland, Tokmats, Coll. KOLTZE.

laevicollis transalpinus SCHWEIGER (*Harpaliscus*)
DEI: 1 Type, Bosnia, Kosicna, Coll. LEONHARD.

laevigatus venetus GRIDELLI (*Scarites*?)
DEI: 2 Typen, Lit. Albeconi, 15. VII. 1933, Venecia, durch GRIDELLI.

mandli JEDLIČKA (*Graniger*)
DEI: 1 Type, Uferwiesen der Dschaz Morian-Senke, 31. III. 1950, leg. LÖFFLER, Iran-Exped.

mesotincta LIEBKE (*Callida*)
DEI: 2 Typen, Paraguay, Hohenau, 5., 23. IX. 1937, leg. JACOB, Nr. 1752.

minima JEDLIČKA (*Rembus*)
DEI: 2 Typen, China, Szechuan, Nitou Tatsienlu, durch REITTER.

minor ALLUAUD (*Parastrigia*)
DEI: 1 Type, Moa, Coll. v. BENNIGSEN.

nebrioides POPP (*Pterostichus*)
DEI: 1 Type, Lena arct., Bulun, durch POPPIUS, Coll. LEONHARD, Mus. Zool. H: fors.

netolitzkyi DUPUIS (*Tachys*)
DEI: 13 Typen, Formosa, Akau, XII. 1907, leg. SAUTER.

nigrina KRAATZ (*Siagona*)
DEI: 2 Typen, Aegypten, Coll. KRAATZ.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

partita LECORDIER (*Siagona*)
DEI: 1 Type, Rhodesia, leg. BODONG, Coll. KRAATZ.

parvispinus REITTER (*Pseudotophoxenus*)
DEI: 1 Type, Juldus, Kuldscha.

phila KOLBE (*Eccoptoptera*)
DEI: 1 Type, N.-Nyassa-See, Usafua, Beya-Berg, Sangwe-Fl., 9. VI. 1899, leg. GOETZE, Coll. KRAATZ.

platensis KULT (*Reicheia*)
DEI: 1 Type, ARG-La Plata, Rio Santiago, durch WEISER.

politus pseudinitidus WAGNER (*Dyschirius*)
DEI: 1 Type, Transcaspien, Merw, V. 1900, Coll. HAUSER.

polonicum MAKOLSKY (*Bembidion*)
DEI: 1 Type, Warszawa, Baniocha.

plaumanni LIEBKE (*Callida*)
DEI: 1 Typus, Paraguay, Hohenau, 29. IX. 1935, leg. JACOB, Nr. 1907.

priapus bulgaricus MEIXNER (*Trechus*)
DEI: 1 Ex. Bulgaria, Sofia, Vkosa pl., 30. V. 1908, leg. RAMBOUSEK, 1 Ex. Rila Geb., 15. VII. 1911, Coll. LEONHARD, Typen.

priapus rhodopensis MEIXNER (*Trechus*)
DEI: 2 Ex. Bulg. Rhodope Geb., 27. VIII. 1911, 2 Ex. dto. Xuchia Tschan, 8. VIII. 1911, 2 Ex. Bulg. Rila Kloster, 10. VII. 1911, 1 Ex. Bulg. Tschamkorija, 13. VI. 1911; leg. HILF, Coll. LEONHARD, Typen.

pseudarchangelicum REITTER (*Agonum*)
DEI: 1 Type, Karagatan.

pusillus DANIEL (*Aptinus*)
DEI: 1 Type, Asia-minor, Goek-Dagh, leg. v. BODEMEYER.

rugatifrons bänningeri KULT (*Mesus*)
DEI: 1 Type, Paraguay, S. Antonio, Staz. Ent. Fabre.

sauteri LIEBKE (*Colliuris*)
DEI: 1 Type, Chikutobi, V. 1911, leg. SAUTER.

simplex SCHAUM (*Tachys*)
DEI: 1 Type, Celebes, Coll. GERMAR-SCHAUM.

superba ZOLOTAREW (*Nebria*)
DEI: 1 Type, Kaukasus centr. bor., Kluchov, 1912.

suturalis ALLUAUD (*Polyaulacus*)
DEI: 1 Type, Usambara, leg. WEISE, Coll. KRAATZ.

tardiformis REITTER (*Harpalus*)
DEI: 1 Type, Quellgebiet des Irkut, Nr. 586, Coll. KOLTZE.

violaceus salisburgensis KRAATZ (*Megadontus*)
DEI: 2 Typen, Salzburg, Coll. KRAATZ.

virgulifera CHAUDOIR (*Lebia*)
DEI: 1 Type, Brasil, Coll. SCHAUM.

weiratherianus SCHAUBERGER (*Harpalus*)
DEI: 1 Type, Galatien-Phrygien, Emir-Dagh-Gbg. Asm. c. leg. WEIRATHER, Innsbruck.

yunnanus SEMENOW (*Broscus*)
DEI: 2 Typen, China, Prov. Szechuan, Gbg. b. Ningyuenfu.

Zusammenfassung

Für die in den Sammlungen des ehemaligen Deutschen Entomologischen Instituts befindlichen Typenexemplare der Käferfamilie Carabidae wird ein Katalog veröffentlicht.

Summary

A catalogue of the type specimens of the family Carabidae in the collections of the former Deutsches Entomologisches Institut is published.

Резюме

Публикуется каталог типовых экземпляров семейства Carabidae, находящихся в коллекциях бывшего Германского Энтомологического Института.

DOI: 10.21248/contrib.entomol.25.1.99-150

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Beiträge zur Entomologie = Contributions to Entomology

Jahr/Year: 1975

Band/Volume: 25

Autor(en)/Author(s): Döbler Helga

Artikel/Article: Katalog der in den Sammlungen des ehemaligen Deutschen Entomologischen Institutes aufbewahrten Typen - XII (Coleoptera: Carabidae). 99-150