

Institut für Pflanzenschutzforschung
der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR zu Berlin
Bereich Eberswalde
Abteilung Taxonomie der Insekten
Eberswalde-Finow (DDR)

HELGA DÖBLER

Katalog der in den Sammlungen
der Abteilung Taxonomie der Insekten
des Institutes für Pflanzenschutzforschung,
Bereich Eberswalde
(ehemals Deutsches Entomologisches Institut),
aufbewahrten Typen — XX

(Coleoptera: Lycidae, Lampyridae, Cantharidae, Phengodidae, Drilidae,
Malachiidae, Karumiidae, Dasytidae, Melyridae, Cleridae, Lymexylonidae,
Derodontidae)

Lycidae

abjectus KLEINE, 1926 (*Dihammatus*)
(Philipp. Journ. Sc. 31, Nr. 1, 69–70, Taf. 2, Fig. 54, 55)

Mehrere Ex.: Luzon, Provinz Laguna, Mount Banahao, 2000 ft., leg. BAKER und BÖTTCHER; Mount Maquiling, leg. BAKER; San Miguel, Provinz Samar; Mindoro, Calapan; leg. BÖTTCHER; Holotypus, Paratypen, im Museum Dresden und in Coll. KLEINE.

DEI: 1 Paratypus, Luzon, Mt. Banahao.

abnormis KLEINE, 1926 (*Dilophotes*)
(l.c., 75–76, Taf. 3, Fig. 12–14)

42 ♂♂, 20 ♀♀, Syntypen, Luzon, Mount Banahao, Provinz Bataan, Mount Limay, Subprovinz Benguet, Baguio; leg. BAKER; Subprovinz Amburayan, Butac, 1400 m, leg. BÖTTCHER; Mindanao, Provinz Surigao, Surigao, Provinz Lanao, Kolambugan, leg. BAKER; Momungan, leg. BÖTTCHER; Sibuyan; Negros, Cuernos Gebirge; leg. BAKER; in Coll. KLEINE.

DEI: Syntypen, Luzon; 2 Ex. Surigao, 1 Ex. Amburayan.

absonus KLEINE, 1926 (*Trichalus*)
(l.c., 108, Taf. 4, Fig. 45, 46)

20 Syntypen; Luzon, Provinz Laguna, Mount Maquiling, Los Baños, leg. BAKER; Provinz Bataan, Lamao, leg. SCHULTZE und BÖTTCHER; Provinz Nueva Vizcaya, Imugan, 4000 ft.; Mindoro, Calapan, Masbate, Aroroy; leg. BÖTTCHER; Sibuyan; Panay; Negros, Cuernos Gebirge; leg. BAKER; in Coll. KLEINE.

DEI: 1 Syntypus, Luzon, Mt. Makiline, leg. BAKER.

Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Mount Maquiling“ steht auf dem Etikett „Mt. Makiline“.

acerbus KLEINE, 1925 (*Leptotrichalus*)
(l.c. 28, Nr. 2, 303–304, Taf. 1, Fig. 9, 11, 12)

Philippinen, Imugan, Provinz Nueva Vizcaya, Luzon, leg. BAKER; ♂ Holotypus, im Museum Dresden, 27 Paratypen, in Coll. KLEINE und Coll. BAKER.

DEI: Paratypen, Luzon: 2 Ex. Mt. Banabas, 1 Ex. Imugan, 1 Ex. Lubwagan.

acutus KLEINE, 1925 (*Leptotrichalus*)
(l.c., 302–303, Taf. 1, Fig. 10, Taf. 2, Fig. 9)

1 ♂, 3 ♀♀, Philippinen, Los Baños, Mount Maquiling, Provinz Laguna, Luzon, Mount Banahao, leg. BAKER; Holotypus, Paratypen, im Museum Dresden und in Coll. KLEINE.

DEI: 1 ♀, Paratypus, Luzon, Mt. Banahao.

adjunctus KLEINE, 1925 (*Leptotrichalus*)
(l.c., 307–308, Taf. 1, Fig. 18, Taf. 2, Fig. 17)

10 Syntypen, Philippinen, Mount Banahao, Luzon, Baguio, Provinz Benguet, Sibuyan, leg. BAKER, im Museum Dresden.

DEI: 1 Syntypus, Luzon, Imugan.

adventicius KLEINE, 1926 (*Bulenides*)
(l.c. 31, Nr. 1, 84—85, Taf. 3, Fig. 36)

24 ♂♂, 18 ♀♀, Syntypen: Mindanao, Provinz Surigao, Surigao, leg. BAKER, BÖTTCHER, Provinz Lanao, Kolambugan, Iligan, leg. BAKER, Momungan, leg. BÖTTCHER; Panaon, leg. BÖTTCHER: in Coll. KLEINE.
DEI: 2 Syntypen, Mindanao, Momungan.

adversarius KLEINE, 1925 (*Leptotrichalus*)
(l.c. 28, Nr. 2, 299, 301—302, Taf. 2, Fig. 5, 6)

Holotypus, Sumatra, im DEI [Coll. KRAATZ].¹

afflictus KLEINE, 1926 (*Ditoneces*)
(l.c. 31, Nr. 1, 61—62, Taf. 2, Fig. 21)

ca. 100 Syntypen: Luzon, Provinz Laguna, Mount Maquiling; Mindanao, Provinz Davao, Davao, Provinz Surigao, Surigao, Provinz Bukidnon, Tangkulan, Provinz Agusan, Butuan, Provinz Lanao, Kolambugan, Iligan, Provinz Zamboangan Dapitan; Negros, Cuernos Gebirge; Samar; leg. BAKER; Mindoro, Calapan; Mindanao, Momungan; leg. BÖTTCHER: in Coll. KLEINE.

DEI: 1 Syntypus, Luzon, Mt. Bulavan.

amicus KLEINE, 1929 (*Trichalus*)
(Treubia 10, 477, Fig. 9, 68)

Syntypen, Nord-Queensland: 1 ♂, Cairns, leg. HACKER, im DEI, 1 ♀, Kuranda, leg. BRYANT, im Britischen Museum.
DEI: 1 ♂, Syntypus, Cairns, leg. HACKER, Coll. HACKER.

amoenus KLEINE, 1929 (*Trichalus*)
(l.c., 479, Fig. 10)

1 ♂, 4 ♀♀, Syntypen, Nord-Queensland, Kuranda, leg. BRYANT, im Britischen Museum und DEI.
DEI: 1 ♀, Syntypus, Kuranda, leg. HACKER, Coll. HACKER.

angustus KLEINE, 1929 (*Trichalus*)
(l.c., 480, Fig. 17, 32)

Mehrere Syntypen, Queensland.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, Coll. HACKER.

animosus KLEINE, 1929 (*Trichalus*)
(l.c., 477, Fig. 31, 66, 71)

Mehrere Syntypen, Australien, ex Coll. KRAATZ, im DEI.
DEI: 1 Syntypus, Australien, Coll. KRAATZ.

apparatus KLEINE, 1929 (*Trichalus*)
(l.c., 481, Fig. 19, 20, 23, 77)

Mehrere Syntypen, Queensland, Coen Distr., Cape York, Cooktown, leg. HACKER, im DEI.

DEI: 2 Ex. Cooktown, 8 Ex. Queensland, Coen Distr., Cape York; leg. HACKER, Coll. HACKER, Syntypen.

atricollis KRAATZ, 1879 (*Dictyoptera*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 23, 125)

♀ Holotypus, Amur.

DEI: Der Holotypus ist verloren gegangen!

atricollis PIC, 1926 (*Dilophotes*)
(Ent. Mitt. 15, 68)

Holotypus, Formosa, leg. SAUTER, im DEI [Kosempo, 22. V. 1912].

bakeri KLEINE, 1926 (*Metanoeus*)
(Philipp. Journ. Sc. 31, Nr. 1, 99—100, Taf. 4, Fig. 38, 39)

70 ♂♂, 18 ♀♀, Luzon: Provinz Laguna, Mount Maquiling, Los Baños; Subprovinz Benguet, Baguio; leg. BAKER; Subprovinz Bontoc, Mount Polis, 2400 ft.; Subprovinz Kalinga, Balbalasan, 4000—5000 ft.; Provinz Sorsogon, Mount Bulusan; leg. BÖTTCHER; Mindanao: Provinz Agusan, Butuan; Iligan; Provinz Zamboanga, Zamboanga; Dapitan; Provinz Davao, Davao; leg. BAKER; Provinz Lanao, Kolambugan; Provinz Surigao, Surigao; leg. BAKER, BÖTTCHER; Momungan, Port Banga, leg. BÖTTCHER; Negros: Cuernos Gebirge, leg. BAKER; Basilan, leg. BAKER, BÖTTCHER; Dinagat, Leyte, Burauen, Santa Cruz, leg. BÖTTCHER: in Coll. KLEINE, Syntypen.

DEI: 2 Syntypen, Surigao.

bardus KLEINE, 1926 (*Libnetis*)
(l.c., 72—73, Taf. 3, Fig. 1—3)

2 ♂♂, 2 ♀♀, Syntypen: Luzon, Subprovinz Benguet, Baguio, leg. BAKER; Pauai, Haight's Place, leg. BÖTTCHER: in Coll. KLEINE.

DEI: 1 Syntypus, Luzon, Haightplace.

böttcheri KLEINE, 1926 (*Metriorrhynchus*)
(l.c., 80—81, Taf. 3, Fig. 25, 26)

13 ♂♂, 11 ♀♀, Syntypen, Luzon, Provinz Nueva Vizcaya, Imugan, 4000 ft., leg. BÖTTCHER, in Coll. KLEINE.

DEI: 1 Syntypus, Luzon, Imugan.

brevis KLEINE, 1926 (*Xylobanus*)
(l.c., 91—92, Taf. 4, Fig. 6—8)

21 Syntypen: Luzon, Provinz Laguna, Mount Maquiling, leg. BAKER; Los Baños, leg. VILLEGAS; Mindanao, Provinz Lanao, Kolambugan; Iligan, Provinz Surigao, Surigao; leg. BAKER; Provinz Zamboanga, Port Banga, leg. BÖTTCHER; Negros, Cuernos Gebirge; Samar; leg. BAKER: in Coll. KLEINE.

DEI: 1 Syntypus, Mindanao, Momungan.

¹ In [] wurden die Angaben gesetzt, die sich auf den Etiketten befanden, in der Originalbeschreibung aber fehlten.

camerunus KLEINE, 1930 (*Xylobanus*)
(Rev. Zool. Bot. Afr. 19, 175–176, Fig. 7–10)

Mehrere Syntypen, Kamerun: Mundame, leg. ROHDE; Joh. Albrechtshöhe, leg. CONRADT; Sierra Leone, Njala, X. 1926, leg. HARGREAVES; Gold Coast, Aburi, 1912–13, leg. PATTERSON; Belg. Congo: Ituri, La Moto, Madyu, leg. BURGEON; Kindu, leg. BURGEON; Kibombo, 2.–11. X., leg. BEQUAERT; Seke, 26. VI. 1911, Eala, IX. 1912, leg. MAYNÉ; Kasai, Ngombe, 14. XI. 1921, leg. SCHOUTEDEN; Stanleyville à Kilo, leg. BURGEON; Kikwit, XI. 1920, Kisantu, leg. VANDERIJST; Mayumba, Tshela, 30. III. 1924, Tshenge-Kwimba, 4. X. 1924, leg. COLLART; Région de Sassa, leg. SAGONA; Beni, leg. BONNEVIE; Bas-Uelé, Koteli, I. 1925, Arebi, Mondo-Mabé, 25.–28. VII. 1925, leg. SCHOUTEDEN; Congo da Lemba, leg. MAYNÉ; Ukaika-Mawambi, leg. GRAUER; Ituri, Medje, IV. 1914, leg. CHRISTY; Mayumbe, Makaia N'Tete-Tuevo, 25. XI. 1915, Ganda-Sundi, VII. 1911, leg. MAYNÉ; Kasai, Ipamu, leg. VANDERIJST; Sandoa, I. XI. 1920, leg. OVERLAET; Haut-Uelé, Moto, II.–III. 1923, leg. BURGEON.

DEI: Syntypen, Kamerun, Coll. KRAATZ: 11 Ex. Mundame, leg. ROHDE, 4 Ex. Johann-Albrechtshöhe, 1896, leg. CONRADT.

captiosus KLEINE, 1927 (*Xylobanus*)
(Treubia 9, 303–304)

♀ Holotypus, Java, G. Papandajan, leg. DRESCHER und FRUHSTORFER, im DEI [Coll. KRAATZ].

castigatus KLEINE, 1927 (*Xylobanus*)
(l.c., 304–305)

♀ Holotypus, Sumatra, Coll. KRAATZ, im DEI.

cereus KLEINE, 1925 (*Leptotrichalus*)
(Philipp. Journ. Sc. 28, Nr. 2, 301, Taf. 2, Fig. 4)

4 ♂♂, Syntypen, Philippinen, Mindanao, Butuan, Surigao, Kolambugan, leg. BAKER.
DEI: 1 Syntypus, Mindanao, Momungan.

circumscriptus KLEINE, 1925 (*Leptotrichalus*)
(l.c., 307, Taf. 1, Fig. 17, Taf. 2, Fig. 15)

1 ♂, 5 ♀♀, Syntypen, Philippinen, Surigao, Mindanao, Butuan, leg. BAKER, in Coll. KLEINE.
DEI: 2 ♀♀, Syntypen, Surigao.

cognatus KLEINE, 1926 (*Metanoëus*)
(l.c. 31, Nr. 1, 100, Taf. 4, Fig. 40)

14 ♂♂, 14 ♀♀, Syntypen; Mindanao, Provinz Lanao, Kolambugan; Sibuyan; Negros, Cuernos Gebirge; Nordwest Panay; leg. BAKER, in Coll. KLEINE.
DEI: 1 Syntypus, Island Sibuyan, leg. BAKER.

commendabilis KLEINE, 1926 (*Libnetis*)
(l.c., 71–72, Taf. 2, Fig. 58–60)

ca. 200 Syntypen: Luzon; Mount Banahao, 2000 ft., Provinz Camarines Sur, Mount Isarog, 4000 ft., Provinz Sorsogon, Mount Bulusan, Provinz Nueva Vizcaya, Imugan, 4000 ft., Subprovinz Kalinga, Lubugan; leg. BÖTTCHER; Provinz Laguna, Mount Maquiling, Los Baños; Mindanao; Provinz Lanao, Iligan, Provinz Zamboanga, Zamboanga; leg. BAKER, in Coll. KLEINE.

DEI: 1 Syntypus, Luzon, Imugan.

confertus KLEINE, 1926 (*Protaphes*)
(Sarawak Museum Journ. 3, 364, Fig. 1–3)

3 ♂♂, 3 ♀♀, Syntypen, Philippinen, Surigao, Mindanao, Butuan, Iligan, Coll. BAKER, in Coll. KLEINE.
DEI: 1 Syntypus, Mindoro.

conradti KLEINE, 1926 (*Cautires*)
(Arch. Naturg. 92, A 12, 132, Taf. 2, Fig. 56, 57)

1 ♂, 2 ♀♀, Syntypen, Kamerun, Mundame, leg. ROHDE, CONRADT, im DEI.
DEI: 2 Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

consociatus KLEINE, 1926 (*Xylobanus*)
(Philipp. Journ. Sc. 31, Nr. 1, 97, Taf. 4, Fig. 33, 34)

Mehrere ♀♀, Syntypen: Luzon, Provinz Bataan, Lamao, leg. BÖTTCHER; Mindanao, Provinz Agusan, Butuan, leg. BAKER; Mindoro, Calapan, leg. BÖTTCHER; in Coll. KLEINE.
DEI: 1 Syntypus, Luzon, Lubwagan.

conveniens KLEINE, 1926 (*Calochromus*)
(l.c., 41–42, Taf. 1, Fig. 3–8)

ca. 100 Syntypen; Luzon: Provinz Laguna, Mount Maquiling; Mount Banahao; Provinz Rizal, Montalban; Provinz Nueva Vizcaya, Imugan, 4000 ft.; Bayombong, 1000 ft.; Provinz Camarines Sur, Mount Isarog, 4000 ft.; Provinz Bataan, Limay; leg. BÖTTCHER; Sibuyan; leg. BÖTTCHER; Panaon, leg. BÖTTCHER; Negros, leg. BÖTTCHER; Cuernos Gebirge, leg. BAKER; Nakalang, leg. BANKS; Mindanao: Provinz Surigao, Surigao, leg. BAKER, BÖTTCHER; Provinz Lanao, Iligan, leg. BAKER; Kolambugan, leg. BAKER, BÖTTCHER; Momungan, leg. BÖTTCHER; Provinz Zamboanga, Dapitan, leg. BAKER; Port Banga, leg. BÖTTCHER; Provinz Agusan, Butuan, leg. BAKER; San Miguel, Provinz Samar, leg. BÖTTCHER; in Coll. KLEINE.
DEI: 2 Syntypen, Cuernos Mts., Negros, leg. BAKER.

croceus KLEINE, 1926 (*Metriorrhynchus*)
(l.c., 79, Taf. 3, Fig. 21–23)

20 Syntypen; Mindanao, Provinz Agusan, Butuan, Provinz Lanao, Kolambugan, leg. BAKER; Momungan, leg. BÖTTCHER; Provinz Surigao, Surigao, leg. BAKER, BÖTTCHER; Provinz Zamboanga, Dapitan, leg. BAKER; in Coll. KLEINE.
DEI: 2 Syntypen, Surigao.

debilis KLEINE, 1926 (*Libnetis*)
(l.c., 74, Taf. 3, Fig. 11)

27 Syntypen, Luzon: Provinz Laguna, Paete; Mindanao: Provinz Lanao, Momungan; leg. BÖTTCHER; Provinz Surigao, Surigao; Samar; leg. BAKER; in Coll. KLEINE.
DEI: 1 Syntypus, Luzon, Anoburayan.

***diffusimaculatus* KLEINE, 1928 (*Metriorrhynchus*)**

(Ent. Mitt. 17, 122, Fig. 10–14)

♀ Holotypus, Australien, Tam Mts., leg. HACKER, im DEI; 1 ♀, Paratypus, dto., in Coll. KLEINE.
DEI: ♀ Holotypus, Tam Mts., I. 1907, Coll. HACKER.***discolor* KLEINE, 1926 (*Metriorrhynchus*)**

(Nova Guinea 15, 112, Fig. 60)

♂ Holotypus, 1 ♀, Paratypus, Neu-Guinea, Coll. KRAATZ, im DEI.

***dolosus* KLEINE, 1936 (*Plateros*)**

(Arb. morph. tax. Ent. 3, 135–136, Fig. 11, 12)

Mehrere Syntypen, Java, K. O. Blawan, Idjen Plateau, 900–1500 m, III. 1934, leg. LUCHT, in Coll. KLEINE und im DEI.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 7. XII. 1933 (Datum nicht erwähnt).***dubitabilis* KLEINE, 1925 (*Leptotrichalus*)**

(Philipp. Journ. Sc. 28, Nr. 2, 302, Taf. 1, Fig. 6, Taf. 2, Fig. 7)

19 Syntypen, Philippinen: Sibuyan, Mount Maquiling; Luzon, Cuernos Gebirge; Negros, Polillo; leg. BAKER; Iligan, Butuan, Kolambungan, Zamboanga, Surigao, Dapitan; Mindanao, Nordwestliches Panay, Nueva Vizcaya; Basilan, Baguio, Benguet; in Coll. KLEINE.

DEI: 2 Syntypen, Luzon, Mt. Banahao.

***elutus* KLEINE, 1926 (*Metriorrhynchus*)**

(Nova Guinea 15, 100, Fig. 14, 15)

Mehrere Syntypen: Neu-Guinea, Pauwi, leg. MOSZKOWSKI; Deutsch Neu-Guinea, Kaiser Wilhelmsland, Hatzfeldhafen, leg. GRABOWSKY, Mäanderberg, 21.–30. VIII. 1913. Lager am Lehmfluß, IV.–V. 1913. Hauptlager bei Malu, 2. II. 1913; leg. BÜRGER; Holl. Neu-Guinea, Kapaur, leg. FRUHSTORFER, Bivak Eiland, 1. X., leg. LORENZ; Roon, leg. FRUHSTORFER, Aru-Inseln, Ureining, leg. RIBBE; im Museum Natura Artis Magistra und im DEI.

DEI: Syntypen, Coll. KRAATZ: 1 Ex. Neu-Guinea, 1 Ex. Roon, ex Coll. FRUHSTORFER; 2 Ex. Holl. N. Guinea, Kapaur, leg. FRUHSTORFER.

***enganicus* KLEINE, 1939 (*Metriorrhynchus*)**

(Treubia 17, 5)

15 ♀♀, Enggano, V.–VII. 1936, leg. DE JONG; Holotypus, im Museum Leiden, Paratypen, in Coll. KLEINE.
DEI: 1 ♀, Paratypus, Enggano I., alt V.–VII. 1936, Meok, leg. DE JONG.***exornatus* KLEINE, 1926 (*Metriorrhynchus*)**

(Nova Guinea 15, 105, Fig. 32, 33)

1 ♂, 2 ♀♀, Holotypus, Paratypen, Neu-Guinea, Coll. KRAATZ, im DEI und in Coll. KLEINE.

DEI: ♂ Holotypus, 1 ♀, Paratypus, Neu-Guinea, Coll. KRAATZ.

***explicatus* KLEINE, 1926 (*Hemiconderis*)**

(l.c., 162–163, Fig. 224)

♂ Holotypus, Neu-Guinea, Coll. KRAATZ, im DEI.

***exploratus* KLEINE, 1926 (*Cautires*)**

(Philipp. Journ. Sc. 31, Nr. 1, 82–83, Taf. 3, Fig. 30, 31)

10 ♂♂, 3 ♀♀, Syntypen: Luzon, Subprovinz Bontoc, Mount Polis, 2400 ft., Subprovinz Kalinga, Balbalasan, 5000 ft., leg. BÖTTCHER; Provinz Nueva Vizcaya, Imugan, 4000 ft.; Mindanao, Provinz Surigao, Surigao; leg. BAKER, BÖTTCHER; Samar, leg. BAKER; in Coll. KLEINE.

DEI: 1 Syntypus, N. Luzon, Bontoc.

***femorialis* KLEINE, 1925 (*Leptotrichalus*)**

(l.c. 28, Nr. 2, 309, Taf. 1, Fig. 22–24)

29 ♂♂, 3 ♀♀, Syntypen, Philippinen; Mindanao, Surigao, Kolambungan, Iligan, Butuan, leg. BAKER, in Coll. KLEINE.

DEI: Syntypen: 2 Ex. Mindanao, Momungan, Surigao; 1 Ex. Fundort nicht lesbar.

***formosanus* PIC, 1926 (*Metaneus*)**

(Ent. Mitt. 15, 67–68)

♂ Holotypus, Formosa, leg. SAUTER, im DEI [Taihorin, 22. VII.].

***formosanus* PIC, 1921 (*Platerus*)**

(Echange, Nr. 405, hors texte 7)

Mehrere Syntypen, Formosa.

DEI: Syntypen, Formosa, leg. SAUTER: 3 Ex. Banshoryo-Distr., Sokutsu, 7. VII., 7. VIII. 1912; 3 Ex. Kankau, Koshun, V., VII. 1912.

***fragilis* KLEINE, 1926 (*Cladophorus*)**

(Philipp. Journ. Sc. 31, Nr. 1, 81–82, Taf. 3, Fig. 27, 28)

25 ♂♂, 20 ♀♀, Syntypen: Mindanao, Provinz Lanao, Iligan, Provinz Zamboanga, Dapitan, Provinz Bukidnon, Provinz Zamboanga, Zamboanga; leg. BAKER; Kolambungan, Provinz Surigao, Surigao, leg. BAKER, BÖTTCHER; Provinz Agusan, Cabadavan, leg. WEBER; Port Banga, leg. BÖTTCHER; Basilan, leg. BAKER; Samar, Catbalogan, leg. BAKER, BÖTTCHER; Negros, Cuernos Gebirge, leg. BAKER; in Coll. KLEINE.

DEI: 1 Syntypus, Surigao.

***fragilis* KLEINE, 1936 (*Plateros*)**

(Arb. morph. taxon. Ent. 3, 136, Fig. 14, 15)

Mehrere Syntypen, Java, K. O. Blawan, Idjen Plateau, 900–1500 m, V. 1934, leg. LUCHT, in Coll. KLEINE und im DEI.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 20.–26. V. 1934.

franklinmülleri KLEINE, 1928 (*Metriorrhynchus*)

(Ent. Mitt. 17, 121, Fig. 1-4)

♂ Holotypus, 3 ♀♀, Paratypen, Queensland, ex Coll. F. MÜLLER, im DEI und in Coll. KLEINE.
DEI: ♂ Holotypus, 1 ♀, Paratypus, Queensland, Coll. F. MÜLLER.**frivolus** KLEINE, 1926 (*Lycostomus*)

(Philipp. Journ. Sc. 31, Nr. 1, 43-44, Taf. 1, Fig. 10-12)

210 ♂♂, 126 ♀♀, Syntypen: Luzon, Provinz Camarines Sur, Mount Isarog, 4000 ft., Provinz Nueva Vizcaya, Bayombong, 1000 ft., leg. BÖTTCHER; Provinz Laguna, Los Baños, Mount Maquiling, leg. BAKER; Mindanao, Provinz Davao, Davao, Provinz Surigao, Surigao, leg. BAKER; Provinz Lanao, Momungan, leg. BÖTTCHER; Samar, leg. BAKER; San Miguel, Provinz Samar, leg. BÖTTCHER; in Coll. KLEINE.
DEI: 2 Syntypen, San Miguel.**fumosus** KLEINE, 1926 (*Eniclases*)

(Nova Guinea 15, 182, Fig. 271)

Mehrere Syntypen, Neu-Guinea, Taura, 4.-17. VII. 1910, leg. MOCZKOWSKY, Kapaur, leg. FRUHSTORFER.
DEI: 1 Syntypus, Holl. N. Guinea, Kapaur, leg. FRUHSTORFER, Coll. KRAATZ.**hackeri** KLEINE, 1928 (*Metriorrhynchus*)

(Ent. Mitt. 17, 121, Fig. 5-9)

1 ♂, 8 ♀♀, Australien, Tam. Mts., leg. HACKER; Holotypus, Paratypen, im DEI und in Coll. KLEINE.
DEI: ♂ Holotypus, 5 ♀♀, Paratypen, Tam. Mts., II. 1906, Coll. HACKER.**hackeri** KLEINE, 1933 (*Xylobanus*)

(Stett. Ent. Ztg. 94, 11, Fig. 76-79)

♂ Holotypus, Australien, Tam. Mts., Blackall, leg. RANGE, im DEI; 1 ♂, Paratypus, dto.
DEI: ♂ Holotypus, Tam. Mts., XI. 1906, Nr. 491, Coll. HACKER.**hirsutus** KLEINE, 1926 (*Trichalus*)

(Nova Guinea 15, 173, Fig. 247)

Holotypus, mehrere Paratypen; Neu-Guinea, Coll. KRAATZ; Südost Neu-Guinea, Fiume Purari, I. 1914, leg. LORIA.
DEI: 1 Paratypus, Neu-Guinea, Coll. KRAATZ.**hogeii** PIC, 1930 (*Calopteron*)

(Ann. Soc. Ent. Fr. 99, 323)

Mehrere Syntypen, Mexico, leg. HOGE, Coll. KRAATZ, im DEI.
DEI: 1 Syntypus, Mexico, leg. HOGE, Coll. KRAATZ.**humeralis** KLEINE, 1926 (*Cladophorus*)

(Nova Guinea 15, 130-131, Fig. 123-126)

Mehrere Syntypen, Holl. Neu-Guinea, Kapaur, leg. FRUHSTORFER.
DEI: 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.**ignotus** KLEINE, 1936 (*Trichalus*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 3, 133-135)

Mehrere Syntypen, Java, G. Tangkoeban Prahoe, 4000-5000', Preanger, leg. DRESCHER, in Coll. KLEINE und im DEI.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 24. IV. - 9. V. 1933.**impressicollis** KLEINE, 1926 (*Cautires*)

(Arch. Naturg. 92, A 12, 140, Taf. 3, Fig. 85, 86)

1 ♂, 3 ♀♀, Syntypen, Usambara, im DEI.
DEI: 1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Usambara, Coll. KRAATZ.**irregularis** KLEINE, 1926 (*Cautires*)

(Arch. Naturg. 92, A 12, 132-133, Taf. 2, Fig. 58-60)

5 ♂♂, 1 ♀, Syntypen, Kamerun, Mundame, leg. ROHDE, CONRADT, im DEI.
DEI: 3 Ex. Kamerun, leg. CONRADT, 5 Ex. Kamerun, Mundame, leg. ROHDE; Coll. KRAATZ (nur 2 Ex. wurden vom Autor als Typen gekennzeichnet); Syntypen.**javanus** KLEINE, 1926 (*Leptotrichalus*)

(Treubia 9, Nr. 4, 313, Taf. 7, Fig. 70)

2 ♂♂, 4 ♀♀, Syntypen; Java, Tjibodas, 1400-1500 m, im Museum Buitenzorg, Preanger, leg. SIJTHOFF, im Museum Leiden.
DEI: Tjibodas, 1400 m, VIII. 1921, No. 270, ex Museum Buitenzorg, 1 Syntypus.**latepicale** PIC, 1932 (*Mesopteron*)

(Rev. Soc. Ent. Argent. 7, Nr. 21, 3)

Holotypus, Bolivien, Yungas, durch GERMAIN, Coll. KRAATZ, im DEI.

longepilosus KLEINE, 1928 (*Metriorrhynchus*)

(Ent. Mitt. 17, 122-123, Fig. 15-18)

1 ♂, 5 ♀♀, Queensland, Coen Distr., Cape York, leg. HACKER; Holotypus, Paratypen, im DEI und in Coll. KLEINE.
DEI: ♂ Holotypus, 1 ♀, Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. HACKER.**longissimum** PIC, 1931 (*Mesopteron*)

(Echange 56, Nr. 443, hors texte 95)

Holotypus, Bolivien, Yungas, durch GERMAIN, Coll. KRAATZ; im DEI.

longithorax KLEINE, 1926 (*Cautires*)

(Arch. Naturg. 92, A 12, 140, Taf. 3, Fig. 81, 82)

♂ Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI; 1 ♂, Paratypus, dto.
DEI: ♂ Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

malignus KLEINE, 1936 (*Calochromus*)
(Arb. morph. taxon. Ent. 3, 139–140, Fig. 31)

Mehrere Syntypen, Java, G. Tangkoeban Prahoe, 4000–5000', Preanger, IV. 1934, leg. DRESCHER, in Coll. KLEINE und im DEI.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, IV. 1936 (nicht 1934!).

marcidus KLEINE, 1926 (*Trichalus*)
(Nova Guinea 15, 175, Fig. 252, 253)

2 ♂♂, 6 ♀♀, Holotypus, Paratypen, Neu-Guinea, Dilo, VI.–VII., leg. LORIA, im Museum Genua, in Coll. KLEINE und Coll. KRAATZ.

DEI: 4 Paratypen, Neu-Guinea, Coll. KRAATZ.

melzeri PIC, 1935 (*Haplobothris*)
(Mél. Exot. Ent. 66, 6)

Mehrere Syntypen, Brésil, Sao Paulo, via MELZER an KLEINE.

DEI: 1 Syntypus, Bras., Sao Paulo, durch MUUS und MELZER.

micans KLEINE, 1926 (*Cladophorus*)
(Nova Guinea 15, 136–137, Fig. 150)

Holotypus, 1 Paratypus, Neu-Guinea, Astrolabe Bay, Roon, leg. FRUHSTORFER, im Museum Berlin.

DEI: ♀ Holotypus, N. Guinea, Astrolabe-B., durch ROHDE.

minutus PIC, 1932 (*Emplectus*)
(Rev. Soc. Ent. Argent. 7, 5)

Holotypus, Bolivie, Yungas, durch GERMAIN, Coll. KRAATZ, im DEI.

nanus KLEINE, 1933 (*Cladophorus*)
(Stett. Ent. Ztg. 94, 7, Fig. 42–44)

♂ Holotypus, 2 ♂♂, Paratypen, Kamerun, leg. CONRADT, in Coll. KLEINE.

DEI: 1 Paratypus, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

nigricauda KLEINE, 1928 (*Metriorrhynchus*)
(Ent. Mitt. 17, 123–124, Fig. 24–27)

2 ♀♀, Holotypus, Paratypus, Queensland, Cape York, Coen District, leg. HACKER, im DEI und in Coll. KLEINE.

DEI: ♀ Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung.

nigricolle PIC, 1932 (*Cyrtopteron*)
(Rev. Soc. Ent. Argent. 7, Nr. 21, 2)

Holotypus, Bolivie, Yungas, durch GERMAIN, Coll. KRAATZ; im DEI.

nigrimembris PIC, 1922 (*Xylobanus*)
(Echange, Nr. 407, hors texte 16)

Mehrere Syntypen, Formosa.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Taihorin, leg. SAUTER.

nigroapicalis PIC, 1935 (*Haplobothris*)
(Mél. Exot. Ent. 66, 7)

Mehrere Syntypen, Brésil, Sao Paulo, ex MELZER, via KLEINE an PIC.

DEI: 1 Syntypus, Bras., Sao Paulo, leg. MUUS und MELZER.

nigrostriatus KLEINE, 1936 (*Ditoneces*)
(Arb. morph. taxon. Ent. 3, 136–137, Fig. 16, 17, 19)

Mehrere Syntypen, Java, G. Tangkoeban Prahoe, 4000–5000', Preanger, III.–IV. 1934, leg. DRESCHER, in Coll. KLEINE und im DEI.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, VI. 1934 (Datum nicht erwähnt!).

nigrostriatus KLEINE, 1926 (*Parapyropterus*)
(Stett. Ent. Ztg. 87, 104)

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Formosa, Hoozan, III. 1910, Kosempo, VII. 1909, leg. SAUTER.

DEI: 1 ♀, Syntypus, Formosa, Kosempo, VII. 1909, leg. SAUTER.

opacus PIC, 1921 (*Libnetis*)
(Mél. Exot. Ent. 33, 14)

Mehrere Syntypen, Formosa.

DEI: 13 Syntypen, Sokutsu, Banshoryo Distr., 7. VI. 1912, leg. SAUTER.

ordinarius KLEINE, 1926 (*Plateros*)
(Philipp. Journ. Sc. 31, Nr. 1, 47, Taf. 1, Fig. 18–19)

18 Ex., Luzon; Provinz Laguna, Mount Maquiling, leg. BAKER; Mindanao; Provinz Davao, Davao, leg. BAKER; Provinz Surigao, Surigao, leg. BAKER, BÖTTCHER; Provinz Lanao, Kolambagan, Provinz Agusan, Butuan; leg. BÖTTCHER; Leyte, Santa Cruz; leg. BÖTTCHER; Holotypus, Paratypen, in Coll. KLEINE.

DEI: 1 Paratypus, Mindanao, Surigao.

pullens KLEINE, 1926 (*Cautires*)
(Arch. Naturg. 92, A 12, 126, Taf. 1, Fig. 36)

3 ♀♀, Kamerun, leg. CONRADT; Paratypen, Holotypus, im DEI.

DEI: ♀ Holotypus, 1 ♀, Paratypus, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

paradoxa MjöBERG, 1925 (*Duliticola*)
(Psyche 32, 134–135, Fig. 1, Taf. 3, Fig. 2a, 2b, Taf. 4)

Mehrere Syntypen, Sarawak, Mt. Batu Gading near Lundu, 1500–3000 ft., 1924, leg. MjöBERG.

DEI: 1 ♂, Syntypus, Sarawak, Mt. Batu Gading near Lundu, 1500–3000 ft.

paululus KLEINE, 1926 (*Xylobanus*)
(Philipp. Journ. Sc. 31, Nr. 1, 93–94, Taf. 4, Fig. 15–18)

Mehrere Ex.; Luzon, Provinz Laguna, Paete, leg. BÖTTCHER; Mount Maquiling, leg. BAKER; Mindanao, Provinz Lanao, Momungan, leg. BÖTTCHER; Negros, Canlaon Vulkan, leg. BANKS; Paratypen, Holotypus, in Coll. des Bureau of Science zu Manila und in Coll. KLEINE.

DEI: 1 Paratypus, Luzon, Mt. Banahao.

pectinicornis KRAATZ, 1879 (*Cerceros*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 23, 127, Taf. 2, Fig. 2b)

Mehrere ♂♂, Syntypen, Amur.

DEI: 2 ♂♂, Syntypen, Amur, Coll. KRAATZ.

Syn. zu *flabellatus* MOTSCHULSKY, 1860.

pilosus KLEINE, 1926 (*Stereotrichalus*)
(Nova Guinea 15, 185, Fig. 277, 278)

♂ Holotypus, Holl. Neu-Guinea, Kapaur, leg. FRUHSTORFER, im DEI [Coll. KRAATZ].

pinguis KLEINE, 1937 (*Merolyceus*)
(Ann. Mus. Congo 3, sect. 2, fasc. 6, 97, Fig. 232, 233)

Holotypus, Congo, Albertville, XII. 1918, leg. MAYNÉ, im Musée du Congo; mehrere Paratypen, Eala, leg. CORBISIER, Poko, leg. FLORIDON, Kwesi à Kilo, leg. BAYER, Lusuku, leg. QUARRÉ, Kaniama, leg. MASSART.

DEI: 1 Paratypus, Kwesi à Kilo, 10.–19. IV. 1911, leg. BAYER, Musée du Congo, Nr. 2425.

pusillus KLEINE, 1926 (*Cautires*)
(Arch. Naturg. 92, A 12, 133, Taf. 2, Fig. 62, 63)

8 ♂♂, 2 ♀♀, Syntypen, Kamerun, Togo, leg. CONRADT, Usambara, Nguelo.

DEI: Syntypen: 1 Ex. Kamerun, 1 Ex. Togo; leg. CONRADT; 7 Ex. Usambara, Nguelo; Coll. KRAATZ.

pusillus KLEINE, 1928 (*Metriorrhynchus*)
(Ent. Mitt. 17, 124–125, Fig. 28–31)

5 ♂♂, Queensland, Coen District, Cape York, leg. HACKER; Holotypus, Paratypen, im DEI und in Coll. KLEINE.

DEI: ♂ Holotypus, 3 ♂♂, Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

queenslandicus KLEINE, 1928 (*Metriorrhynchus*)
(l.c., 123, Fig. 19–23)

Holotypus, 1 Paratypus, Süd-Queensland, Blackal, im DEI und in Coll. KLEINE.

DEI: Holotypus, Blackal, Range, Nr. 495, Coll. HACKER.

rarus KLEINE, 1936 (*Dihammatus*)
(Arb. morph. taxon. Ent. 3, 138, Fig. 26)

Mehrere Syntypen, Java, G. Tangkoeban Prahoe, 4000–5000', III.–XI. 1933, Preanger, leg. DRESCHER, in Coll. KLEINE und im DEI.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

redundus KLEINE, 1936 (*Plateros*)
(l.c., 135, Fig. 7, 8)

Mehrere Syntypen, Java, K. O. Blawan, Idjen Plateau, 900–1500, I. 1934, leg. LUCHT, in Coll. KLEINE und im DEI.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 8. I. 1934.

reticulatus KLEINE, 1926 (*Cladophorus*)
(Nova Guinea 15, 143, Fig. 172, 173)

♀ Holotypus, 1 ♀, Paratypus, Batjan, leg. FRUHSTORFER, im DEI.

DEI: ♀ Holotypus, Batjan, VIII.–IX., ex Coll. FRUHSTORFER, Coll. KRAATZ.

rufiventris KRAATZ, 1879 (*Dictyoptera*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 23, 125; nom. praecoc. = *kraatzi* BOURGEOIS, 1882, Abeille 20, 117)

Mehrere Syntypen, Amur, Külek, leg. CHRISTOPH, durch LEDER.

DEI: 1 Syntypus, Külek, Coll. KRAATZ.

rusticus KLEINE, 1936 (*Plateros*)
(Arb. morph. taxon. Ent. 3, 135)

Mehrere Syntypen, Java, K. O. Blawan Idjen Plateau, 900–1500 m, 20.–26. V. 1934, leg. LUCHT, in Coll. KLEINE und im DEI.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

sanguinosus KLEINE, 1951 (*Calochromus*)
(Ent. Bl. 45–46 (1949–50), 24)

Holotypus, mehrere Paratypen, China, Provinz Fukien, 27, 40° n. Br., 117, 40° ö. L., 2300 m Seehöhe, Kuatun, 22. III., 15. IV. 1938, leg. KLAPPERICH, im Museum KOENIG, Bonn und im DEI.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, 22. III. 1938.

siccus KLEINE, 1936 (*Xylobanus*)
(Arb. morph. taxon. Ent. 3, 133)

Mehrere Syntypen, Java, G. Raoeng, 'Bajoekidoel', 450–700 m, I.–II. 1933, leg. LUCHT, in Coll. KLEINE und im DEI.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 1.–20. II. 1932.

similis KLEINE, 1926 (*Cautires*)
(Arch. Naturg. 92, A 12, 137, Taf. 3, Fig. 71)

1 ♂, 7 ♀♀, Kamerun, Mundame, leg. ROHDE, CONRADT; Usambara; im DEI, Syntypen.

DEI: Syntypen, Coll. KRAATZ: 3 Ex. Kamerun, leg. CONRADT, 2 Ex. Kamerun, Mundame, leg. ROHDE, 1 Ex. Usambara.

sirambeanus KLEINE, 1933 (*Ditoneces*)
(Stett. Ent. Ztg. 94, 16–17, Fig. 127–129)

1 ♂, 2 ♀♀, Sumatra, Si Rambé, leg. MODIGLIANI; Paratypen, Holotypus, in Coll. KLEINE und im DEI.
DEI: 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung, XII. 1890–III. 1891, Coll. KRAATZ.

sondaicus KLEINE, 1927 (*Calochromus*)
(Trebua 9, 293, Taf. 6, Fig. 2, 6, 7, 9)

♂ Holotypus, 2 ♀♀, Paratypen, Sunda-Inseln, in Coll. KLEINE und im Museum Buitenzorg.
DEI: 1 Paratypus, Java, ex Museum Buitenzorg.

suturalis KLEINE, 1926 (*Procautives*)
(Nova Guinea 15, 159, Fig. 213–215)

♂ Holotypus, 2 ♂♂ Paratypen, Neu-Guinea, Astrolabe-Bay, leg. ROHDE, Coll. KRAATZ, in Coll. KLEINE und im DEI.
DEI: Paratypen, Coll. KRAATZ: 1 ♂, Neu-Guinea, 1 ♂, N. Guinea, Astrolabe-B., leg. ROHDE.

tenebricosus KLEINE, 1928 (*Metriorrhynchus*)
(Ent. Mitt. 17, 125, Fig. 32–34)

♀ Holotypus, 1 ♀, Paratypus, Queensland, Coen District, Cape York, leg. HACKER, im DEI und in Coll. KLEINE.
DEI: ♀ Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung.

tenuis KLEINE, 1936 (*Xylobanus*)
(Arb. morph. taxon. Ent. 3, 133)

Mehrere Syntypen; Java, Kendeng Geb., VI. 1932; K. O. Blawan, Idjen Plateau, 900–1500 m, VI. 1933; leg. LUCHT, in Coll. KLEINE und im DEI.
DEI: 1 Syntypus, Java, K. O. Blawan, Idjen Plateau, 900–1500 m, VI. 1933, leg. LUCHT.

transversithorax KLEINE, 1936 (*Libnetis*)
(l.c., 137, Fig. 21)

Mehrere Syntypen, Java, G. Raoeng, „Bajoekidoel“, 450–700 m, leg. DRESCHER, in Coll. KLEINE und im DEI.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 15. I. 1933.

versicolor KLEINE, 1926 (*Eniclases*)
(Nova Guinea 15, 182, Fig. 270)

♂ Holotypus, Neu-Guinea; im DEI, Coll. KRAATZ.

wittei KLEINE, 1937 (*Acantholycus*)
(Expl. Parc Nat. Albert, Miss. DE WITTE, 8, 7, Fig. 10, 11)

Holotypus, 32 Paratypen, Congo, Rutshuru, 1.285 m, 22. V.–1. VI., 12.–16., 20.–24. VI. 1934/1.–15. I., 7.–24. VI. 1935, Miss. DE WITTE, im Museum Congo und in Coll. KLEINE.
DEI: 1 Paratypus, Rutshuru, 17.–20. VI. 1934, leg. DE WITTE, Parc Nat. Albert, ex Musée du Congo, Nr. 438.

Wahrscheinlich nicht beschriebene Arten

absurdus KLEINE (*Trichalus*)

DEI: 1 ♂, 1 ♀, Typen, Sumatra, Siboga, X. 1890–III. 1891, leg. MODIGLIANI, Coll. KRAATZ.

atrithorax PIC (*Lycus*)

DEI: 1 Typus, Mexico, Coll. KRAATZ.

bilineaticollis PIC (*Metapteron*)

DEI: 1 Typus, Amazon, Coll. KRAATZ.

flavus PIC (*Lycus*)

DEI: 1 Typus, Mexico, Coll. KRAATZ.

kraatzi PIC (*Emplectus*)

DEI: 1 Typus, Peru, Vilcanota, Coll. KRAATZ.

longepectinalis PIC (*Calleros*)

DEI: 1 Typus, Bolivien, Yungas, durch GERMAIN, Coll. KRAATZ.

Lampyridae

consors OLIVIER, 1909 (*Lucidota*)
(Bull. Soc. Ent. Fr., 35)

Mehrere Syntypen, Peru, Marcapata, Brasilien, Espirito Santo.
DEI: 2 Syntypen, Peru, Marcapata, Coll. KRAATZ.

filiformis OLIVIER, 1913 (*Luciola*)
(Ent. Mitt. 2, 271)

Mehrere Syntypen, Formosa, Kosempo, Kankau, leg. SAUTER.
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kosempo, 7. VI. 1912, leg. SAUTER.

impolita OLIVIER, 1913 (*Luciola*)
(l.c., 271)

Mehrere Syntypen, Formosa, Koshun, leg. SAUTER.
DEI: 4 Syntypen, Formosa, Kankau, Koshun, VII. 1912, leg. SAUTER.

mundula OLIVIER, 1913 (*Luciola*)
(l.c., 271)

Holotypus, Formosa, Kankau, leg. SAUTER; im DEI [Koshun, VII. 1912].

tricolor OLIVIER, 1909 (*Lucidota*)
(Bull. Soc. Ent. Fr., 36)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Espirito Santo.
DEI: 1 Syntypus, Espirito Santo, Coll. KRAATZ.

Wahrscheinlich nicht beschriebene Arten

nanus SCHAUFUSS (*Photinus*)

DEI: 3 Typen, N. Granada, Coll. SCHAUFUSS.

reitteri HICKER (*Purocaelia*)

DEI: 3 Typen, N. W. China, Tienmuschan, RTT.

Cantharidae

albithorax PIC, 1915 (*Chauliognathus*)
(Bull. Soc. Zool. Fr. 40, 95)

Mehrere Syntypen, Nouvelle-Guinée.
DEI: 1 Syntypus, D. N. Guinea, Deutsch-holländ. Grenze.

albocincticollis PIC, 1936 (*Discodon*)
(Arb. morph. taxon. Ent. 3, 131)

Mehrere Syntypen, Costa Rica, La Caja, bei San José, leg. H. SCHMIDT, im DEI und in Coll. PIC.
DEI: 1 Syntypus, C. R., L. Caja, San José, 8 k/w, 1934.

anatolica BOURGEOIS, 1900 (*Cantharis*)
(In: BODEMEYER, E. v.: Quer durch Kleinasien in den Bulghar Dagh, 152–153)

Mehrere Syntypen, Biledjek, Eski-Chéhir.
DEI: 1 ♂, Asia minor, Biledjek, 1 Ex. Eski-Chéhir; leg. v. BODEMEYER, Coll. LEONHARD, Syntypen.

anatolica DAHLGREN, 1968 (*Rhagonycha*)
(Ent. Bl. Biol. Syst. Käf. 64, 110–111, Fig. 8 A, B)

Holotypus, Kleinasien, Amasia, 1888, leg. KORB, Coll. KRAATZ, im DEI.

apicicorne PIC, 1911 (*Plectonotum*)
(Echange 27, Nr. 323, 179–180)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI und in Coll. PIC.
DEI: 2 Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, Coll. KRAATZ.

astur HEYDEN, 1880 (*Cantharis*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 24, 298)

5 ♂♂, 2 ♀♀, Syntypen, Arvas Asturia, 1879, leg. GETSCHMANN, in Coll. v. HEYDEN.
DEI: 3 Syntypen, Asturia, 1879, leg. GETSCHMANN.

atripennis PIC, 1922 (*Malthinus*)
(Mél. Exot. Ent. 36, 30; nom. praeocc. = *nigripennis* PIC, 1938, Bull. Soc. Ent. Fr., 121)

Mehrere Syntypen, Formosa.
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Hokuto, III. 1912, leg. SAUTER.

atroopacus PIC, 1937 (*Athemus*)
(Ent. Bl. 33, 62–63)

Holotypus, Formosa, Chosokei, leg. SAUTER, im DEI [1914].

bifurcatus KIESENWETTER, 1852 (*Malthodes*)
(Lin. Ent. 7, 297–298, Taf. 2, Fig. 17)

Mehrere Syntypen, Sicilien, leg. SCHIÖPTE und ZELLER.
DEI: Syntypen, Coll. STIERLIN: 2 Ex. Sicilien, 1 Ex. ohne Fundort.

bilateralis PIC, 1927 (*Polemius*)
(Ent. Mitt. 16, 250)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI und in Coll. PIC.
DEI: 1 Syntypus, Bolivien, leg. GERMAIN.

bodemeyeri BOURGEOIS, 1900 (*Cantharis*)
(In: BODEMEYER, E. v.: Quer durch Kleinasien in den Bulghar Dagh, 152–153)

Mehrere Syntypen, Burna, Bulghar-Dagh.
DEI: 1 ♀, Syntypus, Asia minor, Bulghar-Dagh, leg. v. BODEMEYER.

bodemeyeri DAHLGREN, 1968 (*Rhagonycha*)
(Ent. Bl. Syst. Käf. 64, 115, Fig. 14 C, D)

Holotypus, Asia minor, Burna, Taurus, 1899, leg. v. BODEMEYER, im DEI.

boicus KIESENWETTER, 1863 (*Malthodes*)

(In: ERICSON: Nat. Gesch. Ins. Dtschl. Abt. 1, 4, 723–724)

Mehrere Syntypen, um Kreuth, bayerische Alpen, leg. v. KIESENWETTER.

DEI: 1 Syntypus, Kreuth, Coll. STIERLIN.

bolivianus PIC, 1927 (*Polemius*)

(Ent. Mitt. 16, 250)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI und in Coll. PIC.

DEI: 2 Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN.

boliviensis PIC, 1927 (*Malthodes*)

(l.c., 253)

Holotypus, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI.

boliviensis PIC, 1927 (*Oontelus*)

(l.c., 252–253)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI und in Coll. PIC.

DEI: 5 Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN.

bourgeoisii REITTER, 1888 (*Malchinus*)

(Wien. Ent. Ztg. 7, 210)

Mehrere Syntypen, Circassien, 1887, durch LEDER.

DEI: Caucas. occ., Circassien, REITTER, 1 Paralectotypus; von BRANCUCCI designiert.

brachypterus KIESENWETTER, 1863 (*Malthodes*)

(Nat. Gesch. Ins. Dtschl. Abt. 1, 4, 725–726)

Mehrere Syntypen, Südtirol, um Bozen, leg. v. KIESENWETTER.

DEI: 1 ♀, Syntypus, Botzen, Coll. STIERLIN.

Syn. zu *lobatus* KIESENWETTER, 1852.**brunneipennis** HEYDEN, 1889 (*Cantharis*)

(Horae Soc. Ent. Ross. 23, 673–674)

2 Syntypen, Shan-si, 9. VI. 1884, Kan-ssu, 5. VII. 1885, leg. POTANIN.

DEI: 1 Syntypus, Shan-si, 1884, leg. POTANIN.

chosokeiensis PIC, 1937 (*Athemus*)

(Ent. Bl. 33, 63)

Holotypus, Formosa, Chosokei, leg. SAUTER, im DEI [1914].

cilicicus PIC, 1904 (*Cantharis*)

(Echange 20, Nr. 230, 9)

Mehrere Syntypen, Cilicischer Taurus, Coll. PIC.

DEI: 1 Syntypus, Asia-Minor, Bozanti-Thal, leg. v. BODEMEYER, Coll. LEONHARD.

claricolle PIC, 1927 (*Discodon*)

(Ent. Mitt. 16, 252)

♀ Holotypus, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI.

consociata HEYDEN, 1883 (*Rhagonycha*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 27, 311–312)

Holotypus, auf dem Asiatischen Olymp, leg. MERKL; im DEI.

costatipennis PIC, 1937 (*Malthodes*)

(Ent. Bl. 33, 65)

Holotypus, occ. Java, Tjibodas, im DEI [1400 m, 1923, leg. KARNY, No. 9, ex Museum Buitenzorg].

cruciatus BAUDI, 1859 (*Malthodes*)

(Berl. Ent. Ztschr. 3, 301)

Mehrere Syntypen, Sardinia, im Museum Turin.

DEI: 1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Sardinia, leg. BAUDI, Coll. STIERLIN.

csikii STILLER, 1926 (*Cantharis*)

(Rovart. Lap. 26, 136–137)

Mehrere Syntypen, Croatien, Bahnstation Plase und Zlobin, M. V., leg. STILLER.

DEI: 1 Syntypus, Croatien, Plase, V. 1916, leg. STILLER, Nr. 22.

cyphonurus KIESENWETTER, 1861 (*Malthinus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 5, 383)

Mehrere Syntypen, Monte Rosa, Macugnaga, Sommer 1861, leg. v. KIESENWETTER.

DEI: 1 Syntypus, Macugnaga, Coll. STIERLIN.

denticollis SCHUMMEL, 1844 (*Cantharis*)

(Übers. Arb. Veränd. Schles. Ges. (1843), 194–195)

2 Ex. Schlesien, Gesenke oder Altvater, an der Hungerlehne, A. VIII. 1843, leg. SCHUMMEL; 1 Ex. Gesenke, in Coll. LETZNER: Syntypen.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, leg. SCHUMMEL, Coll. KRAATZ.

denticornis WITTMER, 1952 (*Podabrus*)

(Ent. Bl. 47 (1951), 96–97, Fig. 2)

Holotypus, mehrere Paratypen, China-Fukien, Kuatun, 2300 m, 8. V. – 30. V. 1938, leg. KLAPPERICH, im Museum A. KOENIG, Bonn und in Coll. KLAPPERICH.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, 10. V. 1938.

deserticola WITTMER, 1969 (*Boveycanthis*)
(Verh. Nat. Ges. Basel 80, 83, Fig. 34, 35)

Holotypus, Paratypen: Jordanien, Dehbeen b/Jerash, 29. III. 1964, Wadi Scheib, 10. III. 1967; leg. KLAPPERICH; Palestina, Jerusalem, 10. III. 1933, leg. SCHATZMAYR; in Coll. WITTMER.
DEI: 3 Paratypen, Jordan, Dehbeen b. Jerash, 29. IV. 1964, leg. KLAPPERICH (nicht 29. III. 1964!).

dimidiatipes malatiensis HEYDEN, 1886 (*Cantharis*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 30, 279)

Mehrere Syntypen, im südlichen Kleinasien, Malatia.

DEI: Lectotypus, (Nr. 711), 5 Paralectotypen, Malatia, Mesopotam., 1885, leg. STAUDINGER, Coll. v. HEYDEN; von WITTMER designiert.

divisa DAHLGREN, 1972 (*Rhagonycha*)
(Ent. Bl. 68, 144)

♂ Holotypus, Palencia, leg. PAGANETTI; 1 ♂, dto.; 1 ♂, Cuenca, 22. IV. 1896, leg. KORB; 1 ♂, Jaen, leg. KRAATZ; 1 ♂, Hisp. 6 Sz, Coll. v. SEIDLITZ: Paratypen.

DEI: ♂ Holotypus, Palencia, leg. PAGANETTI, Coll. LEONHARD.

dryocoetes ROTTENBERG, 1870 (*Malthinus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 14, 242–243)

Mehrere Syntypen, Sicilien, Catania.

DEI: 5 Syntypen, Catania, leg. v. ROTTENBERG.

ensifer KIESENWETTER, 1871 (*Malthodes*)
(l.c. 15, 80)

Mehrere Syntypen, Sardinia, leg. RAYMOND.

DEI: 3 ♂♂, Syntypen, Sardinia, Coll. STIERLIN.

eurynota BOURGEOIS, 1900 (*Cantharis*)
(In: BODEMEYER, E. v.: Quer durch Kleinasien in den Bulghar Daghs, 153)

Mehrere Syntypen, Biledjik, Bos-Dagh.

DEI: 2 Syntypen, Asia minor, Biledjik, Bos-Dagh, leg. v. BODEMEYER, Coll. LEONHARD (1 Ex. ohne Caput).

fibulatus KIESENWETTER, 1852 (*Malthodes*)
(Linn. Ent. 7, 300–302)

Mehrere Syntypen, Leipzig, leg. SACHSE und v. KIESENWETTER.

DEI: 1 Syntypus, Leipzig, Coll. STIERLIN.

flavonoticeps PIC, 1937 (*Athemus*)
(Ent. Bl. 33, 63–64)

Holotypus, Formosa, Chosokei, leg. SAUTER, im DEI [1914].

forticornis HEYDEN, 1885 (*Cantharis*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 287)

Holotypus, Turkestan, Namagan, leg. STAUDINGER; im DEI [1885].

ganglbaueri WITTMER, 1974 (*Malthinus*)
(Ent. Arb. Mus. FREY 25, 419, Abb. 96)

Holotypus, 9 Paratypen, Griechenland, Athos, leg. SCHATZMAYR, im Museum Wien, Museum Basel und DEI.

DEI: 1 ♂, 3 Ex., Paratypen, Macedonia, Athos, leg. SCHATZMAYR, Coll. LEONHARD.

geniculatus KIESENWETTER, 1859 (*Malthinus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 3, 27–28)

Mehrere Syntypen, Griechenland, Zante, IV., leg. v. KIESENWETTER.

DEI: 2 Syntypen, Zante, Coll. STIERLIN.

genistae KIESENWETTER, 1865 (*Cantharis*)
(Berl. Ent. Ztschr. 9, 392–393)

Mehrere Syntypen, Spanien, Castilisches Gebirge, in *Genista*, Guadarrama, leg. v. KIESENWETTER und SEIDLITZ.

DEI: 1 Syntypus, Guadarrama, Coll. STIERLIN.

Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise, „Guadarrama“ steht auf dem Etikett, „Guadarrama“.

germaini PIC, 1927 (*Chauliognathus*)
(Ent. Mitt. 16, 252)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI und in Coll. PIC.

DEI: 1 Syntypus, Bolivien, leg. GERMAIN.

germaini PIC, 1927 (*Maronius*)
(l.c., 253)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI und in Coll. PIC.

DEI: 1 Syntypus, Bolivien, leg. GERMAIN.

germaini PIC, 1911 (*Plectonotum*)
(Echange 27, 179–180)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI.

DEI: 4 Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, Coll. KRAATZ.

germaini PIC, 1927 (*Polemius*)
(Ent. Mitt. 16, 251)

Mehrere Syntypen, Bolivien, Jungas, leg. GERMAIN, im DEI und in Coll. PIC.

DEI: 12 Ex. Bolivien, 1 Ex. dto., Yungas (nicht Jungas!), Coll. KRAATZ; leg. GERMAIN, Syntypen.

hellenica HEYDEN, 1883 (*Cantharis*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 27, 310)

Holotypus, Griechenland, bei Veluchi, leg. KRÜPER, Coll. v. HEYDEN, im DEI.

horni PIC, 1927 (*Discodon*)
(Ent. Mitt. 16, 251)Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI und in Coll. PIC.
DEI: 3 Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN.**iliacus** MARSEUL, 1864 (*Telephorus*)
(L'Abeille 1, 41)

Mehrere Syntypen, Klein-Asien.

DEI: 1 Ex. Asia minor, Sultan Dag, 1 Ex. Goek-Dagh; leg. v. BODEMEYER, Coll. LEONHARD, Syntypen.

klapperichi WITTMER, 1952 (*Malthinus*)
(Ent. Bl. 47 (1951), 101)

Holotypus, China-Fukien, Kuatun, 2300 m, IV. 1938, leg. KLAPPERICH, 2 Ex. dto., 1 Ex. Tschung-sen, im Museum A. KOENIG, Bonn und in Coll. KLAPPERICH: Paratypen.

DEI: 1 Paratypus, China, Fukien, Kuatun, 2300 m, 10. IV. 1938, leg. KLAPPERICH.

korbi PIC, 1912 (*Cantharis*)
(Echange 28, 82)

Mehrere Syntypen, Sibirien.

DEI: 1 Syntypus, Sibiria orient., Sorka-Gora, leg. v. BODEMEYER, Coll. LEONHARD.

kraatzii PIC, 1927 (*Discodon*)
(Ent. Mitt. 16, 251)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI und in Coll. PIC.

DEI: 1 Syntypus, Bolivien, leg. GERMAIN.

kuatunensis WITTMER, 1952 (*Malthodes*)
(Ent. Bl. 47 (1951), 102, Fig. 5, 5a)

Holotypus, mehrere Paratypen, China-Fukien, Kuatun, 2300 m, IV./VI. 1938, leg. KLAPPERICH, im Museum A. KOENIG, Bonn und in Coll. KLAPPERICH.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

luteolimbatus PIC, 1902 (*Cantharis*)
(Echange 18, 47)

Mehrere Syntypen, Sibiria, Amour, Coll. PIC.

DEI: 1 Syntypus, Sibiria orient., Sorka-Gora, leg. v. BODEMEYER, Coll. LEONHARD.

mackenziei MCKEY-FENDER, 1950 (*Cantharis*)
(Pan-Pacific Ent. 26, 69–70, Fig. 4)♂ Holotypus, 1 ♀, L. Arrowhead, California, 3. VII. 1941, leg. MACKENZIE (Calif. Acad. Sci.); 34 Ex. dto., 3.–5. VII. 1941/11. VII. 1942/23. VII. 1944/2.–6. VII. 1945; 9 Ex. Forest Home, San Bernardino Co., 14. VI. 1928, 3 Ex. 15. VI. 1928, 1 Ex. 10. VI. 1926; 1 Ex. Tahquitz Cn., Riverside Co., 30. VI. 1928, 5 Ex. Idyllwäld, 3. VII. 1928/21. VI. 1940; leg. VAN DYKE; 1 Ex. San Jacinto Mts., 1932, leg. WINTERS; 1 Ex. Santa Rosa Mts., San Jacinto Mts., 31. V. 1940, *Quercus*, leg. RINDGE, 1 Ex. 15. VI. 1946, leg. D. J. und J. N. KNOLL; Paratypen.

DEI: 1 Paratypus, Calif., L. Arrowhead, 7. IV. 1945, leg. MACKENZIE.

manubriatus KIESENWETTER, 1863 (*Malthodes*)
(Berl. Ent. Ztschr. 7, 430, Taf. 5, Fig. 8)

Mehrere Syntypen, bei Ascoli in Mittelitalien, leg. PIRAZZOLI.

DEI: 2 Syntypen, Mittelitalien.

m-signatus PIC, 1919 (*Tripherus*)
(Echange 35, 24)

Mehrere Syntypen, Formosa.

DEI: 4 Syntypen, Formosa, Hokuto, Taihorin, 1911/III. 1912, leg. SAUTER.

nuristanus HICKER, 1937 (*Themus*)
(Arb. morph. taxon. Ent. 4, 180–181)

Holotypus, Afghanistan, Nuristan, Schlucht oberhalb Schuker, im Schuk-Tal, ca. 2600 m, 24. VI. 1935, Hindukusch-Exped., SCHEIBE; im DEI.

Syn. zu *subannulicornis* PIC, 1915.**paganetti** FLACH, 1907 (*Thelephorus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 16)

Mehrere Syntypen, Calabria, Antonimina, leg. HUMMLER, ex Coll. PAGANETTI-HUMMLER.

DEI: 4 Syntypen, Calabria, Antonimina, 1905, Coll. PAGANETTI–Coll. F. MÜLLER.

paulinoi KIESENWETTER, 1870 (*Cantharis*)
(Berl. Ent. Ztschr. 14, Beiheft, 125)

♂ Holotypus, Portugal, bei Coimbra, leg. PAULINO D' OLIVEIRA, in Coll. v. HEYDEN; im DEI.

piceovittatum PIC, 1927 (*Discodon*)
(Ent. Mitt. 16, 251–252)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI und in Coll. PIC.

DEI: 1 Syntypus, Bolivien, leg. GERMAIN.

pictipennis PIC, 1903 (*Malthodes*)
(Echange 19, 156)

Mehrere Syntypen; Umgebung Algier, Provinz Constantine, leg. DESBROCHERS und PIC; Tafaria, leg. THÉRY; Tunisie, leg. PIC.

DEI: 4 Syntypen, Tunis, Oasis Gafsa, durch v. BODEMEYER, Coll. LEONHARD.

plagiata HEYDEN, 1889 (*Cantharis*)
(Horae Soc. Ent. Ross. 23, 675)

Syntypen: 3 Ex. Kan-ssu, 2., 17., 18. VI. 1885, leg. POTANIN, 1 Ex. Korea, leg. HERZ.

DEI: Syntypen: 1 Ex. Kan-ssu, 1885, leg. POTANIN, 1 Ex. Korea, leg. HERZ-SIEVERS, Nr. 204.

pubicollis HEYDEN, 1889 (*Cantharis*)
(l.c., 674–675)

2 Syntypen, Kan-ssu, 18. VI. 1885, leg. POTANIN.

DEI: 1 Syntypus, Kan-ssu, 1885, leg. POTANIN, Coll. v. HEYDEN.

pumilio HEYDEN, 1885 (*Cantharis*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 29, 288)

Holotypus, Turkestan, Namagan, leg. STAUDINGER; im DEI [1885].

reductelineatus PIC, 1922 (*Malthinus*)
(Mél. Exot. Ent. 36, 30)

Mehrere Syntypen, Formosa.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Hokuto, III. 1912, leg. SAUTER.

reductum PIC, 1927 (*Discodon*)
(Ent. Mitt. 16, 251)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI und in Coll. PIC.

DEI: 9 Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN.

reini HEYDEN, 1879 (*Podabrus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 23, 351–352)

♀ Holotypus, Japan, Prov. Mino, 1874–1875, leg. REIN; im DEI, Coll. v. HEYDEN.

Syn. zu *heydeni* KIESENWETTER, 1879.

rufescens LETZNER, 1847 (*Cantharis*)
(Übers. Arb. Veränder. schles. Ges. (1846), 76)

Holotypus, Schlesien, im Gesenke, 1842, leg. LETZNER; im DEI, Coll. LETZNER.

Syn. zu *translucida* KRYNICKI, 1832.

rufostacea LETZNER, 1845 (*Cantharis*)
(l.c. (1844), 72)

2 Ex. Schlesien, Gesenke, in den Hundstagen, 3. Ex. dto., 1844, leg. LETZNER: Syntypen.

DEI: 2 Syntypen, ohne Fundort, Coll. KRAATZ.

sauteri PIC, 1912 (*Cantharis*)
(Echange 28, 46)

Holotypus, Formosa, Taihorinsho, leg. SAUTER, Coll. KRAATZ; im DEI [X. 1909].

sauteri PIC, 1926 (*Cantharis*)
(Ent. Mitt. 15, 68–69)

Holotypus, Formosa, leg. SAUTER, im DEI. [Taihorinsho, 7. IX].

sauteri PIC, 1911 (*Drilosilis*)
(Dtsch. Ent. Nat. Bibl. 2, 188)

Mehrere Syntypen, Formosa, Kosempo, Taihorinsho, leg. SAUTER, im DEI und in Coll. PIC.

DEI: 2 Syntypen, Formosa, Kosempo, Taihorinsho, IX. 1887–1909, leg. SAUTER.

sauteri PIC, 1937 (*Ichthyurus*)
(Ent. Bl. 33, 65; nom. praeocc. = *pici* DELKESKAMP, 1939, Cat. Col. 165, 210)

Holotypus, mehrere Paratypen, Formosa, Maruyama, leg. SAUTER, im DEI und in Coll. PIC.

DEI: Holotypus, 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, IV. 1914.

saxicola KRAUSS, 1894 (*Absidia*)
(Wien. Ent. Ztg. 13, 181–182)

Mehrere ♂♂, Syntypen, Sannthaler-Alpen, Steiner-Sattel, leg. PENECKE.

DEI: 2 Syntypen, Sannthaler-Alpen, 12. VII. 1893.

Syn. zu *birnbacheri* KRAUSS, 1894.

similis WITTMER, 1952 (*Podabrus*)
(Ent. Bl. 47 (1951), 97–98)

Holotypus, 2 Paratypen, China-Fukien, Kuatun, 2300 m, 29. IV.–29. V. 1938, leg. KLAPPERICH, im Museum A. KOENIG, Bonn und in Coll. KLAPPERICH.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, 20. V. 1938.

simplicicollis PIC, 1911 (*Plectonotum*)
(Echange 27, 180)

Holotypus, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI [Coll. KRAATZ].

subacuminatus PIC, 1936 (*Chauliognathus*)
(Ent. Anz. 16, 2)

Mehrere Syntypen, Paraguay, Brésil, Coll. HICKER – Coll. PIC.

DEI: 4 Syntypen, Brasilia, Rio Gr do Sul, Coll. HICKER.

subdilaticornis PIC, 1927 (*Polemius*)
(Ent. Mitt. 16, 250)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI und in Coll. PIC.
DEI: 1 Syntypus, Bolivien, leg. GERMAIN.

sudetica LETZNER, 1847 (*Cantharis*)
(Übers. Arb. Veränder. schles. Ges. (1846), 75–76)

2 Syntypen, Schlesien, an der Südostlehne des schwarzen Berges, ca. 2600' über dem Meere, 4. VI. 1846, leg. LETZNER.
DEI: 6 Syntypen, Schlesien, leg. LETZNER; 4 Ex. mit dem gleichen Fundort sind in der Beschreibung nicht genannt, aber als Typen ausgezeichnet.

taurigrada BOURGEOIS, 1900 (*Metacantharis*)
(In: BODEMEYER, E. v.: Quer durch Kleinasien in den Bulghar Dagh, 154)

Mehrere Syntypen, Burna.
DEI: 1 ♂, Syntypus, Asia minor, Burna, leg. v. BODEMEYER.

testacea PIC, 1910 (*Silis*)
(Ann. Soc. Ent. Belg. 54, 414)

Mehrere Syntypen, Sumatra, Djampang, Coll. PIC.
DEI: 1 Syntypus, Djampang.

testaceiceps PIC, 1927 (*Maronius*)
(Ent. Mitt. 16, 253; nom. praeocc. = *kraatzi* PIC, 1938, Echange 54, 158)

Holotypus, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI.

testaceoprolongatus PIC, 1937 (*Malthodes*)
(Ent. Bl. 33, 64–65)

Holotypus, occ. Java, Tjibodas, im DEI [400 m, 1923, FULMEK 32].

tetraglyphus HICKER, 1953 (*Malthodes*)
(Stud. tentini 30, 130, Fig.)

Mehrere Ex.; Adamello-Gebiet, am Piz Arera, 1500 m, leg. NISSEL; 30 Ex. am Passo di Croce Domini, Brescianer Vorbergen, ca. 1900 m, leg. MANDL; mehrere Ex. am Monte Arere und Oltre il colle, leg. STOLZ; ♂ Holotypus, Paratypen, in Coll. HICKER und Coll. MANDL.
DEI: 1 ♂, 1 ♀, Paratypen, Lombardei, Adamello-Gebiet, 28. VI. – 6. VII. 1952, Passo di Croce Domini, ca. 1900 m, leg. MANDL.

triangulifer PIC, 1931 (*Polemius*)
(Ann. Soc. Ent. Fr. 100, 86)

Holotypus, Bolivia, Coll. KRAATZ [Yungas].

trinitaticollis PIC, 1937 (*Silis*)
(Ent. Bl. 33, 62)

Holotypus, Guatemala, leg. CONRADT, im DEI [Coll. KRAATZ].

vaucheri PIC, 1901 (*Malthinus*)
(Bull. Soc. Ent. Fr., 111)

Mehrere Syntypen, Marokko, Tanger.
DEI: 2 Syntypen, Maroc., Coll. STIERLIN.

Wahrscheinlich nicht beschriebene Arten**banghaasi** PIC (*Chauliognathus*)

DEI: 1 Type, Espirito Santo, STAUDINGER & BANG-HAAS, dedic.

blanchardi BOURGEOIS (*Psilorhynchus*)

DEI: 1 Type, Peru, Callanga, Coll. KRAATZ.

heterocerus BOURGEOIS (*Discodon*)

DEI: 2 Typen, Bolivien, Peru, Pachitea; Coll. KRAATZ.

heteronota BOURGEOIS (*Cantharis*)

DEI: 1 Type, Bolivien, Coll. KRAATZ.

toxophosus GANGLBAUER (*Malthodes*)

DEI: 2 Typen, Venedig, Veneto, Grazepa, 30. VI. 1929, leg. FIORI, Coll. STIERLIN.

trinacrius GANGLBAUER (*Malthodes*)

DEI: 5 Typen, Palermo, leg. HOLDHAUS, Nr. 5856.

Phengodidae**atricolor** PIC, 1937 (*Phengodes*)
(Ent. Bl. 33, 58; als var. von *fusca* GORHAM beschrieben)

Holotypus, Costa Rica, Turrialba, leg. SCHILD, im DEI (III., 900 m, HEYNE].
Von WITTMER 1976 als Art erhoben, in Ent. Arb. Mus. FREY 27, 423.

Drilidae

fischeri PIC, 1937 (*Phrixothrix*)
(Ent. Bl. 33, 58–59)

Holotypus, Brésil, Rio de Janeiro, leg. FISCHER, im DEI [27. XI. 1918].

opacus PIC, 1937 (*Phrixothrix*)
(l.c., 58)

Holotypus, Peru, Callanga, im DEI [Coll. KRAATZ].

subspinosus PIC, 1910 (*Laemoglyptus*)
(Naturaliste 32, 259)

Mehrere Syntypen, Formosa, Coll. PIC.

DEI: 1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Formosa, Taihorinsho, X. 1909/22. VIII., leg. SAUTER;

testaceonotatus PIC, 1937 (*Monocladus*)
(Ent. Bl. 33, 59)

Holotypus, Indes or., im DEI [Coll. KRAATZ].

Malachiidae

akbesianus PIC, 1898 (*Malachius*)
(Misc. Ent. 6, 138)

Mehrere Syntypen, Hte Syrie, Akbes, Coll. DELAGRANGE.

DEI: 1 Syntypus, Akbes, Coll. KRAATZ.

apicalis PIC, 1912 (*Sphingopalpus*)
(Col. Rundsch., 53)

Holotypus, Rhodesia, leg. BODONG, im DEI.

artvinensis WITTMER, 1974 (*Malachius*)
(Fragmenta Ent. 10, 15–16, Abb. 18)

Holotypus, mehrere Paratypen, Türkei, Anatolien, Prov. Artvin, Şavşat (Shavshat), 3.–11. VI. 1972, leg. HOLZSCHUH, im Museum Basel und in Coll. HOLZSCHUH.

DEI: 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

banghaasi FERRIN, 1900 (*Malachius*)
(Bull. Acad. Mars., 16; Separat)

Mehrere Syntypen, Turkestan, Buchara, ex STAUDINGER.

DEI: 6 Ex. Ost-Buchara, Tschitschantan, 1898, leg. HAUSER, Coll. LEONHARD; 1 Ex. Buchara, Coll. KRAATZ: Syntypen.

biapicalis PIC, 1937 (*Attalus*)
(Ent. Bl. 33, 60)

♀ Holotypus, Afrique occ., Kamerun, leg. CONRADT, im DEI [Coll. KRAATZ].

bispinus WITTMER, 1935 (*Cephaloncus*)
(Eos 11, 181–182)

Mehrere Syntypen, Sinai, Wadi Feran, 4. III. 1935, Wadi Hebran, 6. III. 1935, Exped. von TORRE und TASSO.

DEI: 2 Syntypen, Sinai, Wadi Feran, 4. III. 1935, durch WITTMER, Coll. Museo ent., "PIETRO ROSSI" Duino.

brevilineatus PIC, 1937 (*Philhedonus*)
(Ent. Bl. 33, 60)

♀ Holotypus, Afrique, Usambara, im DEI [Coll. KRAATZ].

brevicornis KRAATZ, 1862 (*Malachius*)
(Berl. Ent. Ztschr. 6, 270)

♂ Holotypus, Andalusien, leg. STAUDINGER; im DEI [Coll. KRAATZ].

bucharicus PIC, 1907 (*Attalus*)
(Echange 23, No. 265, 97–98)

Mehrere Syntypen, Buchara, Repetek, in Coll. HAUSER und Coll. PIC.

DEI: 2 Syntypen, Buchara, Repetek, IV. 1900, Coll. HAUSER-Coll. LEONHARD.

caeruleicolor PIC, 1927 (*Attalus*)
(Ent. Mitt. 16, 255)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, in Coll. PIC und im DEI.

DEI: 4 Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN.

coeruleus KRAATZ, 1895 (*Hadrocnemus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 60–61)

Mehrere Syntypen, (Togo) Bismarckburg, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

DEI: 7 Syntypen, Togo, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

Syn. zu *azureus* ERICHSON, 1840.

conradti PIC, 1937 (*Ebaeus*)
(Ent. Bl. 33, 61)

♂ Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI [Coll. KRAATZ].

Syn. zu *malachioides* FAIRMAIRE, 1887.

conradti KRAATZ, 1895 (*Hadrocnemus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 60)

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, (Togo) Bismarckburg, leg. CONRADT, in Coll. KRAATZ; im DEI.

corniculatus KRAATZ, 1864 (*Anthodytes*)
(Berl. Ent. Ztschr. 8, 308–309, Taf. 5, Fig. 1)

♂ Holotypus, Graecia; im DEI, Coll. KRAATZ.

crassicornis WITTMER, 1975 (*Charopus*)
(Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 48, 266–267, Fig. 9)

Holotypus, mehrere Paratypen, Türkei, Anatolien, 30 km östlich von Bingöl, 1200 m, 20. VI. 1972, leg. HOLZSCHUH, im Museum Basel und in Coll. HOLZSCHUH.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

diversicollis CHABAUT, 1898 (*Attalus*)
(Rev. Ent. Caen 17, 77–78)

15 ♂♂, 18 ♀♀, Syntypen, Algerien, Ghardaïa, Plateau Chebka, leg. BAYONNE.

DEI: 2 Syntypen, Ghardaïa, V. 1897, durch CHABAUT, Coll. KRAATZ.

drakei PIC, 1937 (*Attalus*)
(Ent. Bl. 33, 61)

Holotypus, Paraguay, leg. DRAKE, im DEI [188., Coll. KRAATZ].

dux ABEILLE, 1890 (*Anthocomus*)
(Rev. Ent. 9, 44–45)

Mehrere Syntypen, Afghanistan, Kischlak, via v. HEYDEN an AB. EILLE.

DEI: 5 Syntypen, Afghanistan, Kischlak, durch DIECK, Coll. v. HEYDEN.

flavonotatus PIC, 1937 (*Attalus*)
(Ent. Bl. 33, 60–61)

♀ Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI [Coll. KRAATZ].

graecus KRAATZ, 1862 (*Malachius*)
(Berl. Ent. Ztschr. 6, 122)

Mehrere Syntypen, Griechenland, leg. KRÜPER.

DEI: 3 Syntypen, Graecia, leg. KRÜPER, Coll. KRAATZ.

heydeni ABEILLE, 1887 (*Attalus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 31, 447–448)

2 ♀♀, Syntypen, Marocco, Mogador, 1872, leg. FRITSCH und REIN, via v. HEYDEN an ABEILLE.

DEI: 1 ♀, Syntypus, Amsmid bis Mogador, 14.–20. VI. 1872, leg. FRITSCH und REIN, Coll. v. HEYDEN.

horni PIC, 1937 (*Carphurus*)
(Ent. Bl. 33, 62)

Holotypus, Ceylon, Kandy, leg. HORN, im DEI [Nr. 7, 1899].

kraatzi PIC, 1927 (*Dromanthus*)
(Ent. Mitt. 16, 254–255)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, in Coll. PIC und im DEI.

DEI: 4 Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN.

lateapicalis PIC, 1937 (*Pseudocolotes*)
(Ent. Bl. 33, 62)

Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI [Coll. KRAATZ].

latefasciatus PIC, 1919 (*Laius*)
(Mél. Exot. Ent. 30, 12)

Mehrere Syntypen, Formosa.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Anping, VIII. 1911, leg. SAUTER.

lineaticollis PIC, 1917 (*Malachius*)
(l.c. 26, 6)

Mehrere Syntypen, Formosa.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Hokuto, III. 1912, leg. SAUTER.

quadripustulatus KRAATZ, 1895 (*Hadrocnemus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 272)

♂ Holotypus, Niger-Benue, Coll. KRAATZ, im DEI.

(Auf dem handschriftlichen Determinationszettel von KRAATZ steht *quadrimaculatus*!).

Syn. zu *nobilis* ERICHSON, 1843.

ragusae SCHAUFUSS, 1870 (*Axinotarsus*)
(Nunq. otios. 1, 157–158)

Mehrere Syntypen, Palermo, leg. RAGUSA, via METZNER an SCHAUFUSS.

DEI: 1 Syntypus, Palermo.

rufopicalis PIC, 1917 (*Attalus*)
(Mél. Exot. Ent. 26, 6)

Mehrere Syntypen, Formosa.

DEI: 3 Syntypen, Formosa, Hokuto, III. 1912, leg. SAUTER.

schenklingi PIC, 1927 (*Attalus*)
(Ent. Mitt. 16, 255)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI und in Coll. PIC.
DEI: 1 Syntypus, Bolivien, leg. GERMAIN.

serrifer PIC, 1911 (*Malachius*)
(Echange 27, No. 314, 107, Note 2)

Mehrere Syntypen, Persien, Luristan, via v. BODEMEYER an PIC, in Coll. PIC.
DEI: 1 Syntypus, Persien, Luristan, durch v. BODEMEYER.

spectabilis KRAATZ, 1895 (*Hadrocnemus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 271; nom. praeocc. = *constrictipes* CHAMPION, 1920, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) 6, 192)

Mehrere Syntypen, Niger-Benue, ex Coll. RICHTER.
DEI: 3 Syntypen, Niger-Benue, Exp., Coll. KRAATZ.

srnkae KRAATZ, 1895 (*Hadrocnemus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 60)

♂ Holotypus, Africa orient., Mombasa, leg. CONRADT, via SRNKA an KRAATZ; im DEI.

sublumulatus PIC, 1937 (*Laius*)
(Ent. Bl. 33, 59)

Mehrere Syntypen, Australien, Queensland, im DEI.
DEI: 10 Syntypen, Queensland, Coll. HACKER.

tenellus KRAATZ, 1862 (*Malachius*)
(Berl. Ent. Ztschr. 6, 123)

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Griechenland, leg. KRÜPPEL; im DEI.
Syn. zu *labiatus* BRULLÉ, 1832.

tenuicornis KRAATZ, 1895 (*Hadrocnemus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 62)

♀ Holotypus, Bismarckburg, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ; im DEI [Togo].

trimaculatus PIC, 1937 (*Attalus*)
(Ent. Bl. 33, 61)

Holotypus, Guatemala, im DEI [Nr. 58, Coll. KRAATZ].

varitarsis KRAATZ, 1862 (*Anthocomus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 6, 270–271)

Mehrere Syntypen, Italien, leg. KAHR.
DEI: 1 Paratypus, Italien, leg. KAHR, Coll. KRAATZ.

viridis KRAATZ, 1895 (*Hadrocnemus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 62; nom. praeocc. = *fissipes* CHAMPION, 1920, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) 6, 258)

2 ♀♀, Bismarckburg, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ; im DEI [Togo].

Wahrscheinlich nicht beschriebene Art**bodemeyeri** REITTER (*Malachius*)

DEI: 2 Typen, Persien, Luristan, durch v. BODEMEYER, Coll. LEONHARD.

Karumiidae**holzschuhi** MANDL (1978 ?) (*Paulusiella*)
(soll in Koleopt. Rundsch. 54 veröffentlicht werden)

DEI: 1 Paratypus, Iran, Kashun, 25.–27. V. 1976, leg. HOLZSCHUH/RESSL.

richteri MANDL, 1974 (*Paulusiella*)
(Verh. Natur. Ges. Basel 84, 641–642)

♂ Holotypus, Iran, Belutschistan, Iranshar, 800 m, 11.–21. IV. 1954; 15 Ex. dt.; 3 Ex. Iran, Makran, am Kahuran bei Putab, 25. III. 1954; leg. RICHTER und SCHÄUFFELE, Paratypen; im Museum Stuttgart, in Coll. WITTMER und Museum Basel.

DEI: 1 Paratypus, Iran, Belutschistan, Iranshar, 800 m, 11.–21. IV. 1954, leg. RICHTER und SCHÄUFFELE.

Dasytidae**abietum** KIESENWETTER, 1859 (*Haplocnemus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 3, 171–172)

Mehrere Syntypen, Griechenland, Parnes bei Athen und Gebirge Aetoliens, leg. v. KIESENWETTER.
DEI: 2 Syntypen, Graecia, Coll. STIERLIN.

acutus SCHILSKY, 1895 (*Dasytes*)
(In: KÜSTER, H. C.: Käfer Europas 31, Nr. 9)

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Algier, Bongie, leg. KOBELT, ex Coll. v. HEYDEN.
DEI: 1 ♀, Syntypus, Bougie, 1884, leg. KOBELT, Coll. v. HEYDEN. Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Bongie“, steht auf dem Etikett „Bougie“.
Syn. zu *acutipennis* BAUDI, 1873.

aplocnemiformis PIC, 1915 (*Dasytes*)
(Bull. Soc. Zool. Fr. 40, 97)

Mehrere Syntypen, Indes, Khasia Hills.
DEI: 3 Ex. Assam, Khasia Hills, 2 Ex. Khasis, 1898; Coll. KRAATZ, Syntypen.

binotaticollis PIC, 1927 (*Dasytes*)
(Ent. Mitt. 16, 254)

Holotypus, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI.

dasytoides KRAATZ, 1882 (*Chaetomalachius*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 26, 97)

Mehrere Syntypen, Margelan, in Coll. KRAATZ und Coll. v. HEYDEN.
DEI: 1 Ex. Margelan, 2 Ex. ohne Fundort, Coll. KRAATZ, 1 Ex. Turkestan, Coll. v. HEYDEN: Syntypen.

emarginatus SCHILSKY, 1895 (*Dasytes*)
(In: KÜSTER, H. C.: Käfer Europas 31, Nr. 8)

Mehrere Syntypen, Marokko, Mogador, leg. FRITTSCH und REIN, in Coll. v. HEYDEN.
DEI: 1 Ex. Marokko, durch v. HEYDEN, Nr. 6070, Coll. KOLTZE; 7 Ex. Amsmid bis Mogador, 14.–20. VI. 1872; 2 Ex. Mogador nach Djebel Hadid; 4 Ex. Untere Reraya Thal und Berg, 10. VI. 1872; leg. FRITTSCH und REIN, Coll. v. HEYDEN; Syntypen.

kiesenwetteri HEYDEN, 1870 (*Danacaea*)
(Span. Reise, 127; ex Berl. Ent. Ztschr., 1870)

Mehrere Syntypen, Andalusien, Ronda, leg. v. HEYDEN.
DEI: 3 Syntypen, Andalusien, Ronda, 1869, leg. v. HEYDEN, Coll. STIERLIN, Coll. v. HEYDEN.

kraatzi SCHILSKY, 1894 (*Dasytes*)
(In: KÜSTER, H. C.: Käfer Europas 30, Nr. 12)

Mehrere Syntypen, Marokko, Setlat, Mogador, V., VI.
DEI: 1 Syntypus, Marokko, durch v. HEYDEN, Nr. 6062, Coll. KOLTZE.

limbipennis KIESENWETTER, 1865 (*Haplocnemus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 9, 383)

Mehrere Syntypen, Spanien, Andalusisches Gebirge, Excursion, Sommer 1865.
DEI: 2 Syntypen, Spanien, Jaen, Coll. STIERLIN.

longula DESBROCHERS, 1889 (*Amauronia*)
(Bull. Soc. Ent. Fr. (6) 9, 185)

Mehrere Syntypen, Algerien, Téniet-el-Hâad.
DEI: 2 Syntypen, Téniet-el-Hâad, 1889, durch DESBROCHERS, Coll. STIERLIN.

luctuosa DESBROCHERS, 1889 (*Danacaea*)
(l.c., 185)

Mehrere Syntypen, Algerien, Téniet-el-Hâad.
DEI: 4 Syntypen, Téniet-el-Hâad, durch DESBROCHERS, Nr. 102, Coll. STIERLIN.

lusitana HEYDEN, 1870 (*Danacaea*)
(Ent. Reise Span., 127–128; ex Berl. Ent. Ztschr., 1870)

2 Syntypen, Portugal, Coimbra, leg. v. HEYDEN; im DEI [1869].

marginatus ROTTENBERG, 1870 (*Haplocnemus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 14, 243)

♀ Holotypus, Catania, leg. v. ROTTENBERG; im DEI.
Syn. zu *rufomarginatus* FERRIS, 1869.

medius ROTTENBERG, 1870 (*Dasytiscus*)
(l.c., 244)

Mehrere Syntypen, Sicilien, bei Syr., leg. v. ROTTENBERG.
DEI: 3 Syntypen, Syrakus, leg. v. ROTTENBERG.

nigritus KIESENWETTER, 1859 (*Dasytes*)
(l.c. 3, 169)

Mehrere Syntypen, Griechenland.
DEI: 2 Syntypen, Graecia, Coll. STIERLIN.

oertzeni SCHILSKY, 1896 (*Trichocele*)
(In: KÜSTER, H. C.: Käfer Europas 32, Nr. 91)

Mehrere Syntypen, Creta, leg. v. OERTZEN.
DEI: 4 Syntypen, Creta, leg. v. OERTZEN, Coll. LEONHARD.

opaciceps PIC, 1927 (*Haplamaurus*)
(Ent. Mitt. 16, 254)

Holotypus, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI.

picticollis HEYDEN, 1899 (*Aphyctus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 328)

2 Syntypen, Turkestan, Taschkent, via HAUSER an v. HEYDEN.
DEI: 1 ♀, Syntypus, Taschkent, durch HAUSER, Nr. 92.

pristocerus KIESENWETTER, 1859 (*Haplocnemus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 3, 170–171)

Mehrere Syntypen, Griechenland.
DEI: 2 Syntypen, Graecia.

scheibei BLAIR, 1937 (*Eulobonyx*)
(Arb. morph. taxon. Ent. 4, 181–182)

Holotypus, 41 Paratypen, Afghanistan, Gadu im Ramgul-Tal, 5. VII. 1935, Hindukusch-Expedition, im DEI und Britischen Museum.

DEI: ♂ Holotypus, 24 Paratypen, Afghan, Nuristan, Gadu im Ramgul-Tal, 5. VII. 1935, Expedit. SCHEIBE.

subdepressus SCHILSKY, 1895 (*Dasytes*)
(In: KÜSTER, H. C.: Käfer Europas 31, Nr. 7)

Mehrere Syntypen, Nord-Afrika, Djebel-Aures, im Museum Berlin und in Coll. v. HEYDEN.

DEI: 3 Syntypen, Djebel-Aures, 1875, durch OBERTHÜR, Coll. v. HEYDEN (1 Ex. ohne Abdomen).

timidus BAUDI, 1873 (*Dasytes*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 17, 318)

Mehrere Syntypen, Cypern, leg. TRUQUI.

DEI: 1 Syntypus, Cypro, Coll. STERLIN.

turkestanicus KRAATZ, 1882 (*Eulobonyx*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 26, 98)

Mehrere Syntypen, Margelan, in Coll. KRAATZ und Coll. v. HEYDEN.

DEI: 1 Ex. Margelan, 2 Ex. ohne Fundort, Coll. KRAATZ; 3 Ex. Turkestan, durch STAUDINGER-KRAATZ, Coll. v. HEYDEN: Syntypen.

valida HEYDEN, 1877 (*Danacaea*)
(Verh. Nat. Ver. Brünn 16, 215)

2 Syntypen, Kaukasus, Mikwena am Rien, IV., Katharinenfeld, V.; 1874, leg. LEDER.

DEI: 1 Syntypus, Kaukas., leg. LEDER, Nr. 140.

Wahrscheinlich nicht beschriebene Arten

aheneus SCHAUFUSS, (*Dasytes*)

DEI: 2 Typen, Callistoga, IV., Coll. SCHAUFUSS.

australis SCHAUFUSS (*Dasytes*)

DEI: 2 Typen, Australien, Coll. SCHAUFUSS.

paganetti PIC (*Trichoceble*)

DEI: 3 Typen, Zelenika, leg. PAGANETTI, Coll. LEONHARD.

serraticornis KÜSTER (*Dasytes*)

DEI: 1 Type, Sardinien, Coll. KRAATZ.

serrimargo SCHAUFUSS (*Dasytes*)

DEI: 2 Typen, S. Mateo, VI.

Melyridae

amaliae HEYDEN, 1886 (*Melyris*)
(Senckenb. Naturf. Gesellsch., 56)

Holotypus, Algier, Prov. Constantine, nahe El Kantara, 1884, leg. KOBELT; Coll. v. HEYDEN, im DEI.

Syn. zu *ruficrus* FAIRMAIRE, 1882.

atricolor PIC, 1927 (*Melyrodes*)
(Ent. Mitt. 16, 254)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, in Coll. PIC und im DEI.

DEI: 3 Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN.

banghaasi PIC, 1902 (*Astylus*)
(Echange 18, Nr. 210, 34–35)

Mehrere Syntypen, Bolivien, in Coll. PIC.

DEI: 3 Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN.

obscuritarsis PIC, 1912 (*Zygia*)
(Kol. Rundsch. 1, 53)

Holotypus, Panzani-Fälle, im DEI [Coll. KRAATZ].

reitteri HEYDEN, 1890 (*Zygia*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 73)

2 Syntypen, Tripolis, leg. QUEDENFELDT; im DEI.

rubrolimbata PIC, 1909 (*Zygia*)
(Echange 25, Nr. 294, 142)

Mehrere Syntypen, Küste von Somalis Berbera, durch ROLLE, Coll. PIC.

DEI: 2 Syntypen, Abessinien, Dire Dasua, Coll. KRAATZ.

turkestanicus HEYDEN, 1886 (*Anthodromius*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 30, 186)

Syntypen: 1 Ex. Turkestan, Alai Gebirge, 1 Ex. Namagan, leg. STAUDINGER, in Coll. v. HEYDEN.

DEI: 1 ♂, Turkestan, Alai, Nr. 276, 1 Ex. Namangan, 1885, leg. STAUDINGER; Syntypen.

Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Namagan“ steht auf dem Etikett „Naman-gan“.

Wahrscheinlich nicht beschriebene Art

apicalis SCHAUFUSS (*Zygia*)

DEI: 2 Typen, Zambesi, Coll. SCHAUFUSS, HEYNE comm. 1912.

Cleridae

abdominalis KRAATZ, 1899 (*Tenerus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 101)

Holotypus, N. Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT; im DEI [1896, Coll. KRAATZ].

abruptepunctatus SCHENKLING, 1932 (*Orthrius*)

(Mitt. Dtsch. Ent. Ges. 3, 24–25)

2 ♂♂, 2 ♀♀, Holotypus, Paratypen, südl. Provinz China, Yunnan, Gebirge bei Mengtze, in Coll. HAUSER und im DEI.

DEI: 1 ♂, Paratypus, China, Prov. Yunnan, Gebirge bei Mengtze.

abyssinicus GORHAM, 1883 (*Gyponya*)

(Ann. Mus. Genova 18, 604–605)

Mehrere Syntypen, Abyssinien, Scioa, Giagaguè, Let-Marefia, Mahal-Uonz, leg. ANTINORI, im Museum Genua.

DEI: 1 ♂, Syntypus, Scioa, Giagaguè, 1881, leg. ANTINORI, Coll. SCHENKLING.

adustus KRAATZ, 1899 (*Tenerus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 104)

Mehrere Syntypen, Westafrika, Togo, leg. CONRADT.

DEI: 2 Syntypen, Togo, Coll. KRAATZ.

aneicollis SCHENKLING, 1907 (*Hydnocera*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 306)

Mehrere Syntypen, Mexico, Guerrero, Chilpancingo, 4000 ft., Amula, 6000 ft., VII.–VIII., leg. SMITH, im Britischen Museum, Museum Berlin und DEI.

DEI: 1 Ex. Mexico, Guerrero; 2 Ex. Guerrero, Amula, 6000 ft., leg. SMITH: Syntypen.

aestivus SCHENKLING, 1906 (*Clerus*)

(l.c., 274)

Holotypus, mehrere Paratypen, Brasilien, im DEI.

DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Brasilien, Coll. KRAATZ.

albolineata SCHENKLING, 1906 (*Lemidia*)

(l.c., 302)

Holotypus, Queensland, Kuranda, leg. DODD, im DEI [XI. 1904].

amoenus SCHENKLING, 1906 (*Cleronomus*)

(l.c., 263, Taf. 2, Fig. 5)

Holotypus, mehrere Paratypen, Magdalenenstrom, im DEI.

DEI: ♂ Holotypus, Magdalenenfluss, Coll. KRAATZ.

Syn. zu *viridipennis* SPINOLA, 1844.

amoenus KRAATZ, 1899 (*Leptoclerus*)

(l.c., 83)

Holotypus, Nord-Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT; im DEI.

andamanensis SCHENKLING, 1906 (*Orthrius*)

(l.c., 268)

Holotypus, Andamanen, im DEI [Coll. KRAATZ].

Syn. zu *binotatus* FISCHER, 1829.

andresi SCHENKLING, 1913 (*Phloeocopus*)

(Bull. Soc. Ent. Egypte 5 (1912), 38–39)

Holotypus, Unter-Aegypten, Dessounes, VII. 1909, leg. ANDRES, im DEI.

andrewesi SCHENKLING, 1908 (*Callimerus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 366)

Holotypus, Nilgiri Hills, leg. ANDREWES, im DEI.

angulata SCHENKLING, 1900 (*Priocera*)

(l.c., 387–388)

Holotypus, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. SCHENKLING; im DEI [durch DONCKIER].

angustefasciatus PIC, 1947 (*Philocalus*)
(Diversites ent. 1, 5)

Holotypus, Rhodesia; im DEI [Plumtree, 5. II. 1909, to light].

angusticollis SCHENKLING, 1902 (*Orthrius*)
(Not. Leyd. Mus. 23, 126–127)

4 Syntypen, West-Java, leg. PASTEUR und SIXTHOFF, im Museum Leiden.

DEI: 1 Syntypus, West-Java, Toegoe.

angustus SCHENKLING, 1908 (*Gypomyz*)
(In: SJÖSTEDT, Y.: *Ergebn. Schwed. Zool. Exped. Kilimandjaro* 7, 7, 73–74, Taf. 2, Fig. 7)

Syntypen, Kilimandjaro, leg. SJÖSTEDT: 3 Ex. Kibonoto, untere Kulturzone, 23., 27., 30. IV. 1906; 2 Ex. dto., Kulturzone, 13. III., 16. IV. 1906.

DEI: 1 Syntypus, Kilimandjaro, Kibonoto, 1000–1200 m, 23. IV. 1906, leg. SJÖSTEDT.

annulipes SCHENKLING, 1906 (*Cephaloclerus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 300)

Holotypus, mehrere Paratypen, Britisch Ostafrika, im DEI.

DEI: Holotypus, 2 Paratypen, Britisch Ostafrika, leg. STAUDINGER, Coll. KRAATZ.

antennata SCHENKLING, 1916 (*Ichnea*)
(Ent. Mitt. 5, 151–152)

Holotypus, Jatahy, Goyaz, via DONCKIER an SCHENKLING, im DEI [Coll. SCHENKLING].

apicalis KRAATZ, 1899 (*Placocerus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 84–85)

Mehrere Ex. Nord-Kamerun, 1 Ex. Togo, leg. CONRADT; Syntypen.

DEI: 3 Ex. N. Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, 1896, 1 Ex. Togo; leg. CONRADT, Coll. KRAATZ, Syntypen.

apicicornis SCHENKLING, 1908 (*Phaeocyclotomus*)
(l.c., 482–483)Holotypus, Angola, Benguella, an Rinde von *Berlinea* spec., in Gesellschaft von Ameisen, leg. WELLMANN, im DEI [Nr. 57, 27. II. 1906].**araneipes** CORPORAAL, 1925 (*Clerus*)
(Ent. Mitt. 14, 394–395)

Holotypus, mehrere Paratypen, Costa Rica, Turrialba und San José, im Museum Amsterdam und DEI.

DEI: 1 Paratypus, Costa Rica, Turrialba, 1922, durch HEYNE.

arrowi SCHENKLING, 1907 (*Clerus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 313)

Mehrere Syntypen, Amazon, leg. BATES, Ega, Peru, im Britischen Museum und DEI.

DEI: 1 Syntypus, Ega, 1906, ex Britisch. Museum.

banksi SCHENKLING, 1913 (*Dasyceroderus*)
(Phil. Journ. Sci. 8, No. 4, 304)

Holotypus, No. 12364, Palawan, Bacuit, leg. WEBER, in Coll. des Bureau of Science, Manila; Paratypen, dto., im DEI.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, ex Bu. of Sci., P. J.

basalis SCHENKLING, 1900 (*Axina*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 389)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Jatahy, Minas Geraes, in Coll. FAIRMAIRE, Coll. GRANDJEAN, Coll. KRAATZ und Coll. SCHENKLING.

DEI: 2 Syntypen, Brasilien, Goyaz, leg. DONCKIER, Coll. SCHENKLING, Coll. KRAATZ.

basalis KRAATZ, 1899 (*Phaeocyclotomus*)
(l.c., 93–94)

Mehrere Ex. SO.-Kamerun, Lolodorf, leg. CONRADT, 1 Ex. Gabun, leg. STAUDINGER; Syntypen.

DEI: 6 Syntypen, SO.-Kamerun, Lolodorf, 1895, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

basiventris SCHENKLING, 1902 (*Thaleroenemis*)
(Bull. Mus. Paris 8, 328–329)

Mehrere Syntypen, Nouvelle-Guinée, Dorey, 1878, leg. RAFFRAY und MAINDRON, im Museum Paris.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. SCHENKLING.

bellus SCHENKLING, 1898 (*Clerus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 365)

Mehrere Syntypen, Bolivia, leg. STAUDINGER.

DEI: 2 Syntypen, Bolivia, leg. STAUDINGER.

bennigseni SCHENKLING, 1912 (*Ommadius*)
(Ent. Mitt. 1, 308–309)

2 Syntypen, Neuguinea, Sattelberg, Coll. v. BENNIGSEN; im DEI.

bennigseni HINTZ, 1907 (*Phloeocopus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 26)

2 Syntypen, Deutsch-Ostafrika, Kionga.

DEI: 1 Syntypus, Kionga, Coll. v. BENNIGSEN.

bicarinatus GORHAM, 1882 (*Clerus*)
(Biol. Centr.-Amer. 3(2), 152)

Mehrere Syntypen; Nicaragua, Chontales, leg. BELT; Panama, Volcan de Chiriqui, leg. CHAMPION.
DEI: 1 Syntypus, Bugaba, 800–1500 ft., leg. CHAMPION.

bicolor SCHENKLING, 1906 (*Lemidia*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 301)

Holotypus, Australien, im DEI [N. Holl.].

bifasciatus KRAATZ, 1900 (*Thanasimus*)
(l.c., 191)

Holotypus, Ceylon, Dambulla, leg. HORN; im DEI [Coll. KRAATZ].

bimaculata KRAATZ, 1899 (*Epiclines*)
(l.c., 87–88)

Holotypus, Nord-Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT; im DEI [1896, Coll. KRAATZ].

bipartitus SCHENKLING, 1915 (*Clerus*)
(Ent. Mitt. 4, 314)

Holotypus, Ecuador, Coca, leg. HAENSCH, im DEI [Coll. SCHENKLING].

bipunctata SCHENKLING, 1900 (*Isolemidia*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 399)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. KRAATZ und Coll. SCHENKLING.
DEI: 1 Syntypus, Brasilien, Goyaz, leg. DONCKIER, Coll. SCHENKLING.

birmanicum GORHAM, 1892 (*Stigmatium*)
(Ann. Mus. Civ. Genova (2) 12, 740)

4 Syntypen, Burma, Carin Hills, Cheba, 900–1100 m, in Coll. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Carin Cheba, 900–1100 m, 5. XII. 1888, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

blackburni HINTZ, 1908 (*Phlogistus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 711, 714)

7 Syntypen, Australien, Paek Downs, Victoria, Sidney, in Coll. HINTZ und im DEI.
DEI: 1 Syntypus, Peak Downs, Museum Godeffroy, Coll. SCHENKLING.

blackburni SCHENKLING, 1906 (*Phlogistus*)
(l.c., 279–280)

Holotypus, Australien, im DEI [N. Holl., Coll. KRAATZ].

brevis SCHENKLING, 1908 (*Apteroclerus*)
(In: SJÖSTEDT: Ergebn. Schwed. Zool. Exped. Kilimandjaro 7, 7, 71, Taf. 2, Fig. 4)

4 Syntypen, Kilimandjaro, Kiboscho, 3000–3500 m, 15. II. 1906, leg. SJÖSTEDT.
DEI: 1 Syntypus (Ex. verliehen, konnte nicht überprüft werden).

bruchi SCHENKLING, 1908 (*Hydnocera*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 701)

3 Syntypen, Argentina, Prov. Catamarca und Tucuman, via BRUCH an SCHENKLING, im La Plata Museum und DEI.
DEI: 1 Syntypus, Argentina, Prov. Catamarca, 4. III. 1907, leg. BRUCH.

bruchi SCHENKLING, 1908 (*Pelonium*)
(l.c., 705)

2 Syntypen, Argentina, Prov. Santiago de Estero, via BRUCH an SCHENKLING, im DEI.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, II. 1908, durch BRUCH.

bruchi SCHENKLING, 1916 (*Pyticeroopsis*)
(Ent. Mitt. 5, 154)

Holotypus, Argentina, Prov. San Luis, leg. BRUCH, via BRUCH an SCHENKLING, im DEI [XII. 1911].

brunnea SCHENKLING, 1906 (*Azina*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 254)

Holotypus, Nordperu, Prov. Tumbes, via DONCKIER an SCHENKLING, im DEI [Grao, durch BAER, Coll. SCHENKLING].

brunneopunctatus HINTZ, 1902 (*Gyponyx*)
(l.c., 398)

2 Syntypen, Capland, Natal, Bedford.
DEI: 1 Syntypus, Capland, Bedford, Coll. SCHENKLING.

brunniceps SCHENKLING, 1902 (*Tenerus*)
(Stett. Ent. Ztg. 63, 374–375)

Syntypen, Sumatra, leg. DOHRN; mehrere Ex. Soekaranda, 3 Ex. Palembang, in Coll. SCHENKLING.
DEI: 2 Syntypen, Sumatra, Palembang, Coll. KRAATZ.

caffer BOHEMAN, 1851 (*Opetiopalpus*)
(Ins. Caffraria 1, 516)

Mehrere Syntypen, Caffraria, leg. WAHLBERG.
DEI: 1 Syntypus, Caffraria, leg. WAHLBERG.

carinatum SCHENKLING, 1908 (*Pelonium*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 704–705)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Goyaz, leg. DONCKIER und leg. BAER, im DEI.
DEI: 1 Ex. Goyaz, Jatahy, Coll. KRAATZ; 1 Ex. Brésil, Goyaz, Rio verde, Coll. SCHENKLING; Syntypen.

carinulatus SCHENKLING, 1908 (*Tillus*)
(l.c., 364)

Mehrere Syntypen, Mindoro, Brit. Museum, im DEI.
DEI: 1 Syntypus, Mindoro, Nr. 95 – 226.

caucasicus KRAATZ, 1882 (*Trichodes*)
(l.c. 26, 320 – 321)

Mehrere Syntypen, Caucasus, via STAUDINGER an KRAATZ.
DEI: 1 Ex. Caucasus, Coll. KRAATZ, 1 Ex. Caucasus, durch STAUDINGER, in Coll. v. HEYDEN; Syntypen.
Syn. zu *armeniacus* BAUDI, 1873.

caviceps KRAATZ, 1899 (*Neohydnius*)
(Ann. Soc. Ent. Belg. 43, 216)

Holotypus, Südwest Sumatra, leg. WEYERS; im DEI [Coll. KRAATZ].

celebensis SCHENKLING, 1899 (*Phaeocyclotomus*)
(Ann. Mus. Genova (2) 20, 144 – 145)

Mehrere Syntypen, Celebes, Kandari, 1874, leg. BECCARI, im Museum Genua.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, III., Coll. SCHENKLING.

centrimaculata SCHENKLING, 1900 (*Axina*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 388)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Coll. BRANCSIK und Coll. SCHENKLING.
DEI: 1 Syntypus, Brasilien, Goyaz, durch DONCKIER, Coll. SCHENKLING.
Syn. zu *bifasciata* CHEVROLAT, 1876.

centurio SCHENKLING, 1906 (*Phaeocyclotomus*)
(l.c., 293)

Holotypus, mehrere Paratypen, Sumatra, Palembang, im DEI.
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Sumatra, Palembang, Coll. SCHENKLING.

ceylonicum KRAATZ, 1900 (*Stigmatium*)
(l.c., 190 – 191)

2 Syntypen, Ceylon, bei Weligama, leg. HORN.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, 1899, Coll. KRAATZ.

ceylonicus KRAATZ, 1900 (*Thanasimus*)
(l.c., 191 – 192)

Holotypus, Ceylon, Kanthaley-See, leg. HORN; im DEI [Coll. KRAATZ].

chinensis SCHENKLING, 1915 (*Callimerus*)
(Ent. Mitt. 4, 111 – 112)

Mehrere Syntypen, Südchina, Kweitschou, Kiangsi, Kanton, im DEI.
DEI: 3 Ex. China, Kweitschou, 1 Ex. Canton, durch STAUDINGER (PLASON!); Syntypen.

cicatricosa LEA, 1907 (*Lemidia*)
(Ann. Soc. Ent. Belg. 51, 334, 344)

Mehrere Syntypen; Tasmanien, leg. GRIFFITH, Launceston, George Town, West Tamar, leg. SIMSON, Mount Wellington, Hobart, Frankford, leg. LEA; King Island, leg. KERSHAW und LEA; Victoria, leg. FRENCH; N. S. Wales, Otford, im Macleay Museum.
DEI: 2 Syntypen, Tasmanien, King Island, leg. LEA, Coll. HACKER.

cinctus SCHENKLING, 1915 (*Clerus*)
(Ent. Mitt. 4, 315)

Holotypus, Peru, Vilcanota, im DEI [leg. STAUDINGER, Coll. SCHENKLING].

cinereum GORHAM, 1878 (*Stigmatium*)
(Trans. Ent. Soc. London, 165)

Mehrere Syntypen; New Guinea, Dorey, leg. WALLACE; Andaman Isles; in Coll. FRY und Coll. GORHAM.
DEI: 1 Syntypus, Dorey, leg. WALLACE, Coll. SCHENKLING.

circumcincta SCHENKLING, 1906 (*Lemidia*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 302)

Holotypus, mehrere Paratypen, Queensland, Kuranda, leg. DODD, im DEI.
DEI: Holotypus, Queensland, Kuranda, leg. DODD; 6 Paratypen, dto., VII., VIII. 1904.

circumductus SCHENKLING, 1915 (*Clerus*)
(Ent. Mitt. 4, 314 – 315)

Holotypus, Amazonas, im DEI [Coll. KRAATZ].

coccineus SCHENKLING, 1906 (*Clerus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 272, Taf. 2, Fig. 7)

Holotypus, mehrere Paratypen, Nord-Mexiko, Tsuque, im DEI.
DEI: Holotypus, 2 Paratypen, Nord-Mexiko, Tsuque, Coll. KRAATZ.

conspicua SCHENKLING, 1900 (*Axina*)
(l.c., 390)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. GRANDJEAN und Coll. SCHENKLING.
DEI: 4 Syntypen, Brasilien, Goyaz, durch DONCKIER, Coll. SCHENKLING.

cribrata SCHENKLING, 1916 (*Eleale*)
(Ent. Mitt. 5, 148–149)

Mehrere Syntypen, N. S.-Wales, im DEI.
DEI: 1 Ex. Belmore, leg. TAYLOR, Coll. HACKER; 2 Ex. N. Holl., Coll. KRAATZ; 1 Ex. Collect. PLASON; Syntypen.

cribratus SCHENKLING, 1908 (*Callimerus*)
(Rec. Ind. Mus. 2, 4, 387)

Holotypus, Bengal, Berhampur, Murshidabad District, leg. LLOYD, ex Museum Indian; im DEI [1. I. 1908].

cribricollis SCHENKLING, 1915 (*Cladiscus*)
(Ent. Mitt. 4, 108)

Holotypus, Tonkin, Sept Pagodes, durch LE MOULT, im DEI.

cribripennis SCHENKLING, 1916 (*Tarsostenodes*)
(l.c. 5, 154–155)

9 Syntypen, Australia, Kuranda, Herberton, im DEI.
DEI: 4 Ex. Quid., Kuranda, leg. DODD, 1 Ex. dto., leg. HACKER, Coll. HACKER; 2 Ex. Herberton, I., II. 1911, 3700 ft., leg. DODD; Syntypen.

cruciger SCHENKLING, 1906 (*Orthrius*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 269)

Holotypus, mehrere Paratypen, Queensland, Kuranda, leg. DODD, im DEI.
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

curticollis SCHENKLING, 1906 (*Tenerus*)
(l.c., 305–306, Taf. 2, Fig. 12)

Holotypus, Nepal, im DEI [leg. WEBER, Coll. KRAATZ].

cuspidata SCHENKLING, 1902 (*Pallenis*)
(Bull. Mus. Paris 8, 317–318)

Mehrere Syntypen, Madagascar, baie d' Antongil, 1893, leg. MOCQUERYS, im Museum Paris.
DEI: 2 Syntypen, S. de la baie d' Antongil, Coll. SCHENKLING, Coll. KRAATZ.

cyarella GORHAM, 1878 (*Dolichopsis*)
(Trans. Ent. Soc. London, 155–156)

Mehrere Syntypen, Prom. Bon. Spei., Coll. GORHAM, im Museum SAUNDERS.
DEI: 1 Syntypus, Cap. Bon. Spei., Coll. SCHENKLING.

cyanescens KRAATZ, 1899 (*Cephaloclerus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 106)

1 Ex. Togo, leg. CONRADT, 1 Ex. Gabun, leg. WEBER; Syntypen.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. KRAATZ.

cyanipennis GORHAM, 1883 (*Hydnocera*)
(Biol. Centr.-Amer. 3, 2, 175)

Mehrere Syntypen, Guatemala, Calderas, Capetillo, Quiche Mountains, leg. CHAMPION.
DEI: 2 Syntypen, Guatemala, Calderas, leg. CHAMPION.

cyanipennis PIC, 1948 (*Enopliomorpha*)
(Tiidschr. Ent. (1946), 131)

Holotypus, Africa centralis, Bangui, im DEI [Dubangui-Chari-Tchad].

cylindricollis GORHAM, 1886 (*Hydnocera*)
(Biol. Centr.-Amer. 3, 2 (Suppl.), 343)

Mehrere Syntypen; Nicaragua, Chontales, leg. JANSON; Panama, Bugaba, David, Volcan de Chiriqui below 4000 ft., leg. CHAMPION.
DEI: 1 Ex. Panama, Bugaba, leg. CHAMPION, 1 Ex. Teapa, Tabasco, leg. JAN. H. H. S.; Syntypen.

dalmatinus OBENBERGER, 1916 (*Corynetes*)
(Neue Beitr. Syst. Insekt. 1, 22)

Mehrere Syntypen, Dalmatien, Krivošija, Coll. OBENBERGER.
DEI: 1 Syntypus, Crkvice, Krivošije.

dealbatus KRAATZ, 1879 (*Pseudoclerops*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 23, 128–129)

Mehrere Syntypen, Amur, leg. CHRISTOPH.
DEI: 3 Syntypen, Amur, leg. CHRISTOPH, Coll. KRAATZ.

defletum SCHENKLING, 1902 (*Pelonium*)
(Not. Leyd. Mus. 23, 129–130)

4 Syntypen, N. O. Sumatra, Tandjong Morawa, Serdang, leg. HAGEN, im Museum Leyden.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. SCHENKLING.

difficilis SCHENKLING, 1912 (*Opilo*)
(Ent. Mitt. 1, 324–325)

Holotypus, Formosa, Taihorinsho, IX. 1909, leg. SAUTER; im DEI.

dimidiata SCHENKLING, 1915 (*Pallenis*)
(l.c. 4, 109–110)

Holotypus, Madagaskar, Tananarivo, im DEI.

dimidiatipennis SCHENKLING, 1899 (*Ommadius*)
(Ann. Mus. Genova (2) 20, 155–156)Mehrere Syntypen, Ins. Aru, Wokan, 1873, leg. BECCARI, im Museum Genua.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. SCHENKLING.***dimidiatus*** SCHENKLING, 1907 (*Clerus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 304–305)

15 Syntypen, Zentral-Amerika, Guerrero, Chilpancingo, 4600 ft., Amula, 6000 ft., VI.–IX., leg. SMITH, im Britischen Museum, Museum Berlin und DEI.

DEI: 1 Ex. Guerrero, Chilpancingo, 2 Ex. dto., durch HÖGE; 1 Ex. dto., 4600 ft., VI., leg. SMITH; Syntypen.

dimidiatus SCHENKLING, 1922 (*Stenocylidrus*)
(Trans. Linn. Soc. London 18, 1, 326–327, Fig. 2)

5 Syntypen, Seychelles Inseln, Silhouette, Wald nahe Mare bis Cochons, über 1000 ft., Hochwald 100)–2000 ft., VIII. bis IX. 1908, PERCY SLADEN TRUST Exped.

DEI: 1 Syntypus, Silhouette, 1908, Exp. Seychelles.

discoidalis SCHENKLING, 1908 (*Diplophorus*)
(In: SJÖSTEDT, Y.: Ergebn. Schwed. Zool. Exped. Kilimandjaro 7, 7, 70, Taf. 2, Fig. 3)

Mehrere Syntypen, Deutsch-Ostafrika, Kilimandjaro, 1905–1906, leg. SJÖSTEDT.

DEI: 1 Syntypus, Kilimandjaro, Kibonoto, 1300 m, 1905–1906, leg. SJÖSTEDT.

distinguendus SCHENKLING, 1908 (*Opilo*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 477)

Mehrere Syntypen, Nilgiri Hills, Hulikal, 6000 ft., X., leg. ANDREWES, im DEI.

DEI: 1 Syntypus, Nilgiri Hills.

diversipes SCHENKLING, 1916 (*Stigmatium*)
(Arch. Naturg. 82, A 5, 118)

Holotypus, Formosa, Hoozan, III. 1910, leg. SAUTER; im DEI.

dorsalis SCHENKLING, 1902 (*Orthrius*)
(Bull. Mus. Paris 8, 323–324)

Mehrere Syntypen, Dardjiling, 1890, leg. HARMAND, im Museum Paris.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

drescheri SCHENKLING, 1915 (*Callimerus*)
(Ent. Mitt. 4, 111)

Holotypus, Java, Noesa Kembangan, leg. DRESCHER, im DEI [I. 1910].

duodecimpustulatus SCHENKLING, 1912 (*Callimerus*)
(l.c. 1, 323–324)

7 Syntypen, Formosa, Kankau, IV.–V. 1912, Kosempo, V. 1912, Banshoryo, VI. 1912, leg. SAUTER.

DEI: 6 Ex. Formosa, Kankau, Koshun, IV., V. 1912, 1 Ex. Kosempo, V. 1912, 1 Ex. Kankau, 7. IV. 1912, 1 Ex. Banshoryo Distr., Sokutsu, VI. 1912; leg. SAUTER, Syntypen.

2 als Typen ausgezeichnete Ex. desselben Fundortes werden in der Beschreibung nicht genannt.

elegans SCHENKLING, 1907 (*Gyponyx*)
(Ann. South Afr. Mus. 5, 198)

Mehrere Syntypen, Transvaal, Lydenburg District, im South African Museum.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

elegantulus SCHENKLING, 1902 (*Clerus*)
(Bull. Mus. Paris 8, 325)

Mehrere Syntypen, Venezuela, La Victoria, 1896, leg. GEAY, im Museum Paris.

DEI: 1 Syntypus, Venezuela, La Victoria, IX., 33–96, leg. GEAY, ex Museum Paris, Coll. SCHENKLING.

eliminata SCHENKLING, 1900 (*Ichne*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 400)

Holotypus, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. SCHENKLING; im DEI [leg. DONCKIER].

elongatus HINTZ, 1908 (*Phlogistus*)
(l.c., 710, 713)

Holotypus, N. S. Wales, im DEI [durch STAUDINGER, Coll. SCHENKLING].

elongatus SCHENKLING, 1906 (*Thaneroclerus*)
(l.c., 278)

Holotypus, Yunnan, durch DONCKIER, im DEI.

equestris SCHENKLING, 1906 (*Priocera*)
(l.c., 257)

Holotypus, Brasilien, Jatahy, im DEI [Goyaz, Coll. SCHENKLING].

erinaceus SCHENKLING, 1908 (*Dasyroclerus*)
(l.c., 481–482)

Mehrere Syntypen, Nilgiri Hills, Ouchterlony Valley, 3500 ft., X.–II., leg. ANDREWES, im DEI.

DEI: 3 Syntypen, Nilgiri Hills.

***erymanthoides* SCHENKLING, 1906 (*Pelonium*)**
(l.c., 313)

Holotypus, mehrere Paratypen, Brasilien, Jatahy, im DEI.
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Brasilien, Goyaz, leg. DONCKIER, Coll. SCHENKLING.

***escherichi* KRAATZ, 1894 (*Trichodes*)**
(l.c., 132, Taf. 1, Fig. 12b)

Mehrere Syntypen, Turkestan, Bairam-Ali, leg. HAUSER, im DEI.
DEI: 1 Syntypus, Transcasp., Bairam-Ali, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *rectilinea* REITTER, 1894.

***escherichi* REITTER, 1893 (*Trichodes*)**
(Wien. Ent. Ztg. 12, 303–304)

Mehrere Syntypen, Turkestan, Kulüb, leg. STAUDINGER und BANG-HAAS.
DEI: 1 Syntypus, Turkestan, Mts. Ghissar, 1893, durch HAUSER, Coll. LEONHARD.

***farinosus* SCHENKLING, 1915 (*Callimerus*)**
(Ent. Mitt. 4, 114)

Mehrere Syntypen, Südindien, Wallardi bei Travancore, im DEI.
DEI: 1 Ex. Travancore, Wallardi, Coll. LE MOULT; 1 Ex. Wallardi, Coll. RONCHETTI: Syntypen.

***fasciatus* SCHENKLING, 1908 (*Cladiscus*)**
(Dtsch. Ent. Ztschr., 362–363)

Holotypus, Westl. Himalaya, Kulu, leg. ROST, im DEI [Beasfluss].

***fasciatus* SCHENKLING, 1900 (*Clerus*)**
(l.c., 394–395)

Mehrere Syntypen, Amazonas, Coll. KRAATZ und Coll. SCHENKLING.
DEI: 3 Ex. Amazon., 1 Ex. Amazon. Strom, Coll. KRAATZ, Coll. SCHENKLING.

***fasciatus* SCHENKLING, 1915 (*Orthrius*)**
(Ent. Mitt. 4, 248)

2 Syntypen, N. S. Wales, im DEI [Coll. HACKER].

***fasciatus* KRAATZ, 1899 (*Phaeocyclotomus*)**
(Dtsch. Ent. Ztschr., 98–99)

Mehrere Syntypen, Nord-Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, 1896, Coll. KRAATZ.

***fasciicollis* SCHENKLING, 1900 (*Clerus*)**
(l.c., 393–394)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Espirito Santo, Coll. SCHENKLING.
DEI: 1 Syntypus, Espirito Santo, Coll. SCHENKLING.

***fasciicollis* SCHENKLING, 1906 (*Evenus*)**
(l.c., 299–230, Taf. 2, Fig. 11)

Holotypus, Madagaskar, im DEI [Coll. KRAATZ].

***faustus* GORHAM, 1892 (*Callimerus*)**
(Ann. Mus. Genova (2) 12, 724–725)

Mehrere Syntypen, Burma, Carin Hills, Chebà, 900–1100 m, in Coll. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Carin Chebà, 900–1100 m, 5. XII. 1888, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

***faustus* SCHENKLING, 1900 (*Clerus*)**
(Dtsch. Ent. Ztschr., 395–396)

Mehrere Syntypen, Peru, Callanga, Coll. KRAATZ und Coll. SCHENKLING.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, durch STAUDINGER.

***femoratis* SCHENKLING, 1915 (*Callimerus*)**
(Ent. Mitt. 4, 112)

Mehrere Syntypen, Südindien, Wallardi bei Travancore, im DEI.
DEI: 2 Syntypen, Wallardi, durch LE MOULT.

***fenestratus* PIC, 1953 (*Opilo*)**
(Beitr. Ent. 3, 321)

Holotypus, Ost-Asien, China, Shan-Hai-Kouan, im DEI.

***flavangulus* KRAATZ, 1899 (*Tenerus*)**
(Dtsch. Ent. Ztschr., 103)

Holotypus, Togo, leg. CONRADT; im DEI [Coll. KRAATZ].

***flavipennis* KRAATZ, 1899 (*Neohydнус*)**
(Ann. Soc. Ent. Belg. 43, 216)

Holotypus, Südwest Sumatra, leg. WEYERS; im DEI [Coll. KRAATZ].

***flavipes* SCHENKLING, 1899 (*Ommadius*)**
(Ann. Mus. Genova (2) 20, 342–343)

Mehrere Syntypen, Ins. Mentawai, Sipora, 1894, leg. MODIGLIANI, im Museum Genua.
DEI: 1 Syntypus, Mentawai, Sipora, Sereinu, V. – VI. 1894, leg. MODIGLIANI, Coll. SCHENKLING.

Beiträge zur Entomologie, Heft 2, 1982, Band 32

flavus CHAPIN, 1919 (*Callimerus*)
(Proc. Biol. Soc. Washington 32, 233–234)

♂ Holotypus, Luzon, P. J., Mt. Banahao, leg. BAKER, in Coll. BAKER, Nr. 7278; 1 ♀, Paratypus, dto., No. 8290.
DEI: 1 Paratypus, P. J. Mt. Banahao, leg. BAKER.

floccosus SCHENKLING, 1898 (*Opilo*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 363–364)

Mehrere Syntypen, Australia.
DEI: 1 Syntypus, Austral., leg. HEYNE.

formosanum SCHENKLING, 1912 (*Pelonium*)
(Ent. Mitt. 1, 329–330)

Holotypus, Formosa, Kankau, IV. 1912, leg. SAUTER; im DEI [Koshun].

formosanus SCHENKLING, 1912 (*Opilo*)
(l.c., 324)

3 Syntypen, Formosa, Taihorin, VI. 1911, leg. SAUTER; im DEI.

formosanus SCHENKLING, 1912 (*Tenerus*)
(l.c., 329)

Holotypus, Formosa, Kosempo, VIII. 1911, leg. SAUTER; im DEI.

fossipenne SCHENKLING, 1917 (*Pelonium*)
(l.c. 6, 282–283)

Mehrere Syntypen, Argentinien, Mendoza, via JENSEN-HAARUP an SCHENKLING, in Coll. JENSEN-HAARUP und im DEI.
DEI: 2 Syntypen, Mendoza, Santa Rosa.

frater KRAATZ, 1893 (*Trichodes*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 80)

Mehrere Syntypen, Klein-Asien, leg. v. HAUSER.
DEI: 4 Ex. Asia minor, Coll. KRAATZ, 1 Ex. Asia minor, leg. v. HAUSER, in Coll. v. HEYDEN; Syntypen.

fraternus SCHENKLING, 1907 (*Clerus*)
(l.c., 311–312)

Mehrere Syntypen, Amazon, Ega, leg. BATES, im Britischen Museum und DEI.
DEI: 2 Syntypen, Amazon, leg. BATES, 1905, Nr. 100, Coll. FRY.

fritzi PIC, 1947 (*Opetiopalpus*)
(Divers. ent. 1, 5)

Mehrere Syntypen, Afr. mer.
DEI: 3 Syntypen, D.S.-Westafrika, durch FRITZ, Swakopmund.

fulva KRAATZ, 1899 (*Aphelochroa*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 86–87)

Mehrere Syntypen, Niger-Benue, ex Coll. RICHTER.
DEI: 4 Syntypen, Niger-Benue, Coll. KRAATZ.

fulvipennis SCHENKLING, 1898 (*Hydnocera*)
(l.c., 366–367)

Holotypus, Guatemala; im DEI [leg. HEYNE, Coll. SCHENKLING].

fulvus KRAATZ, 1899 (*Paradoxocerus*)
(l.c., 84)

Holotypus, Nord-Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT [1896, Coll. KRAATZ].

furcata GORHAM, 1886 (*Hydnocera*)
(Biol. Centr.-Amer. Col. 3, 2, Suppl. 342, Taf. 13, Fig. 14)

Ca. 12 Syntypen, Mexico, Northern Sonora, leg. MORRISON, via MORRISON an SCHENKLING.
DEI: 1 Syntypus, Mexico, N. Sonora, leg. MORRISON, Coll. SCHENKLING.
Syn. zu *discoidea* LECONTE, 1852.

furcatus SCHAEFFER, 1904 (*Colyphus*)
(Journ. New York Ent. Soc. 12, 218)

4 Syntypen, Texas, Brownsville, San Tomas, Esperanza Ranch, im Museum Brooklyn Institute of Arts and Sciences.
DEI: 1 Syntypus, Texas, Brownsville, Esperanza Rch., 30. VII.

gahani SCHENKLING, 1907 (*Clerus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 311)

Mehrere Syntypen, Amazon, leg. BATES, im Britischen Museum und DEI.
DEI: 1 Syntypus, Amazon, leg. BATES, 1905, Nr. 100, Coll. FRY.

gemellatus SCHENKLING, 1907 (*Gyponyx*)
(Ann. South Afr. Mus. 5, 198)

Mehrere Syntypen, Cape Colony, Ookiep, im South African Museum.
DEI: 1 Syntypus, Ookiep, 1880.

geminum SCHENKLING, 1900 (*Pelonium*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 409)

Mehrere Syntypen, Peru, Callanga, Coll. SCHENKLING.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

gestroi SCHENKING, 1899 (*Xestonotus*)
(Ann. Mus. Genova (2) 20, 142–143)

Mehrere Syntypen, Brit. Neu Guinea; Mt. Astrolabe; Ighibirei, 1890 u. 1893, leg. LORIA; Fly River, 1876–77, leg. D'ALBERTIS.

DEI: 1 Syntypus, Neu Guinea, Fly River, 1876–77, leg. D'ALBERTIS.

glaber SCHENKING, 1922 (*Stenocylidrus*)
(Trans. Linn. Soc. London 18, 1, 327–328, Fig. 3)

6 Syntypen, Seychelles Inseln, Mahé, Gegend oberhalb Port Glaud, ca. 500–1000 ft., XI. 1908; nahe Morne Blanc, ca. 1000 ft., PERCY SLADEN TRUST Exped.

DEI: 1 Syntypus, Mahé, 1908–1909; 1921, Exp. Seychelles, Mus. Cambridge (SCOTT).

gorhami WOLCOTT, 1910 (*Hydnocera*)
(Publ. Field. Mus. Chicago 7, 378, Taf. 5, Fig. 8)

Holotypus, Mexico, Cuernavaca, Morelos, in Coll. WICKHAM, 5 Paratypen, dto., in Coll. WOLCOTT.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, ex Coll. WOLCOTT.

gorhami SCHENKING, 1898 (*Lemidia*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 174–175)

Mehrere Syntypen, Australia.

DEI: 2 Syntypen, N. Holl., Coll. SCHENKING und Coll. KRAATZ.

gorhami SCHENKING, 1906 (*Tenerus*)
(l.c., 306)

Holotypus, Morty, leg. WALLACE, im DEI [Coll. SCHENKING].

gracilis SCHENKING, 1898 (*Lemidia*)
(l.c., 178)

Holotypus, Tasmania; im DEI [Emu Bay, Coll. SCHENKING].

gracilis SCHENKING, 1906 (*Priocera*)
(l.c., 257)

Holotypus, Brasilien, Jatahy, im DEI [Goyaz, Coll. SCHENKING].

grandis SCHENKING, 1902 (*Strotocera*)
(Not. Leyd. Mus. 23, 124–125)

Syntypen: 1 Ex. Java, Mons Tjikorai, 1892, leg. FRUHSTORFER, 2 Ex. Borneo, leg. SIJTHOFF; im Museum Leiden; 1 Ex. Südost-Borneo, Tandjong, 1894, leg. SÜCK, im Museum Hamburg; 1 Ex. Holländisch-Borneo, Pontianak, via DONCKIER an SCHENKING, in Coll. SCHENKING.

DEI: 1 Syntypus, Holl. Borneo, Pontianak, Coll. SCHENKING.

grandis STIERLIN, 1868 (*Opilus*)
(Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 2, 346–347)

Mehrere Syntypen, Bagdad, leg. SCHLÄFLI.

DEI: 3 Syntypen, Bagdad, VII. 1862, Coll. STIERLIN.

grandjeani SCHENKING, 1901 (*Callimerus*)
(Ann. Soc. Ent. Belg. 45, 104–105)

Mehrere Syntypen, Bengal, Himalaya, Barway, im Museum Brüssel und in Coll. GRANDJEAN.

DEI: 1 Syntypus, Barway, durch CARDON, Coll. SCHENKING.

grossepunctatus FAIRMAIRE, 1902 (*Opilo*)
(Ann. Soc. Ent. Fr. 71, 555)

Mehrere Syntypen, Madagascar, Umgebung von Suberbieville, leg. PERRIER.

DEI: 1 Syntypus, Madagascar, leg. PERRIER (FAIRM.), Coll. SCHENKING.

hackeri LEA, 1907 (*Lemidia*)
(Ann. Soc. Ent. Belg. 51, 334, 356)

Mehrere Syntypen, Queensland, Coen River, leg. HACKER.

DEI: 2 Syntypen, Queensland, Coen District, Cape York, leg. HACKER, Coll. HACKER.

hackeri SCHENKING, 1915 (*Phaeocyclotomus*)
(Ent. Mitt. 4, 317–318)

Mehrere Syntypen; Süd-Queensland, Cairns, Coll. HACKER; Nord-Queensland, Kuranda, leg. DODD; im DEI.

DEI: 4 Syntypen, Süd-Queensland, Cairns, Coll. HACKER.

haemorrhoidalis SCHENKING, 1906 (*Orthrius*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 268, Taf. 2, Fig. 6)

Holotypus, Ceylon, im DEI [leg. LEWIS, Coll. KRAATZ].

heynei SCHENKING, 1915 (*Gladiscus*)
(Ent. Mitt. 4, 108)

Holotypus, India mer., Shembaganur, durch HEYNE, im DEI.

hirsutus SCHENKING, 1906 (*Tenerus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 306–307)

Holotypus, Sumatra, Tebing tinggi, im DEI [leg. SCHULTHEISS, Coll. KRAATZ].

Beiträge zur Entomologie, Heft 2, 1982, Band 32

horni KRAATZ, 1900 (*Callimerus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 189–190)

3 Syntypen, Ceylon, bei Anuradhapura und Dambulla, leg. HORN.
DEI: 1 Ex. Ceylon, Anuradhapura, 1 Ex. Dambulla, leg. HORN, Coll. KRAATZ; Syntypen.

hydnoceroides GORHAM, 1893 (*Callimerus*)
(Proc. Zool. Soc. London, 574–575)

Mehrere Syntypen, Burmah, Ruby Mines, leg. DOHERTY.
DEI: 1 Syntypus, Upper Burmah, Ruby Mines, 7500 ft., Coll. KRAATZ.

hypocaustus GORHAM, 1892 (*Opilo*)
(Ann. Mus. Genova (2) 12, 730)

Mehrere Syntypen, Burma, Carin Hills, Cheba, in Coll. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Carin Cheba, 900–1100 m, 5. XII. 1888, leg. FEA, Coll. SCHENKLING.

illaesicollis KRAATZ, 1899 (*Tenerus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 101–102)

Holotypus, N. Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT; im DEI [1896, Coll. KRAATZ].

imitans SCHENKLING, 1908 (*Orthopleuroides*)
(l.c., 706–707)

Holotypus, Natal, leg. O'NEIL, im DEI [1908].

impressipennis GORHAM, 1903 (*Opilo*)
(Ann. Soc. Ent. Belg. 47, 334–335)

Mehrere Syntypen; India, Nilgiri Hills, Beating, Upper Slopes, leg. ANDREWES, in Coll. ANDREWES.
DEI: 1 Syntypus, Nilgiri Hills, Coll. SCHENKLING.

impressus FAIRMAIRE, 1902 (*Opilo*)
(Ann. Soc. Ent. Fr. 51, 557)

Mehrere Syntypen, Madagascar, Ankarahitra, leg. PERRIER, Nossi-Bé, leg. COQUEREL.
DEI: 1 Syntypus, Madagascar, leg. PERRIER (FAIRM.), Coll. SCHENKLING.

inaequalicolle SCHENKLING, 1902 (*Pelonium*)
(Bull. Mus. Paris 8, 331–332)

Syntypen: 1 Ex. Amérique méridionale, 1845, leg. CASTELNAU, im Museum Paris; Saint-Paul, in Coll. SCHENKLING (Ex. ?).
DEI: 1 Syntypus, S. Paulo, Coll. SCHENKLING.

inaequalis PIC, 1947 (*Necrobinus*)
(Diversites ent. 1, 5)

Mehrere Syntypen, Afr., Le Cap.
DEI: 1 Syntypus, Capland, Willowmore, durch BRAUNS.

insignis SCHENKLING, 1915 (*Cymatodera*)
(Ent. Mitt. 4, 110–111)

Mehrere Syntypen, San José, Costa Rica, durch H. SCHMIDT, im Museum Hamburg und DEI.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, vend. 31. VIII. 1911.

israelicus WINKLER, 1963 (*Trichodes*)
(Beitr. Ent. 13, 890–893, Abb. 1–3)

♂ Holotypus, Palestine, Hadi Raman, leg. BYTINSKI-SALZ, im DEI; 1 ♀, Paratypus, dto., in Coll. BYTINSKI-SALZ.
DEI: Holotypus (Ex. verliehen, konnte nicht überprüft werden).

jacobsoni SCHENKLING, 1915 (*Callimerus*)
(Ent. Mitt. 4, 113)

3 Syntypen, Java, Samarang, leg. JACOBSON, via VETH an SCHENKLING, in Coll. VETH und im DEI.
DEI: 1 Syntypus, Java, Samarang, VI. 1910, leg. JACOBSON.

jocosum SCHENKLING, 1908 (*Pelonium*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 705–706)

Holotypus, N. O. Australien, Kuranda, leg. DODD, im DEI.

jucundum SCHENKLING, 1900 (*Pelonium*)
(l.c., 404–405)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. SCHENKLING.
DEI: 2 Ex. Brasilien, Goyaz, 1 Ex. dto., leg. DONCKIER, Coll. SCHENKLING, Syntypen.

kelecsenyi GEBIEN, 1899 (*Necrobia*)
(Ent. Nachr. 25, 97)

Mehrere Syntypen, Hamburg.
DEI: 1 Syntypus, Kuhwärder, 1897, leg. GEBIEN.

kolbei SCHENKLING, 1907 (*Cymatodera*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 303)

2 ♂♂, 1 ♀, Syntypen, Mexiko, Tepic, Navarrete, Coll. FLOHR, im Museum Berlin und in Coll. SCHENKLING.
DEI: 1 Syntypus, Mexiko, Tepic, Coll. FLOHR.

kraatzi SCHENKLING, 1900 (*Pelonium*)
(l.c., 408–409)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. KRAATZ, Coll. GRANDJEAN, Coll. SCHENKLING.
DEI: 4 Ex. Brasilien, Goyaz, leg. DONCKIER, Coll. SCHENKLING, 3 Ex. Prov. Goyaz, Jatahy, IX.–XI. 1897, Coll. KRAATZ; Syntypen.

- kuntzent** SCHENKLING, 1929 (*Callimerus*)
(Wien. Ent. Ztg. 46, 82–84, Fig.)
1 Ex. Indien, Hyderabad, bei Bangalore, leg. MAHDIHASSAN, via MAHDIHASSAN an SCHENKLING, 1 Ex. Calcutta, im DEI; Syntypen.
- laterimaculatus** KRAATZ, 1900 (*Tenerus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 192)
Holotypus, Ceylon, Dambulla, leg. HORN; im DEI [Coll. KRAATZ].
- lateripunctatum** SCHENKLING, 1906 (*Pelonium*)
(l.c., 314–315)
Holotypus, mehrere Paratypen, Columbien, Muzo, Los Tibayer, Paso del Auiedin, im DEI.
DEI: Holotypus, Columbia, Las Tibayer, 1 Paratypus, Muzo; Coll. KRAATZ.
- laterisignatus** SCHENKLING, 1922 (*Pallenis*)
(Trans. Linn. Soc. London 18, 1, 325–326, Fig. 1)
6 Syntypen, Seychelles Inseln; Silhouette, Wald nahe Mont Pot-à-eau, ca. 1500 ft., VIII. 1908, Wald nahe Plateau von Mare aux Cochons, über 1000 ft., VIII.–IX. 1908; Mahé, Hochwald von Morne Blanc und Pilot, ca. 1500–2000 ft., XI. 1908; PERCY SLADEN TRUST Exped.
DEI: 1 Syntypus, Silhouette, 1908, Seychelles Exp., Mus. Cambridge (SCOTT), 1921.
- latesellatus** SCHENKLING, 1900 (*Clerus*)
(Mitt. Mus. Hamburg 15, 8–9, Separat)
Mehrere Syntypen, Mexico, in Coll. KRAATZ, Coll. GORHAM, Coll. GRANDJEAN, Coll. SCHENKLING und im Museum Hamburg.
DEI: 1 Syntypus, Mexico, leg. STAUDINGER, Coll. SCHENKLING.
- lividipenne** SCHENKLING, 1912 (*Pelonium*)
(Ent. Mitt. 1, 330)
7 Syntypen, Formosa, Hoozan, V. 1910, Kosempo, VII., VIII. 1911, leg. SAUTER.
DEI: 3 Ex. Formosa, Kosempo, VIII. 1911, 1 Ex. Hoozan, V. 1910; leg. SAUTER, Syntypen.
- longipes** SCHENKLING, 1907 (*Clerus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 303–304)
5 Syntypen, Zentral-Amerika, Temax, N. Yucatan, leg. GAUMER, im Britischen Museum.
DEI: 2 Syntypen, Temax, N. Yucatan, leg. GAUMER.
- longula** SCHENKLING, 1906 (*Priocera*)
(l.c., 256)
Holotypus, Brasilien, Jatahy, im DEI, mehrere Paratypen, dto.
DEI: Holotypus, Brasilien, Prov. Goyaz, IX.–XI. 1897, Coll. KRAATZ.
- longulus** SCHENKLING, 1906 (*Ommadius*)
(l.c., 295–296)
Holotypus, mehrere Paratypen, Borneo, Pontianak, via STAUDINGER an SCHENKLING, im DEI.
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Holl. Borneo, Pontianak, Coll. SCHENKLING.
- macer** SCHENKLING, 1902 (*Callimerus*)
(Not. Leyd. Mus. 23, 125–126)
4 Syntypen, Java, Simpar bei Tagal, 1890, leg. LUCASSEN, im Museum Leiden.
DEI: 1 Syntypus, Java, Simpar, leg. LUCASSEN, ex Museum Leiden.
- maculata** SCHENKLING, 1899 (*Chlorocnemis*)
(Ann. Mus. Genova (2) 20, 141–142)
Mehrere Syntypen; Neu Guinea, Geelvink Bai, Ansus, 1875, leg. BECCARI; Brit. Neu Guinea, Paumomu Fluss, 1892, leg. LORIA; im Museum Genua.
DEI: 2 Syntypen, N. Guinea, Ansus, IV. 1875, leg. BECCARI, Coll. SCHENKLING.
- maculata** SCHENKLING, 1902 (*Lemidia*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 160)
Mehrere Syntypen, Australien, Victoria.
DEI: 1 Syntypus, Austral., Victoria, Coll. SCHENKLING.
- maculiceps** KRAATZ, 1899 (*Tenerus*)
(l.c., 102)
Holotypus, N. Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT; im DEI [1896, Coll. KRAATZ].
- maculiceps** KRAATZ, 1899 (*Tenerus*)
(l.c., 103–104; nom. praeocc. = *conradti* LOHDE, 1899, Ent. Nachr. 25, 305)
Holotypus, Togo, leg. CONRADT; im DEI [Coll. KRAATZ].
- maculicolle** SCHAEFFER, 1904 (*Pelonium*)
(Journ. New York Ent. Soc. 12, 219–220)
4 Syntypen, Texas, Brownsville, im Museum Brooklyn Institute of Arts and Sciences.
DEI: 2 Syntypen, Texas, Brownsville, Esperanza Rch.
- maculicollis** KRAATZ, 1899 (*Tenerus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 102–103; nom. praeocc. = *kraatzii* LOHDE, 1899, Ent. Nachr. 25, 305)
Holotypus, N. Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT; im DEI [1896, Coll. KRAATZ].

maculiventris SCHENKING, 1916 (*Tenerus*)
(Ent. Mitt. 5, 149–150)

Mehrere Syntypen, Queensland, Cooktown, Coen District, im DEI.
DEI: 1 Ex. Australien, 1 Ex. Cooktown, Nord-N. H.; Coll. KRAATZ; 1 Ex. Queensland, Coen District, Cape York, leg. HACKER, Coll. HACKER: Syntypen.

magnificus SCHENKING, 1908 (*Cladiscus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 363)

Holotypus, Malang, auf Borneo ? (Sarawak-Museum), im DEI; [VI. 1900].

marginalis SCHENKING, 1908 (*Phaeocyclotomus*)
(l.c., 482)

Mehrere Syntypen, Nilgiri Hills, leg. ANDREWES, im DEI.
DEI: 2 Syntypen, Nilgiri Hills, leg. ANDREWES.

meieri SCHENKING, 1900 (*Pelonium*)
(l.c., 408)

Holotypus, Elbinsel Steinwälder, nahe bei Hamburg, leg. MEIER, Coll. SCHENKING, aus America mer.?, eingeschleppt; im DEI [1895].

mediopunctatus SCHENKING, 1908 (*Ommadius*)
(l.c., 483–484)

Mehrere Syntypen, Nilgiri Hills, leg. ANDREWES, im DEI.
DEI: 3 Syntypen, Nilgiri Hills, leg. ANDREWES.

metasternalis SCHENKING, 1907 (*Clerus*)
(l.c., 312)

Mehrere Syntypen, Amazon, Ega, leg. BATES, im Britischen Museum und DEI.
DEI: 2 Syntypen, Amazon, leg. BATES, 1905, Nr. 100, Coll. FRY.

militaris SCHENKING, 1906 (*Clerus*)
(l.c., 272–273)

Holotypus, mehrere Paratypen, Brasilien, San Leopoldo, im DEI.
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Brasilien, San Leopoldo, durch SCHNEIDER.

minutus SCHENKING, 1908 (*Callimerus*)
(l.c., 366–367)

Mehrere Syntypen, Nilgiri Hills, Naduvatam, Ouchterlony Valley, 6000–6500 Fuss, XII., V., leg. ANDREWES, im DEI.
DEI: 2 Syntypen, Nilgiri Hills, leg. ANDREWES.

minutus SCHENKING, 1899 (*Ommadius*)
(Ann. Mus. Genova (2) 20, 161–162)

Mehrere Syntypen, Neu Guinea, Andai, Ramoi, 1872, leg. D'ALBERTIS, im Museum Genua.
DEI: 1 Syntypus, Neu Guinea, Ramoi, IV. 1872, leg. D'ALBERTIS, Coll. SCHENKING.

mirifica SCHENKING, 1909 (*Hydnocera*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 307)

2 Syntypen, Mexiko, Ventanas, leg. FLOHR, im Museum Berlin und in Coll. SCHENKING.
DEI: 1 Syntypus, Mexiko, Ventanas, leg. FLOHR.

modestum GORHAM, 1903 (*Stigmatium*)
(Ann. Soc. Ent. Belg. 47, 336–337)

Mehrere Syntypen, India, Nilgiri Hills, Anamalais Hills, 4000 ft., leg. ANDREWES, in Coll. ANDREWES.
DEI: 1 Syntypus, Nilgiri Hills, Coll. SCHENKING.

modestus KRAATZ, 1899 (*Tillus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 82)

Holotypus, Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT; im DEI.

monticola SCHENKING, 1906 (*Orthrius*)
(l.c., 267)

Holotypus, Nordborneo, Kini-Balu, 1500 m, leg. WATERSTRADT, im DEI.

munda SCHENKING, 1900 (*Azina*)
(l.c., 391)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. SCHENKING.
DEI: 2 Syntypen, Brasilien, Goyaz, durch DONCKIER, Coll. SCHENKING.

mundum SCHENKING, 1912 (*Pelonium*)
(Ent. Mitt. 1, 329)

Holotypus, Formosa, Kosempo, VIII. 1911, leg. SAUTER; im DEI.

muscosus SCHENKING, 1906 (*Ommadius*)
(l.c., 297)

Holotypus, mehrere Paratypen, Sumatra, Si-Rambé, im DEI.
DEI: Holotypus, 3 Paratypen, Sumatra, Si-Rambé, XII. 1890–III. 1891, durch MODIGLIANI, Coll. KRAATZ.

mutilloides HINTZ, 1902 (*Thanasimus*)
(l.c., 181)

6 Syntypen, Usambara, im Museum Berlin.
DEI: 1 Syntypus, Kepai, durch WEISE.

- muzensis** SCHENKLING, 1915 (*Clerus*)
(Ent. Mitt. 4, 313)
Holotypus, Columbien, Muzo, im DEI [Coll. KRAATZ].
- myrmecodes** SCHENKLING, 1916 (*Pseudopallenis*)
(l.c. 5, 219)
Mehrere Syntypen, Madagascar, Kap Amber, im DEI.
DEI: 2 Syntypen, Madagascar, Cap d'Ambre, ex Coll. SCHNEIDER.
- nanus** SCHENKLING, 1901 (*Thaneroclerus*)
(Ann. Soc. Ent. Belg. 45, 106)
Mehrere Syntypen, Sumatra, Painan, Ins. Bodjo, im Museum Brüssel.
DEI: 1 Ex. Painan; 1 Ex. Ile. Bodja, leg. WEYERS; Syntypen.
- niger** KRAATZ, 1899 (*Cylidrus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 82)
Holotypus, Kamerun, Johann Albrechts-Höhe, leg. CONRADT; im DEI [1896, Coll. KRAATZ].
- niger** HINTZ, 1908 (*Phlogistus*)
(l.c., 710, 712)
9 Syntypen, N. Queensland, Kuranda, in Coll. HINTZ und im DEI.
DEI: 1 Ex. N. Holl., Coll. KRAATZ; 2 Ex. Kuranda, leg. DODD; Syntypen.
- nigra** KRAATZ, 1899 (*Chariessa*)
(l.c., 104–105)
Holotypus, N. Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT; im DEI [1896, Coll. KRAATZ].
Syn. zu *nigerrimus* KUWERT, 1893.
- nigrifrons** SCHENKLING, 1906 (*Axina*)
(l.c., 253, Taf. 2, Fig. 4)
Holotypus, mehrere Paratypen, Puerto Cabello, im DEI.
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Puerto Cabello, Coll. SCHENKLING.
- nigrifrons** KRAATZ, 1899 (*Tenerus*)
(l.c., 104)
Holotypus, N. Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT; im DEI [1896, Coll. KRAATZ].
- nigripes** PIC, 1953 (*Ceratocopus*)
(Beitr. Ent. 3, 320–321)
Holotypus, Ost-Afrika, Pugu, XII. 1913, leg. METHNER, im DEI.
- nigriventris** GORHAM, 1886 (*Colyphus*)
(Biol. Centr.-Amer. 3 (2), Suppl., 336)
Mehrere Syntypen; Guatemala, Zapote, San Gerónimo, Teleman in Vera Paz, leg. CHAMPION; Panama, Caldera in Chiriqui, Bugaba, leg. CHAMPION.
DEI: 1 Syntypus, Panama, Bugaba, leg. CHAMPION.
- nigroaenea** GORHAM, 1883 (*Hydnocera*)
(l.c., 174)
Mehrere Syntypen, Mexico, Guanajuato, leg. DUGÉS, Coll. SALLÉ, Puebla, leg. SALLÉ.
DEI: 1 Syntypus, Mexico, Puebla, Coll. SALLÉ.
- nilgirensis** SCHENKLING, 1908 (*Ommadius*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 484–485)
Mehrere Syntypen, Nilgiri Hills, Ouchterlony Valley, 3000–3500 ft., VI., IX. – XII., leg. ANDREWES, im DEI.
DEI: 2 Syntypen, Nilgiri Hills.
- nitida** SCHENKLING, 1908 (*Strotocera*)
(l.c., 361–362)
Holotypus, Kamerun, Mundame, leg. ROHDE, im DEI [Coll. KRAATZ].
- nitidum** SCHENKLING, 1916 (*Gastrocentrum*)
(Arch. Naturg. 82, A 5, 117)
Holotypus, Formosa, Banshoryo Distr., Sokutsu, VII. 1912, leg. SAUTER; im DEI.
- nitidus** SCHENKLING, 1898 (*Ommadius*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 366)
Mehrere Syntypen, Ceram.
DEI: 2 Syntypen, Ceram, Illo, 1884, leg. RIBBE, Coll. SCHENKLING.
- niveifascia** SCHAEFFER, 1905 (*Hydnocera*)
(Sci. Bull. Brooklyn Inst. Mus. 1, 156)
Mehrere Syntypen, Arizona, Palmerlee, Cochise Co., leg. SCHAEFFER, im Brooklyn Museum.
DEI: 3 Syntypen, Arizona, Palmerlee, Cochise Co.
- obscurus** SCHENKLING, 1904 (*Phloeocopus*)
(Ann. Mus. Genova (3) 1, 16–17)
Holotypus, Madagascar, Diego Suarez, via DONCKIER an SCHENKLING, im DEI.

occidentalis SCHENKLING, 1906 (*Tenerus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 307–308)

Holotypus, San Thomé, im DEI [Coll. SCHENKLING].

occipitalis SCHENKLING, 1908 (*Ommadius*)
(l.c., 486–487)

Mehrere Syntypen, N. Queensland, leg. SCHNEIDER, Kuranda, leg. DODD, im DEI.
DEI: Syntypen: 1 Ex. N. Queensland, leg. SCHNEIDER, 3 Ex. Kuranda, leg. DODD.

octopunctatus SCHENKLING, 1906 (*Orthrius*)
(l.c., 267)

Holotypus, Sumatra, im DEI [Coll. KRAATZ].

omissus SCHENKLING, 1906 (*Ommadius*)
(l.c., 295, Taf. 2, Fig. 10)

Holotypus, mehrere Paratypen, Celebes, via STAUDINGER an SCHENKLING, im DEI.
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Celebes, durch STAUDINGER, Coll. SCHENKLING und Coll. KRAATZ.

orientalis HINTZ, 1902 (*Cardiostichus*)
(l.c., 191)

6 Syntypen, Usambara, im Museum Berlin.
DEI: 1 Syntypus, D. Ost-Afrika, Lindi, Coll. SCHENKLING.

pallidiventre GORHAM, 1876 (*Stigmatium*)
(Cist. Ent. 2, 97–98)

Mehrere Syntypen, Mysol, durch CHEVOLAT.
DEI: 1 Syntypus, Mysol, Wallace, Coll. SCHENKLING.

pallida LEA, 1907 (*Lemidia*)
(Ann. Soc. Ent. Belg. 51, 334, 348)

Mehrere Syntypen, N. S. Wales, leg. FRENCH, Tarcutta, im Macleay Museum, Sydney, Blue Montains, leg. FERGUSON, Galston, Clifton, National Park, Como, leg. LEA.
DEI: 1 Syntypus, N. S. Wales, Clifton, leg. LEA, Coll. HACKER.

pallipes KRAATZ, 1899 (*Neohydnus*)
(l.c. 43, 215)

Holotypus, Südwest Sumatra, leg. WEYERS; im DEI [Coll. KRAATZ].

parallela PIC, 1948 (*Enopliomorpha*)
(Tijdschr. Ent. (1946), 131–132)

Holotypus, Africa australis, Rhodesia, im DEI [Plumtin].

parcepunctata SCHENKLING, 1900 (*Axina*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 388–389)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. BRANCSIK und Coll. SCHENKLING.
DEI: 4 Syntypen, Brasilien, Goyaz, durch DONCKIER, Coll. SCHENKLING.

parva SCHENKLING, 1908 (*Eucymatodera*)
(l.c., 364–365)

2 Ex. Deutsch-Südwestafrika, Outyo, leg. LANGHELD, 1 Ex. Damara bis Ngamisee, leg. FLECK, im DEI und Museum Berlin: Syntypen.
DEI: 1 Syntypus, Deutsch SW Afrika, Outyo, leg. LANGHELD.

parvicollis SCHENKLING, 1908 (*Thanasimus*)
(l.c., 478)

Holotypus, Deutsch-Ostafrika, Kigonsera, leg. ERTL, im DEI.

parvulus SCHENKLING, 1900 (*Epiphloeus*)
(l.c., 398–399)

Holotypus, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. SCHENKLING; im DEI [durch DONCKIER].

parvum KRAATZ, 1899 (*Pyrrhostigmatium*)
(l.c., 97)

Holotypus, SO.-Kamerun, Lolodorf, leg. CONRADT; im DEI [1895, Coll. KRAATZ].

parvus SCHENKLING, 1916 (*Thaneroclerus*)
(Ent. Mitt. 5, 222)

2 Syntypen, Java, Preanger, in Coll. CORPORAAL und im DEI.
DEI: 1 Syntypus, Java, Preanger, Tjimbong, durch CORPORAAL.

paula SCHENKLING, 1908 (*Tillicera*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 224)

Mehrere Syntypen, Nilgiri Hills, in Coll. ANDREWES und im DEI.
DEI: 1 Syntypus, Nilgiri Hills.

pectoralis SCHENKLING, 1899 (*Chlorocnemis*)
(Ann. Mus. Genova (2) 20, 141)

Mehrere Syntypen; Australia, Somerset, 1875, leg. D'ALBERTIS; Brit. Neu Guinea, Bujakori, 1890, leg. LORIA; im Museum Genua.
DEI: 1 Syntypus, Australia, Somerset, I. 1875, leg. D'ALBERTIS, Coll. SCHENKLING.

pectoralis KRAATZ, 1899 (*Cylidrus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 81)

Mehrere Syntypen, Togo und Nigro-Benue, leg. CONRADT.
DEI: 1 Ex. Nigro-Benue, 1 Ex. Togo, 1 Ex. dto., leg. CONRADT; Coll. KRAATZ, Syntypen.

pectoralis SCHENKLING, 1912 (*Ommañius*)
(Ent. Mitt. 1, 326–327)

Mehrere Syntypen, Formosa, Fuhosho, VII. 1909/VIII. 1911, Taihorinsho, IX. 1909, Hoozan, 1909, Kosempo, VIII. 1911, Alikang, X. 1911, Kankau, IV.–V. 1912, leg. SAUTER.
DEI: Syntypen, Formosa, leg. SAUTER: 3 Ex. Fuhosho, VII. 1909/7. VIII.; 4 Ex. Taihorinsho, VIII., IX., 7. IX. 1909; 3 Ex. Hoozan, 1908–10; 6 Ex. Kosempo, 7. VIII., 7. IX. 1909/VII., 7. VIII. 1911; 4 Ex. Alikang, 7. X.; 4 Ex. Kankau, IV., V. 1912.

pectoralis SCHENKLING, 1900 (*Platynoptera*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 401–402)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, in Coll. GRANDJEAN und Coll. SCHENKLING.
DEI: 1 Syntypus, Brasilien, Goyaz, leg. DONCKIER, Coll. SCHENKLING.

pelonioides SCHENKLING, 1915 (*Clerus*)
(Ent. Mitt. 4, 315–316)

Holotypus, Mexico, Jalapa, im DEI [1908].

penicillatus SCHENKLING, 1899 (*Metademius*)
(Ann. Mus. Genova (2) 20, 137–138)

Mehrere Syntypen, Brit. Neu Guinea, Ins. Yule, VI. 1875, leg. D'ALBERTIS, im Museum Genua.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. SCHENKLING.

pernix SCHENKLING, 1915 (*Callimerus*)
(Ent. Mitt. 4, 112–113)

7 Syntypen, östl. Himalaya, Kursong, 4700–5000 ft., im Indian Museum Kalkutta und DEI.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, Annandale, 24. VI. 1910.

persicus KRAATZ, 1894 (*Trichodes*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 126)

9 Syntypen, Persien, Hadschabad.
DEI: 3 Syntypen, Hadschabad, durch LEDERER, Coll. KRAATZ.

piceocinctus KRAATZ, 1899 (*Phaeocyclotomus*)
(l.c., 92–93)

Mehrere Syntypen, Nord-Kamerun, Togo, leg. CONRADT.
DEI: Syntypen: 4 Ex. N. Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, 1896; 2 Ex. Togo; leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

picta SCHENKLING, 1907 (*Axina*)
(l.c., 309)

Mehrere Syntypen, Amazon, Coll. BATES, Coll. FRY, im Britischen Museum und DEI.
DEI: 1 Syntypus, Amazon, durch BATES, Coll. FRY, 1903, Nr. 100.

pictipennis KRAATZ, 1899 (*Phaeocyclotomus*)
(l.c., 98)

2 Syntypen, Westafrika, Kamerun, Togo, leg. CONRADT.
DEI: 2 Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

placidum SCHENKLING, 1900 (*Pelonium*)
(l.c., 405–406)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. KRAATZ und Coll. SCHENKLING.
DEI: Syntypen, Brasilien: 2 Ex. Goyaz, durch DONCKIER, Coll. SCHENKLING; 1 Ex. Prov. Goyaz, Jatahy, IX.–XI. 1897, Coll. KRAATZ.

plagiata SCHENKLING, 1900 (*Axina*)
(l.c., 390–391)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. GRANDJEAN und Coll. SCHENKLING.
DEI: 3 Syntypen, Brasilien, Goyaz, durch DONCKIER, Coll. SCHENKLING.

plicaticollis SCHENKLING, 1916 (*Eleale*)
(Ent. Mitt. 5, 147–148)

Mehrere Syntypen; N. S.-Wales, National Park; Victoria, Mallee Distr.; Tasmania, Mole Creek; im DEI.
DEI: 2 Ex. Tasmania, Mole Creek, durch LEA, Coll. HACKER; 2 Ex. New S.-Wales, National Park, durch TAYLOR, Coll. HACKER; Syntypen.

plumbeus SCHENKLING, 1906 (*Phloeocopus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 259)

Holotypus, mehrere Paratypen, Madagascar, Ankazoaba, 1902, leg. BASTARD.
DEI: 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

podagrica SCHENKLING, 1900 (*Priocera*)
(l.c., 385–386)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, in Coll. FAIRMAIRE, Coll. GRANDJEAN und Coll. SCHENKLING.
DEI: 2 Syntypen, Brasilien, Goyaz, durch DONCKIER, Coll. SCHENKLING.

pretiosus GORHAM, 1892 (*Callimerus*)
(Ann. Mus. Genova (2) 12, 727)

2 Syntypen, Upper Burma, Bhamo, 1885–86, in Coll. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Birmania, Bhamo, VI. 1886, leg. FEA.

princeps GORHAM, 1886 (*Epiphloeus*)
(Biol. Centr.-Amer. 3 (2), Suppl., 340, Taf. 12, Fig. 19)

Mehrere Syntypen, Panama, Bugaba, 1000 ft., leg. CHAMPION.
DEI: 2 Syntypen, Bugaba, 800–1500 ft., leg. CHAMPION, Coll. SCHENKLING.

procera SCHENKLING, 1900 (*Ichnea*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 399–400)

Mehrere Syntypen, Peru, Callanga, in Coll. KRAATZ und Coll. SCHENKLING.
DEI: 6 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, durch STAUDINGER.

prolongatus SCHENKLING, 1912 (*Orthrius*)
(Ent. Mitt. 1, 325)

6 Syntypen, Formosa, leg. SAUTER: Taihorinsho, III., X. 1909, Kosempo, VIII. 1911, Taihorin, IX. 1911, Kankau, IV.–V. 1912.
DEI: Syntypen, Formosa, leg. SAUTER: 2 Ex. Kosempo, VIII. 1911/22. V. 1912 (Datum nicht erwähnt); 2 Ex. Taihorinsho, VII./1909/7. IX. 1911 (Daten nicht erwähnt); 1 Ex. Kankau, Koshun, IV. 1912; 1 Ex. Taihorin, 7. IX. 1911.

proximus SCHENKLING, 1908 (*Tenerus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 703)

Mehrere Syntypen, Borneo, Klingkang, im Sarawak-Museum und DEI.
DEI: 1 Syntypus, Klingkang, I.

pulcher SCHENKLING, 1907 (*Clerus*)
(l.c., 310–311)

Mehrere Syntypen, Amazon, leg. BATES, im Britischen Museum und DEI.
DEI: 1 Syntypus, Amazon, 1905, leg. BATES, Nr. 100, Coll. FRY.

pulcher SCHENKLING, 1906 (*Diplophorus*)
(l.c., 247–248)

Holotypus, Africa (or. ?), im DEI [♂].

pulcherrimus SCHENKLING, 1899 (*Ommadius*)
(Ann. Mus. Genova (2) 20, 338–339)

Mehrere Syntypen, Sumatra, Si-Rambé, 1890–91, leg. MODIGLIANI, im Museum Genua.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, XII. 1890–III. 1891, Coll. SCHENKLING.

punctatus HINTZ, 1908 (*Phlogistus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 710, 713–714)

17 Syntypen, Australia, Kuranda, in Coll. HINTZ und im DEI.
DEI: 5 Syntypen, Kuranda, leg. DODD.

puncticollis KRAATZ, 1899 (*Tenerus*)
(Ann. Soc. Ent. Belg. 43, 216–217)

2 Syntypen, Südwest Sumatra, leg. WEYERS, im DEI [Coll. KRAATZ].

purpurea LEA, 1907 (*Lemidia*)
(l.c. 51, 332, 341)

Holotypus, Queensland, Coen River, Coll. HACKER, im DEI.

pusilla SCHENKLING, 1906 (*Lemidia*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 303)

Holotypus, mehrere Paratypen, Queensland, Kuranda, leg. DODD, im DEI.
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, VII. 1904.

pusio SCHENKLING, 1906 (*Clerus*)
(l.c., 276)

Holotypus, mehrere Paratypen, Peru, Callanga, Marcapata, im DEI.
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Peru, Callanga, durch STAUDINGER, Coll. SCHENKLING und Coll. KRAATZ.

quadrifoveolatum SCHENKLING, 1906 (*Pelonium*)
(l.c., 313–314)

Holotypus, mehrere Paratypen, Brasilien, Jatahy, im DEI.
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Brasilien, Goyaz, durch DONCKIER, Coll. SCHENKLING.

quadrinotata SCHENKLING, 1900 (*Priocera*)
(l.c., 386–387)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, in Coll. FAIRMAIRE, Coll. GRANDJEAN, Coll. KRAATZ und Coll. SCHENKLING.
DEI: 2 Ex. Brasilien, Goyaz, leg. DONCKIER, Coll. SCHENKLING; 2 Ex. Prov. Goyaz, Jatahy, IX.–XI. 1897, Coll. KRAATZ: Syntypen.

quadriplagiata GAHAN, 1908 (*Dieropsis*)
(Ann. Mag. Nat. Hist. (3) 1, 96)

Mehrere Syntypen, British Central Africa, Kondowe, leg. WHYTE, Niomkolo, leg. CARSON, Fwambo, leg. NUTT.
DEI: 1 ♀, Syntypus, E. Africa, Niomkolo, 91–28.

- rectefasciatus** SCHENKING, 1915 (*Clerus*)
(Ent. Mitt. 4, 313)
2 Syntypen, Brasilien, San Leopoldo, via SCHNEIDER an SCHENKING, im DEI.
- rhodesianum** SCHENKING, 1907 (*Stigmatium*)
(Ann. S. Afr. Mus. 5, 201–202)
Mehrere Syntypen, Rhodesia, Sebakwe, im South African Museum.
DEI: 1 Syntypus, Rhodesia, Sebakwe.
- rostri** SCHENKING, 1908 (*Cladiscus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 362)
Holotypus, Westl. Himalaya, Kulu, leg. ROST, im DEI [Beasfluss].
- rotundopunctatus** HINTZ, 1908 (*Phlogistus*)
(l.c., 711, 714)
3 Syntypen, Australia, Kuranda, in Coll. HINTZ und im DEI.
DEI: 1 Syntypus, Kuranda, leg. DODD.
- ruficeps** KRAATZ, 1899 (*Microstigmatium*)
(l.c., 100–101)
25 Syntypen, Togo, leg. CONRADT; im DEI [Coll. KRAATZ].
- ruficeps** SCHENKING, 1900 (*Pelonium*)
(l.c., 404)
Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, in Coll. SCHENKING.
DEI: 2 Ex. Goyaz, 1 Ex. Brasilien, Goyaz, leg. DONCKIER; Coll. SCHENKING, Syntypen.
- rufimanus** SCHENKING, 1900 (*Clerus*)
(l.c., 395)
Mehrere Syntypen, Peru, Paranga, Coll. SCHENKING.
DEI: 3 Syntypen, Peru, Callanga, durch STAUDINGER, Coll. SCHENKING.
Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Paranga“ steht auf dem Etikett „Callanga“.
- rufipes** KRAATZ, 1899 (*Phaeocyclotomus*)
(l.c., 95–96)
Mehrere Syntypen, Westafrika, Kamerun, Togo, leg. CONRADT.
DEI: 4 Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.
- rufipes** SCHENKING, 1898 (*Poecilochroa*)
(l.c., 364–365)
Mehrere Syntypen, Mexiko, leg. COMITÁN.
DEI: Lectotypus, Mexiko, durch SPEYER, Coll. SCHENKING; 1 ♀, Paralectotypus, Mexiko, leg. COMITÁN, Coll. KRAATZ; von EKIS designiert.
- rufofemoratus** KRAATZ, 1899 (*Cephaloclerus*)
(l.c., 106)
Holotypus, Togo, leg. CONRADT; im DEI [Coll. KRAATZ].
- rufofemoratus** SCHENKING, 1915 (*Clerus*)
(Ent. Mitt. 4, 314)
Holotypus, Peru, Chanchamayo, im DEI [leg. HEYNE].
- rufopicum** KRAATZ, 1899 (*Pyrrhostigmatium*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 97)
2 Syntypen, Nord-Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 1896, Coll. KRAATZ.
- rufotestaceus** SCHENKING, 1902 (*Orthrius*)
(Bull. Mus. Paris 8, 323)
Mehrere Syntypen, Dardjiling, 1890, leg. HARMAND, im Museum Paris.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. SCHENKING.
- rufum** KRAATZ, 1899 (*Pyrrhostigmatium*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 96)
Holotypus, Gabun, durch WEBER; im DEI [Coll. KRAATZ].
- rufus** KRAATZ, 1899 (*Corymetes*)
(l.c., 107)
Holotypus, Nord-Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT; im DEI [1896].
- rugulicollis** SCHENKING, 1906 (*Opilo*)
(l.c., 260)
Holotypus, Darjeeling, im DEI [Hammer. Coll. SCHENKING].
- salamandra** SCHENKING, 1906 (*Priocera*)
(l.c., 255)
Holotypus, Mexiko, im DEI [Coll. KRAATZ].
- sanguineus** SCHENKING, 1899 (*Tenerus*)
(Ann. Mus. Genova (2) 20, 344–345)
Mehrere Syntypen, Ins. Nias, 1897–98, leg. RAAP, im Museum Genua.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

sauteri SCHENKING, 1912 (*Allochotes*)
(Ent. Mitt. 1, 328)

15 Syntypen, Formosa, Kankau, IV. 1912, leg. SAUTER.
DEI: 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

sauteri SCHENKING, 1912 (*Cladiscus*)
(l.c., 322)

2 Syntypen, Formosa, Kosempo, VI. 1911, Banshoryo, VI. 1912, leg. SAUTER; im DEI [Sokutsul].

schenklingi HINTZ, 1908 (*Phlogistus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 712, 715)

13 Syntypen, Australia, N. S. Wales, in Coll. HINTZ und im DEI.
DEI: 3 Ex. Australia, Coll. HACKER-Coll. KRAATZ; 1 Ex. N. Holl., Coll. KRAATZ: Syntypen.

schultzei SCHENKING, 1913 (*Callimerus*)
(Phillipp. Journ. Sci. 8, No. 4, 303)

Holotypus, No. 1598, Luzon, Benguet, Baguio, leg. BANKS, in Coll. des Bureau of Science, Manila; Paratypen, No. 1392, Negros Occ., Bago, leg. BANKS, im DEI.
DEI: 1 Paratypus, No. 1392, Negros, Occ., Nakalang, lot Gort. Lab. Coll., leg. BANKS.

schulzi HINTZ, 1908 (*Phlogistus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 710, 712)

7 Syntypen, Australia, Kap York, Kuranda, Endeavour, in Coll. HINTZ und im DEI.
DEI: 1 Ex. N. Holl., Coll. KRAATZ; 1 Ex. Austral.; 2 Ex. Kuranda, leg. DODD; Syntypen.

scitum SCHENKING, 1906 (*Stigmatium*)
(l.c., 289–290, Taf. 2, Fig. 8)

Holotypus, mehrere Paratypen, Sumatra, Tebing tinggi, im DEI.
DEI: Holotypus, 2 Paratypen, N. O. Sumatra, Tebing tinggi, leg. SCHULTHEISS, Coll. KRAATZ.

scaber SCHENKING, 1902 (*Phaeocyclotomus*)
(Not. Leyd. Mus. 23, 128–129)

4 Syntypen, West-Java, leg. SIJTHOFF, im Museum Leiden.
DEI: 1 Syntypus, Java, ex Museum Leiden, Coll. SCHENKING.

scotti SCHENKING, 1922 (*Anthriboclerus*)
(Trans. Linn. Soc. London 18, 1, 328–329, Fig. 4)

9 Syntypen; Seychelles Inseln, Silhouette, Wald nahe d. Plateau von Mare bis Cochons, über 1000 ft., VIII.–IX. 1908; Mahé, Hochwald von Morne Blanc und Pilot, ca. 1500–2000 ft., XI. 1908, nahe Morne Blanc, ca. 1000 ft., XI. 1908, Cascade Estale, ca. 1000 ft.; PERCY SLADEN TRUST Exped.
DEI: 1 Syntypus, Mahé, 1908–09, Seychelles Exp.

searnotatus BOHEMAN, 1851 (*Clerus*)
(Ins. Caffraria 1, 496–497)

Mehrere Syntypen, Caffraria, leg. WAHLBERG.
DEI: 1 Syntypus, Caffraria, leg. WAHLBERG.

searplagiatus SCHENKING, 1908 (*Orthrius*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 478–479)

Mehrere Syntypen, Nilgiri Hills, leg. HAMPSON, im Britischen Museum und DEI.
DEI: 2 Syntypen, Nilgiri Hills, leg. HAMPSON, 94–89.

signatus SCHENKING, 1915 (*Orthrius*)
(Ent. Mitt. 4, 310)

Holotypus, Bengalen, im DEI [Coll. SCHENKING].

similis SCHENKING, 1900 (*Epichelus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 397)

Mehrere Syntypen, Chile, Coll. KRAATZ und Coll. SCHENKING.
DEI: Lectotypus, Chile, durch SCHRÖDER; designiert von SOLERVICENS.
Syn. zu *aeneus* PHILIPPI, 1864.

similis SCHENKING, 1898 (*Priocera*)
(l.c., 362)

Holotypus, via HEYNE an SCHENKING, ohne Fundortangabe; im DEI [Brasilien, durch HEYNE, Coll. SCHENKING]
Syn. zu *variegata* KIRBY, 1818.

similis KRAATZ, 1899 (*Tenerus*)
(l.c., 102)

Holotypus, Ashante, leg. REITTER; im DEI [Coll. KRAATZ].

simillimus SCHENKING, 1902 (*Tenerus*)
(l.c., 112)

Mehrere Syntypen, Nordost-Sumatra, Tebing tinggi, Tandjong Morawa, 1884–85, leg. SCHULTHEISS, via KRAATZ an SCHENKING, im Museum Leiden und in Coll. SCHENKING.
DEI: 2 Syntypen, N. O. Sumatra, Tebing tinggi, leg. SCHULTHEISS, Coll. KRAATZ.

simplex SCHENKING, 1907 (*Apopempsis*)
(Ann. S. Afr. Mus. 5, 202)

Mehrere Syntypen, S. Rhodesia, Manica, Christmas Pass, im South African Museum.
DEI: 1 Syntypus, S. E. Trop. Afr., Manica, Christmas Pass, Coll. SCHENKING.

simplex SCHENKLING, 1900 (*Epiphloeus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 397–398)

Mehrere Syntypen, Bolivia, Coll. SCHENKLING.
DEI: 2 Syntypen, Bolivia, durch STRAUDINGER, Coll. SCHENKLING.

simplex SCHENKLING, 1903 (*Xenorthrius*)
(Stett. Ent. Ztg. 64, 16–17)

Mehrere Syntypen, Hongkong, leg. BOWRING, im Museum Stettin.
DEI: 1 Syntypus, Hongkong, leg. BOWRING, Coll. SCHENKLING.

simsoni LEA, 1907 (*Lemidia*)
(Ann. Soc. Ent. Belg. 51, 333, 349, Taf. 3, Fig. 58)

Mehrere Syntypen, Tasmania, Launceston, leg. SIMSON und GRIFFITH, Goulds Country, Mole Creek, Beaconsfield, leg. SIMSON, HOBART und LEA; King Island, leg. KERSHAW.
DEI: 1 Syntypus, Tasmania, Launceston, Coll. HACKER.

smaragdinus SCHENKLING, 1899 (*Ommadius*)
(Ann. Mus. Genova (2) 20, 152–153)

Mehrere Syntypen; Neu Guinea, Fly River, 1876–77, leg. D'ALBERTIS; Paumomu River, 1892, leg. LORIA; im Museum Genua.
DEI: 1 Syntypus, Neu Guinea, Fly River, 1876–77, leg. D'ALBERTIS, Coll. SCHENKLING.

socius SCHENKLING, 1899 (*Ommadius*)
(l.c., 157)

Mehrere Syntypen, Neu Guinea, Fly River, 1876–77, leg. D'ALBERTIS, im Museum Genua.
DEI: 1 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. SCHENKLING.

soror SCHENKLING, 1915 (*Pallenis*)
(Ent. Mitt. 4, 110)

Holotypus, Madagaskar, Diego Suarez, im DEI [Coll. SCHENKLING].

soror SCHENKLING, 1903 (*Tillicera*)
(Not. Leyd. Mus. 23, 127–128)

Mehrere Syntypen, Brit. Bootang, Bhutan, leg. DUREL, im Museum Leiden.
DEI: 1 Syntypus, Brit. Bootang, leg. DUREL.

speciosus HINTZ, 1908 (*Phlogistus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 710, 713)

11 Syntypen, N. Queensland, Kuranda, Townsville, in Coll. HINTZ und im DEI.
DEI: 4 Syntypen, Kuranda, leg. DODD.

spectabilis KRAATZ, 1883 (*Trichodes*)
(l.c. 27, 346)

Holotypus, Turkestan, Osch, Coll. KRAATZ; im DEI.

spinipenne KRAATZ, 1899 (*Oxystigmatium*)
(l.c., 91–92)

Mehrere Syntypen, Nord-Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, 1896, Coll. KRAATZ.

stictica GORHAM, 1882 (*Priocera*)
(Biol. Centr.-Amer. 3 (2), 140, Taf. 7, Fig. 17)

Mehrere Syntypen; Mexico, Oaxaca, leg. HÖGE und SALLÉ; Guatemala, Teleman, San Juan, Calderas, Cerro Zunil, Pantaleon, Panajachel, leg. CHAMPION; Nicaragua, Chontales, leg. BELT; Panama, Volcan de Chiriqui, leg. CHAMPION.
DEI: 2 Syntypen, V. de Chiriqui, 25–4000 ft., leg. CHAMPION, Coll. SCHENKLING.

striatopunctatus SCHENKLING, 1901 (*Orthrius*)
(Ann. Soc. Ent. Belg. 45, 106)

Mehrere Syntypen, Bengal, Barway, Mandar, im Museum Brüssel.
DEI: 3 Syntypen, Bengal, Mandar, VII. 1891, leg. CARDON, Coll. SCHENKLING.

suavis GORHAM, 1892 (*Callimerus*)
(Ann. Mus. Genova (2) 12, 722–723)

4 Ex. Burma, Carin Hills, Chebà, 900–1100 m, in Coll. FEA; 2 Ex. India, Manipur, leg. DOHERTY, in Coll. FRY; Syntypen.
DEI: 1 Syntypus, Carin Chebà, 900–1100 m, 5. XII. 1888, leg. FEA.

subfuscum GORHAM, 1876 (*Stigmatium*)
(Cist. Ent. 2, 94)

Mehrere Syntypen, Philippine Isles, East Mindanao, durch SEMPER.
DEI: 3 Syntypen, Mindanao, durch GORHAM, Coll. SCHENKLING.

sumatranus KRAATZ, 1899 (*Cylidrus*)
(Ann. Soc. Ent. Belg. 43, 212)

Mehrere Syntypen, Südwest Sumatra, leg. WEYERS.
DEI: 3 Syntypen, Sumatra, Coll. KRAATZ.

sumatranus KRAATZ, 1899 (*Tillus*)
(l.c., 214)

Holotypus, Südwest Sumatra, leg. WEYERS; im DEI [Coll. KRAATZ].

sumatrensis PIC, 1953 (*Teneropsis*)
(Beitr. Ent. 3, 322)

Holotypus, Sumatra, im DEI.

suturale KRAATZ, 1899 (*Microstigmatium*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 101)

Holotypus, Togo, leg. CONRADT; im DEI [Coll. KRAATZ].

suturalis SCHENKLING, 1906 (*Clerus*)
(l.c., 277)

Holotypus, mehrere Paratypen, Brasilien, Jatahy, im DEI.

DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Brasilien, Goyaz, durch DONCKIER, Coll. SCHENKLING.

suturalis SCHENKLING, 1906 (*Dasyceroclerus*)
(l.c., 291)

Holotypus, mehrere Paratypen, Sumatra, Si-Rambé, Malakka, im DEI.

DEI: Holotypus, Sumatra, Si-Rambé, XII. 1890—III. 1891, leg. MODIGLIANI, Coll. KRAATZ; 4 Ex. dto., 1 Ex. Malakka, Coll. KRAATZ: Paratypen.

suturalis SCHENKLING, 1898 (*Platynoptera*)
(l.c., 367—368)

Holotypus, Bolivia; im DEI [durch STAUDINGER, Coll. SCHENKLING].

suturalis SEIDLITZ, 1891 (*Trichodes*)
(Fauna Transsylvanica, 527)

Mehrere Syntypen, Spanien, in Escorial, 1865.

DEI: 2 Syntypen, Hisp., ex Coll. SEIDLITZ.

tarsale SCHENKLING, 1900 (*Pelonium*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 407)

Mehrere Syntypen; Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy; Paraguay; in Coll. GRANDJEAN und Coll. SCHENKLING.

DEI: Syntypen, Brasilien: 1 Ex. Goyaz, leg. DONCKIER, Coll. SCHENKLING; 2 Ex. Prov. Goyaz, Jatahy; 2 Ex. Paraguay, 188 .., leg. DRAKE; Coll. KRAATZ.

tarsalis GORHAM, 1892 (*Orthrius*)
(Ann. Mus. Genova (2) 12, 737—738)

4 Syntypen, Birmania, Bhamò, 1885—86, in Coll. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Birmania, Bhamò, VIII. 1885, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

terminale SCHENKLING, 1908 (*Enoplium*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 706)

2 Syntypen, Vorderindien, Anamalai Hills, 3500 ft., durch ANDREWES, in Coll. ANDREWES und im DEI.

DEI: 1 Syntypus, Anamalais.

terminalis SCHENKLING, 1912 (*Cladiscus*)
(Ent. Mitt. 1, 322—323)

Holotypus, Formosa, Taihorinsho, X. 1909, leg. SAUTER; im DEI [♂, 7. X.].

terminicola CORPORAAL, 1939 (*Thaneroclerus*)
(Bijdr. Dierkd. 27, 351—352, Taf. 9, Fig. 6)

Mehrere Syntypen, Sumatra's West Küste, Haraukloof, leg. JACOBSON.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, 560 m, VII. 1925.

testacea GORHAM, 1883 (*Hydnocera*)
(Biol. Centr.-Amer. 3 (2), 169)

Mehrere Syntypen; Mexico, Playa Vicente, leg. HÖGE; Guatemala, Cerro Zunil, Quiche Mountains, leg. CHAMPION; Panama,

Volcan de Chiriqui, alt. 8000 ft., Bugaba, leg. CHAMPION.
DEI: 1 Syntypus, Cerro Zunil, 4—5000 ft., leg. CHAMPION.

texana WOLCOTT, 1908 (*Chariessa*)
(Ent. News 19, 70, 72)

3 Syntypen, Texas, Nolan County, Sweetwater, via WOODING an WOLCOTT.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. WOODING.

thoracicus SCHENKLING, 1907 (*Aulicus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 305)

4 Syntypen, Zentral-Amerika, Guerrero, Venta de Zopilote, 2800 ft., leg. SMITH, im Britischen Museum und in Coll. SCHENKLING.

DEI: 1 Syntypus, Guerrero, Venta de Zopilote, 2800 ft., X., leg. SMITH.

tibialis SCHENKLING, 1915 (*Orthrius*)
(Ent. Mitt. 4, 310—311; nom. praeocc. = *tonkineus* PIC, 1925, Echange (40) 41, 15)

Holotypus, Tonkin, Laokay, via SALVAZA an SCHENKLING, im DEI [V. 1913].

tibialis SCHENKLING, 1906 (*Orthrius*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 268—269)

Holotypus, mehrere Paratypen, Assam, im DEI.

DEI: Holotypus, Assam, Coll. KRAATZ.

Syn. zu *brachialis* GORHAM, 1893.

tibialis KRAATZ, 1899 (*Tenerus*)
(l.c., 104)

Holotypus, N. Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT; im DEI [1896, Coll. KRAATZ].

togonis SCHENKLING, 1906 (*Phloeocopus*)
(l.c., 258)Holotypus, mehrere Paratypen, Togo, im DEI.
DEI: Holotypus, Togo, Coll. KRAATZ.**tomentosus** SCHENKLING, 1906 (*Clerus*)
(l.c., 275—276)Holotypus, mehrere Paratypen, Central-Cordillere, unt. Salento, Muzo, im DEI.
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.**tricolor** SCHENKLING, 1902 (*Ommadius*)
(l.c., 158—159)Mehrere Syntypen, Sumatra, Palembang, Java, in Coll. GRANDJEAN, Coll. SCHENKLING und im Museum Leiden.
DEI: 1 Syntypus, Sumatra, Palembang, Coll. SCHENKLING.
Syn. zu *ustulatus* GORHAM, 1878.**tricolor** SCHENKLING, 1908 (*Orthrius*)
(l.c., 479)

Holotypus, Queensland, leg. SCHNEIDER, im DEI [1906].

trinitatus SCHENKLING, 1916 (*Tenerus*)
(Ent. Mitt. 5, 150)

Holotypus, Togo, im DEI [durch LUDWIG].

tubercularis GORHAM, 1882 (*Clerus*)
(Biol. Centr.-Amer. 3 (2), 153, Taf. 8, Fig. 20)Mehrere Syntypen; Mexico, Cordova, leg. SALLÉ; Guatemala, Cerro Zunil, Capetillo, Aceituno, leg. CHAMPION.
DEI: 1 Syntypus, Cerro Zunil, 4—5000 ft., leg. CHAMPION, Coll. SCHENKLING.**tuberculatus** SCHENKLING, 1906 (*Neoclerus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 278—279)

Holotypus, Ceylon, leg. LEWIS, im DEI [Coll. KRAATZ].

tuberculatus SCHENKLING, 1906 (*Neotenerus*)
(l.c., 309)Holotypus, mehrere Paratypen, Brasilien, Jatahy, Paraguay; im DEI.
DEI: Holotypus, Bresil., Prov. Goyaz, Jatahy, IX.—XI., Coll. SCHENKLING; 2 Ex. dto., Coll. SCHENKLING und Coll. KRAATZ; 1 Ex. Paraguay, 188., leg. DRAKE, Coll. KRAATZ: Paratypen.**tubercuicollis** CHEVROLAT, 1874 (*Opilo*)
(Rev. Mag. Zool., 284—285)Mehrere Syntypen, Africa Australi, Natal, in Coll. CHEVROLAT.
DEI: 1 Syntypus, Afr. mer. (Fundort nicht lesbar!), durch CHEVROLAT, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *nodicollis* BOHEMAN, 1851.**tubercuicollis** SCHENKLING, 1902 (*Orthrius*)
(Bull. Mus. Paris 8, 323)Mehrere Syntypen, Dardjiling, 1890, leg. HARMAND, im Museum Paris.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.**tuberculipenne** SCHENKLING, 1900 (*Pelonium*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 406)Mehrere Syntypen, Chile, Coll. KRAATZ und Coll. SCHENKLING.
DEI: 3 Ex. Chile, durch SCHRÖDER, 4 Ex. Chile; Coll. SCHENKLING, Syntypen.
Syn. zu *insignicorne* FAIRMAIRE, 1861.**tucumanensis** SCHENKLING, 1908 (*Platynoptera*)
(l.c., 703—704)1 Ex. Argentina, Prov. Tucuman, bei Tapia, 1903, leg. BAER, via PIC an DEI; 1 Ex. Tucuman, leg. BRUCH, im La Plata-Museum; Syntypen.
DEI: 1 Syntypus, Argentine, Prov. Tucuman, Tapia, 600 m, 3. IV. 1903, leg. BAER, Coll. PIC, 1906 — Coll. SCHENKLING.**tugelanus** GORHAM, 1900 (*Trichodes*)
(Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 5, 72—74)3 Syntypen, Natal, Tugela River, Weenen, 1896, leg. MARSHALL.
DEI: 1 Syntypus, Natal, Weenen, durch GORHAM, Coll. SCHENKLING.**umbratus** SCHENKLING, 1912 (*Xenorhrius*)
(Ent. Mitt. 1, 325—326)Mehrere Syntypen, Formosa, Kosempo, IX. 1911/V. 1912, Kankau, IV.—V. 1912, leg. SAUTER.
DEI: Syntypen, Formosa, leg. SAUTER: 5 Ex. Kosempo, 7. IX. 1909 (Datum nicht erwähnt!), 7. IX. 1911; 6 Ex. Kankau, Koshun, IV., V. 1912.**uncinatus** SCHENKLING, 1907 (*Clerus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 312)Mehrere Syntypen, Amazon, leg. BATES, im Britischen Museum und DEI.
DEI: 1 Syntypus, Amazon, leg. BATES, 1906, ex Britisches Museum.

Beiträge zur Entomologie, Heft 2, 1982, Band 32

undatus SCHENKLING, 1899 (*Ommadius*)
(Ann. Mus. Genova (2) 20, 343–344)

Mehrere Syntypen, Sumatra, Si-Rambé, 1890–91, leg. MODIGLIANI, im Museum Genua.
DEI: 2 Syntypen, Sumatra, Si-Rambé, XII. 1890–III. 1891, leg. MODIGLIANI, Coll. SCHENKLING.

ungulatus ELSTON, 1922 (*Phlogistus*)
(Trans. Proc. R. Soc. S. Austr. 46, 314)

Holotypus, mehrere Paratypen, Western Australia, Swan River, leg. CLARK, in Coll. ELSTON.
DEI: 2 Paratypen, W. Australia, Swan R., leg. CLARK.

unifasciata SCHENKLING, 1900 (*Priocera*)
(Mitt. Mus. Hamburg 15, 4, Separat)

Mehrere Syntypen, Brasilia, Lages, im Museum Hamburg.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

unifasciata PIC, 1953 (*Thriocera*)
(Beitr. Ent. 3, 321)

Holotypus, Ost-Afrika, Myombe, III. 1914, leg. METHNER, im DEI [10.–16. III.].

unifasciatum KRAATZ, 1899 (*Microstigmatium*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 100)

Holotypus, Togo, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ; im DEI.

unimaculata PIC, 1940 (*Lebasiella*)
(Echange 56, Nr. 481, 10–11)

Mehrere Syntypen, Mexico, im DEI und in Coll. PIC.
DEI: 1 Syntypus, Mexico, Taseo, durch HOEGE.

unimaculata PIC, 1953 (*Strotocera*)
(Beitr. Ent. 3, 320)

Holotypus, West-Afrika, Togogebiet, durch STAUDINGER & BANG-HAAS, im DEI.

unistriatus SCHENKLING, 1906 (*Opilo*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 260–261)

Holotypus, mehrere Paratypen, Pondicherry, im DEI.
DEI: Holotypus, 2 Paratypen, Pondicherry, durch STAUDINGER.

validus SCHENKLING, 1915 (*Tillus*)
(Ent. Mitt. 4, 109)

Holotypus, Südafrika, Rhodesia, Plumtree, im DEI.

varicollis SCHENKLING, 1906 (*Ichnea*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 310–311)

Holotypus, mehrere Paratypen, Brasilien, Jatahy, im DEI.
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Brasilien, Goyaz, leg. DONCKIER, Coll. SCHENKLING.

ventralis SCHENKLING, 1908 (*Ommadius*)
(l.c., 485–486)

Mehrere Syntypen, Nord-Kanara, Basti, Bombay, 2500 ft., leg. BELL und leg. ANDREWES, im DEI.
DEI: 2 Syntypen, Nord-Kanara, Basti, Bombay, leg. ANDREWES.

vicinus SCHENKLING, 1899 (*Ommadius*)
(Ann. Mus. Genova (2) 20, 341–342)

Mehrere Syntypen, Ins. Mentawai, Sipora, 1894, leg. MODIGLIANI, im Museum Genua.
DEI: 1 Syntypus, Mentawai, Sipora, Sereinu, V.–VI. 1894, leg. MODIGLIANI, Coll. SCHENKLING.

villosa SCHENKLING, 1908 (*Hydnocera*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 702)

Mehrere Syntypen, Mexiko, San Isidro, leg. HÖGE, im Britischen Museum und DEI.
DEI: 2 Syntypen, Mexiko, San Isidro, leg. HÖGE.

violaceipennis SCHENKLING, 1912 (*Allochotes*)
(Ent. Mitt. 1, 328)

Holotypus, Formosa, Kankau, IV. 1912, leg. SAUTER; im DEI [Koshun].

viridescens PIC, 1947 (*Prosymnus*)
(Divers. Ent. 1, 5)

Mehrere Syntypen, Tanganjika.
DEI: 1 Syntypus, D.O.A., Tanganjika, STAUDINGER & BANG-HAAS dedic.

viridicollis SCHENKLING, 1899 (*Chlorocnemis*)
(Ann. Mus. Genova (2) 20, 140–141)

Mehrere Syntypen, Brit. Neu Guinea; Ighibirei, Kapakapa, 1890–91, leg. LORIA; Fly River, 1876–77, leg. D'ALBERTIS; im Museum Genua.
DEI: 1 Syntypus, N. Guinea, Ighibirei, VII.–VIII. 1890, leg. LORIA, Coll. SCHENKLING.

viridis SCHENKLING, 1915 (*Cyclotomocerus*)
(Ent. Mitt. 4, 317)

Syntypen: 2 Ex. Nord-Queensland, Kuranda, ex Coll. HACKER; 1 Ex. dto., via DODD an SCHENKLING; im DEI.
DEI: 2 Syntypen, Kuranda, VII. 1905, Coll. HACKER.

vitticeps KRAATZ, 1899 (*Tenerus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 104)

Holotypus, N. Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT; im DEI [1896, Coll. KRAATZ].

vitticollis SCHENKLING, 1906 (*Epiphloeus*)
(i.c., 299)

Holotypus, mehrere Paratypen, Amazon, im DEI.
DEI: Holotypus, 3 Paratypen, Amazon, Coll. KRAATZ.

vitticollis KRAATZ, 1899 (*Tenerus*)
(i.c., 103; nom. praeocc. = *conradii* LOHDE, 1899, Ent. Nachr. 25, 305)

Holotypus, Togo, leg. CONRADT; im DEI [Coll. KRAATZ].

vittipenne SCHENKLING, 1906 (*Pelonium*)
(i.c., 316)

Holotypus, mehrere Paratypen; Argentinien, Tucuman; Paraguay; im DEI.
DEI: Holotypus, Argentinien, Tucuman, leg. DONCKIER, Coll. KRAATZ; 2 Ex. dto., 1 Ex. Paraguay, leg. KRAATZ, Coll. KRAATZ; 1 Ex. dto., leg. DRAKE, 188.: Paratypen.

vittipennis SCHENKLING, 1903 (*Tenerus*)
(Ann. Mus. Nat. Hung. 1, 396–397)

7 Syntypen, Neu-Guinea, Stephansort, Simbang, 1897–1900, leg. BIRÓ, im Museum Budapest.
DEI: 1 Ex. N. Guinea, Simbang, Huon Golf., 1898, leg. BIRÓ, 1 Ex. (Fundort nicht lesbar!), durch WALLACE; Coll. SCHENKLING, Syntypen.

wagneri SCHENKLING, 1926 (*Opetiopalpus*)
(Col. Centralbl. 1, 102)

Mehrere Syntypen, Hispania centr., Aragonien, Hochplateau bei Albarracin, 1200 m, leg. WAGNER.
DEI: 2 Syntypen, Hispania, Aragon., Umgeb. Albarracin, 1200 m, VI. – VII. 1925.

weyersii KRAATZ, 1899 (*Cladiscus*)
(Ann. Soc. Ent. Belg. 43, 213–214)

Holotypus, Südwest Sumatra, leg. WEYERS; im DEI.

wokanensis SCHENKLING, 1899 (*Ommadius*)
(Ann. Mus. Genova (2) 20, 148)

Mehrere Syntypen, Ins. Aru, Wokan, 1873, leg. BECCARI, im Museum Genua.
DEI: 1 Ex. Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. SCHENKLING.

yunnanensis SCHENKLING, 1908 (*Allochotes*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 702–703)

Mehrere Syntypen, Yunnan, leg. DONCKIER, im DEI.
DEI: 3 Syntypen, Yunnan, leg. DONCKIER.

Wahrscheinlich nicht beschriebene Arten

bakeri SCHENKLING (*Dasyceroclerus*)

DEI: 3 Typen, Los Banos, P. I., leg. BAKER.

bipartitus SCHENKLING (*Galeruclerus*)

DEI: 1 Typus, Brasilien, Mar de Hespanha, 14. XI. 1905.

curvifasciata LEA (*Alleidea*)

DEI: 1 Typus, W. Australia, Coll. HACKER.

italicus OBENBERGER (*Tillus*)

DEI: 1 Typus, Calabria, Aspromonte, leg. PAGANETTI, Coll. LEONHARD.

mundum SCHENKLING (*Pelonium*)

DEI: 1 Typus, Argentina, Pr. Santiago d. Estero, leg. BRUCH, 190.

plagiatus SCHENKLING (*Epiphloeus*)

DEI: 2 Typen, Brazil, Minas, Passa Quatro, Faz. dos Campos, 4. XII. 1915/2. I. 1918, leg. ZIRÁN.

zikani SCHENKLING (*Galeruclerus*)

DEI: 3 Typen, Brasilien, Minas, Passa Quatro, 7. XII. 1920, leg. ZIRÁN.

virescens SCHENKLING (*Ommadius*)

DEI: 1 Type, Sumatra, Liangagas, leg. DOHRN, Coll. SCHENKLING.

Lymexylonidae

ater KRAATZ, 1895 (*Atractocerus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 163)

♂ Holotypus, Togo; im DEI [leg. CONRADT, Coll. KRAATZ].

Nach KRAATZ ist der Holotypus ein ♂, er wurde jedoch vom Spezialisten WHEELER bei seiner Revision als ♀ ausgezeichnet.
Syn. zu *brevicornis* LINNÉ, 1766.

procerus SCHENKLING, 1914 (*Atractocerus*)
(Ent. Mitt. 3, 319–320)

1 Ex. Brasilia, Corumba, Coll. RICHTER, im DEI; 1 Ex. Süd-Brasilien, Porto Alegre, im Museum Dresden; 1 Ex. Cayenne, Demerara, im Britischen Museum: Syntypen.
DEI: 1 ♀, Syntypus, Brazil, Corumba, Ato Paraguay, Coll. RICHTER.

Derodontidae

erichsoni ROSENHAUER, 1846 (*Laricobius*)
(*Brosocosoma* und *Laricobius*, zwei neue Käfergatt. 7, Tab. f (II) A–L)

Mehrere Syntypen, Tyrol, Gschnitzer Thal bei Steinach, 30. VII.–6. VIII., 3200 ft.; Katharinenberg bei Wunsiedel im Fichtelgebirge, A. IX.; leg. ROSENHAUER.
DEI: 1 Syntypus, Tyrol, Coll. STIERLIN.

sahlbergi REITTER, 1883 (*Laricobius*)
(Rev. mens. Ent, 1, 42)

Mehrere Syntypen, Sibiria arctica, Fatjanowsk, leg. SAHLBERG.
DEI: 1 Syntypus, Sibir. arct., leg. SAHLBERG, Coll. STIERLIN.

Zusammenfassung

Vorliegender Katalog beinhaltet die Coleopteren-Typen (XX), die in den Sammlungen der Abteilung Taxonomie der Insekten des Institutes für Pflanzenschutzforschung, Bereich Eberswalde (ehemals Deutsches Entomologisches Institut), aufbewahrt werden.

Summary

The present catalogue contains the types of Coleoptera (XX) that are preserved in the collections of the Department of Taxonomy of Insects in the Eberswalde branch of the Institute of Plant Protection Research (former Deutsches Entomologisches Institut).

Резюме

Данный каталог содержит типы Coleoptera (XX), хранящиеся в коллекциях отдела таксономии насекомых при Научно-исследовательском институте защиты растений, Эберсвальдский филиал (бывший Немецкий энтомологический институт).

Besprechungen

Immunology of Human Infection. Part II: Viruses and Parasites; Immunodiagnosis and Prevention of Infectious Diseases. (Comprehensive Immunology, Vol. 9). Herausgeber: NAHMAS, A. J. & O'REILLY, R. J. PLENUM MEDICAL BOOK COMPANY, New York–London. 1982; 19,5 × 25,8 cm; xxvii + 603 S., illus. Preis 45,00 U.S.\$.

Ausgehend von der Tatsache, daß das Stadium der Infektion nicht ohne die Untersuchung der Immunität vorangebracht werden kann, ist dieser Band dem Komplex der Wechselbeziehungen zwischen Mikrobiologie und Immunologie gewidmet. Namhafte Experten erörtern die allgemeinen Aspekte der gegenseitigen Beeinflussung von Wirt und infektiös wirkenden Kräften, der Immundiagnose, Immunitätsverhinderung und der Infektion in speziellen Wirten. Es werden detaillierte Angaben zu den spezifischen, infektiös wirkenden Kräften mitgeteilt einschließlich Bakterien, Mycoplasmen, Chlamydiae, Pilze, Viren und Parasiten. Mit diesem Inhalt, gegliedert in 23 Hauptkapitel, spricht der Band nicht nur die Forschungen auf dem Gebiet der Infektionskrankheiten an, sondern ebenso die der Mikrobiologie und Immunologie. MORGE

Flies of the Nearctic Region. (Herausgeber: G. C. D. GRIFFITHS). E. SCHWEIZERBART'sche Verlagsbuchhandlung (NÄGELE und OBERMILLER), Stuttgart. 17,3 × 24,5 cm. Volume V: Homeodactyla and Asilomorpha Part 13, Number 1 (1980): HALL, J. C. & EVENHUIS, N. L.: Bombyliidae. 96 S., Fig. 1–73.

Die Bearbeitung der nearktischen Bombyliidae reicht in der exzellenten Gründlichkeit dieser Publikationsreihe von der Bestimmungstabelle der Unterfamilien, der der nearktischen Gattungen der Bombyliinae bis zur Revision des Genus *Bombylius*. Der Teil endet im Bestimmungsschlüssel der *Bombylius*-Arten. MORGE

Pott, E. Wald und Forst. Pflanzen und Tiere nach Farbfotos bestimmen. Reihe BLV Naturführer 121. BLV Verlagsgesellschaft, München–Wien–Zürich. 1981; 11,7 × 17,8 cm, 128 S., 149 Farbfotos, 3 Zeichnungen. Preis 80,00 ö. S.

In der Reihe „BLV Naturführer“ ist nach den Bänden „Strand + Küste“ und „Bach – Fluß – See“ hiermit nun der dritte Biotopführer erschienen. Mit diesem wird nicht ein weiterer Beitrag zur Diskussion über die Situation der Wälder geliefert, in diesem Taschenbuch geht es vielmehr um die rein informative Darstellung des Lebensraumes Wald und seiner Bewohner. Es vermittelt damit primär die Grundlagen der Artenkenntnis, die Voraussetzung ist für die weitere Beschäftigung mit diesem Thema. — In der praxisbezogenen Konzeption dieser Serie mit ihrer Fülle von Informationen, ausgezeichnet durch die Handlichkeit des Bändchens, werden auf 149 hervorragenden Farbfotos die Pflanzen- und Tierarten der Wälder vorgestellt. Ergänzende Texte beschreiben Merkmale, Vorkommen, Lebensweise und Ökologie. Die Einleitung beinhaltet die Waldtypen Europas, einen Abriss zur Waldgeschichte, Ökologie und Funktion des Waldes sowie der Waldbewirtschaftung. MORGE

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Beiträge zur Entomologie = Contributions to Entomology](#)

Jahr/Year: 1982

Band/Volume: [32](#)

Autor(en)/Author(s): Döbler Helga

Artikel/Article: [Katalog der in den Sammlungen der Abteilung Taxonomie der Insekten des Institutes für Pflanzenschutzforschung, Bereich Eberswalde \(ehemals Deutsches Entomologisches Institut\), aufbewahrten Typen - XX \(Coleoptera: Lycidae, Lampyridae, Cantharidae, Phengodidae, Drilidae, Malachiidae, Kaumiidae, Dasytidae, Melyridae, Cleridae, Lymexylonidae, Derodontidae\). 393-435](#)