

Institut für Pflanzenschutzforschung
der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR
Bereich Eberswalde
Abteilung Taxonomie der Insekten
Eberswalde-Finow (DDR)

LOTHAR DIECKMANN

Ergebnisse der Albanien-Expedition 1961 des Deutschen Entomologischen Institutes

98. Beitrag

Coleoptera: Curculionidae

In dieser Arbeit werden 599 Exemplare aus 153 Arten der Familie der Rüsselkäfer erfaßt. Einige wenige Käfer wurden von Dr. U. SCHEIDING 1958 und von Dr. E. KÖNIGSMANN 1959 auf Touristenreisen in Albanien erbeutet. Alle anderen Exemplare wurden 1961 von den drei Teilnehmern der Albanien-Expedition des ehemaligen Deutschen Entomologischen Institutes (Dr. G. FRITZSE, Dr. E. KÖNIGSMANN, J. SCHULZE) gesammelt. Die Determination von fünf *Otiorhynchus*-Arten wurde freundlicherweise von J. FREMUTH (Hradec Králové, ČSSR) übernommen, dem ich an dieser Stelle noch einmal besonders danke.

Die Mehrzahl der Arten ist in Europa weit verbreitet oder besiedelt außerdem asiatische und nordafrikanische Gebiete der paläarktischen Region. Nur 17 Spezies sind in ihrer Verbreitung auf die Balkanhalbinsel beschränkt; davon kommen acht ausschließlich in Albanien vor. Diese endemischen Arten sind meist flugunfähig und gehören vorwiegend in die Unterfamilien Otiorhynchinae und Brachyderinae.

Das System des WINKLER-Katalogs wurde — mit Ausnahme weniger Spezies — als Grundlage für die Anordnung der Gattungen und Arten genommen.

Coenorhinus germanicus (HERBST, 1797)

Verbreitung: Europa, Vorder- und Mittelasien, Sibirien, Mongolei.
Untersuchtes Material: 1 Exemplar
1 Ex. Tirana, 9.–12. V. 61, DEI.

Coenorhinus aequatus (LINNÉ, 1767)

Verbreitung: Europa, Vorderasien, Mittelasien.
Untersuchtes Material: 1 Exemplar
1 Ex. Bizë bei Shëngjergji, 10.–15. VII. 61, DEI.

Rhynchites hungaricus (HERBST, 1784)

Verbreitung: Südöstliches Mitteleuropa bis Vorderasien.
Untersuchtes Material: 4 Exemplare
2 Ex. Mali me Gropë, Livadhet e Selitës, Wiese, 1000–1100 m, 3.–8. VII. 61, DEI;
2 Ex. Pogradec, Ohrida-See, 700–1000 m, 20. VI. 1959, leg. KÖNIGSMANN, DEI.

Rhynchites aethiops BACH, 1854

Verbreitung: Frankreich, Mittel-, Süd-, Ost- und Südosteuropa, Vorderasien.
Untersuchtes Material: 3 Exemplare
1 Ex. Mali me Gropë, Livadhet e Selitës, Wiese, 1000–1100 m, 3.–8. VII. 61, DEI;
2 Ex. Bizë bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400–1500 m, 10.–15. VII. 61, DEI.

Rhynchites bacchus (LINNÉ, 1758)

Verbreitung: West-, Mittel-, Süd- und Osteuropa, Vorder- und Mittelasien, Westsibirien.
Untersuchtes Material: 1 Exemplar
1 Ex. Borshi südl. Vlora, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50–150 m, 14.–27. V. 61, DEI.

***Apoderus coryli* (LINNÉ, 1758)**

Verbreitung: Europa, Vorderasien, Sibirien, China.

Untersuchtes Material: 3 Exemplare

3 Ex. Nordalban. Alpen, Shalabach-Tal bei Thethi, 900–1200 m, 1.–4. VIII. 61, DEI.

***Apion violaceum* KIRBY, 1808**

Verbreitung: Paläarktische Region.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

1 Ex. Tirana, 9.–12. V. 61, DEI;

1 Ex. Mali me Gropë, Livadhet e Selitës, Wiese, 1000–1100 m, 3.–8. VII. 61, DEI.

***Apion affine* KIRBY, 1808**

Verbreitung: Europa, Vorderasien.

Untersuchtes Material: 4 Exemplare

3 Ex. Bizi bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400–1500 m, 10.–15. VII. 61, DEI;

1 Ex. Lurja östl. Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen, 1300 m, 19.–24. VII. 61, DEI.

***Apion oblongum* GYLLENHAL, 1839**

Verbreitung: Mittel- und Osteuropa, Vorder- und Mittelasien, Mittelsibirien, Mongolei.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Bizi bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400–1500 m, 10.–15. VII. 61, DEI.

***Apion tubiferum* GYLLENHAL, 1833**

Verbreitung: Europäische Mittelmeerländer, Syrien, Algerien.

Untersuchtes Material: 6 Exemplare

1 Ex. Lukova nördl. Saranda, 250 m, 24. V. 61, DEI;

5 Ex. Poliçan westl. Tomor, *Arbutus-Phillyrea*-Macchie, 500 m, 2.–12. VI. 61, DEI.

***Apion malvae* (FABRICIUS, 1775)**

Verbreitung: Paläarktische Region (fehlt in den nördlichen Gebieten).

Untersuchtes Material: 6 Exemplare

3 Ex. Borshi südl. Vlora, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50–150 m, 14.–27. V. 61, DEI;

3 Ex. Durresi, Umgeb. von Plazh, Anfang VI. 58, leg. SCHEIDING, DEI.

***Apion rufirostre* (FABRICIUS, 1775)**

Verbreitung: Europa, Nordafrika, Vorder- und Mittelasien.

Untersuchtes Material: 4 Exemplare

1 Ex. Tirana, 9.–12. V. 61, DEI;

2 Ex. Borshi südl. Vlora, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50–150 m, 14.–27. V. 61, DEI;

1 Ex. Durresi, Umgeb. von Plazh, Anfang VI. 58, leg. SCHEIDING, DEI.

***Apion aeneum* (FABRICIUS, 1775)**

Verbreitung: Paläarktische Region.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

2 Ex. Durresi, Umgeb. von Plazh, Anfang VI. 58, leg. SCHEIDING, DEI.

***Apion radiolus* KIRBY, 1808**

Verbreitung: Paläarktische Region.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

2 Ex. Durresi, Umgeb. von Plazh, Anfang VI. 58, leg. SCHEIDING, DEI.

***Apion frumentarium* (PAYKULL, 1792)**

Verbreitung: Europa, Vorderasien, Nordafrika.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

1 Ex. Bizi bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400–1500 m, 10.–15. VII. 61, DEI;

1 Ex. Lurja östl. Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen, 1300 m, 19.–24. VII. 61, DEI.

***Apion semivittatum* GYLLENHAL, 1833**

Verbreitung: Europa (fehlt im Norden), Vorderasien, westliches Nordafrika.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Borshi südl. Vlora, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50–150 m, 14.–27. V. 61, DEI.

***Apion urticarium* (HERBST, 1784)**

Verbreitung: Europa, Vorder- und Mittelasien, Ostsibirien.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

2 Ex. Borshi südl. Vlora, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50–150 m, 14.–27. V. 61, DEI.

***Apion vicinum* KIRBY, 1808**

Verbreitung: Europa, Algerien, Vorder- und Mittelasien, Sibirien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Lurja östl. Kurbneshi, Maja e Madhe, 1400–1780 m, 19.–24. VII. 61, DEI.

***Apion atomarium* KIRBY, 1808**

Verbreitung: Europa, Algerien, Anatolien, Kaukasus, Mongolei.

Untersuchtes Material: 17 Exemplare

1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.–22. VI. 61, DEI;

1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI.–2. VII. 61, DEI;

1 Ex. Bizë bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400–1500 m, 10.–15. VII. 61, DEI;

14 Ex. Lurja östl. Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen, 1300 m, 19.–24. VII. 61, DEI.

***Apion oblium* SCHILSKY, 1902**

Verbreitung: Süd-, Mittel-, Ost- und Südosteuropa, Anatolien.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

2 Ex. Lurja östl. Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen, 1300 m, 19.–24. VII. 61, DEI.

***Apion seniculus* KIRBY, 1808**

Verbreitung: Paläarktische Region.

Untersuchtes Material: 3 Exemplare

2 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flussthal des Luma, 250–300 m, 25.–29. VII. 61, DEI;

1 Ex. Nordalban. Alpen, Shalabach-Tal bei Thethi, 900–1200 m, 1.–4. VIII. 61, DEI.

***Apion pubescens* KIRBY, 1811**

Verbreitung: Europa, Vorderasien, Mittelasien, Sibirien, Nordafrika (Marokko, Algerien)

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Bizë bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400–1500 m, 10.–15. VII. 61, DEI.

***Apion confluens* KIRBY, 1808**

Verbreitung: Europa, Vorderasien.

Untersuchtes Material: 7 Exemplare

6 Ex. Borshi südl. Vlora, Flussthal des Lumë i Borshit, 14.–27. V. 61, DEI;

1 Ex. Lukova nördl. Saranda, 250 m, 24. V. 61, DEI.

***Apion detritum* MULSANT et REY, 1859**

Verbreitung: Europa, Vorderasien, Nordafrika.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Dajti, Westhang, 1100 m, 29. VI. 61, DEI.

***Apion onopordi* KIRBY, 1808**

Verbreitung: Europa, Vorder- und Mittelasien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Nordalban. Alpen, Shalabach-Tal bei Thethi, 900–1200 m, 1.–4. VII. 61, DEI.

***Apion penetrans* GERMAR, 1817**

Verbreitung: Europa, Kaukasus, Kasachstan, Marokko, Tunesien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Bizë bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400–1500 m, 10.–15. VII. 61, DEI.

***Apion alliariae* HERBST, 1797**

Verbreitung: Europa, westliches Nordafrika, Anatolien, Transkaukasus.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Mali me Gropë, Rotbuchenbestand mit angrenzender Weide, 1200 m, 3.–8. VII. 61, DEI.

***Apion carduorum* KIRBY, 1808**

Verbreitung: Europa, Nordafrika, Vorder- und Mittelasien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Borshi südl. Vlora, Flussthal des Lumë i Borshit, 14.–27. V. 61, DEI.

***Apion loti* KIRBY, 1808**

Verbreitung: Europa, Vorder- und Mittelasien, Mongolei, Nordafrika.

Untersuchtes Material: 5 Exemplare

1 Ex. Ujë Fiochte südl. Tepelenë, 200 m, 29.–31. V. 61, DEI;

1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI.–2. VII. 61, DEI;

2 Ex. Mali me Gropë, Livadhet e Sëlitës, Wiese, 1000–1100 m, 3.–8. VII. 61, DEI;

1 Ex. Nordalban. Alpen, Shalabach-Tal bei Thethi, 900–1200 m, 1.–4. VIII. 61, DEI.

***Apion aeneomicans* WENCKER, 1864**

Verbreitung: Europäische Mittelmeerländer, südöstliches Mittel- und Osteuropa, Algerien.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

2 Ex. Polican westl. Tomor, *Arbutus-Phillyrea*-Macchie, 500 m, 2. - 12. VI. 61, DEI.

***Apion platalea* GERMAR, 1817**

Verbreitung: Europa (nicht im Norden), Kaukasus.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

2 Ex. Mali me Gropë, Livadhet e Selitës, Wiese, 1000 - 1100 m, 3. - 8. VII. 61, DEI.

***Apion gyllenhali* KIRBY, 1808**

Verbreitung: Europa, Kaukasus, Mittelasien, Sibirien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Borshi südl. Vlora, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50 - 150 m, 14. - 27. V. 61, DEI.

***Apion columbinum* GERMAR, 1817**

Verbreitung: Europa, Vorderasien, Mittelasien, Sibirien.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

2 Ex. Mali me Gropë, Livadhet e Selitës, Wiese, 1000 - 1100 m, 3. - 8. VII. 61, DEI.

***Apion facetum* GYLLENHAL, 1839**

Verbreitung: Europa, Vorderasien, Mittelasien, Sibirien, Mongolei.

Untersuchtes Material: 3 Exemplare

2 Ex. Borshi südl. Vlora, SW-Hang, mit *Pistacia lentiscus*, *Phlomis fruticosa*, 200 - 400 m, 14. - 27. V. 61; DEI;

1 Ex. Borshi südl. Vlora, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50 - 150 m, 14. - 27. V. 61, DEI.

***Apion ononis* KIRBY, 1808**

Verbreitung: Europa, Vorderasien, Nordafrika.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

1 Ex. Dajti, Westhang, 1100 m, 29. VI. 61, DEI;

1 Ex. Mali me Gropë, Livadhet e Selitës, Wiese, 1000 - 1100 m, 3. - 8. VII. 61, DEI.

***Apion viciae* (PAYKULL, 1800)**

Verbreitung: Paläarktische Region.

Untersuchtes Material: 4 Exemplare

1 Ex. Borshi südl. Vlora, Flusstal des Lumi i Borshit, 14. - 27. V. 61, DEI;

1 Ex. Uji Ftohtë südl. Tepelenë, 200 m, 29. - 31. V. 61, DEI;

2 Ex. Dajti, Südhang - Wiese, 900 m, 30. VI. 61, DEI.

***Apion virens* HERBST, 1797**

Verbreitung: Gesamte Paläarktis.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

2 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flusstal des Luma, 250 - 300 m, 25. - 29. VII. 61, DEI.

***Apion cerdo* GERSTAECKER, 1854**

Verbreitung: Europa, Vorder- und Mittelasien, Mittel- und Ostsibirien, Mongolei, Nordostchina.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

1 Ex. Borshi südl. Vlora, Flussdal des Lumi i Borshit, 14. - 27. V. 61, DEI;

1 Ex. Borshi südl. Vlora, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50 - 150 m, 14. - 27. V. 61, DEI.

***Apion flavipes* (PAYKULL, 1792)**

Verbreitung: Gesamte Paläarktis.

Untersuchtes Material: 23 Exemplare

4 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17. - 22. VI. 61, DEI;

6 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI. - 2. VII. 61, DEI;

11 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flussdal des Luma, 250 - 300 m, 25. - 29. VII. 61, DEI;

1 Ex. Nordalban. Alpen, Shalabach-Tal bei Thethi, 900 - 1200 m, 1. - 4. VIII. 61, DEI;

1 Ex. Durrezi Umgeb. von Plazh, Anfang VI. 58, leg. SCHEIDING, DEI.

***Apion nigritarse* KIRBY, 1808**

Verbreitung: Europa, Vorder- und Mittelasien, Sibirien, Nordafrika.

Untersuchtes Material: 4 Exemplare

1 Ex. Borshi südl. Vlora, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50 - 150 m, 14. - 27. V. 61, DEI;

1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17. - 22. VI. 61, DEI;

1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI. - 2. VII. 61, DEI;

1 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flussdal des Luma, 250 - 300 m, 25. - 29. VII. 61, DEI.

***Apion trifolii* (LINNÉ, 1768)**

Verbreitung: Europa, Vorder- und Mittelasien, Nordafrika.

Untersuchtes Material: 31 Exemplare

6 Ex. Borshi südl. Vlora, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50–150 m, 14.–27. V. 61, DEI;

6 Ex. Uji Ftohte südl. Tepelena, 200 m, 29.–31. V. 61, DEI;

5 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.–22. VI. 61, DEI;

12 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Luzernefeld, 300 m, 25.–29. VII. 61, DEI;

2 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250–300 m, 25.–29. VII. 61, DEI.

***Apion interjectum* DESBROCHERS, 1895**

Verbreitung: Europa, westliches Nordafrika.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.–22. VI. 61, DEI;

1 Ex. Bizi bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400–1500 m, 10.–15. VII. 61, DEI.

***Apion schoenherri* BOHEMAN, 1839**

Verbreitung: West-, südöstliches Mittel-, Ost- und Südosteuropa, Vorderasien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Borshi südl. Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.–27. V. 61, DEI.

***Apion laevicolle* KIRBY, 1811**

Verbreitung: West-, südöstliches Mittel- und Südosteuropa, Vorderasien, westliches Nordafrika.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Tirana, 9.–12. V. 61, DEI.

***Apion angusticolle* GYLLENHAL, 1833**

Verbreitung: Mittelmeergebiet.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

2 Ex. Borshi südl. Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.–27. V. 61, DEI.

***Apion assimile* KIRBY, 1808**

Verbreitung: Gesamte Paläarktis.

Untersuchtes Material: 5 Exemplare

1 Ex. Borshi südl. Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.–27. V. 61, DEI;

3 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.–22. VI. 61, DEI;

1 Ex. Bizi bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400–1500 m, 10.–15. VII. 61, DEI.

***Apion ononicola* BACH, 1854**

Verbreitung: Europa, Vorderasien, Nordafrika.

Untersuchtes Material: 39 Exemplare

1 Ex. Borshi südl. Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.–27. V. 61, DEI;

1 Ex. Uji Ftohte südl. Tepelena, 200 m, 29.–31. V. 61, DEI;

15 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.–22. VI. 61, DEI;

7 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI.–2. VII. 61, DEI;

1 Ex. Dajti, Westhang, 1100 m, 29. VI. 61, DEI;

12 Ex. Dajti, Südhang – Wiese, 900 m, 30. VI. 61, DEI;

1 Ex. Mali me Gropë, Livadhet e Selitës, Wiese, 1000–1100 m, 3.–8. VII. 61, DEI;

1 Ex. Nordalban. Alpen, Shalabach-Tal bei Thethi, 900–1200 m, 1.–4. VIII. 61, DEI.

***Apion difforme* GERMAR, 1818**

Verbreitung: Westeuropa, Italien, Südosteuropa, Syrien, westliches Nordafrika.

Untersuchtes Material: 3 Exemplare

1 Ex. Borshi südl. Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.–27. V. 61, DEI;

1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI.–2. VII. 61, DEI;

1 Ex. Dajti, Südhang – Wiese, 900 m, 30. VI. 61, DEI.

***Brachycerus undatus* FABRICIUS, 1798**

Verbreitung: Europäische Mittelmeerländer, Balkanhalbinsel, Algerien.

Untersuchtes Material: 3 Exemplare

3 Ex. Borshi südl. Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.–27. V. 61, DEI.

***Otiorynchus meridianus* APFELBECK, 1907**

Verbreitung: Albanien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Lurja östl. Kurbneshi, Kunora e Lurës, 1400–2000 m, 19.–24. VII. 61, DEI (TREMUTH det.).

***Otiorynchus rugosostriatus* (GOEZE, 1777)**

Verbreitung: Europa, Kaukasus, Nordafrika.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

2 Ex. Borshi südl. Vlora, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50–150 m, 14.–27. V. 61, DEI.

Otiorhynchus corruptor (HOST, 1789)

Verbreitung: Italien, Balkanhalbinsel, Anatolien.

Untersuchtes Material: 3 Exemplare

2 Ex. Borshi südl. Vlora, Fluttal des Lunti i Borshit, 14.-27. V. 61, DEI;

1 Ex. Borshi südl. Vlora, Litorale Terrasse mit Olea u. Ficus, 50-150 m, 14.-27. V. 61, DEI.

Otiorhynchus albanicus APPELBECK, 1907

Verbreitung: Albanien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Bizë bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400-1500 m, 10.-15. VII. 61, DEI (FREMUTH det.).

Otiorhynchus inunctus STIERLIN, 1861

Verbreitung: Jugoslawien, Bulgarien, Albanien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Mali me Gropë, Livadhet e Selitës, Wiese, 1000-1100 m, 3.-8. VII. 61, DEI.

Otiorhynchus tumidipes STIERLIN, 1861

Verbreitung: Jugoslawien, Albanien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Nordalban. Alpen, Shalabach-Tal bei Thethi, 900-1200 m, 1.-4. VIII. 61, DEI (FREMUTH det.).

Otiorhynchus anatolicus BOHEMAN, 1843

Verbreitung: Albanien, Griechenland, Türkei (europäischer Teil und Anatolien).

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Borshi südl. Vlora, SW-Hang, mit Pistacia lentiscus, Phlomis fruticosa, 200-400 m, 14.-27. V. 61, DEI (FREMUTH det.).

Otiorhynchus ligustici (LINNÉ, 1758)

Verbreitung: Europa, Vorder- und Mittelasien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Tomor, Kloster Abbas Ali, 1800 m, 8.-10. VI. 61, DEI.

Otiorhynchus krueperi ssp. *tomoricensis* LONA, 1922

Verbreitung: Albanien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Tomor, Abbas Ali, Gipfel, 2401 m, 8.-10. VI. 61, DEI (FREMUTH det.).

Trachyphloeus spec. aff. *bosnicus* APPELBECK, 1898

Verbreitung: Albanien.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

2 Ex. Bizë bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400-1500 m, 10.-15. VII. 61, DEI.

Argoptochus bisignatus (GERMAR, 1824)

Verbreitung: Italien, Jugoslawien, Albanien.

Untersuchtes Material: 6 Exemplare

6 Ex. Mali me Gropë, Dolinengebiet, 1350 m, 6. VII. 61, DEI.

Phyllobius oblongus (LINNÉ, 1758)

Verbreitung: Europa, Sibirien.

Untersuchtes Material: 3 Exemplare

3 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250-300 m, 25.-29. VII. 61, DEI.

Phyllobius maculicornis GERMAR, 1824

Verbreitung: Europa, Sibirien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Tomor, Kloster Abbas Ali, 2000 m, 8.-10. VI. 61, DEI.

Phyllobius argentatus (LINNÉ, 1758)

Verbreitung: Paläarktische Region.

Untersuchtes Material: 9 Exemplare

5 Ex. Mali me Gropë, Rotbuchenbestand mit angrenzender Weide, 1200 m, 3.-8. VII. 61, DEI;

2 Ex. Bizë b. Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400-1500 m, 10.-15. VII. 61, DEI;

1 Ex. Lurja östl. Kurbneshi, Lan Lura, Geröllhang in Fagus-Abies-Wald, 1350 m, 19.-24. VII. 61, DEI;

1 Ex. Lurja östl. Kurbneshi, Kunora e Lurës, 1400-2000 m, 19.-24. VII. 61, DEI.

***Phyllobius seladonius* BRULLÉ, 1832**

Verbreitung: Südöstliches Mittel-, Ost- und Südosteuropa.
Untersuchtes Material: 1 Exemplar
1 Ex. Uji Ftohte südl. Tepelena, 200 m, 29.-31. V. 61, DEI.

***Phyllobius betulae* (FABRICIUS, 1801)**

Verbreitung: Mittel-, Süd- und Südosteuropa, Kaukasus.
Untersuchtes Material: 4 Exemplare
3 Ex. Dajti, Südhang — Wiese, 900 m, 30. VI. 61, DEI;
1 Ex. Bizë bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10.—15. VII. 61, DEI.

***Phyllobius pinicola* KIESENWETTER, 1864**

Verbreitung: Jugoslawien, Bulgarien, Albanien, Griechenland.
Untersuchtes Material: 3 Exemplare
2 Ex. Lurja östl. Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen, 1300 m, 19.—24. VII. 61, DEI;
1 Ex. Lurja östl. Kurbneshi, Lan Lura, Geröllhang in *Fagus-Abies*-Wald, 1350 m, 19.—24. VII. 61, DEI.

***Polydrusus cervinus* (LINNÉ, 1758)**

Verbreitung: Europa, Sibirien.
Untersuchtes Material: 2 Exemplare
2 Ex. Polican westl. Tomor, *Arbutus-Phillyrea*-Macchie, 500 m, 2.—12. VI. 61, DEI.

***Polydrusus picus* (FABRICIUS, 1792)**

Verbreitung: Mittel- und Südosteuropa, Kleinasien.
Untersuchtes Material: 1 Exemplar
1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 61, DEI.

***Polydrusus tibialis* GYLLENHAL, 1834**

Verbreitung: Südöstliches Mittel-, Süd- und Südosteuropa, Vorderasien.
Untersuchtes Material: 20 Exemplare
1 Ex. Borshi südl. Vlora, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50—150 m, 14.—27. V. 61, DEI;
5 Ex. Borshi südl. Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 61, DEI;
2 Ex. Uji Ftohte südl. Tepelena, 200 m, 29.—31. V. 61, DEI;
2 Ex. Polican westl. Tomor, Kulturland, 500 m, 2.—12. VI. 61, DEI;
7 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI.—2. VII. 61, DEI;
3 Ex. Dajti, Südhang — Wiese, 900 m, 30. VI. 61, DEI.

***Polydrusus dorsualis* GYLLENHAL, 1840**

Verbreitung: Griechenland, Albanien.
Untersuchtes Material: 4 Exemplare
4 Ex. Borshi südl. Vlora, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50—150 m, 14.—27. V. 61, DEI.

***Polydrusus thalassinus* GYLLENHAL, 1834**

Verbreitung: Südöstliches Mittel-, Ost- und Südosteuropa.
Untersuchtes Material: 3 Exemplare
1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 61, DEI;
1 Ex. Mali me Gropë, Livadhet e Selitës, Wiese, 1000—1100 m, 3.—8. VII. 61, DEI;
1 Ex. Nordbalban. Alpen, Shalabach-Tal bei Thethi, 900—1200 m, 1.—4. VIII. 61, DEI.

***Polydrusus apfelbecki* SOLARI, 1926**

Verbreitung: Albanien.
Untersuchtes Material: 2 Exemplare
2 Ex. Uji Ftohte südl. Tepelena, 200 m, 29.—31. V. 61, DEI.

***Polydrusus mollis* (STRÖM, 1768)**

Verbreitung: Europa, Anatolien, Kaukasus, nordöstliches Kasachstan, Sibirien.
Untersuchtes Material: 1 Exemplar
1 Ex. Bizë bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10.—15. VII. 61, DEI.

***Polydrusus hoppei* APPFELBECK, 1921**

Verbreitung: Albanien.
Untersuchtes Material: 2 Exemplare
2 Ex. Borshi südl. Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 61, DEI.

***Sciaphobus rubi* (GYLLENHAL, 1813)**

Verbreitung: Mittel-, Ost- und Südosteuropa.
Untersuchtes Material: 3 Exemplare
1 Ex. Mali me Gropë, Livadhet e Selitës, Wiese, 1000—1100 m, 3.—8. VII. 61, DEI;
2 Ex. Bizë b. Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10.—15. VII. 61, DEI.

***Sciaphebus barbatulus* (GERMAR, 1824)**

Verbreitung: Italien, südliches Mittel- und Südosteuropa.

Untersuchtes Material: 17 Exemplare

16 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI. – 2. VII. 61, DEI;

1 Ex. Dajti, Südhang – Wiese, 900 m, 30. VI. 61, DEI.

***Sciaphebus megalopsis* APPFELBECK, 1921**

Verbreitung: Albanien.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

2 Ex. Duresi Umgeb. von Plazh, Anfang VI. 58, leg. SCHEIDING, DEI.

***Eusomus ovulum* GERMAR, 1824**

Verbreitung: Europa, Vorder- und Mittelasien, Westsibirien.

Untersuchtes Material: 17 Exemplare

1 Ex. Tomor, Kloster Abbas Ali, 1800 m, 8. – 10. VI. 61, DEI;

3 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI. – 2. VII. 61, DEI;

8 Ex. Dajti, Südhang – Wiese, 900 m, 30. VI. 61, DEI;

3 Ex. Bizë bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400 – 1500 m, 10. – 15. VIII. 61, DEI;

1 Ex. Lurja östl. Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen, 1300 m, 19. – 24. VII. 61, DEI;

1 Ex. Nordalban. Alpen, Shalabach-Tal bei Thethi, 900 – 1200 m, 1. – 4. VIII. 61, DEI.

***Foucartia depilis* KRAATZ, 1859**

Verbreitung: Jugoslawien (Dalmatien, Herzegowina, Montenegro), Albanien.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

1 Ex. Dajti, Südhang – Wiese, 900 m, 30. VI. 61, DEI;

1 Ex. Mali me Gropë, Livadhet e Selitës, Wiese, 1000 – 1100 m, 3. – 8. VII. 61, DEI.

***Strophomorphus porcellus* (SCHOENHERR, 1832)**

Verbreitung: Europäische und asiatische Mittelmeerländer, Ost- und Südosteuropa, Kaukasus, nordwestliches Afrika.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Polican westl. Tomor, Kulturland, 500 m, 2. – 12. VI. 61, DEI.

***Sitona ophthalmicus* DESBROCHERS, 1869**

Verbreitung: Südeuropa, Transkaukasien, Algerien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17. – 22. VI. 61, DEI.

***Sitona sulcifrons* (THUNBERG, 1798) ssp. *deubeli* KRAUSS, 1902**

Verbreitung: Jugoslawien (Bosnien, Montenegro), Albanien, Griechenland, Bulgarien, Rumänien.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

1 Ex. Borshi südl. Vlora, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50 – 150 m, 14. – 27. V. 61, DEI;

1 Ex. Dajti, Südhang – Wiese, 900 m, 30. VI. 61, DEI.

***Sitona puncticollis* STEPHENS, 1831**

Verbreitung: Europa, Vorder- und Mittelasien, Nordafrika.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI. – 2. VII. 61, DEI.

***Sitona flavescens* (MARSHAM, 1802)**

Verbreitung: Paläarktische Region.

Untersuchtes Material: 9 Exemplare

1 Ex. Borshi südl. Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14. – 27. V. 61, DEI;

7 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250 – 300 m, 25. – 29. VII. 61, DEI;

1 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Unterwuchs in Apfelplantage, 350 m, 25. – 29. VII. 61, DEI.

***Sitona waterhousei* WALTON, 1846**

Verbreitung: Europa.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI. – 2. VII. 61, DEI.

***Sitona crinitus* (HERBST, 1795)**

Verbreitung: Paläarktis.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

2 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Luzernefeld, 300 m, 25. – 29. VII. 61, DEI.

***Sitona cylindricollis* FAHRAEUS, 1840**

Verbreitung: Gesamte Paläarktis.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

2 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250 – 300 m, 25. – 29. VII. 61, DEI.

***Sitona humeralis* STEPHENS, 1831**

Verbreitung: Westliches Nordafrika, Europa, Vorder- und Mittelasien.

Untersuchtes Material: 5 Exemplare

2 Ex. Borshi südl. Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.-27. V. 61, DEI;

2 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.-22. VI. 61, DEI;

1 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250-300 m, 25.-29. VII. 61, DEI.

***Psalidium macillosum* (FABRICIUS, 1792)**

Verbreitung: Norditalien, südöstliches Mittel-, Ost- und Südosteuropa, Vorder- und Mittelasien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Polican westl. Tomor, Kulturland, 500 m, 2.-12. VI. 61, DEI.

***Chlorophanus* spec. aff. *viridis* (LINNÉ, 1758)**

Verbreitung: Bulgarien, Albanien, Griechenland.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250-300 m, 25.-29. VII. 61, DEI.

Es handelt sich hier wahrscheinlich um eine neue Art, die wegen der kurzen Mukronen der Flügeldecken *C. viridis* ähnlich ist, aber wegen der runden dunklen Schuppen auf der Scheibe der Flügeldecken auch an *C. graminicola* GYLLENHAL erinnert.

***Larinus latus* (HERBST, 1784)**

Verbreitung: Östliche Mittelmeerländer, Ost- und Südosteuropa, Vorderasien.

Untersuchtes Material: 7 Exemplare

7 Ex. Borshi südl. Vlora, SW-Hang, mit *Pistacia lentiscus*, *Phlomis fruticosa*, 200-400 m, 14.-27. V. 61, DEI.

***Larinus carinirostris* GYLLENHAL, 1836**

Verbreitung: Italien, östliche Mittelmeerländer, Balkanhalbinsel, Vorderasien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Durrest, Umgeb. von Plazh, Anfang VI. 58, leg. SCHEIDING, DEI.

***Larinus planus* (FABRICIUS, 1792)**

Verbreitung: Europa, Vorderasien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Uji Ftohte südl. Tepelena, 200 m, 29.-31. V. 61, DEI.

***Larinus sturnus* (SCHALLER, 1783)**

Verbreitung: Europa, Vorder- und Mittelasien.

Untersuchtes Material: 9 Exemplare

3 Ex. Bizë bei Shëngjergjil, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400-1500 m, 10.-15. VII. 61, DEI;

6 Ex. Lurja östl. Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen, 1300 m, 19.-24. VII. 61, DEI.

***Larinus jaceae* (FABRICIUS, 1775)**

Verbreitung: Europa (fehlt im Norden), Vorder- und Mittelasien.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

1 Ex. Bizë bei Shëngjergjil, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400-1500 m, 10.-15. VII. 61, DEI;

1 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250-300 m, 25.-29. VII. 61, DEI.

***Larinus brenskei* FAUST, 1900**

Verbreitung: Sizilien, Albanien, Bulgarien, Griechenland.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250-300 m, 25.-29. VII. 61, DEI.

***Lixus iridis* OLIVIER, 1807**

Verbreitung: Paläarktische Region.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

2 Ex. Mali me Gropë, Livadhet e Selitës, Wiese, 1000-1100 m, 3.-8. VII. 61, DEI.

***Lixus algirus* (LINNÉ, 1758)**

Verbreitung: Madeira, Kanaren, Europa (fehlt im Norden), Vorder- und Mittelasien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Mali me Gropë, Livadhet e Selitës, Wiese, 1000-1100 m, 3.-8. VII. 61, DEI.

***Lixus elongatus* (GOEZE, 1777)**

Verbreitung: Paläarktische Region (fehlt in Nordeuropa).

Untersuchtes Material: 3 Exemplare

3 Ex. Tirana, 9.-12. V. 61, DEI.

Cleonis piger (SCOPOLI, 1773)

Verbreitung: Paläarktische Region.

Untersuchtes Material: 4 Exemplare

3 Ex. Tirana, 9.—12. V. 61, DEI;

1 Ex. Borshi südl. Vlora, Flusstal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 61, DEI.

Pachytychius haematocephalus (GYLLENHAL, 1836)

Verbreitung: Europäische Mittelmeerlande, West- und Mitteleuropa, Algerien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Borshi südl. Vlora, Flusstal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 61, DEI.

Smicronyx reichi (GYLLENHAL, 1836)

Verbreitung: Europa, Kleinasien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Borshi südl. Vlora, Flusstal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 61, DEI.

Smicronyx nebulosus TOURNIER, 1874

Verbreitung: Spanien, Frankreich, Schweiz, BRD, Italien, ČSSR, Österreich, Ungarn, Bulgarien, Albanien, Griechenland, Anatolien, UdSSR (Gruzinien).

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI.—2. VII. 61, DEI;

1 Ex. Mali me Gropë, Livadhet e Selitës, Wiese, 1000—1100 m, 3.—8. VII. 61, DEI.

Tychius [= Aoromius] quinquepunctatus (LINNÉ, 1758)

Verbreitung: Europa, Asien (bis Ostasien).

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Polican westl. Tomor, *Arbutus-Phillyrea*-Macchie, 500 m, 2.—12. VI. 61, DEI.

Tychius argentatus CHEVROLAT, 1859

Verbreitung: Südeuropa, Vorder- und Mittelasien, nordwestliches Afrika.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Polican westl. Tomor, *Arbutus-Phillyrea*-Macchie, 500 m, 2.—12. VI. 61, DEI.

Tychius flavigollis STEPHENS, 1831

Verbreitung: Europa, Vorderasien, nordwestliches Afrika.

Untersuchtes Material: 3 Exemplare

1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 61, DEI;

1 Ex. Dajti, Westhang, 1100 m, 29. VI. 61, DEI;

1 Ex. Dajti, Südhang — Wiese, 900 m, 30. VI. 61, DEI.

Tychius curtirostris DESBROCHERS, 1873

Verbreitung: Marokko, Spanien, Frankreich, Italien, Jugoslawien, Albanien, Griechenland.

Untersuchtes Material: 12 Exemplare

2 Ex. Borshi südl. Vlora, Flussdal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 61, DEI;

1 Ex. Borshi südl. Vlora, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50—150 m, 14.—27. V. 61, DEI;

1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 61, DEI;

8 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flussdal des Luma, 250—300 m, 25.—29. VII. 61, DEI.

Tychius [= Miccotrogus] picirostris (FABRICIUS, 1787)

Verbreitung: Europa, Asien (bis Ostasien).

Untersuchtes Material: 6 Exemplare

6 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flussdal des Luma, 250—300 m, 25.—29. VII. 61, DEI.

Tychius [= Miccotrogus] cuprifer (PANZER, 1799)

Verbreitung: Mittel-, Süd- und Südosteuropa, Vorder- und Mittelasien, westliches Nordafrika.

Untersuchtes Material: 10 Exemplare

2 Ex. Borshi südl. Vlora, Flussdal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 61, DEI;

2 Ex. Borshi südl. Vlora, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50—150 m, 14.—27. V. 61, DEI;

1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 61, DEI;

1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI.—2. VII. 61, DEI;

2 Ex. Bize bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10.—15. VII. 61, DEI;

2 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flussdal des Luma, 250—300 m, 25.—29. VII. 61, DEI.

Sibinia primita (HERBST, 1795)

Verbreitung: Europa, Vorder- und Mittelasien, Nordafrika.

Untersuchtes Material: 3 Exemplare

3 Ex. Dajti, Südhang — Wiese, 900 m, 30. VI. 61, DEI.

***Anthonomus rubi* (HERBST, 1795)**

Verbreitung: Europa, Asien (bis Ostsibirien), Algerien.
Untersuchtes Material: 1 Exemplar
1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17. – 22. VI. 61, DEI.

***Anthonomus chevrolati* DESBROCHERS, 1868**

Verbreitung: Europa (fehlt im Norden), Algerien.
Untersuchtes Material: 1 Exemplar
1 Ex. Bizé bei Shéngjergi, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400 – 1500 m, 10. – 15. VII. 61, DEI.

***Anthonomus rufus* GYLLENHAL, 1836**

Verbreitung: Europa, Vorderasien.
Untersuchtes Material: 1 Exemplar
1 Ex. Bizé bei Shéngjergi, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400 – 1500 m, 10. – 15. VII. 61, DEI.

***Hylobius graecus* PIC, 1902**

Verbreitung: Albanien, Griechenland.
Untersuchtes Material: 1 Exemplar
1 Ex. Borshi südl. Vlora, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50 – 150 m, 14. – 27. V. 61, DEI.

***Liparus tenebrioides* (PALLAS, 1781)**

Verbreitung: Balkanhalbinsel, Osteuropa, Kaukasus.
Untersuchtes Material: 4 Exemplare
3 Ex. Tomor, Kloster Abbas Ali, 1800 m, 8. – 10. VI. 61, DEI;
1 Ex. Mali me Gropë, Rotbuchenbestand mit angrenzender Weide, 1200 m, 3. – 8. VII. 61, DEI.

***Donus audax* FAUST, 1887**

Verbreitung: Albanien, Griechenland.
Untersuchtes Material: 1 Exemplar
1 Ex. Borshi südl. Vlora, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50 – 150 m, 14. – 27. V. 61, DEI.

***Hypera pastinacae* (ROSSI, 1790)**

Verbreitung: Europäische Mittelmeerländer, West- und Mitteleuropa, Vorderasien, westliches Nordafrika.
Untersuchtes Material: 1 Exemplar
1 Ex. Borshi südl. Vlora, SW-Hang, mit *Pistacia lentiscus*, *Phlomis fruticosa*, 200 – 400 m, 14. – 27. V. 61, DEI.

***Hypera meles* (FABRICIUS, 1792)**

Verbreitung: Europa, Vorder- und Mittelasien, Sibirien, Mongolei, westliches Nordafrika.
Untersuchtes Material: 2 Exemplare
1 Ex. Uji Ftohte südl. Tepelena, 200 m, 29. – 31. V. 61, DEI;
1 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flusstal des Luma, 250 – 300 m, 25. – 29. VII. 61, DEI.

***Hypera nigrirostris* (FABRICIUS, 1775)**

Verbreitung: Europa, Vorder- und Mittelasien, westliches Nordafrika.
Untersuchtes Material: 2 Exemplare
1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI. – 2. VII. 61, DEI;
1 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flussdal des Luma, 250 – 300 m, 25. – 29. VII. 61, DEI.

***Hypera postica* (GYLLENHAL, 1813) [= *variabilis* (HERBST, 1795)]**

Verbreitung: Paläarktische Region.
Untersuchtes Material: 1 Exemplar
1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17. – 22. VI. 61, DEI.

***Hypera trilineata* (MARSHAM, 1802)**

Verbreitung: Europa, Anatolien.
Untersuchtes Material: 2 Exemplare
1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17. – 22. VI. 61, DEI;
1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI. – 2. VII. 61, DEI.

***Sphenophorus piceus* (PALLAS, 1776)**

Verbreitung: Mittel- und Südeuropa, Vorderasien, Nordafrika.
Untersuchtes Material: 2 Exemplare
1 Ex. Saranda, 28. V. 61, DEI;
1 Ex. Vlora, Strand, 27. VII. 58, leg. GREBENSCIKOV, DEI.

***Camptorhinus simplex* SEIDLITZ, 1867**

Verbreitung: Marokko, Spanien, Frankreich, Italien, Ungarn, Slowakei, Albanien, Griechenland, Syrien.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

1 Ex. Uji Ftohte südl. Tepelena, 200 m, 29. - 31. V. 61, DEI;

1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17. - 22. VI. 61, DEI.

***Echinodera hypocrita* (BOHEMAN, 1837)**

Verbreitung: Europa (fehlt im Norden), Anatolien, Kaukasus.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Bizë bei Shëngjergji, Rotbuchenwald, an und unter Buchenrinde, 1400 - 1500 m, 10. - 15. VII. 61, DEI

***Baris analis* (OLIVIER, 1790)**

Verbreitung: West-, Mittel- und Südeuropa, Kaukasus.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Borshi südl. Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14. - 27. V. 61, DEI.

***Baris timida* (ROSSI, 1792)**

Verbreitung: Mittel-, Süd- und Osteuropa, Vorder- und Mittelasien, Nordafrika.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Tirana, 9. - 12. V. 61, DEI.

***Baris coerulescens* (SCOPOLI, 1763)**

Verbreitung: Mittel-, Süd- und Osteuropa, Vorder- und Mittelasien, westliches Nordafrika.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Tirana, 9. - 12. V. 61, DEI.

***Ceuthorhynchus erysimi* (FABRICIUS, 1787)**

Verbreitung: Paläarktische Region.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Durresi, Umgeb. von Plazh, Anfang VI. 58, leg. SCHEIDING. DEI.

***Ceuthorhynchus angustus* DIECKMANN & SMRECZYNSKI, 1972**

Verbreitung: Spanien, Frankreich, Schweiz, BRD, DDR, Polen, Österreich, ČSSR, Jugoslawien, Albanien, Bulgarien, Griechenland, Anatolien.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

2 Ex. Lurja östl. Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen, 1300 m, 19. - 24. VII. 61, DEI.

***Ceuthorhynchus moelleri* THOMSON, 1868**

Verbreitung: Europa.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Dajti, Südhang - Wiese, 900 m, 30. VI. 61, DEI.

***Ceuthorhynchus jareti* BRISOUT, 1869**

Verbreitung: Europa (fehlt im Westen), Anatolien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Bizë bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400 - 1500 m, 10. - 15. VII. 61, DEI.

***Sirocalodes nigrinus* (MARSHAM, 1802)**

Verbreitung: Europa, Vorder- und Mittelasien, Algerien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Borshi südl. Vlora, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50 - 150 m, 14. - 27. V. 61, DEI.

***Ceuthorhynchidius troglodytes* (FABRICIUS, 1787)**

Verbreitung: Europa, Vorderasien, Sibirien, westliches Nordafrika.

Untersuchtes Material: 12 Exemplare

9 Ex. Borshi südl. Vlora, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50 - 150 m, 14. - 27. V. 61, DEI;

1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI. - 2. VII. 61, DEI;

1 Ex. Bizë bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400 - 1500 m, 10. - 15. VII. 61, DEI;

1 Ex. Lurja östl. Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen, 1300 m, 19. - 24. VII. 61, DEI.

***Ceuthorhynchidius campanellae* SCHULTZE, 1895**

Verbreitung: Jugoslawien (Kroatien, Bosnien, Dalmatien), Albanien, Türkei, Kaukasus.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Borshi südl. Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14. - 27. V. 61, DEI.

***Nanophyes marmoratus* (GOEZE, 1777)**

Verbreitung: Europa, Vorder- und Mittelasien, Sibirien (bis zum Pazifik).

Untersuchtes Material: 3 Exemplare

2 Ex. Borshi südl. Vlora, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50–150 m, 14.–27. V. 61, DEI;

1 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250–300 m, 25.–29. VII. 61, DEI.

***Nanophyes globiformis* KIESENWETTER, 1864**

Verbreitung: Europa (fehlt im Norden).

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Borshi südl. Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.–27. V. 61, DEI.

***Nanophyes brevis* BOHEMAN, 1845**

Verbreitung: Europäische und asiatische Mittelmeerländer, Mittel- und Osteuropa, Kaukasus, Ägypten.

Untersuchtes Material: 11 Exemplare

1 Ex. Borshi südl. Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.–27. V. 61, DEI;

1 Ex. Borshi südl. Vlora, Sumpf am Lumi i Borshit, 14.–27. V. 61, DEI;

9 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250–300 m, 25.–29. VII. 61, DEI.

***Nanophyes nitidulus* GYLLENHAL, 1838**

Verbreitung: Europäische Mittelmeerländer, Mittel- und Osteuropa, Vorderasien, Nordafrika.

Untersuchtes Material: 5 Exemplare

3 Ex. Borshi südl. Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.–27. V. 61, DEI;

2 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250–300 m, 25.–29. VII. 61, DEI.

***Gymnaetron pascuorum* (GYLLENHAL, 1813)**

Verbreitung: Europa, Anatolien, Kaukasus.

Untersuchtes Material: 10 Exemplare

4 Ex. Borshi südl. Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.–27. V. 61, DEI;

4 Ex. Borshi südl. Vlora, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50–150 m, 14.–27. V. 61, DEI;

1 Ex. Iba unterhalb Kraba, 400 m, 17.–22. VI. 61, DEI;

1 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250–300 m, 25.–29. VII. 61, DEI.

***Gymnaetron tetricum* (FABRICIUS, 1792)**

Verbreitung: Europa (fehlt im Norden), Vorder- und Mittelasien, Sibirien.

Untersuchtes Material: 18 Exemplare

1 Ex. Borshi südl. Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.–27. V. 61, DEI;

3 Ex. Borshi südl. Vlora, SW-Hang, mit *Pistacia lentiscus*, *Phlomis fruticosa*, 200–400 m, 14.–27. V. 61, DEI;

1 Ex. Dajti, Südhäng – Wiese, 900 m, 30. VI. 61, DEI;

2 Ex. Mali me Gropë, Livadhet e Selitës, Wiese, 1000–1100 m, 3.–8. VII. 61, DEI;

11 Ex. Durresi, Umgeb. von Plazh, Anfang VI. 58, leg. SCHEIDING, DEI.

***Gymnaetron antirrhini* (PAYKULL, 1800)**

Verbreitung: Europa, Vorder- und Mittelasien, Ostsibirien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Nordalban. Alpen, Shalabach-Tal bei Thethi, 900–1200 m, 1.–4. VIII. 61, DEI.

***Miarus monticola* PETRI, 1912**

Verbreitung: BRD, DDR, Polen, ÖSSR, Österreich, Ungarn, Jugoslawien, (Slowenien, Dalmatien, Bosnien, Mazedonien), Albanien, Griechenland, Bulgarien, Rumänien, UdSSR (Moskau, Bukowina).

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Tomor, Kloster Abbas Ali, 1800 m, 8.–10. VI. 61, DEI.

***Miarus graminis* (GYLLENHAL, 1813)**

Verbreitung: Europa, Vorder- und Mittelasien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Mali me Gropë, Rotbuchenbestand mit angrenzender Weide, 1200 m, 3.–8. VII. 61, DEI.

***Cionus hortulanus* (GEOFFROY, 1785)**

Verbreitung: Europa, Vorder- und Mittelasien, Westsibirien, Marokko.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Durresi, Umgeb. von Plazh, Anfang VI. 58, leg. SCHEIDING, DEI

***Cionus olivieri* ROSENSCHÖLD, 1838**

Verbreitung: Europa (fehlt im Norden), Vorder- und Mittelasien, Marokko.

Untersuchtes Material: 25 Exemplare

25 Ex. Durresi, Umgeb. von Plazh, Anfang VI. 58, leg. SCHEIDING, DEI.

***Cionus thapsi* (FABRICIUS, 1792)**

Verbreitung: Europa, Vorder- und Mittelasien.

Untersuchtes Material: 8 Exemplare

1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17. – 22. VI. 61, DEI;

7 Ex. Durresi, Umgeb. von Plazh, Anfang VI. 58, leg. SCHEIDING, DEI.

***Cionus pulverosus* GYLLENHAL, 1838**

Verbreitung: Österreich, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Albanien, Griechenland, Anatolien.

Untersuchtes Material: 22 Exemplare

22 Ex. Durresi, Umgeb. von Plazh, Anfang VI. 58, leg. SCHEIDING, DEI.

***Stereonychus fraxini* (DEGEER, 1781)**

Verbreitung: Europa, Ostsibirien, nordwestliches Afrika.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Lukova nördl. Saranda, 250 m, 24. V. 61, DEI.

***Rhynchaenus quercus* (LINNÉ, 1758)**

Verbreitung: Europa, Vorderasien, Algerien.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

1 Ex. Bizë bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400 – 1500 m, 10. – 15. VII. 61, DEI;

1 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250 – 300 m, 25. – 29. VII. 61, DEI.

***Rhynchaenus hirtellus* MILLER, 1862**

Verbreitung: Albanien, Griechenland, Anatolien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Borshi südl. Vlora, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50 – 150 m, 14. – 27. V. 61, DEI.

***Rhynchaenus rufus* (SCHRANK, 1781)**

Verbreitung: Europa, Iran.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Borshi südl. Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14. – 27. V. 61, DEI.

***Rhynchaenus fagi* (LINNÉ, 1758)**

Verbreitung: Europa, Anatolien, Kaukasus.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

2 Ex. Mali me Gropë, Rotbuchenbestand mit angrenzender Weide, 1200 m, 3. – 8. VII. 61, DEI.

***Rhynchaenus stigma* (GERMAR, 1821)**

Verbreitung: Europa, Vorder- und Mittelasien, Mongolei, Sibirien (bis zum Pazifik).

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

2 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250 – 300 m, 25. – 29. VII. 61, DEI.

Zusammenfassung

Aus der Käferfamilie Curculionidae werden 599 Exemplare aus 153 Arten behandelt, welche vorwiegend von den Teilnehmern der Albanien-Expedition des ehemaligen Deutschen Entomologischen Instituts 1961 gesammelt worden sind. 17 Arten sind nur auf der Balkanhalbinsel, acht Arten nur in Albanien verbreitet. Ein Exemplar der Gattung *Chlorophanus* gehört wahrscheinlich zu einer neuen Art, die auch in Bulgarien und Griechenland vorkommt.

Summary

This paper deals with 599 specimens of 153 species of the family Curculionidae that were mainly collected by members of the expedition to Albania made in 1961 by the former Deutsches Entomologisches Institut. Of these species, 17 are to be found on the Balkan peninsula only, and eight only in Albania. One specimen of the genus *Chlorophanus* probably belongs to a new species which occurs also in Bulgaria and Greece.

Резюме

Из семейства жуков Curculionidae рассматриваются 599 экземпляров 153 видов, которые большей частью были собраны участниками Албанской экспедиции бывшего Немецкого энтомологического института в 1961 г. 17 видов распространены только на Балканском полуострове, а 8 видов только в Албании. Один экземпляр, по всей вероятности, относится к новому виду, который тоже встречается в Болгарии и Греции.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Beiträge zur Entomologie = Contributions to Entomology](#)

Jahr/Year: 1984

Band/Volume: [34](#)

Autor(en)/Author(s): Dieckmann Lothar

Artikel/Article: [Ergebnisse der Albanien-Expedition 1961 des Deutschen
Entomologischen Institutes. 98. Beitrag \(Coleoptera: Curculionidae\). 427-440](#)