©Bembix, Christian Schmid-Egger; download unter http://bembix.de oder www.zobodat.at

Literatur

BAAL, T., DENKER, W. MÜHLEN & B. SURHOLT (1994): Die Ursachen des Massensterbens von Hummeln unter spätblühenden Linden. – Natur und Landschaft 69: 412–418.

BALDOWSKI, G. (1993): Unsere Wildbienen - Ein Beitrag zu ihrer Erforschung in der Oberlausitz (erster Nachtrag) (Hymenoptera, Apoidea). – Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 67: 1–24.

BISCHOFF, I. (1994): Untersuchungen zur Ökologie der Bienen (Hymenoptera, Apoidea) im Botanischen Garten Bonn und weiteren Grünflächen im Bonner Stadtgebiet. Diplomarbeit 123 + 51 Seiten, Diplomarbeit Universität Bonn.

BLANK, S.M. (1989): Lothar Zirngiebel (1902-1973) - Biographie. – Spixiana 12: 303–306.

BÜCHLER, R. (1994): Wildbienen-Trapnester für Schulungs- und Monitorzwecke. In: Hedtke, C. (Hrsg): Wildbienen. – Tagungsband Wildbienentagung 1993, Inst. Bienenk. Hohen Neudorf. 70–72.

BÜCHS, W., J.C. KÜHLE, C. NEUMANN & W. WENDLING (1989): Untersuchungen zur Fauna und Flora im Großraum Altenahr – ein Beitrag zur Charakterisierung eines Naturraumes. – Jber. naturwiss. Ver. Wuppertal 42: 225-237.

DAHTE, H.H. & J. OEHLKE (1993): Zum Problem Lindenblüte und Insektensterben. – Insecta 1: 161–165.

DOLLFUSS, H. (1982): Die Gasteruptioniden des Bezirks Scheibbs (Niederösterreich) (Insecta: Hymenoptera, Evanioidea, Gasteruptionidae). – Entomofauna 3: 21–25.

DONATH, H. (1990): Ein Beitrag zur Hummelfauna des Harzes. – Naturschutzarb. Bezirken Halle Magdeburg 27: 27–32.

DORN, M (1986): Bedeutung, Gefährdung und Schutz der Wildbienenfauna in Agrarökosystemen. – Ent. Nachr. Ber. 30: 278–280.

DORN, M. & D. WEBER (1988): Die Luzerne-Blattschneiderbiene. – 110 Seiten, Wittenberg.

DRESSLER, A. (1993): Wildbienen (Hymenoptera, Apoidea) der Gemarkung Darmstadt-Eberstadt und angrenzender Sandgebiete. – Hess. Faun. Briefe 13: 33–46.

EBMER, A.W. (1994): Die Systematik und Taxonomie der Wildbienen - eine faszinierende entomologische Lebensaufgabe. – Linzer biol. Beitr. 26: 149–177.

ECK, R. (1980): *Dolichovespula loekenae* n.sp., eine neue soziale Faltenwespen aus Skandinavien (Hymenoptera, Vespidae). – Reichenbachia 18: 213–217.

ECK, R. (1981): Zur Verbreitung und Variabilität von *Dolichovespula norwegica* (Hymenoptera, Vespidae). – Ent. Abh. Mus. Tierk. Dresden 44: 133–152.

Eck, R. (1984): Bestimmungsschlüssel für die Arten der Gattung *Dolichovespula* ROHWE, 1916 (Hymenoptera, Vespidae). – Ent. Abh. Mus. Tierk. Dresden 48: 35–44.

Eck, R. (1984): Zur Verbreitung von *Dolichovespula loekenae* ECK und ihrer Stellung zu den nächstverwandten Arten (Hymenoptera, Vespidae). – Ent. Abh. Mus. Tierk. Dresden 48: 13–22.

Eck, R. (1989): Schutz den Hummeln und Wespen. – Naturschutzarbeit in Sachsen 31: 47–50.

Eck, R. (1993): Wird das Zeichnungsmuster der Arbeiterinnen von *Vespula vulgaris* (L.) durch die im Laufe der Nistperiode wechselnden klimatischen Bedingungen beeinflußt? (Insecta, Hymenoptera: Vespidae). – Ent. Abh. Mus. Tierk. Dresden 55: 169–183.

ERTFELD, C. (1994): Die „Döberitzer Heide“ als Refugium seltener und vom Aussterben bedrohter Wildbienenarten. In: HEDTKE, C. (Hrsg): Wildbienen. – Tagungsband Wildbienentagung 1993, Inst. Bienenk. Hohen Neudorf. 39–48.

FELTON, J.C. & N. SCHNEIDER (1994): Matériaux pour un catalogue des Hyménoptères Aculéates du Luxembourg. – Bull. Soc. Nat. luxemb. 95: 287–294

GATHMANN, A. & T. TSCHARNTKE (1993): Bienen und Wespen in Nisthilfen auf eingesäten Flächen und selbstbegrünten Brachen (Hymenoptera Aculeata). – Verh. Ges. Ökologie 22: 53–56.

GATHMANN, A., H.-J. GREILER & T. TSCHARNTKE (1984): Trap-nesting bees and wasps colonizing set-aside fields: succession and body size, management by cutting and sowing. – Oecologia 98: 8–14.

GLADIS, Th. (1994): Hinweise zur Nutzung der Roten Mauerbiene *Osmia rufa* (L.) in der Pflanzenzüchtung. In: HEDTKE, C. (Hrsg): Wildbienen. – Tagungsband Wildbienentagung 1993, Inst. Bienenk. Hohen Neudorf. 26–27.

GLADIS, Th. (1994): Zuchtmethoden und Nutzungsmöglichkeiten für einheimische Insekten als Bestäuber allogamer Kulturpflanzenarten. In: HEDTKE, C. (Hrsg): Wildbienen. – Tagungsband Wildbienentagung 1993, Inst. Bienenk. Hohen Neudorf. 10–24.

GRETENKORD, C. & W. DRESCHER (1994): Die Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf die Dunkle Erdhummel (*Bombus terrestris*): Ergebnisse aus Labor- und Zeltversuchen. In: HEDTKE, C. (Hrsg): Wildbienen. – Tagungsband Wildbienentagung 1993, Inst. Bienenk. Hohen Neudorf. 88–93.

GUSENLEITNER, J. (1993): Bestimmungstabellen mittel- und südeuropäischer Eumeniden (Vespoidea, Hymenoptera). Teil 1. Die Gattung *Leptochilus* SAUSSURE 1852. – Linzer biol. Beitr. 25: 745–769.

HAACK, A. T. TSCHARNTKE, & S. Vidal (1984): Zur Verbreitung und Ökologie der Grabwespen (Hymenoptera, Sphecidae) in Norddeutschland. – Drosera 84: 121–140.

HAESELER, V. (1981): Ein von *Dolichovespula adulterina* (du BUYSSON) infiziertes *Dolichovespula saxonica* (FABRICIUS)-Nest aus Norddeutschland (Hymenoptera: Vespidae: Vespinae). – Z. angew. Zool. 68: 437–452.

HAESELER, V. (1982): Solitäre Wespen und Bienen als Transporteure der Wandernymphen von Uropodien. – Mikrokosmos 8: 227–229.

HAESELER, V. (1984): *Mimumesa sibiricana* R. BOHART, eine für die Bundesrepublik Deutschland neue Grabwespe, und wei-

©Bembix, Christian Schmid-Egger; download unter http://bembix.de oder www.zobodat.at

tere für Nordeutschland seltene Hautflügler (Hymenoptera: Aculeata s.l.). – Drosera'84: 103–116.

HAESELER, V. (1985): Zum Kolonisationserfolg der Grabwespen (Hymenoptera, Sphecidae) auf den ostfriesischen Inseln. – Verh. Ges. Ökol. 13: 569–578.

HAESELER, V. (1985): Zum Auftreten von Wespen und Bienen in einem abgestorbenen Birkenbestand im östlichen Hügelland Schleswig-Holsteins (Hymenoptera: Aculeata). – Faun.- ökol. Mitt. 5: 345–363.

HAESELER, V. (1985): Werkzeugsgebrauch bei der europäischen Grabwespe *Ammophila hungarica* MOCSARY 1833 (Hymenoptera: Sphecidae). – Zool. Anz. 215: 279–286.

HAESELER, V. (1986): Zur Färbung von Weibchen, Arbeiterinnen und Männchen eines Nestes von *Dolichovespula media* (RETZIUS, 1783) aus dem Norddeutschen Tiefland (Hymenoptera: Vespidae). – Braunschw. Naturk. Schr. 2: 491–497.

HAESELER, V. (1986): Attachment to the Nest an Worker-like Activities in Young Queens: Effects on Reproduction in *Dolichovespula media* (RETZIUS 1783) (Hymenoptera, Vespidae). – Zool. Anz. 217: 145–155.

HAESELER, V. (1987): Zur Biologie der Grabwespe *Crossocerus styrius* (KOHL 1892) (Hymenoptera: Sphecidae). – Drosera '87: 115–119.

HAESELER, V. (1988): A nest of *Paravespula vulgaris* (L.) (Hym., Vespidae) in a juniper-tree. – J. Appl. Ent. 105: 14–18.

HAESELER, V. (1989): The situation of the invertebrate fauna of coastal dunes and sandy coasts in the western mediterranean (France, Spain). In: perspectives in coastal dune management: 125–131.

HAESELER, V. (1993): Zur Bionomie der zwischen Pflastersteinen nistenden Wegwespe *Anoplius concinnus* (DAHLBOM 1845) (Hymenoptera, Pompilidae). – Mitt. dtsch. Ges. allg. angew. Ent. 8: 573–589.

HALLMEN, M. (1992): Das Vorkommen von Hummeln der Gattung *Bombus* LATREILLE auf Ekkeroy, einer kleinen subarktischen Halbinsel im Varanger-Fjord (Lappland) (Hymenoptera, Apidae). – Luscinia 47: 203–217.

HALLMEN, M. (1993): Eine Kolonie der Wildbienenart Andrena flavipes (Panzer) nahe des Naturschutzgebietes „Am Berger Hang" (Hymenoptera, Apoidea, Andrenidae). – Hess. faun. Briefe 13: 1–5.

HALLMEN, M. & J.F.N. v. Leuwen (1991): Das Pollensammelverhalten der Solitärbiene *Andrena vaga* PANZER im Naturschutzgebiet „Am Berger Hang" im Osten von Frankfurt am Main. – Luscinia 47: 77–87.

HALLMEN, M. & H. EVERTS (1991): Die Wildbiene *Andrena vaga* im rasterelektronenmikroskopischen Bild (Hymenoptera, Andrenidae). – Jber. wetterau. Ges. ges. Naturk. 142/143: 5–16.

HALLMEN, M. & H. WOLF (1994): Die Bienenfauna des Naturschutzgebietes „Am Berger Hang" im Osten von Frankfurt am Main (Hymenoptera, Apoidea). – Hess. faun. Briefe 13: 53–61.

HAMON, J. & T. OSTEN (1994): Le nom de la grande scolie euroéen à tete jaune est-il *Scolia (Triscolia) flavifrons* FABRICIUS, 1787, ou bien *Megascolia (Regiscolia) maculata* (DRURY, 1773) (Hymenoptera: Scoliidae). – Bull. Soc. linn. Bordeaux 22: 13–17.

HAMON, J., A. FOUCART & R. FONFRIA (1993): Notes sur les *Bembecinus* de France continentale et de Corse (Hymenoptera, Sphecidae). – Bull. Soc. ent. France 98: 463–471.

HAUSER, M. (1994): Floristisch-faunistische Untersuchungen am Rheindamm zwischen Mainz und Ingelheim und Vorschläge zu seiner Pflege. III. Die Wildbienenfauna (Hymenoptera: Apoidea) des R. z. M. u. I., mit Beifängen von Stechimmen (H. A) und Schwebfliegen. – Fauna Flora Rheinland-Pfalz 7: 345–375.

HEDTKE, C. (1994): Qualitative und quantitative Analysen zum Sammelverhalten von *Bombus*. In: HEDTKE, C. (Hrsg): Wildbienen. – Tagungsband Wildbienentagung 1993, Inst. Bienenk. Hohen Neudorf. 94–112.

HEDTKE, C. (1994): Heimfindevermögen von Hummeln (*Bombus*). In: HEDTKE, C. (Hrsg): Wildbienen. – Tagungsband Wildbienentagung 1993, Inst. Bienenk. Hohen Neudorf. 113–123.

HEDTKE, C. & B. SCHRÖDTER (1994): Hummelhaltung für wissenschaftliche Zwecke. In: HEDTKE, C. (Hrsg): Wildbienen. – Tagungsband Wildbienentagung 1993, Inst. Bienenk. Hohen Neudorf. 81–87.

HEINE, W. & H. WOLF (1992): Neue Nachweise von Hornissen und zwei weiteren Papierwespen-Arten (Hymenoptera: Vespidae) im südlichen Sauerland. – Der Sauerländische Naturbeobachter 22: 34–36.

KLAUSNITZER, B. (1984): Die Konzeption der Entomofaunistischen Gesellschaft e.V. für die Ausarbeitung einer Insektenfauna Deutschlands (Entomofauna Germanica). – Ent. Nachr. Ber. 38: 1–6.

KUHLMANN, M. (1993): Kritisches Verzeichnis ausgewählter Stechimmenfamilien Westfalens (Hym., Aculeata) I. Chrysididae, Tiphiidae, Mutillidae, Sapygidae, Pompilidae, Eumenidae, Sphecidae und Apidae (excl. Apinae). – Mitt. ArbGem. ostw.-lipp. Ent. 9: 69–85.

LANGER, N. (1994): Dämmerungsflugverhalten bei Hornissen (*Vespa crabro* L.). In: HEDTKE, C. (Hrsg): Wildbienen. – Tagungsband Wildbienentagung 1993, Inst. Bienenk. Hohen Neudorf. 124–128.

MADL, M. (1987): Eine neue *Gasteruption*-Art aus Finnland (Hymenoptera, Gasteruptionidae). – Entomofauna 8: 225–228.

MAURIZIO, A. & I. GRAFL (1980): Das Trachtpflanzenbuch: Nektar u. Pollen der wichtigsten Nahrungspflanzen der Honigbiene. – 360 Seiten. 2., überarb. Aufl.; München.

MAUSS, V. (1987): Bestimmungsschlüssel für Hummeln. 2. Aufl. Hamburg, DJN.

MAUSS, V. (1988): Bestimmungsschlüssel. In: Hagen, E. v.: Hummeln bestimmen, ansiedeln, vermehren schützen. 2. Aufl.: 208–219; Neumann-Neudamm, Melsungen. .

MAUSS, V. (1993): Vergleichend biometrische Untersuchung verschiedener Darmabschnitte bei Vertretern der Gattungen *Polistes, Vespa, Dolichovespula* und *Vespula* (Hymenoptera, Vespidae). – Mitt. Ges. allg. angew. Entomologie 9 (im Druck).

©Bembix, Christian Schmid-Egger; download unter http://bembix.de oder www.zobodat.at

MAUSS, V. (1993): Biologische Aspekte der Lebensweise und des antagonistischen Verhaltens aculeater Hymenopteren Mitteleuropa. – Allergo Journal 2 Suppl. 2: 57–59.

MAUSS, V., M.A. PABST & K. CRAILSHEIM (1990): Rasterelektronenemikroskopische Untersuchung des Proventriculus bei mehreren Arten sozialer Faltenwespen (Hymnoptera, Vespidae). – Verh. dt. zool. Ges. 83: 269.

MAUSS, V. & M. SCHRÖDTER (1986): Hummelfauna des Hollersbachtales. – Naturkundliche Beiträge des DJN 16: 74–80.

MAUSS, V. & R. TREIBER (1994): Bestimmungsschlüssel für Faltenwespen (Hymenoptera: Masarinae, Polistinae, Vespinae) der Bundesrepublik Deutschland: 1–53; DJN, Hamburg.

MÖNCH, K. (1993): Schutzmaßnahmen und Bestand der Sozialen Faltenwespen (Hymenoptera; Vespidae) dargestellt am Beispiel der Stadt Ratingen. – Verh. Westd. Entom. Tag 1992: 201–208.

NIEHUIS, O. & W. FLUCK (1994): Nachweis der Furchenbiene *Halictus pollinosus* SICHEL in der Bundesrepublik Deutschland (Insecta: Hymenoptera). – Fauna Flora Rheinland-Pfalz 7: 471–476.

KARL, H. (1994): Analyse der Stechimmenfauna (Hymenoptera aculeata) als Grundlage für die Pflege und Entwicklung von Mager- und Trockenrasenstandorten im Biosphärenreservat Mittlere Elbe. Diplomarbeit Universität Hamburg, Zoologisches Institut. (Harald Karl, Chr. Förster Str. 15: D-20253 Hamburg).

OSTEN, T. (1994): Beobachtungen zum Paarungsverhalten von *Scolia cypria* SAUSSURE 1855 (Hym. Scoliidae). – Linzer biol. Beitr. 26: 335–341.

PAXTON, R.J. (1994): Messungen zur Dispersion von *Andrena fulva* Weibchen (MÜLLER 1776). In: HEDTKE, C. (Hrsg): Wildbienen. – Tagungsband Wildbienentagung 1993, Inst. Bienenk. Hohen Neudorf. 73–77.

RIEDMILLER, J. & P. SCHNEIDER (1993): Begrünte Dächer als Sekundärlebensräume für bestimmte Tier- und Pflanzenarten. – Veröff. PAÖ 7: 155–162.

RITZAU, C. & F. PLAISIER (1992): Die Veröffentlichungen der Arbeitsgruppe Terrestrische Ökologie an der Universität Oldenburg. – Oldenburger Jahrb. 92: 283–298.

SAURE, C. (1994): Mitteilungen über neue Nachweise von Fächerflüglern als Bienen- und Wespenparasiten in Berlin und Umland (Insecta: Strepsiptera: Stylopidae). – Brandenburgische Ent. Nachr. 2: 47–53.

SCHEUCHL, E. (1993): Mitteilungen über das Vordringen von *Andrena taraxaci* GIRAUD 1861 nach Deutschland (Hymenoptera, Apoidea). – Der Bayerische Wald 7: 22.

SCHEUCHL, E. (1993): Das untere Ilztal bei Passau - Ein Refugium für bedrohte Wildbienenarten (Hymenoptera, Apoidea). – Der Bayerische Wald 7: 22–24

SCHMID-EGGER, C. (1993): Malaisefallen versus Handfang - Der Vergleich zweier Methoden zur Erfassung von Stechimmen (Hymenoptera, Aculeata). – Verh. Westd. Entom. Tag 1992: 195–201.

SCHMID-EGGER, C. (1994): Bestimmungsschlüssel für die deutschen Arten der solitären Faltenwespen (Hymenoptera: Eumeninae). – 54-90; DJN, Hamburg.

SCHMID-EGGER, C. (1994): Die Bedeutung der 'historischen Kulturlandschaft' als Lebensraum für Wildbienen (Hymenoptera, Apoidea) am Beispiel des Stromberges in Baden-Württemberg. In: HEDTKE, C. (Hrsg): Wildbienen. – Tagungsband Wildbienentagung 1993, Inst. Bienenk. Hohen Neudorf. 29–38.

SCHMID-EGGER, C. (1994): Die Repräsentanz von Wildbienenerfassungen (Hymenoptera, Apoidea) bei naturschutzfachlichen Bewertungen. In: HEDTKE, C. (Hrsg): Wildbienen. – Tagungsband Wildbienentagung 1993, Inst. Bienenk. Hohen Neudorf. 49–59.

SCHNEIDER, N. (1984): Observations écoéthologiques sur *Rhopalum clavipes* L., Sphécidé bien établi au Grand-Duché de Luxembourg (Hym.). – L'Entomologiste: 40: 145–154.

SCHNEIDER, N. (1986): Sur la présence multiple à Mertzig d'une guepe solitaire menacée (Hymenoptera, Eumenidae). – Bull. Soc. Nat. luxemb. 86: 61–63

SCHNEIDER, N. (1988): Nouveau cas de nidification d'un Vespiforme (Hym. Pompilidae) dans un rayon de l'abeille des ruches (Hym. Apidae). – L'Entomologiste 44: 351.

SCHNEIDER, N. (1990): Note sur les Hyménoptères Aculéates attirés par nos ruchers. – Bull. Soc. Nat. luxemb. 90: 179–182

SCHNEIDER, N. (1991): Contribution à la connaissance des Arthropodes rubicoles du Grand-Duché de Luxembourg. – Bull. Soc. Nat. luxemb. 92: 85–119.

SCHNEIDER, N. (1992): Clin d'oeil aux Vespiformes vivant à deux pas de l'échangeur du Val de Hamm (Hymenoptera, Aculeata). – Bull. Soc. Nat. luxemb. 93: 173–180.

SCHNEIDER, N. & A. JACOB-REMACLE (1992): Contribution a la connaissance de l'entomofaune d'éttelbruck et de ses environs: psocoptères et hyménoptères aculeates. – Etudes de Biologie 2: 29–61. Publications du Centre Universitaire de Luxembourg.

SCHNEIDER, N. & A. PELLES (1988): Découverte d'une étrange poterie au dépot militaire Sanem (Hymenoptera, Sphecidae). – Bull. Soc. Nat. luxemb. 88: 89–91.

SCHNEIDER, N. & J. LECLERCQ (1987): Nidification d'une guepe solitaire (Hym. Eumenidae) dans un rayon d'une abielle sociale (Hym. Apidae). – L'Entomologiste 43: 269–270

SCHNEIDER, N. & J. WEISS. (1987): Abschluß der Erfassung der Hornissenvorkommen in Luxemburg. – Regulus 1: 17–18

SCHÖNITZER, K. & J. SCHUBERTH (1993): Vorkommen und Morphologie der Fovea facialis und der darunterliegenden Drüsen bei Apoidea (Hymenoptera). – Mitt. Dtsch. Ges. Allg. Angew. Ent. 8: 911–917.

SCHULZ, H.-J. (1989): Erstfund von *Anoplius tenuicornis* TOURNIER, 1889 (Hymenoptera, Pompilidae) auf dem Gebiet der DDR. – Ent. Nachr. Ber. 33: 180.

SCHULZ, H.-J. (1989): Beobachtungen zur Grab-, Weg- und Goldwespenfauna eines Kahlschlages bei Neunzehnhain (Erzgebirge) (Hymenoptera: Sphecidae, Pompilidae, Chrysididae). – Ent. Nachr. Ber. 33: 280.

©Bembix, Christian Schmid-Egger; download unter http://bembix.de oder www.zobodat.at

Schulz, H.-J. (1989): Nachweis von *Ectemnius fossorius* (LINNAEUS, 1758) - einer sehr seltenen Grabwespe (Hymenoptera,Sphecidae).-Ent.Nachr.Ber.33:181.

Schulz, H.-J. (1993): Ein weiterer Beitrag zum Vorkommen aculeater Hymenopteren in der Oberlausitz. – Verh. Westd. Entom. Tag 1992: 189–194; Löbbecke-Mus., Düsseldorf.

SCHWAMMBERGER, K.-H. (1993): Freilandbeobachtungen zur Nestübernahme bei *Polistes biglumis bimaculatus* (GEOFFROY) durch den Sozialparasiten *Sulcopolistes atrimandibularis* (ZIMMERMANN) [Hymenoptera, Vespidae]. – Z angew. Zool. 79: 291–297.

SCHWARZ, M. (1988): Zur Kenntnis der von E. SAUNDERS beschriebenen *Nomada*-Arten (Hymenoptera, Apoidea). – Entomofauna 9: 301–313.

SMISSEN, J.v.d. (1993): Zweiter Beitrag zur Bienen- und Wespenfauna im südöstlichen Schleswig-Holstein und nordöstlichen Niedersachsen (Hymenoptera: Aculeata). – Drosera'93: 125–134.

SOHMEN, W. (1990): Reaktion von Arbeiterinnen und jungen Königinnen gestörter Faltenwespen-Nester (Hymenoptera: Vespidae). – Drosera '90: 43–54.

SORG, M. & H. WOLF (1993): Naturkundliche Untersuchungen zum Naturschutzgebiet „Die Spey" (Stadt Krefeld, Kreis Neuss). – Natur am Niederrhein (N.F.) 8: 58–72.

STENMANS, W. (1993): Artenschutzmaßnahmen für Hornissen (*Vespa crabro* L., 1758) in Krefeld. – Heimat. Krefeld. Jb. 64: 129–134.

STUKE, J.-H. (1993): Einige Tips zur Präparation und Aufbewahrung von Insektengenitalien. – Naturkundl. Beiträge DJN 28: 63–69.

THEUNERT, R. (1994): Erstnachweise von Stechimmen für die niedersächsische Fauna (Insecta: Hymenoptera). – Mitt. internat. entomol. Ver. 19: 45–51.

THEUNERT, R. (1994): Kommentiertes Verzeichnis der Stechimmen Niedersachsens und Bremens (Insecta: Hymenoptera Aculeata). – Ökologieconsult-Schriften 1. 112 Seiten.

THEUNERT, R. (1994): Bestätigungen von Stechimmen für die niedersächsische Fauna nach über 50 Jahren (Hymenoptera). – Ent. Nachr. Ber. 38: 58–59.

TKALCU, B. (1983): Die europäischen *Osmia*-Arten der Untergattung *Melanosmia* (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae). – Vest. Cs. Spolec. zool. 47: 140–159.

TÖLKE, A. (1994): Computer-Sofortanalyse des Zeitverhaltens von Wildbienen demonstriert am Beispiel *Osmia rufa* (L.) und *Anthophora acervorum* (L.). In: HEDTKE, C. (Hrsg): Wildbienen. – Tagungsband Wildbienentagung 1993, Inst. Bienenk. Hohen Neudorf. 60–69.

TSCHARNTKE, T. (1984): Bienen (Hymenoptera: Apoidea) de Schnaakenmoors in Hamburg. – Entomol. Mitt. zool. Mus. Hamburg 8: 7–20.

TSCHARNTKE, T. (1992): Cascade effects among four trophic levels: bird predation on galls affects density-dependent parasitism. – Ecology 73: 1689–1698

TSCHARNTKE, T. (1993): Connections of insect population dynamics with community structure in Phragmites-habitates. In: Dynamics of Populationes. – Boer, P.J., P.J.M. Mols & J. Szyszko (Hrsg.). Agricultural Univ. Warsaw. 37–44.

WAHIS, R. & N. SCHNEIDER (1989): Matériaux pour un catalogue des Pompilides du Grand-Duché de Luxembourg (Hymenoptera, Pompilidae). – Bull. Soc. Nat. luxemb. 89: 45–52.

WALL, I. (1993): Diapriiden aus Südwestdeutschland - I. Die Gattungen *Belyta* JURINE und *Synbelyta* HELLÉN (Insecta, Hymenoptera, Diapriidae, Belytinae). 8. Beitrag zur Kenntnis mitteleuropäischer Zehrwespen. – Rudolstädter nat. hist. Schr. 5: 35–63.

WARZECHA M. & Th. Gladis (1994): Eine Methode zur Aufzucht von Hummelvölkern. In: HEDTKE, C. (Hrsg): Wildbienen. – Tagungsband Wildbienentagung 1993, Inst. Bienenk. Hohen Neudorf. 78–80.

WESTERCAMP, C. (1994): Das Beziehungsgefüge zwischen Bienen und Blumen. Anmerkungen aus der Blütenperspektive. In: HEDTKE, C. (Hrsg): Wildbienen. – Tagungsband Wildbienentagung 1993, Inst. Bienenk. Hohen Neudorf. 4–9.

WOLF, H. (1992): Heimische Wespen. – Der Sauerländische Naturbeobachter 22: 6–13.

WOLF, H. (1992): Zur Kenntnis der Hautflügler-Fauna des Naturschutzgebietes Lengelsen- Wilhelmstal (4.Beitrag). – Der Sauerländische Naturbeobachter 22: 30–33.

WOLF, H. (1992): Zur Kenntnis der Hautflügler-Fauna an der Burgruine Schwarzenberg bei Plettenberg, Märkischer Kreis. – Der Sauerländische Naturbeobachter 22: 14–29.

WOLF, H. (1993): Zitter von *Andrena barbilabris* (KIRBY) und *Bombus pascuorum* (SCOPOLI) (Hym. Apidae). – Linzer biol. Beitr. 25: 785–786.

WOLF, H. (1993): Katalog der österreichischen Wegwespen (Insecta, Hymenoptera, Pompiloidea). – Linzer biol. Beitr. 25: 993–1011.

WOLF, H. (1994): *Meragenia sculpturata* (KOHL 1898) - eine für Österreich neue mediterrane Wegwespe (Hymenoptera, Pompilidae). – Linzer biol. Beitr. 26: 187–189.

WOLF, H. (1994): Über den Umgang mit Naturschutzbehörden. - Mitt. ArbGem. ostwestf.-lipp. Ent. 10: 15-18.

WOLF, H. (1994): Ein Zwitter von *Sphecodes albilabris* (FABRICIUS) (Hymenoptera, Apidae). – Linzer biol. Beitr. 26: 191–193

WOLF, H. (1994): Veränderungen der Hummelfauna (Hymenoptera: Apidae) bei Marburg (Lahn). II. – Hess. faun. Briefe 13: 65–66.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Bembix - Zeitschrift für Hymenopterologie

Jahr/Year: 1994

Band/Volume: 3

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: Literatur 40-47