

B

Verzeichniss

der in der Umgebung Annabergs beobachteten Käfer.

Von **C. Lange.**

Das nachfolgende Verzeichniss kann, da die Beobachtungszeit sich wenig über das Jahr 1880 zurückerstreckt, zwar den Anspruch auf Vollständigkeit nicht machen, dürfte aber immerhin deshalb einiges Interesse erregen, weil Berichte über Käferfunde im westlichen Theile des sächsischen Erzgebirges bisher nur spärlich in die Oeffentlichkeit gelangt sind.

Die Beobachtungen geschahen in der Umgebung der Stadt Annaberg bis auf etwa eine Stunde Entfernung. Einige charakteristische Funde aus Hochthälern des Erzgebirges — namentlich am Fichtelberge — sind mit aufgenommen.

Die geologische Beschaffenheit, die Seehöhe des in Frage kommenden Gebietes und die daraus resultirende Armuth der Flora lassen für die Insektenfauna auf eine gleiche Armuth an Arten schliessen. Diese Vermuthung wird besonders in Bezug auf die phytophagen Arten der Käfer bestätigt, aber auch Carabidae und Staphylinidae sind nicht reichlich vertreten. Die Fauna zeigt subalpinen Charakter und in manchen Arten Verwandtschaft mit jener der Gebirge Thüringens und Schlesiens.

Die Aufstellung des Verzeichnisses ist nach dem „Catalogus Coleopterorum Europae et Caesariae, auctoribus Dr. L. v. Heyden, E. Reitter et J. Weise, editio tertia“ geschehen.

Mein verehrter Freund, Herr Gerichtsschreiber Jung-hans, welchem ich schon die Einführung in das Studium der Coleopterologie verdankte, ist mir auch bei dieser Arbeit vielfach mit seinen reicheren Erfahrungen an die Hand ge-

gangen, dass ich nicht unterlassen will, ihm auch an dieser Stelle meinen Dank auszusprechen. Nicht minder fühle ich mich verpflichtet, dem Herrn Pfarrer W. Scriba in Wimpfen hiernit für die ausserordentliche Gefälligkeit, die vorhandenen Aleocharinen und Homaliinen zu bestimmen, wodurch die Aufnahme dieser schwierigen Sectionen der Staphylinidae ermöglicht wurde, den aufrichtigsten Dank zu wiederholen.

Cicindelidae.

1. *Cicindela campestris* L. Nicht häufig
2. - *hybrida* L. Sehr selten.

Carabidae.

Carabitae.

1. *Cychrus caraboides* L. Nicht selten. Meist kleinere der Var: *elongatus* Hoppe sich nähernde Stücke.
2. *Procrustes coriaceus* L. Nicht selten.
3. *Orinocarabus hortensis* L. Häufig.
4. - *Linnei* Panz. Am Fichtelberg im Nadelwald nicht selten.
5. - *sylvestris* Panz. Ziemlich häufig.
6. *Chaetocarabus intricatus* L. Häufig.
7. *Megadontus violaceus* L. Ziemlich selten.
8. *Melancarabus glabratus* Payk. Am Fichtelberg selten.
9. *Mesocarabus catenulatus* Scop. Nicht selten.
10. *Chrysocarabus auronitens* F. Ziemlich häufig.
11. *Carabus nitens* L. Selten.
12. - *granulatus* L. Häufig; darunter nicht selten *B. rufofemoratus* Letzner.
13. - *arvensis* Herbst. Sehr selten.
14. - *cancellatus* Ill. Ziemlich häufig. Die *B. viridis* Letzner. und *rufipes* Kraatz selten.
15. - *nemoralis* Müll. Häufigste Art. Darunter nicht selten *B. nigrescens* Letzner.
16. - *convexus* F. Nicht selten.

Nebriitae.

17. *Nebria cursor* Müll. Sehr selten.
18. *Leistus nitidus* Duftsch. Nur einmal am Böhlsberge aufgefunden.
19. - *ferrugineus* L. Ziemlich selten.
20. - *rufescens* F. Etwas häufiger.
21. *Notiophilus aquaticus* L. Häufig.
22. - *palustris* Duft. Ebenso.
23. - *biguttatus* F. Wie vorige.

Bembidiitae.

24. *Elaphrus cupreus* Duftschm. Ziemlich selten.
 25. *Tachypus flavipes* L. Sehr vereinzelt.
 26. *Bembidion lampros* Hbst. Häufig.
 27. - *gilvipes* Strm. Weniger häufig.
 28. - *4-maculatum* L. Häufig.
 29. - *nitidulum* Marsh. Nicht selten.
 30. - *tibiale* Dft. Am Sehmauser, ziemlich selten.
 31. - *ustulatum* L. Häufig.
 32. *Trechus montanellus* Gemm. Am Fichtelberg, im Wald selten.
 33. - *4-striatus* Schrnk. Ziemlich selten.
 34. - *secalis* Payk. Juli-August häufig.
 35. *Patrobus excavatus* Payk. In feuchten Waldorten stellenweise häufig.
 36. *Brosicus cephalotes* L. Ziemlich selten.

Scarititae.

37. *Clivina fossor* L. Nicht häufig; am Sehmauser selten *B. collaris* Hbst.
 38. *Dyschirius globosus* Hbst. Sehr häufig.

Loroceritae.

39. *Lorocera pilicornis* F. Vereinzelt.

Harpalitae.

40. *Panagaeus bipustulatus* F. Sehr selten.
 41. *Chlaenius nigricornis* F. *B. melanocornis* Dej. Selten.
 42. *Badister bipustulatus* F. Selten.
 43. *Anisodactylus binotatus* F. Häufig; darunter *B. spuraticornis* Dej. sehr selten.
 44. *Ophonus punctatulus* Duft. Einmal am Schreckenbergr.
 45. *Pseudophonus pubescens* Müller. Sehr häufig.
 46. *Harpalus laevicollis* Duft. Sehr häufig.
 47. - *rufitarsis* Duft. Nicht selten.
 48. - *aeneus* F. Gemein. *B. confusus* Dej. Ziemlich selten.
 49. - *rubripes* Duft. Nicht selten.
 50. - *latus* L. Sehr häufig.
 51. - *4-punctatus* Dej. Sehr selten.
 52. - *rufimanus* Marsh. Ziemlich häufig.
 53. - *neglectus* Serv. Selten.
 54. *Bradycellus verbasci* Dft. Im Walde selten.
 55. - *collaris* Payk. Häufig.
 56. - *similis* Dej. Sehr selten.
 57. *Amara similata* Gyll. Häufig.
 58. - *communis* Panz. Häufig.
 59. - *curta* Dej. Ebenso.
 60. - *eurynota* Panz. Selten.
 61. - *aenea* Degeer. Selten.

62. *Amara familiaris* Duft. Häufig.
 63. - *fusca* Dej. Ziemlich häufig.
 64. - *aulica* Panz. Nicht selten.
 65. - *fulva* Degeer. Häufig.
 66. - *apricaria* Payk. Nicht häufig.
 67. - *consularis* Duft. Nicht selten.
 68. - *equestris* Duft. Selten.
 69. *Abax striolus* Fabr. Häufig.
 70. - *carinatus* Duft. Im Hochsommer nicht häufig.
 71. *Molops elatus* F. Häufig
 72. - *piceus* Panz. Einmal gefunden.
 73. *Pterostichus metallicus* F. Häufig.
 74. - *melas* Creutz. Auf dem Stamme des Erzgebirges selten.
 75. - *oblongopunctatus* F. Nicht häufig.
 76. - *aethiops* Panz. Am Fichtelberg selten.
 77. - *niger* Schaller. Häufig.
 78. - *vulgaris* L. Sehr häufig.
 79. - *nigritus* Fabr. Wie Voriger.
 80. - *diligens* Sturm. Nicht häufig.
 81. *Poccilus lepidus* Leske. Häufig.
 82. - *coerulescens* L. Gemein; in vielen Färbungen, namentlich häufig dunkle Exemplare, welche in allen Farben schillern.
 83. *Lagarus vernalis* Panz. Häufig.
 84. *Calathus fuscipes* Goeze. Sehr häufig.
 85. - *erratus* Sahlbg. Ebenso.
 87. - *micropterus* Dft. Sehr häufig.
 88. - *Synuchus nivalis* Panz. Ziemlich selten.
 89. *Platynus assimilis* Payk. Sehr häufig.
 90. - *ruficornis* Goeze. Häufig.
 91. *Agonum sexpunctatum* L. Ebenso.
 92. - *Mülleri* Hbst. Ebenso.
 93. - *viduum* Panz. Ziemlich selten.
 B. moestum Panz. Selten.
 94. *Europhilus gracilis* Gyllh. Sehr selten.
 95. *Clibanarius dorsalis* Pontopp. Selten. Wurde nur an 2 Orten in
 kleiner Gesellschaft gefunden.
 96. *Olisthepus rotundatus* Payk. Vereinzelt.
 97. *Lebia chlorocephala* Hoffm. Selten.
 98. - *cynocephala* L. Sehr selten.
 99. *Cymindis humeralis* Fourer. Wie Voriger.
 100. *Dromius agilis* Fabr. Nicht häufig.
 101. - *fenestratus* Fabr. Sehr häufig.
 102. - *nigriventris* Thoms. Ziemlich selten.
 103. - *quatrimalatus* L. Häufig.

104. *Dromius quatrnotatus* Panz. Etwas weniger häufig.
 105. *Metabletus truncatellus* L. Häufig.

Haliplidae.

1. *Peltodytes caesus* Duft. Selten.
 2. *Halipus ruficollis* Degeer, Nicht selten.
 3. - *impressus* Fabr. Ebenso.

Dyticidae.

1. *Laccophilus hyalinus* Deg. Ziemlich selten. Heuteiche.

Hydroporitae.

2. *Hyphidrus ferrugineus* L. Nicht häufig.
 3. *Coelambus impressopunctatus* Schaller. Selten.
 4. *Deronectes platynotus* Germ. Nicht häufig.
 5. - *latus* Steph. Selten.
 6. *Hydroporus pictus* Fabr. Sehr selten.
 7. - *nigrita* Fabr. Selten.
 8. - *pubescens* Gyllh. Ebenso.
 9. - *marginatus* Duft. Nicht häufig. Schwammündung.
 10. - *palustris* L. Sehr häufig.
 11. - *erythrocephalus* L. Selten.

Colymbetitae.

12. *Agabus biguttatus* Oliv. Selten im Quellwasser.
 13. - *Sturmi* Gyll. Nicht selten.
 14. - *bipustulatus* Payk. Ebenso.
 15. *Platambus maculatus* L. Schwammündung häufig.
 16. *Ilybius fuliginosus* F. Nicht häufig.
 17. *Rhantus punctatus* Fourc. Häufig.
 18. *Colymbetes fuscus* L. Sehr selten.
 19. *Dyticus marginalis* L. Nicht häufig.

Hydaticitae.

20. *Acilius sulcatus* L. Ziemlich selten.

Gyrinidae.

1. *Gyrinus natator* L. Selten.

Hydrophilidae.

Helophoritae.

1. *Helophorus aquaticus* L. Ziemlich selten.
 2. - *granularis* L. Häufig.

Hydrophilitae.

3. *Hydrocharis caraboides* L. Seit Jahren nicht mehr gefunden.

4. *Hydrobius fuscipes* L. Nicht häufig.
5. *Paracymus aeneus* Germ. Selten.
6. *Creniphilus limbatus* F.
7. *Philydrus melanocephalus* Oliv. Sehr selten.
8. - *testaceus* F. Selten.
9. *Laccobius minutus* L. Häufig.
10. *Chaetarthria seminulum* Payk. Nicht häufig.
11. *Limnobijs truncatellus* Thunb. Häufig.

Sphaeridiidae.

1. *Sphaeridium bipustulatum* F. Die reine Art sehr selten, etwas häufiger
S. marginatum F.
2. *Coelostoma orbiculare* F. Nicht häufig.
3. *Cereyon impressus* Sturm Häufig.
4. - *melanocephalus* L. Sehr selten.
5. - *haemorrhoidalis* F. Häufig.
6. - *unipunctatus* L. Nicht häufig.
7. - *terminatus* Marsh. Selten.
8. - *analis* Payk. Ebenjo.
9. - *pygmaeus* Ill. Ebenjo.
10. - *marinus* Thoms. Nicht selten.
11. *Cryptopleurum minutum* F. Gemein.

Dryopidae.

1. *Dryops auriculata* Panz. Selten.
2. - *prolificicornis* F. Selten.
3. - *Latelmis Volkmani* Panz. Selten.

Staphylinidae.

1. *Autalia impressa* Ol. In Pilzen nicht selten.
2. *Bolitochara lunulata* Payk. Ebendort häufig.
3. - *obliqua* Er. Selten.
4. *Leptusa analis* Gyllh. Selten.
5. *Aleochara ruficornis* Grav. Einmal gefunden.
6. - *fuscipes* Grav. Nicht häufig.
7. - *bipunctata* Oliv. Selten.
8. - *lanuginosa* Grav. Sehr häufig.
9. - *nitida* Grav. Nicht häufig.
10. *Dinarda dentata* Grav. Häufig.
11. *Lomechusa strumosa* F. Nicht selten.
12. *Atemeles emarginatus* Grav. Selten.
13. *Myrmedonia Harworthi* Steph. Einmal gefunden.
14. - *humeralis* Grav. Nicht selten.
15. - *cognata* Maerk. Sehr selten.

16. *Myrmedonia limbata* Payk. Selten.
17. *Astilbus canaliculatus* F. Gemein.
18. *Ocalea picata* Steph. Selten.
19. *Chilopora longitarsis* Er. Selten.
20. *Falagria nigra* Grav. Nicht selten.
21. - *thoracica* Curt. Selten.
22. *Tachyusa umbratica* Er. Selten.
23. *Gnypeta carbonaria* Mannorh. Ebenso.
24. *Homalota elongatula* Grav. Ebenso.
25. - *nitidula* Kr. Nicht selten.
26. - *aquatica* Thoms. Selten.
27. - *sericans* Grav. Nicht selten.
28. - *nigritula* Grav. Selten.
29. - *sodalis* Er. Ziemlich häufig.
30. - *gagatina* Baudi. Selten.
31. - *coriaria* Kr. Ebenso.
32. - *marcida* Er. Nicht selten.
33. - *longicornis* Grav. Ebenso.
34. - *palustris* Kiesw. Selten.
35. - *ravilla* Er. Ebenso.
36. - *corvina* Thoms. Ebenso.
37. - *indubia* Sharp. Ebenso.
38. - *subtilis* Scriba. Ebenso.
39. - *circellaris* Grav. Gemein.
40. - *analis* Grav. Häufig.
41. - *cavifrons* Sharp. Wie Vorige.
42. - *aterrima* Grav. Nicht häufig.
43. - *fungi* Grav. Häufig.
B. clientula Er. Seltener.
44. - *laticollis* Steph. Häufig.
45. *Thectura aequata* Er. Nicht selten.
46. - *angustula* Gyll. Häufig.
47. - *linearis* Grav. Selten.
48. - *plana* Gyllh. Selten.
49. *Phlocopora reptans* Grav. Ebenso.
50. - *corticalis* Grav. Ebenso.
51. *Oxypoda vittata* Maerk. Selten.
52. - *opaca* Grav. Häufig.
53. - *umbrata* Gyll. Selten.
54. - *alternans* Grav. Sehr häufig.
55. - *terrestris* Kr. Selten.
56. *Gyrophaena nana* Payk. Häufig.
57. *Hypocypus longicornis* Payk. Ziemlich häufig.
58. *Trichophya pilicornis* Grav. Sehr selten.
59. *Tachinus rufipes* L. Häufig.

60. *Tachinus flavipes* Fabr. Häufig.
 61. - *laticollis* Grav. Nicht selten.
 62. - *marginellus* F. Ziemlich selten.
 63. - *collaris* Grav. Häufig.
 64. - *subterraneus* L. Ziemlich selten.
 65. - *finetarius* F. Häufig.
 66. *Tachyporus obtusus* L. Häufig.
 67. - *chrysomelinus* L. Häufig.
 68. - *hypnorum* F. Häufig.
 69. - *atriceps* Steph. Selten.
 70. - *ruficollis* Grav. Selten.
 71. - *pusillus* Grav. Nicht häufig.
 72. - *nitidulus* F. Ebenso.
 73. - *saginata* Grav. Einmal gefunden.
 74. *Conurus pedicularius* Grav. Häufig.
 75. *Bolitobius lunulatus* L. Ziemlich selten.
 76. - *trinotatus* Er. Selten.
 77. - *pygmaeus* F. Sehr häufig.
 78. *Megacronus aralis* F. Selten.
 79. - *rufus* Er. Sehr selten.
 80. *Mycetoporus splendidus* Grav. Selten.
 81. - *brunneus* Marsh. Ebenso.
 82. - *splendens* Marsh. Ebenso.
 83. - *nanus* Er. ? Sehr selten.
 84. *Quedius fulgidus* F. Sehr selten.
 85. - *mesomelinus* Marsh. Häufig.
 86. - *xanthopus* Er. Selten.
 87. - *cruentus* Oliv. Einmal gefunden.
 88. - *laevigatus* Gyll. Unter Nichtenrinde nicht selten.
 89. - *cinetus* Payk. Sehr selten.
 90. - *fuliginosus* Grav. Ziemlich häufig.
 91. - *molochinus* Grav. Ebenso.
 92. - *paradisianus* Heor. Ebenso.
 93. - *boops* Grav. Nicht selten.
 94. *Emus maxillosus* L. Sehr selten.
 95. *Leistotrophus nebulosus* F. Nicht selten.
 96. *Staphylinus pubescens* Degeer. Nicht selten.
 97. - *fossor* Scop. Häufig.
 98. - *erythropterus* L. Ziemlich häufig.
 99. - *caesareus* Cederh. Ziemlich selten.
 100. - *stercorarius* Ol. Sehr selten.
 101. - *latebricola* Grav. Ebenso.
 102. - *ophthalmicus* Scop. Selten, früher viel häufiger.
 103. - *nitens* Schrank. Häufig.
 104. - *picipennis* F. Häufig.

105. *Staphylinus fuscatus* Grav. Sehr häufig.
 106. - *aeneocephalus* Deg. Häufig.
 107. - *edentulus* Block. Nicht selten.
 108. *Philontus umbratilis* Grav. Einmal gefunden.
 109. - *atratus* Grav. Häufig.
 110. - *aeneus* Rossi. Ziemlich selten.
 111. - *ventralis* Grav. Selten.
 112. - *ebeninus* Grav. Sehr häufig.
 113. - *corvinus* Er. Selten.
 114. - *sanguinolentus* Grav. Selten.
 115. - *laminatus* Creutz. Häufig.
 116. - *nigritulus* Grav. Sehr häufig.
 117. - *vernalis* Grav. Nicht selten.
 118. - *nitidulus* Grav. Selten.
 119. - *politus* F. Nicht selten.
 120. - *lucens* Er. Selten.
 121. - *varius* Gyll. Selten.
 B. bimaculatus Grav. Einmal gefunden.
 122. - *varians* Payk. Nicht selten.
 123. - *fulvipes* F. Schwa-Mfer ziemlich selten.
 124. - *pullus* Nordm. Selten.
 125. *Othius melanocephalus* Grav. Sehr selten
 126. - *myrmecophilus* Kiesw. Ebenso.
 127. - *fulvipennis* F. Selten.
 128. *Xantholinus glabratus* Grav. Sehr selten.
 129. - *tricolor* F. Im Walde häufig.
 130. - *linearis* Oliv. Sehr häufig.
 131. - *punctulatus* Payk. Häufig.
 132. - *ochraceus* Gyllh. Ebenso.
 133. - *lentus* Er. Unter der Rinde von Nichtenstümpfen
 ziemlich selten.
 134. *Cryptobium fracticorne* Payk. Selten.
 135. *Lathrobium elongatum* L. Häufig.
 136. - *fulvipenne* Grav. Häufig.
 137. - *filiforme* Grav. Selten.
 138. - *longulum* Grav. Sehr selten.
 139. - *terminatum* Grav. Einmal gefunden.
 140. - *multipunctatum* Grav. Sehr selten.
 141. - *bicolor* Er. Einmal gefunden.
 142. *Medon melanocephalus* F. Sehr selten.
 143. *Scopaeus cognatus* Rey. Selten.
 144. *Domene scabricollis* E. Häufig.
 145. *Stilicis rufipes* Germ. Selten.
 146. *Sunius angustatus* Payk. Häufig.
 147. *Paederus gregarius* Scop. Nicht selten.

148. *Stenus bipunctatus* Er. Gemein.
 149. - *pusillus* Er. Nicht selten.
 150. - *clavicornis* Scop. Häufig.
 151. - *ater* Mannerh. Selten.
 152. - *morio* Grav. Nicht häufig.
 153. - *ruralis* Er. Ziemlich selten.
 154. - *latifrons* Er. Selten.
 155. - *tarsalis* Ljungh. Ziemlich häufig.
 156. - *similis* Herbst. Ebenso.
 157. - *bifoveolatus* Gyll. Selten.
 158. - *impressus* Germ. Wie Voriger.
 159. *Oxyporus rufus* L. Sehr selten.
 160. *Platysthetus arenarius* Fourer. Häufig.
 161. - *nodifrons* Sahlbg. Selten.
 162. *Oxytelus rugosus* Grav. Gemein.
 163. - *nitidulus* Grav. Häufig.
 164. - *complanatus* Er. Selten.
 165. - *tetracarinatus* Block. Ziemlich selten.
 166. *Haploderus caelatus* Grav. Sehr selten.
 167. *Coprophilus striatulus* F. Einmal gefunden.
 168. *Syntomium aeneum* Müll. Einmal am Fichtelberg gefunden.
 169. *Deleaster dichrous* Grav. Am Schma-llfer selten.
 170. *Anthophagus bicornis* Block. Nicht selten.
 171. - *alpestris* Heer. Häufig.
 172. - *caraboides* L. Nicht selten.
 173. *Geodromicus plagiatus* F. Selten. Nur die *B. nigritus* Müller.
 174. *Lesteva longelytrata* Goeze. Selten.
 175. *Olophrum assimile* Payk. Ebenso.
 176. *Lathrimacum melanocephalum* Ill. Ziemlich selten.
 177. *Deliphrum tectum* Erichs. Sehr selten.
 178. *Acidota crenata* F. Einmal gefunden.
 179. *Homalium rivulare* Payk. Gemein.
 180. - *concinnum* Marsh. Nicht häufig.
 181. - *rufipes* Fourer. Ziemlich häufig.
 182. - *pusillum* Grav. Unter Fichtenrinde, nicht selten.
 183. - *monilicorne* Gyll. Selten.
 184. - *deplanatum* Gyll. Selten.
 185. - *planum* Payk. Selten.
 186. *Anthobium abdominale* Grav. Häufig.
 187. - *signatum* Maerk. Selten.
 188. - *limbatum* Er. Häufig.
 189. - *florale* Panz. Sehr häufig.
 190. - *alpinum* Heer. Häufig.
 191. - *longipenne* Er. Nicht selten.
 192. - *sorbi* Gyllh. Häufig.

193. *Anthobium torquatum* Marsh. Selten.
194. *Protinus brachypterus* F. Ziemlich häufig.
195. - *atomarius* Er. Selten.
196. *Megarthus depressus* Payk. Selten.

Pselaphidae.

1. *Pselaphus Heisei* Hbst. Häufig.

Clavigeridae.

1. *Claviger testaceus* Preysl. Selten.

Scydmaenidae.

1. *Scydmaenus pusillus* Müll. Sehr selten.

Silphidae.

1. *Choleva angustata* F. Selten.
2. - *cisteloides* Frölich. Selten.
3. - *agilis* Illig. Sehr selten.
4. *Ptomaphagus picipes* F. Selten.
5. - *fuscus* Panz. Selten.
6. - *nigricans* Spence. Ebenso.
7. - *Watsoni* Spence. Häufiger.
8. *Phosphuga atrata* L. Häufig.
 B. brunnea Hbst. Nicht selten.
9. - *opaca* L. Ziemlich selten.
10. *Thanatophilus thoracicus* L. Sehr selten.
11. - *sinuatus* F. Nicht selten.
12. *Silpha lunata* F. (*carinata* Ill.) Häufig.
13. - *tristis* Illig. Ziemlich selten.
14. - *obscura* L. Häufig.
15. *Necrophorus humator* Goeze. Nicht selten.
16. - *vespillo* L. Seltener.
17. *Agathidium laevigatum* Er. Selten.
18. - *badium* Er. Sehr selten.

Clambidae.

1. *Clambus armadillo* Degger. Selten.

Trichopterygidae.

1. *Trichopteryx fascicularis* Herbst. Nicht selten.
2. - *sericans* Heer. Häufig.

Scaphidiidae.

1. *Scaphisoma agaricinum* L. Nicht selten.

Phalacridae.

1. *Phalacrus corruscus* Payk. Ziemlich selten.

Erotylidae.

1. *Daene bipustulata* Thunbg. Im Blattenwald selten.
2. *Combocerus glaber* Schall. Sehr selten.

Endomychidae.

1. *Lycoperdina Bovistae* F. Selten.
2. *Mycotaea hirta* Marsh. Nicht selten.

Cryptophagidae.

1. *Antherophagus nigricornis* F. Sehr selten.
2. *Cryptophagus cellaris* Scop. Selten.
3. - *dentatus* Hbst. Selten.
4. - *seanicus* L. Nicht selten.
5. - *subdepressus* Gyll. Selten.
6. *Atomaria nigripennis* Payk. Selten.
7. - *fuscata* Seh. Selten.
8. - *testacea* Steph. Selten.
9. - *apicalis* Er. Selten.
10. - *ruficornis* Marsh. Selten.

Lathridiidae.

1. *Enicmus minutus* L. Sehr häufig.
2. *Cartodere elongata* Curtis. Selten.
3. - *ruficollis* Marsh. Sehr selten.
4. *Corticaria denticulata* Gyll. Nicht selten.
5. - *umbilicata* Beck. Selten.

Tritomidae.

1. *Typhaca fumata* L. Selten.

Micropeplidae.

1. *Micropeplus porcatus* F. Selten.

Nitidulidae.

1. *Cercus pedicularius* L. Selten.
2. *Heterhelus solani* Heer. Häufig.
3. *Brachypterus gravidus* Ill. Selten.
4. - *urticae* F. Sehr häufig.
5. *Omosiphora limbata* E. Nicht selten.
6. *Epuraca aestiva* L. Selten.
7. - *melina* Er. Selten.
8. - *deleta* Er. Selten.
9. - *rufomarginata* Steph. Ziemlich selten.
10. *Soronia grisea* L. Im Mitweidathal.
11. *Meligethes hebes* Er. Selten.
12. - *brassicae* Scop. Gemein.
13. - *viridescens* F. Häufig.

14. *Meligethes picipes* Sturm. Selten.
15. *Ips 4-pustulatus* L. Häufig.
16. - *ferrugineus* L. Selten.
17. *Rhizophagus ferrugineus* Payk. Selten.
18. - *dispar* Payk. Sehr häufig.
19. - *bipustulatus* F. Häufig.

Cucujidae.

1. *Monotoma picipes* Hbst. Sehr selten.

Byturidae.

1. *Byturus rosae* Scop. Häufig.
2. - *sambuci* Scop. Häufig.

Dermestidae.

1. *Dermestes lardarius* L. Häufig.
2. - *ater* Ol. Sehr selten.
3. *Attagenus pelli* L. Häufig.
4. *Anthrenus pimpinellae* F. Häufig.
5. - *serophulariae* L. Ziemlich selten.
6. - *muscorum* L. Ziemlich selten.

Cistelidae.

1. *Byrrhus ornatus* Panzer. Ziemlich selten.
2. - *pilula* L. Häufig.
B. albopunctatus F. Selten.
3. - *fasciatus* F. Selten.
B. arictinus Steff. Einmal gefunden.
4. - *pustulatus* Forster. Selten.
5. *Cistela varia* F. Häufig.
6. *Simplocaria semistriata* F. Nicht häufig.

Histeridae.

1. *Hister cadaverinus* Hoffm. ? Selten.
2. - *distinctus* Er. Selten.
3. - *neglectus* Germ. Nicht häufig.
4. - *purpurascens* Herbst. Ziemlich häufig.
5. *Onthophilus striatus* Forster. Häufig.

Lucanidae.

1. *Systemocerus caraboides* L. Sehr selten.
2. *Sinodendron cylindricum* L. Einmal gefunden.

Scarabaeidae.

1. *Onthophagus fracticornis* Preyssl. Selten.
2. - *ovatus* L. Häufiger.

- Aphodius fossor* L. Nicht häufig.
A. sylvaticus Ahr. Manchmal.
 - *finetarius* L. Gemein.
 - *ater* Degeer. Nicht häufig.
 - *granarius* L. Ebenso.
 - *inquinatus* F. Sehr häufig.
 - *tessulatus* Payk. Häufig.
 - *prodromus* Brahm. Sehr häufig.
- Odontaeus armiger* Scop. Sehr selten.
- Geotrupes stereorarius* L. Sehr häufig. Sämmtliche Exemplare nähern sich mehr oder weniger der Form *spiniger* Marsh.
 - *sylvaticus* Panz. Häufig.
 - *vernalis* L. Selten.
- Hoplia philantus* Füssl. Häufig bei der Buchholzer Buche.
- Scirica brunnea* L. Nicht selten.
- Rhizotrogus solstitialis* L. Ziemlich selten.
- Melolontha vulgaris* F. Ganz selten.
- Phyllopertha horticola* L. Häufig.
- Cetonia aurata* L. Einmal gefunden.
- Gnorimus nobilis* L. Bei Wolfenstein, selten.
- Trichius fasciatus* L. Nicht häufig.

Buprestidae.

- Anthaxia Apunctata* L. Häufig.
- Agrilus viridis* L. Selten.
 - *coeruleus* Rossi. Sehr selten.
- Trachys minuta* L. Nicht häufig.

Elateridae.

- Laeon murinus* L. Nicht häufig.
- Elater balteatus* L. Einmal erbeutet.
- Cryptohypnus riparius* F. Nicht häufig.
 - *dermestoides* Herbst *B. 4-guttatus* Scop. Ziemlich selten.
 - *minutissimus* Germ. Sehr selten.
- Cardiophorus ruficollis* L. Sehr selten.
 - *musculus* Er. Ebenso.
- Melanotus castanipes* Payk. Am Fichtelberg selten.
 - *rufipes* Herbst. Nicht häufig.
- Limonius pilosus* Leske. Selten.
 - *minutus* L. Nicht häufig.
 - *parvulus* L. Ebenso.
 - *aeneoniger* Degeer. Häufig.

14. *Athous porrectus* Thoms. }
 ♂ *alpinus* Redtb. } Sehr häufig; darunter die
 ♀ *scrutator* Hbst. }
 ♂ *acneithorax* Desbr. } Häufig.
15. - *haemorrhoidalis* F. Häufig.
 16. - *subfuscus* Müll. Häufig.
 17. - *Zeebi* Bach. Nicht häufig.
 18. *Corymbites pectinicornis* L. Nicht selten.
 19. - *cupreus* F. Ziemlich häufig.
 ♀ *aeruginosus* F. Häufiger.
 20. - *purpureus* Poda. Vereinzelt.
 21. - *castaneus* L. Sehr selten.
 22. - *sjaelandicus* Müll. Selten.
 23. - *serraticornis* Payk. Sehr selten.
 24. - *quercus* Gyllh. Nicht selten; am Fichtelberg häufig.
 ♀ *elytris testaceis* Kiesw. Ebenso, oft als dunkle Stücke.
 25. - *tessellatus* L. Häufig.
 26. - *aeneus* L. Häufig, darunter oft die ♀ *germanus* L.
 27. *Agriotes aterrimus* L. Ziemlich selten.
 28. - *pilosellus* Schh. Selten
 29. - *sputator* L. Nicht häufig.
 30. - *lineatus* L. Selten.
 31. - *obscurus* L. Sehr häufig.
 32. - *pallidulus* Hl. Sehr selten.
 33. *Dolopius marginatus* L. Häufig.
 34. *Sericus brunneus* L. Selten.
 35. *Synaptus filiformis* F. Ziemlich häufig.
 36. *Adrastus limbatus* F. Häufig.
 37. - *pallens* F. Selten.
 38. *Denticollis linearis* L. Selten

Dascillidae.

1. *Dascillus cervinus* L. Nicht häufig.
2. *Melodes marginatus* F. Sehr selten.
3. *Cyphon coarctatus* Payk. Selten.

Cantharidae.

1. *Eros Aurora* Hbst. In Bierensteig, selten.
2. *Dictyoptera sanguinea* L. Bei Wiesenbad, selten.
3. *Lamprorhiza splendidula* L. Häufig.
4. *Podabrus alpinus* Payk. Selten.
5. *Cantharis abdominalis* F. Selten.
6. - *violacea* Payk. Häufiger.
7. - *fusca* L. Häufig.
8. - *rustica* Fall. Ebenso.

9. *Cantharis tristis* F. Nicht selten.
10. - *obsura* L. Häufig.
11. - *nigricans* Müll. Ebenso.
12. - *pellucida* F. Sehr häufig.
13. - *livida* L. Häufig.
14. - *rufa* L. Ebenso.
15. - *fulvicollis* F. Nicht selten.
16. - *haemorrhoidalis* F. Wie Vorige.
17. *Rhagonycha fuscicornis* Oliv. Selten.
18. - *fulva* Scop. Gemein.
19. - *testacea* L. Sehr häufig.
20. - *pallipes* F. Ziemlich häufig.
21. - *clongata* Fall. Nicht selten.
22. - *atra* L. Selten.
23. *Malthodes minimus* L. Selten.
24. - *marginatus* Latr. Selten.
25. - *brevicollis* Payk. Häufig.
26. *Malachius acneus* L. Nicht häufig.
27. *Anthocomus equestris* F. Selten.
28. - *fasciatus* L. Häufig.
29. *Charopus flavipes* Payk. Einmal gefunden.
30. *Dasytes niger* L. Selten.
31. - *plumbeus* Müller. Sehr häufig.
32. *Danacaea pallipes* Pauz. Nicht häufig.

Cleridae.

1. *Cleroides formicarius* L. Ziemlich selten.
2. *Corynetes coeruleus* Degeer. Nicht selten.

Bruchidae.

1. *Niptus hololeucus* Falderm. In Häusern nicht selten.
2. *Bruchus (Ptinus) latro* F. Sehr selten.
3. - *dubius* Sturm. Selten.
4. - *brunneus* Duft. Sehr selten.
5. - *fur* L. Häufig.

Byrrhidae.

1. *Anobium domesticum* Fourcr. Sehr häufig.
2. *Ernobius abietis* F. Nicht selten.
3. - *mollis* L. Ziemlich selten.
4. *Trypopytus carpini* Hbst. Einmal bei Wolfenstein gefunden.

Cisidae.

1. *Cis boleti* Scopoli. Nicht häufig.
2. - *micans* F. Selten.

3. *Cis hispidus* Payk. Nicht selten.
4. - *nitidus* Hbst. Ebenso.
5. - *Octotennus glabriculus* Gyllh. Häufig.

Tenebrionidae.

1. *Gnathocerus cornutus* F. 2 Stück in Weizengebüch vorgefunden.
2. *Tenebrio molitor* L. Selten.

Alleculidae.

1. *Pseudocistela murina* L. Häufig.
 B. maura F. Ebenso.
 B. evonymi F. Ebenso.

Lagriidae.

1. *Lagria hirta* L. Nicht selten.

Anthicidae.

1. *Anthicus floralis* L. Selten.

Pyrochroidae.

1. *Pyrochroa coccinea* L. Sehr selten.
2. „ *pectinicornis* L. Ebenso.

Mordellidae.

1. *Mordellistena abdominalis* F. Bei Wiesbaden sehr selten.
2. *Anaspis frontalis* L. Sehr häufig.
3. - *ruficollis* F. Häufig.
4. - *rufilabris* Gyllh. Ebenso.

Rhipiphoridae.

1. *Metoeus paradoxus* L. Einmal vorgekommen

Meloidae.

1. *Meloe proscarabaeus* L. Nicht selten.

Oedemeridae.

1. *Calopus serraticornis* L. Selten.
2. *Oedemera femorata* Scop. Nicht häufig.
3. - *subulata* Oliv. Selten.
4. - *flavipes* F. Nicht häufig.
5. - *virescens* L. Häufig.
6. - *lurida* Marsh. Häufig.

Pythidae.

1. *Salpingus castaneus* Panz. Selten.
2. *Rhinosimus planirostris* F. Etwas häufiger.

Curculionidae.*Curculionitae.*

1. Otiorrhynchus niger F. Häufig.
B. villosopunctatus Gyllh. Ebenso.
2. - morio F. Häufig.
B. ebeninus Gyllh. Ebenso.
3. - raucus F. Selten.
4. - scaber L. Sehr selten.
5. - dubius Sturm. Am Dichtelberg, selten.
6. - singularis L. Häufig.
7. - Marquardtii Fald. Häufig.
8. - lepidopterus F. Nicht selten.
9. - ligustici L. Ziemlich selten.
10. - ovatus L. Ziemlich häufig.
11. Peritelus hirticornis Hbst. Nicht selten.
12. Phyllobius glaucus Scop. Häufig.
B. alneti F. Weit seltener.
13. - psittacinus Germ. Sehr häufig.
14. - viridicollis Germ. Gemein.
15. - piri L. Nicht häufig.
16. - viridiaereis Laich. Nicht selten.
17. Polydrusus cervinus L. Häufig.
18. Strophosomus coryli F. Nicht selten.
19. - obesus Marsh. Selten.
20. Sitona flavescens Marsh. Nicht selten.
21. - sulcifrons Thunberg. Häufig.
22. - crinitus Oliv. Nicht häufig.
23. - lineatus L. Häufig.
24. - hispidulus F. Ebenso.
25. Trachyploeus laticollis Boh. Selten.
26. Liophloeus tessellatus Bonsdorff. Ziemlich selten.
27. Barynotus murinus Bonsdorff. Selten.
28. - moerens F. Selten.
29. Dactylorrhinus plagiatus Schall. Selten.
30. Tropiphorus clavatus Hbst. Sehr selten.

Rhynchaenitae.

31. Alophus triguttatus F. Selten.
32. Hypera oxalidis Herbst. Sehr selten.
33. - punctata F. Nicht selten.
34. - polygoni F. Sehr selten.
35. - suspiciosa Herbst. Ebenso.
36. - nigrirostris F. Ziemlich häufig.
37. Liparus germanus L. Häufig.

38. *Liparus carinacrostris* Kst. Am Fichtelberg, ziemlich selten.
39. *Hyllobius abietis* L. Häufig.
40. *Pissodes pini* L. Selten.
41. *Erirhinus acridulus* L. Selten.
42. *Dorytomus costirostris* Gyll. Häufig.
43. *Anoplus plantaris* Naezen. Nicht häufig.
44. *Magdalis duplicata* Germ. Sehr selten.
45. - *nitida* Gyll. Selten.
46. - *pruni* L. Nicht selten.
47. *Balaninus nucum* L. Selten.
48. *Balanobius crux* F. Nicht selten.
49. - *brassicae* F. Ebenso.
50. *Anthonomus rubi* Herbst. Ziemlich häufig.
51. - *brassicae* F. Ebenso.
52. *Elleschus bipunctatus* L. Selten.
53. *Mecinus piraster* Hbst. Einmal bei Wiesenbad unter Rinde gefunden.
54. *Gymnetron labile* Hbst. Sehr selten.
55. - *pilosum* Gyllh. Selten.
56. *Cionus serophulariae* L. Nicht selten.
57. *Orchestes populi* F. Sehr häufig.
58. - *salicis* L. Häufig.
59. - *stigma* Germ. Ziemlich selten.
60. - *foliorum* Müller. Häufig.
61. *Rhamphus flavicornis* Clairv. Häufig.
62. *Coeliodes rubicundus* Payk. Selten.
63. *Cidnorrhinus 4-maculatus* L. Selten.
64. *Orobitis cyaneus* L. Sehr selten.
65. *Ceuthorrhynchidius troglodytes* F. Ziemlich selten.
66. - *floralis* Payk. Ebenso.
67. *Ceuthorrhynchus syrites* Germ. Ziemlich häufig.
68. - *marginatus* Payk. Ziemlich selten.
69. - *assimilis* Payk. Nicht häufig.
70. - *cochleariae* Gyllh. Selten.
71. - *quadridens* Panz. Selten.
72. - *sulcicollis* Payk. Nicht häufig.
73. *Calandra granaria* L. Einmal in Menge im Gerichtsgebäude.
74. *Cossonus linearis* F. Selten.
75. *Stereocorynes truncorum* Germ. Selten.
76. *Rhyncolus cylindricus* Boh. Selten.

Apionidae.

1. *Apion pubescens* Kirby. Selten.
2. - *apricans* Herbst. Häufig.
3. - *assimile* Kirby. Häufig.
4. - *flavipes* F. Ebenso.

5. *Apion virens* Herbst. Nicht häufig.
6. - *punctigerum* Thunbg. Selten.
7. - *columbinum* Germ. Nicht selten.
8. - *frumentarium* L. Selten.
9. - *sedi* Germ. Ziemlich selten.

Rhynchitidae.

1. *Rhynchites cupreus* L. Nicht selten.
2. - *planirostris* F. Sehr häufig.
3. - *betulae* L. Ziemlich häufig.
4. *Rhinomacer populi* L. Häufig.

Anthribidae.

1. *Anthribus varius* F. Häufig.

Hylesinidae.

1. *Hylastes cunicularius* Er. Häufig.
2. - *palliatu*s Gyllh. Häufig.
3. *Myelophilus piniperda* L. Ziemlich selten.
4. *Hylesinus fraxini* F. Selten.

Scolytidae.

1. *Scolytus pruni* Ratzeb. Selten.

Tomicidae.

1. *Crypturgus pusillus* Gyllh. Häufig.
2. *Tomicus laricis* F. Nicht häufig.
3. - *curvidens* Germ. Selten.
4. *Dryocoetes autographus* Ratzeb. Häufig.
5. *Trypodendron lineatum* Ol. Häufig.
6. - *domesticum* L. Sehr selten.

Cerambycidae.

Anaulacnemitae.

1. *Stenocorus bifasciatus* F. Sehr selten.
2. „ *inquisitor* L. Selten.
3. *Oxymirus cursor* L. Selten.
4. *Brachyta clathrata* F. Im Mitteleidathal, darunter auch die
V. *nigrescens* Gredl.
5. *Pachyta quadrimaculata* L. Ziemlich selten.
6. *Gaurotus virginea* L. Selten.
7. *Acmacops collaris* L. Ziemlich häufig.
8. *Leptura livida* F. Sehr häufig.
9. - *rubra* L. Nicht häufig.
10. - *cerambyciformis* Schrank. Häufig.
11. - *chrysomeloides* Schrnk. Ziemlich selten.
12. - *aethiops* Poda. Ebenso.
13. - *melanura* L. Häufig.

12. *Molorchus minor* L. Nicht häufig.
13. - *minimus* Scop. Sehr selten.
14. *Obridium brunneum* F. Häufig.
15. *Tetropium luridum* L. Häufig.
T. aulicum F.
T. fuleratum F. Diese Form am häufigsten.
16. - *fuscum* F. Selten.
17. *Callidium violaceum* L. Nicht selten.
18. *Hylotropes bajulus* L. Bei Wolfenstein selten.
19. *Aromia moschata* L. Sehr selten; seit Jahren nicht mehr beobachtet.

Metaulacnemitae.

20. *Ponochaerus fasciculatus* Degeer. Sehr selten.
21. *Lamia textor* L. Sehr selten.
22. *Saperda populnea* L. Nicht häufig.
23. - *carcharias* L. Ziemlich selten.
24. *Tetrops praeusta* L. Selten.
25. *Oberea oculata* L. Ziemlich selten.

Chrysomelidae.

Eupoda.

1. *Orsodaena cerasi* L. Sehr selten bei Wiejenbad.
2. *Donacia simplex* F. Selten.
3. - *thalassina* Germ. Selten.
4. *Plateumaris sericea* L. Selten.
5. - *consimilis* Schrank. Häufig.
6. *Zeugophora subspinosa* F. Sehr selten.
7. - *flavicollis* Marsh. Häufig.
8. *Lema lichenis* Voet. Nicht häufig.
9. - *melanopa* L. Selten.
10. *Crioceris merdigera* L. Selten.

Camptosomata.

11. *Clytra 4-punctata* L. Ziemlich selten.
12. *Cryptocephalus 8-punctatus* Scop. Selten
13. - *sexpunctatus* L. Sehr selten.
14. - *bipunctatus* L. Ziemlich selten.
15. - *aureolus* Suffr. Nicht häufig
16. - *hypochoeridis* L. Ebenso.
17. - *nitidulus* F. Selten.
18. - *nitidus* L. Selten.
19. - *parvulus* Müll. Sehr selten.
20. - *marginatus* F. Einmal gefunden.
21. - *pini* L. Sehr selten.
22. - *flavipes* F. Häufig.
23. - *chrysopus* Gmel. Selten.

24. *Cryptocephalus labiatus* L. Ziemlich häufig; darunter oft die *♀*.
exilis Steph
25. - *Moraei* L. Häufig.
- Cyclica.*
26. *Adoxus obscurus* L. Nicht häufig.
27. *Gastroidea polygona* L. Ebenso.
28. *Timarcha metallica* Laich. Ziemlich selten.
29. *Chrysomela rufa* Duft. Selten
30. - *haemoptera* L. Häufig.
31. - *staphylea* L. Häufig.
32. - *limbata* F. Selten.
33. - *goettingensis* L. Sehr selten.
34. - *analis* Panz. *♀*. *lomata* Hbst. Nicht häufig.
35. - *oricalcia* Müller. Sehr selten.
36. - *geminata* Payk. Nicht selten.
37. - *cerealis* L. Ebenso.
38. - *varians* Schaller. Ziemlich häufig.
39. - *fastuosa* L. Ebenso.
40. - *graminis* L. Ziemlich selten.
41. - *polita* L. Selten.
42. *Orina alpestris* Schumm. *♀* polymorpha Kr. Am Haßberg.
43. - *cacalia* Schrank. *♀*. *senecionis* Schumm. Häufig.
44. - *speciosissima* Scop. Häufig; darunter ziemlich selten *♀*. Letzneri
 Weise
45. *Phytodecta viminalis* L. Häufig.
46. - *5-punctata* F. Häufig; vorwiegend ist die *♀*. *flavicolis* Duft.
47. *Phyllodecta vulgatissima* L. Nicht häufig.
48. - *laticollis* Suffr. Häufig.
49. - *vitellinae* L. Ebenso.
50. *Hydrothassa aucta* F. Nicht häufig.
51. - *marginella* L. Ziemlich selten.
52. *Prasocuris phellandrii* L. Selten.
53. *Phaedon cochleariae* F. Nicht selten
54. *Plagioderia versicolora* Laich. Ziemlich selten.
55. *Melasoma aenea* L. Nicht häufig; in mehreren Färbungen.
56. - *populi* L. Ziemlich häufig.
57. - *tremulae* F. Ebenso.
58. *Lochmaea capreae* L. Nicht selten.
59. *Trirhabda viburni* Payk. Ebenso.
60. *Galerucella lineola* F. Häufig.
61. *Galeruca tanacetii* L. Gemein.
62. - *pomonae* Scop. Selten.
63. *Crepidodera femorata* Gyll. Sehr selten.

64. *Crepidodera nitidula* L. Nicht häufig.
 65. - *Modeeri* L. Sehr selten.
 66. - *ferruginea* Scop. Häufig.
 67. *Mantura rustica* L. Sehr selten.
 68. *Chaetocnema concinna* Marsh. Häufig.
 69. - *aridula* Gyll. Selten.
 70. - *hortensis* Fourer. Häufig.
 71. *Psylliodes chrysocephala* L. Nicht häufig.
 72. - *affinis* Payk. Selten.
 73. - *cucullata* Ill. Nicht selten.
 74. *Haltica oloracea* L. Häufig.
 75. *Batophila rubi* Payk. Häufig.
 76. *Phyllotreta flexuosa* Ill. Selten.
 77. - *nemorum* L. Häufig.
 78. - *vittula* Redt. Häufig.
 79. - *aterrima* Schrank. Selten.
 80. - *nigripes* F. Häufig.
 81. *Aphthona cyparissiae* Koch. Selten.
 82. *Longitarsus anehusae* Payk. Selten.
 83. - *apicalis* Beck. Sehr häufig.
 84. - *brunneus* Duft. Häufig.
 85. - *tabidus* F. Selten.
 86. - *atricillus* L. Ebenso.
 87. - *melanocephalus* Deg. Ebenso.
 88. - *pusillus* Gyll. Häufig.
 89. - *laevis* Duft. Nicht selten.
 90. *Apteropeda orbiculata* Marsh. Selten.
 91. *Sphaeroderma cardui* Gyll. Selten.
 92. *Hispa atra* L. Sehr selten.
 93. *Cassida vibex* L. Selten.
 94. - *nebulosa* L. Selten.
 95. - *viridis* L. Selten.

Coccinellidae.

1. *Hippodamia tredecimpunctata* L. Sehr selten.
 2. - *septemmaculata* Deg. Ebenso.
 3. *Adonia variegata* Goeze. Sehr selten.
 4. *Adalia oblitterata* L. Nicht selten.
 5. - *bothnica* Payk. Selten.
 6. - *bipunctata* L. Gemein; sehr oft auch die *B. 6-punctata* L.
 (4-pustulata Scop).
 7. *Coccinella 7-punctata* L. Gemein.
 8. - *5-punctata* L. Ziemlich selten.
 9. - *10-punctata* L. Häufig.
 10. - *14-pustulata* L. Nicht häufig.

11. *Mysia oblongoguttata* L. Nicht häufig.
12. *Halyzia ocellata* L. Häufig.
13. - *10-guttata* L. Selten.
14. - *18-guttata* L. Ziemlich selten.
15. - *14-guttata* L. Selten.
16. - *conglobata* L. Ill. Häufig.
17. *Subcoccinella 24-punctata* L. Häufig.
18. *Coccidula scutellata* Herbst. Selten.
19. *Chilocorus similis* Rossi. Ziemlich selten.
20. - *bipustulatus* L. Häufig.
21. *Scymnus ferrugatus* Moll. Selten.
22. - *suturalis* Thunbg. Häufig.
23. - *abietis* Payk. Nicht selten.

Nach vorstehendem Verzeichnisse sind in dem Annaberger Gebiete bis jetzt 819 Arten von Käfern aufgefunden worden, die zu 59 verschiedenen Familien gehören.



Seemanne aus einer fliegenden Schaar Enten allein niedergeschossen worden, zu einer Zeit, wo nach langem Froste durch das eingefallene Thauwetter sich bereits im Eise stellenweise offenes Wasser zeigte und die hier überwinterten, verschiedenen nordischen Enten zum Theil ihre Abreise begannen und andere durchzogen.

Mein Ex. stimmt sonst ganz mit dem bei Kjärbölling abgebildeten alten Männchen, nur dass die schön dunkelgrüne Farbe des Oberkopfes sich bei diesem gleichfarbig von der Schnabelwurzel über denselben bis zum Hinterkopf erstreckt, während sie bei dem meinigen durch einen weissen Streifen unterbrochen wird, der zwischen Schnabelwurzel und Auge einen halben Centimeter breit beginnend, nach oben etwas breiter werdend, quer zwischen Stirne und Scheitel über den Kopf zur entgegengesetzten Seite geht, so dass dadurch die grüne Haube in 2 Theile getrennt wird.

Franz Schmidt.



Berichtigungen.



Seite 81 Z. 3 nach limbatus F. fehlt: häufig.

- 88 Z. 10 v. u. anstatt distinctus Er. lies carbonarius Illig.

- 96 Z. 12 v. o. anstatt Ponochaerus lies Pogonochaerus.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Bericht des Annaberg-Buchholzer Vereins für Naturkunde](#)

Jahr/Year: 1886

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Lange C.

Artikel/Article: [Verzeichniss der in der Umgebung Annabergs beobachteten Käfer 76-99](#)

