

# B

## Verzeichniss der in der Umgebung Annabergs beobachteten Käfer.

Von C. Lange.

Das nachfolgende Verzeichniss kann, da die Beobachtungszeit sich wenig über das Jahr 1880 zurückstreckt, zwar den Anspruch auf Vollständigkeit nicht machen, dürfte aber immerhin deshalb einiges Interesse erregen, weil Berichte über Käferfunde im westlichen Theile des sächsischen Erzgebirges bisher nur spärlich in die Oeffentlichkeit gelangt sind.

Die Beobachtungen geschahen in der Umgebung der Stadt Annaberg bis auf etwa eine Stunde Entfernung. Einige charakteristische Funde aus Hochthälern des Erzgebirges — namentlich am Fichtelberge — sind mit aufgenommen.

Die geologische Beschaffenheit, die Seehöhe des in Frage kommenden Gebietes und die daraus resultirende Armuth der Flora lassen für die Insektenfauna auf eine gleiche Armuth an Arten schliessen. Diese Vermuthung wird besonders in Bezug auf die phytophagen Arten der Käfer bestätigt, aber auch Carabidae und Staphylinidae sind nicht reichlich vertreten. Die Fauna zeigt subalpinen Charakter und in manchen Arten Verwandschaft mit jener der Gebirge Thüringens und Schlesiens.

Die Aufstellung des Verzeichnisses ist nach dem „Catalogus Coleopterorum Europae et Caucasiae, auctoribus Dr. L. v. Heyden, E. Reitter et J. Weise, editio tertia“ geschehen.

Mein verehrter Freund, Herr Gerichtsschreiber Juhghans, welchem ich schon die Einführung in das Studium der Coleopterologie verdankte, ist mir auch bei dieser Arbeit vielfach mit seinen reicherem Erfahrungen an die Hand ge-

gangen, dass ich nicht unterlassen will, ihm auch an dieser Stelle meinen Dank auszusprechen. Nicht minder fühle ich mich verpflichtet, dem Herrn Pfarrer W. Scriba in Wimpfen hiermit für die ausserordentliche Gefälligkeit, die vorhandenen Aleocharinen und Homaliinen zu bestimmen, wodurch die Aufnahme dieser schwierigen Sectionen der Staphylinidae ermöglicht wurde, den aufrichtigsten Dank zu wiederholen.

## Cicindelidae.

1. *Cicindela campestris* L. Nicht häufig
2. - *hybrida* L. Sehr selten.

## Carabidae.

### *Carabitae.*

1. *Cyclus caraboides* L. Nicht selten. Meist kleinere der Var: elongatus Hoppe sich nähernde Stücke.
2. *Procrustes coriaceus* L. Nicht selten.
3. *Orinocarabus hortensis* L. Häufig.
4. - *Linnei* Panz. Am Fichtelberg im Nadelwald nicht selten.
5. - *sylvestris* Panz. Ziemlich häufig.
6. *Chaetocarabus intricatus* L. Häufig.
7. *Megadontus violaceus* L. Ziemlich selten.
8. *Melanocarabus glabratus* Payk. Am Fichtelberg selten.
9. *Mesocarabus catenulatus* Scop. Nicht selten.
10. *Chrysocarabus auronitens* F. Ziemlich häufig.
11. *Carabus nitens* L. Selten.
12. - *granulatus* L. Häufig; darunter nicht selten *B. rufofemoratus* Letzner.
13. - *arvensis* Herbst. Sehr selten.
14. - *cancellatus* Ill. Ziemlich häufig. Die *B. viridis* Letzner. und *rufipes* Kraatz selten.
15. - *nemoralis* Müll. Häufigste Art. Darunter nicht selten *B. nigrescens* Letzner.
16. - *convexus* F. Nicht selten.

### *Nebriitae.*

17. *Nebria cursor* Müll. Sehr selten.
18. *Leistus nitidus* Duftsch. Nur einmal am Pöhlberge aufgefunden.
19. - *ferrugineus* L. Ziemlich selten.
20. - *rufescens* F. Etwa häufiger.
21. *Notiophilus aquaticus* L. Häufig.
22. - *palustris* Duft. Ebenjo.
23. - *biguttatus* F. Wie vorige.

*Bembidiitae.*

24. *Elaphrus cupreus* Duftschm. Ziemlich selten.  
 25. *Tachypus flavipes* L. Sehr vereinzelt.  
 26. *Bembidion lampros* Hbst. Häufig.  
 27. - *gilvipes* Strm. Weniger häufig.  
 28. - *4-maculatum* L. Häufig.  
 29. - *nitidulum* Marsh. Nicht selten.  
 30. - *tibiale* Dft. Am Gehmauer, ziemlich selten.  
 31. - *ustulatum* L. Häufig.  
 32. *Trechus montanellus* Gemm. Am Fichtelberg, im Wald selten.  
 33. - *4-striatus* Schrnk. Ziemlich selten.  
 34. - *secalis* Payk. Juli-August häufig.  
 35. *Patrobis excavatus* Payk. An feuchten Waldorten stellenweise häufig.  
 36. *Broscus cephalotes* L. Ziemlich selten.

*Scaritiae.*

37. *Clivina fossor* L. Nicht häufig; am Gehmauer selten *B. collaris* Hbst.  
 38. *Dyschirius globosus* Hbst. Sehr häufig.

*Loroceritae.*

39. *Lorocera pilicornis* F. Vereinzelt.

*Harpalitae.*

40. *Panagaeus bipustulatus* F. Sehr selten.  
 41. *Chlaenius nigricornis* F. *B. melanocornis* Dej. Seltener.  
 42. *Badister bipustulatus* F. Seltener.  
 43. *Anisodactylus binotatus* F. Häufig; darunter *B. spurcaticornis* Dej.  
     sehr selten.  
 44. *Ophonus punctatulus* Duft. Einmal am Schreckenberg.  
 45. *Pseudophonus pubescens* Müller. Sehr häufig.  
 46. *Harpalus laevicollis* Duft. Sehr häufig.  
 47. - *rufitarsis* Duft. Nicht selten.  
 48. - *aeneus* F. Gemein. *B. confusus* Dej. Ziemlich selten.  
 49. - *rubripes* Duft. Nicht selten.  
 50. - *latus* L. Sehr häufig.  
 51. - *4-punctatus* Dej. Sehr selten.  
 52. - *rufimanus* Marsh. Ziemlich häufig.  
 53. - *neglectus* Serv. Seltener.  
 54. *Bradyceillus verbasci* Dft. Im Walde selten.  
 55. - *collaris* Payk. Häufig.  
 56. - *similis* Dej. Sehr selten.  
 57. *Amara similata* Gyll. Häufig.  
 58. - *communis* Panz. Häufig.  
 59. - *curta* Dej. Ebenso.  
 60. - *eurynota* Panz. Seltener.  
 61. - *aenca* Degeer. Seltener.

62. *Amara familiaris* Duft. Häufig.
63. - *fusca* Dej. Ziemlich häufig.
64. - *aulica* Panz. Nicht selten.
65. - *fulva* Degeer. Häufig.
66. - *apricaria* Payk. Nicht häufig.
67. - *consularis* Duft. Nicht selten.
68. - *equestris* Duft. Selten.
69. *Abax striolus* Fabr. Häufig.
70. - *carinatus* Duft. Im Hochsommer nicht häufig.
71. *Molops elatus* F. Häufig
72. - *piceus* Panz. Einmal gefunden.
73. *Pterostichus metallicus* F. Häufig.
74. - *melas* Creutz. Auf dem Kamm des Erzgebirges selten.
75. - *oblongopunctatus* F. Nicht häufig.
76. - *aethiops* Panz. Am Fichtelberg selten.
77. - *niger* Schaller. Häufig.
78. - *vulgaris* L. Sehr häufig.
79. - *nigritus* Fabr. Wie Voriger.
80. - *diligens* Sturm. Nicht häufig.
81. *Poecilus lepidus* Leske. Häufig.
82. - *coeruleescens* L. Gemein; in vielen Färbungen, namentlich häufig dunkle Exemplare, welche in allen Farben schillern.
83. *Lagarus vernalis* Panz. Häufig.
84. *Calathus fuscipes* Goeze. Sehr häufig.
85. - *erratus* Sahlbg. Ebenso.
87. - *micropterus* Dst. Sehr häufig.
88. - *Synuchus nivalis* Panz. Ziemlich selten.
89. *Platynus assimilis* Payk. Sehr häufig.
90. - *ruficornis* Goeze. Häufig.
91. *Agonum sexpunctatum* L. Ebenso.
92. - *Mülleri* Ilbst. Ebenso.
93. - *viduum* Panz. Ziemlich selten.  
♀. *moestum* Panz. Selten.
94. *Europhilus gracilis* Gyllh. Sehr selten.
95. *Clibanarius dorsalis* Pontopp. Selten. Wurde nur an 2 Orten in kleiner Gesellschaft gefunden.
96. *Olisthopus rotundatus* Payk. Vereinzelt.
97. *Lebia chlorocephala* Hoffm. Selten.
98. - *cyancephala* L. Sehr selten.
99. *Cymindis humeralis* Fourer. Wie Voriger.
100. *Dromius agilis* Fabr. Nicht häufig.
101. - *fenestratus* Fabr. Sehr häufig.
102. - *nigriventris* Thoms. Ziemlich selten.
103. - *quattrimaculatus* L. Häufig.

104. *Dromius quatrinitatus* Panz. Etwas weniger häufig.  
 105. *Metabletus truncatellus* L. Häufig.

## Haliplidae.

1. *Peltodytes caesus* Duft. Seltен.
2. *Haliplus ruficollis* Degeer. Nicht selten.
3. - *impressus* Fabr. Ebenso.

## Dyticidae.

1. *Laccophilus hyalinus* Deg. Ziemlich selten. Heuteidhe.
- Hydroporitae.*

2. *Hyphydrus ferrugineus* L. Nicht häufig.
3. *Coelambus impressopunctatus* Schaller. Seltен.
4. *Deronectes platynotus* Germ. Nicht häufig.
5. - *latus* Steph. Seltен.
6. *Hydroporus pictus* Fabr. Sehr selten.
7. - *nigrita* Fabr. Seltен.
8. - *pubescens* Gyllh. Ebenso.
9. - *marginatus* Duft. Nicht häufig. Schmamündung.
10. - *palustris* L. Sehr häufig.
11. - *erythrocephalus* L. Seltен.

*Colymbetitae.*

12. *Agabus biguttatus* Oliv. Seltен im Quellwasser.
13. - *Sturmi* Gyll. Nicht selten.
14. - *bipustulatus* Payk. Ebenso.
15. *Platambus maculatus* L. Schmamündung häufig.
16. *Ilybius fuliginosus* F. Nicht häufig.
17. *Rhantus punctatus* Foucr. Häufig.
18. *Colymbetes fuscus* L. Sehr selten.
19. *Dyticus marginalis* L. Nicht häufig.

*Hydaticitae.*

20. *Acilius sulcatus* L. Ziemlich selten.

## Gyrinidae.

1. *Gyrinus natator* L. Seltен.

## Hydrophilidae.

*Helophoritae.*

1. *Helophorus aquaticus* L. Ziemlich selten.
2. - *granularis* L. Häufig.

*Hydrophilitae.*

3. *Hydrocharis caraboides* L. Seit Jahren nicht mehr gefunden.

4. *Hydrobius fuscipes* L. Nicht häufig.
5. *Paracymus aeneus* Germ. Seltener.
6. *Creniphilus limbatus* F.
7. *Philydrus melanocephalus* Oliv. Sehr selten.
8. - *testaceus* F. Seltener.
9. *Laccobius minutus* L. Häufig.
10. *Chaetarthria seminulum* Payk. Nicht häufig.
11. *Limnobiuss truncatellus* Thunb. Häufig.

## Sphaeridiidae.

1. *Sphaeridium bipustulatum* F. Die reine Art sehr selten, etwas häufiger  
*B. marginatum* F.
2. *Coclostoma orbiculare* F. Nicht häufig.
3. *Cereyon impressus* Sturm Häufig.
4. - *melanocephalus* L. Sehr selten.
5. - *haemorrhoidalis* F. Häufig.
6. - *unipunctatus* L. Nicht häufig.
7. - *terminatus* Marsh. Seltener.
8. - *analis* Payk. Ebenso.
9. - *pygmaeus* Ill. Ebenso.
10. - *marinus* Thoms. Nicht selten.
11. *Cryptopleurum minutum* F. Gemein.

## Dryopidae.

1. *Dryops auriculata* Panz. Seltener.
2. - *prolifericornis* F. Seltener.
3. - *Latelmis Volkmarii* Panz. Seltener.

## Staphylinidae.

1. *Autalia impressa* Ol. In Pilzen nicht selten.
2. *Bolitochara lunulata* Payk. Ebendort häufig.
3. - *obliqua* Er. Seltener.
4. *Leptusa analis* Gyllh. Seltener.
5. *Aleochara ruficornis* Grav. Einmal gefunden.
6. - *fuscipes* Grav. Nicht häufig.
7. - *bipunctata* Oliv. Seltener.
8. - *lanuginosa* Grav. Sehr häufig.
9. - *nitida* Grav. Nicht häufig.
10. *Dinarda dentata* Grav. Häufig.
11. *Lomechusa strumosa* F. Nicht selten.
12. *Atemelus emarginatus* Grav. Seltener.
13. *Myrmedonia Harworthi* Steph. Einmal gefunden.
14. - *humeralis* Grav. Nicht selten.
15. - *cognata* Maerk. Sehr selten.

16. *Myrmedonia limbata* Payk. Seltener.
17. *Astilbus canaliculatus* F. Gemein.
18. *Ocalea picata* Steph. Seltener.
19. *Chilopora longitarsis* Er. Seltener.
20. *Falagria nigra* Grav. Nicht selten.
21. - *thoracica* Curt. Seltener.
22. *Tachyusa umbratica* Er. Seltener.
23. *Gnypeta carbonaria* Mannerh. Ebenso.
24. *Homalota elongatula* Grav. Ebenso.
25. - *nitidula* Kr. Nicht selten.
26. - *aquatica* Thoms. Seltener.
27. - *sericans* Grav. Nicht selten.
28. - *nigritula* Grav. Seltener.
29. - *sodalis* Er. Ziemlich häufig.
30. - *gagatina* Baudi. Seltener.
31. - *coriaria* Kr. Ebenso.
32. - *marcida* Er. Nicht selten.
33. - *longicornis* Grav. Ebenso.
34. - *palustris* Kiesw. Seltener.
35. - *ravilla* Er. Ebenso.
36. - *corvina* Thoms. Ebenso.
37. - *indubia* Sharp. Ebenso.
38. - *subtilis* Seriba. Ebenso.
39. - *circellaris* Grav. Gemein.
40. - *analis* Grav. Häufig.
41. - *cavifrons* Sharp. Wie Vorige.
42. - *aterrima* Grav. Nicht häufig.
43. - *fungi* Grav. Häufig.  
B. *clientula* Er. Seltener.
44. - *laticollis* Steph. Häufig.
45. *Thectura aquata* Er. Nicht selten.
46. - *angustula* Gyll. Häufig.
47. - *linearis* Grav. Seltener.
48. - *plana* Gylh. Seltener.
49. *Phloecopora reptans* Grav. Ebenso.
50. - *corticalis* Grav. Ebenso.
51. *Oxypoda vittata* Maerk. Seltener.
52. - *opaca* Grav. Häufig.
53. - *umbrata* Gyll. Seltener.
54. - *alternans* Grav. Sehr häufig.
55. - *terrestris* Kr. Seltener.
56. *Gyrophaena nana* Payk. Häufig.
57. *Hypocyptus longicornis* Payk. Ziemlich häufig.
58. *Trichophya pilicornis* Grav. Sehr selten.
59. *Tachinus rufipes* L. Häufig.

60. *Tachinus flavigipes* Fabr. Häufig.  
 61. - *laticollis* Grav. Nicht selten.  
 62. - *marginellus* F. Ziemlich selten.  
 63. - *collaris* Grav. Häufig.  
 64. - *subterraneus* L. Ziemlich selten.  
 65. - *fimotarius* F. Häufig.  
 66. *Tachyporus obtusus* L. Häufig.  
 67. - *chrysomelinus* L. Häufig.  
 68. - *hypnorum* F. Häufig.  
 69. - *atriceps* Steph. Seltener.  
 70. - *ruficollis* Grav. Seltener.  
 71. - *pusillus* Grav. Nicht häufig.  
 72. - *nitidulus* F. Ebenso.  
 73. - *saginatus* Grav. Einmal gefunden.  
 74. *Conurus pedicularius* Grav. Häufig.  
 75. *Bolitobius lunulatus* L. Ziemlich selten.  
 76. - *trinotatus* Er. Seltener.  
 77. - *pygmaeus* F. Sehr häufig.  
 78. *Megaceronius aralis* F. Seltener.  
 79. - *rufus* Er. Sehr selten.  
 80. *Mycetophorus splendidus* Grav. Seltener.  
 81. - *brunneus* Marsh. Ebenso.  
 82. - *splendens* Marsh. Ebenso.  
 83. - *nanus* Er. ? Sehr selten.  
 84. *Quedius fulgidus* F. Sehr selten.  
 85. - *mesomelinus* Marsh. Häufig.  
 86. - *xanthopus* Er. Seltener.  
 87. - *eruentus* Oliv. Einmal gefunden.  
 88. - *laevigatus* Gyll. Unter Fichtenrinde nicht selten.  
 89. - *cinctus* Payk. Sehr selten.  
 90. - *fuliginosus* Grav. Ziemlich häufig.  
 91. - *molochinus* Grav. Ebenso.  
 92. - *paradisianus* Heer. Ebenso.  
 93. - *boops* Grav. Nicht selten.  
 94. *Emus maxillosus* L. Sehr selten.  
 95. *Leistostrophus nebulosus* F. Nicht selten.  
 96. *Staphylinus pubescens* Degeer. Nicht selten.  
 97. - *fossor* Scop. Häufig.  
 98. - *erythropterus* L. Ziemlich häufig.  
 99. - *caesareus* Cederh. Ziemlich selten.  
 100. - *stereorarius* Ol. Sehr selten.  
 101. - *latebricola* Grav. Ebenso.  
 102. - *ophthalmicus* Scop. Seltener, früher viel häufiger.  
 103. - *nitens* Schrank. Häufig.  
 104. - *picipennis* F. Häufig.

- 105 *Staphylinus fuscatus* Grav. Sehr häufig.  
 106. - *aeneocephalus* Deg. Häufig.  
 107. - *edentulus* Block. Nicht selten.  
 108. *Philontus umbriatilis* Grav. Einmal gefunden.  
 109. - *atratus* Grav. Häufig.  
 110. - *acneus* Rossi. Ziemlich selten.  
 111. - *ventralis* Grav. Seltener.  
 112. - *ebeninus* Grav. Sehr häufig.  
 113. - *corvinus* Er. Seltener.  
 114. - *sanguinolentus* Grav. Seltener.  
 115. - *laminatus* Creutz. Häufig.  
 116. - *nigritulus* Grav. Sehr häufig.  
 117. - *vernalis* Grav. Nicht selten.  
 118. - *nitidulus* Grav. Seltener.  
 119. - *politus* F. Nicht selten.  
 120. - *lucens* Er. Seltener.  
 121. - *varius* Gyll. Seltener.  
     *B. bimaculatus* Grav. Einmal gefunden.  
 122. - *varians* Payk. Nicht selten.  
 123. - *fulvipes* F. Schma-Ufer ziemlich selten.  
 124. - *pullus* Nordm. Seltener.  
 125. *Othius melanocephalus* Grav. Sehr selten  
 126. - *myrmecophilus* Kiesw. Ebenso.  
 127. - *fulvipennis* F. Seltener.  
 128. *Xantholinus glabratus* Grav. Sehr selten.  
 129. - *tricolor* F. Im Walde häufig.  
 130. - *linearis* Oliv. Sehr häufig.  
 131. - *punctulatus* Payk. Häufig.  
 132. - *ochraceus* Gyllh. Ebenso.  
 133. - *lentus* Er. Unter der Rinde von Fichtenstümpfen  
       ziemlich selten.  
 134. *Cryptobium fracticorne* Payk. Seltener.  
 135. *Lathrobium elongatum* L. Häufig.  
 136. - *fulvipenne* Grav. Häufig.  
 137. - *filiforme* Grav. Seltener.  
 138. - *longulum* Grav. Sehr selten.  
 139. - *terminatum* Grav. Einmal gefunden.  
 140. - *multipunctatum* Grav. Sehr selten.  
 141. - *bicolor* Er. Einmal gefunden.  
 142. *Medon melanocephalus* F. Sehr selten.  
 143. *Scopaeus cognatus* Rey. Seltener.  
 144. *Domene scabricollis* E. Häufig  
 145. *Stilicus rufipes* Germ. Seltener.  
 146. *Sunius angustatus* Payk. Häufig.  
 147. *Paederus gregarius* Scop. Nicht selten.

148. *Stenus bipunctatus* Er. Gemein.  
 149. - *pusillus* Er. Nicht selten.  
 150. - *clavicornis* Scop. Häufig.  
 151. - *ater* Mannerh. Seltener.  
 152. - *morio* Grav. Nicht häufig.  
 153. - *ruralis* Er. Ziernlich selten.  
 154. - *latifrons* Er. Seltener.  
 155. - *tarsalis* Ljungh. Ziernlich häufig.  
 156. - *similis* Herbst. Ebenso.  
 157. - *bifoveolatus* Gyll. Seltener.  
 158. - *impressus* Germ. Wie Voriger.  
 159. *Oxyporus rufus* L. Sehr selten.  
 160. *Platysthetus arenarius* Fourer. Häufig.  
 161. - *nodifrons* Sahlbg. Seltener.  
 162. *Oxytelus rugosus* Grav. Gemein.  
 163. - *nitidulus* Grav. Häufig.  
 164. - *complanatus* Er. Seltener.  
 165. - *tetracarinatus* Block. Ziernlich selten.  
 166. *Haploderus caelatus* Grav. Sehr selten.  
 167. *Coprophilus striatulus* F. Einmal gefunden.  
 168. *Syntomium aeneum* Müll. Einmal am Fichtelberg gefunden.  
 169. *Deleaster dichrous* Grav. Am Schma-Ufer selten.  
 170. *Anthophagus bicornis* Block. Nicht selten.  
 171. - *alpestris* Heer. Häufig.  
 172. - *caraboides* L. Nicht selten.  
 173. *Geodromicus plagiatus* F. Seltener. Nur die *V. nigritus* Müller.  
 174. *Lesteva longelytrata* Goeze. Seltener.  
 175. *Olophrum assimile* Payk. Ebenso.  
 176. *Lathrimacum melanocephalum* Ill. Ziernlich selten.  
 177. *Deliphrum tectum* Erichs. Sehr selten.  
 178. *Acidota crenata* F. Einmal gefunden.  
 179. *Homalium rivulare* Payk. Gemein.  
 180. - *concinnum* Marsh. Nicht häufig.  
 181. - *rufipes* Fourer. Ziernlich häufig.  
 182. - *pusillum* Grav. Unter Fichtenrinde, nicht selten.  
 183. - *monilicorne* Gyll. Seltener.  
 184. - *deplanatum* Gyll. Seltener.  
 185. - *planum* Payk. Seltener.  
 186. *Anthobium abdominalis* Grav. Häufig.  
 187. - *signatum* Maerk. Seltener.  
 188. - *limbatum* Er. Häufig.  
 189. - *florale* Panz. Sehr häufig.  
 190. - *alpinum* Heer. Häufig.  
 191. - *longipenne* Er. Nicht selten.  
 192. - *sorbi* Gyllh. Häufig.

193. *Anthobium torquatum* Marsh. Seltener.
194. *Protinus brachypterus* F. Ziemlich häufig.
195. - *atomarius* Er. Seltener.
196. *Megarthrus depressus* Payk. Seltener.

### **Pselaphidae.**

1. *Pselaphus Heisei* Hbst. Häufig.

### **Clavigeridae.**

1. *Claviger testaceus* Preyssl. Seltener.

### **Scydmaenidae.**

1. *Scydmaenus pusillus* Müll. Sehr selten.

### **Silphidae.**

1. *Choleva angustata* F. Seltener.
2. - *cisteloides* Frölich. Seltener.
3. - *agilis* Illig. Sehr selten.
4. *Ptomaphagus picipes* F. Seltener.
5. - *fuscus* Panz. Seltener.
6. - *nigricans* Spence. Ebenso.
7. - *Watsoni* Spence. Häufiger.
8. *Phosphuga atrata* L. Häufig.  
    *B. brunnea* Hbst. Nicht selten.
9. - *opaca* L. Ziemlich selten.
10. *Thanatophilus thoracicus* L. Sehr selten.
11. - *sinuatus* F. Nicht selten.
12. *Silpha lunata* F. (*carinata* Ill.) Häufig.
13. - *tristis* Illig. Ziemlich selten.
14. - *obscura* L. Häufig.
15. *Necrophorus humator* Goeze. Nicht selten.
16. - *vespillo* L. Seltener.
17. *Agathidium laevigatum* Er. Seltener.
18. - *badium* Er. Sehr selten.

### **Clambidae.**

1. *Clambus armadillo* Degeer. Seltener.

### **Trichopterygidae.**

1. *Trichopteryx fascicularis* Herbst. Nicht selten.
2. - *sericans* Heer. Häufig.

### **Scaphidiidae.**

1. *Scaphisoma agaricinum* L. Nicht selten.

### **Phalacridae.**

1. *Phalacrus corruscus* Payk. Ziemlich selten.

## Erotylidae.

1. Daene bipustulata Thunbg. Im Blätterwald selten.
2. Combocerus glaber Schall. Sehr selten.

## Endomychidae.

1. Lycoperdina Bovistae F. Seltens.
2. Mycetaea hirta Marsh. Nicht selten.

## Cryptophagidae.

1. Anthrophagus nigricornis F. Sehr selten.
2. Cryptophagus cellaris Scop. Seltens.
3. - dentatus Hbst. Seltens.
4. - scanicus L. Nicht selten.
5. - subdepressus Gyll. Seltens.
6. Atomaria nigripennis Payk. Seltens.
7. - fuscata Schh. Seltens.
8. - testacea Steph. Seltens.
9. - apicalis Er. Seltens.
10. - ruficornis Marsh. Seltens.

## Lathridiidae.

1. Enicmus minutus L. Sehr häufig.
2. Cartodere elongata Curtis. Seltens.
3. - ruficollis Marsh. Sehr selten.
4. Corticaria denticulata Gyll. Nicht selten.
5. - umbilicata Beck. Seltens.

## Tritomidae.

1. Typhaca fumata L. Seltens.

## Micropeplidae.

1. Micropeplus porcatus F. Seltens.

## Nitidulidae.

1. Cercus pedicularius L. Seltens.
2. Heterhelus solani Heer. Häufig.
3. Brachypterus gravidus Ill. Seltens.
4. - urticae F. Sehr häufig.
5. Omosiphora limbata E. Nicht selten.
6. Epuraea aestiva L. Seltens.
7. - melina Er. Seltens.
8. - deleta Er. Seltens.
9. - rufomarginata Steph. Ziemlich selten.
10. Soronia grisea L. Im Mitteidathal.
11. Meligethes hebes Er. Seltens.
12. - brassicae Scop. Gemein.
13. - viridescens F. Häufig.

14. *Meligethes picipes* Sturm. Seltener.
15. *Ips 4-pustulatus* L. Häufig.
16. - *ferrugineus* L. Seltener.
17. *Rhizophagus ferrugineus* Payk. Seltener.
18. - *dispar* Payk. Sehr häufig.
19. - *bipustulatus* F. Häufig.

### Cucujidae.

1. *Monotoma picipes* Ilbst. Sehr selten.

### Byturidae.

1. *Byturus rosae* Scop. Häufig.
2. - *sambuci* Scop. Häufig.

### Dermestidae.

1. *Dermestes lardarius* L. Häufig.
2. - *ater* Ol. Sehr selten.
3. *Attagenus pellio* L. Häufig.
4. *Anthrenus pimpinellae* F. Häufig.
5. - *scrophulariae* L. Ziemlich selten.
6. - *muscorum* L. Ziemlich selten.

### Cistelidae.

1. *Byrrhus ornatus* Panzer. Ziemlich selten.
2. - *pilula* L. Häufig.  
B. *albopunctatus* F. Seltener.
3. - *fasciatus* F. Seltener.  
B. *arietinus* Steff. Einmal gefunden.
4. - *pustulatus* Forster. Seltener.
5. *Cistela varia* F. Häufig.
6. *Simplocaria semistriata* F. Nicht häufig.

### Histeridae.

1. *Hister cadaverinus* Hoffm. ? Seltener.
2. - *distinctus* Er. Seltener.
3. - *neglectus* Germ. Nicht häufig.
4. - *purpurascens* Herbst. Ziemlich häufig.
5. *Onthophilus striatus* Forster. Häufig.

### Lucanidae.

1. *Systenocerus caraboides* L. Sehr selten.
2. *Sinodendron cylindricum* L. Einmal gefunden.

### Scarabaeidae.

1. *Onthophagus fracticornis* Preyssl. Seltener.
2. - *ovatus* L. Häufiger.

*Aphodius fessor* L. Nicht häufig.

♂ *sylvaticus* Ahr. Manchmal.

- *fimetarius* L. Gemein.

- *ater* Degeer. Nicht häufig.

- *granarius* L. Ebenso.

- *inquinatus* F. Sehr häufig.

- *tessulatus* Payk. Häufig.

- *prodromus* Brahm. Sehr häufig.

*Odontaeus armiger* Scop. Sehr selten.

*Geotrupes stercorarius* L. Sehr häufig. Sämtliche Exemplare nähern sich mehr oder weniger der Form spiniger Marsh.

- *sylvaticus* Panz. Häufig.

- *vernalis* L. Selten.

*Hoplia philanthus* Füssl. Häufig bei der Buchholzer Buche.

*Sericia brunnea* L. Nicht selten.

*Rhizotrogus solstitialis* L. Ziemlich selten.

*Melolontha vulgaris* F. Ganz selten.

*Phyllopertha horticola* L. Häufig.

*Cetonia aurata* L. Einmal gefunden.

*Gnorimus nobilis* L. Bei Wolfenstein, selten.

*Trichius fasciatus* L. Nicht häufig.

## Buprestidae.

*Anthaxia 4-punctata* L. Häufig.

*Agrius viridis* L. Selten.

- *coeruleus* Rossi. Sehr selten.

*Trachys minuta* L. Nicht häufig.

## Elateridae.

*Lacon murinus* L. Nicht häufig.

*Elater halteatus* L. Einmal erbaut.

*Cryptohypnus riparius* F. Nicht häufig.

- *dermestoides* Herbst ♂. 4-guttatus Scop. Ziemlich selten.

- *minutissimus* Germ. Sehr selten.

*Cardiophorus ruficollis* L. Sehr selten.

- *musculus* Er. Ebenso.

*Melanotus castanipes* Payk. Am Fichtelberg selten.

- *rufipes* Herbst. Nicht häufig.

*Limonius pilosus* Leske. Selten.

- *minutus* L. Nicht häufig.

- *parvulus* L. Ebenso.

- *aeneoniger* Degeer. Häufig.

14. *Athous porrectus* Thoms. }  
     ♂ *alpinus* Redtb. } Sehr häufig; darunter die  
     ♀ *scrutator* Hbst. }  
     ♂ *acneithorax* Desbr. } Häufig.
15. - *haemorrhoidalis* F. Häufig.
16. - *subfuscus* Müll. Häufig.
17. - *Zebei* Bach. Nicht häufig.
18. *Corymbites pectinicornis* L. Nicht selten.
19. - *cupreus* F. Ziemlich häufig.  
     ♀ *aeruginosus* F. Häufiger.
20. - *purpureus* Poda. Vereinzelt.
21. - *castaneus* L. Sehr selten.
22. - *sjaelandicus* Müll. Seltens.
23. - *serraticornis* Payk. Sehr selten.
24. - *quercus* Gyllh. Nicht selten; am Fichtelberg häufig.  
     ♀ *elytris testaceis* Kiesw. Ebenso, oft als dunkle Stücke.
25. - *tessellatus* L. Häufig.
26. - *aeneus* L. Häufig, darunter oft die ♀. *germanus* L.
27. *Agriotes aterrimus* L. Ziemlich selten.
28. - *pilosellus* Schh. Seltens.
29. - *sputator* L. Nicht häufig.
30. - *lineatus* L. Seltens.
31. - *obscurus* L. Sehr häufig.
32. - *pallidulus* Hl. Sehr selten.
33. *Dolopius marginatus* L. Häufig.
34. *Sericus brunneus* L. Seltens.
35. *Synaptus filiformis* F. Ziemlich häufig.
36. *Adrastus limbatus* F. Häufig.
37. - *pallens* F. Seltens.
38. *Denticollis linearis* L. Seltens

## Dascillidae.

1. *Dascillus cervinus* L. Nicht häufig.
2. *Heodes marginatus* F. Sehr selten.
3. *Cyphon coarctatus* Payk. Seltens.

## Cantharidae.

1. *Eros Aurora* Hbst Am Bierensteig, selten.
2. *Dictyoptera sanguinea* L. Bei Wiesenbad, selten.
3. *Lamprorhiza splendidula* L. Häufig.
4. *Podabrus alpinus* Payk. Seltens.
5. *Cantharis abdominalis* F. Seltens.
6. - *violacea* Payk. Häufiger.
7. - *fusca* L. Häufig.
8. - *rustica* Fall. Ebenso.

9. *Cantharis tristis* F. Nicht selten.
10. - *obscura* L. Häufig.
11. - *nigricans* Müll. Ebenso.
12. - *pellucida* F. Sehr häufig.
13. - *livida* L. Häufig.
14. - *rufa* L. Ebenso.
15. - *fulvicollis* F. Nicht selten.
16. - *haemorrhoidalis* F. Wie Vorige.
17. *Rhagonycha fuscicornis* Oliv. Seltener.
18. - *fulva* Scop. Gemein.
19. - *testacea* L. Sehr häufig.
20. - *pallipes* F. Ziemlich häufig.
21. - *elongata* Fall. Nicht selten.
22. - *atra* L. Seltener.
23. *Malthodes minimus* L. Seltener.
24. - *marginatus* Latr. Seltener.
25. - *brevicollis* Payk. Häufig.
26. *Malachius acneus* L. Nicht häufig.
27. *Anthocomus equestris* F. Seltener.
28. - *fasciatus* L. Häufig.
29. *Charopus flavipes* Payk. Einmal gefunden.
30. *Dasytes niger* L. Seltener.
31. - *plumbeus* Müller. Sehr häufig.
32. *Danaceae pallipes* Panz. Nicht häufig.

### **Cleridae.**

1. *Cleroides formicarius* L. Ziemlich selten.
2. *Corynetes coeruleus* Degeer. Nicht selten.

### **Bruchidae.**

1. *Niptus hololeucus* Falderm. In Häusern nicht selten.
2. *Bruchus (Ptinus) latro* F. Sehr selten.
3. - *dubius* Sturm. Seltener.
4. - *brunneus* Duft. Sehr selten.
5. - *fur* L. Häufig.

### **Byrrhidae.**

1. *Anobium domesticum* Fourer. Sehr häufig.
2. *Ernobius abietis* F. Nicht selten.
3. - *mollis* L. Ziemlich selten.
4. *Trypopitys carpini* Hbst. Einmal bei Wolfenstein gefunden.

### **Cisidae.**

1. *Cis boleti* Scopoli. Nicht häufig.
2. - *micans* F. Seltener.

3. *Cis hispidus* Payk. Nicht selten.
4. - *nitidus* Ilbst. Ebenso.
5. - *Octotemnus glabriculus* Gyllh. Häufig.

## Tenebrionidae.

1. *Gnathocerus cornutus* F. 2 Stück in Weizengebäck vorgefunden.
2. *Tenebrio molitor* L. Seltens.

## Alleculidae.

1. *Pseudocistela murina* L. Häufig.  
♂ *maura* F. Ebenso.  
♀ *evonymi* F. Ebenso.

## Lagriidae.

1. *Lagria hirta* L. Nicht selten.

## Anthicidae.

- 1 *Anthicus floralis* L. Seltens.

## Pyrochroidae.

1. *Pyrochroa coccinea* L. Sehr selten.
2. " *pectinicornis* L. Ebenso.

## Mordellidae.

1. *Mordellistena abdominalis* F. Bei Wiesenbad sehr selten.
2. *Anaspis frontalis* L. Sehr häufig.
3. - *ruficollis* F. Häufig.
4. - *rufilabris* Gyllh. Ebenso.

## Rhipiphoridae.

1. *Meteocles paradoxus* L. Einmal vorgekommen

## Meloidae.

1. *Meloë proscarabaeus* L. Nicht selten.

## Oedemeridae.

1. *Calopus serraticornis* L. Seltens.
2. *Oedemera femorata* Scop. Nicht häufig.
3. - *subulata* Oliv. Seltens.
4. - *flavipes* F. Nicht häufig.
5. - *virescens* L. Häufig.
6. - *lurida* Marsh. Häufig.

## Pythidae.

1. *Salpingus castaneus* Panz. Seltens.
2. *Rhinosimus planirostris* F. Etwas häufiger.

**Curculionidae.***Curculionitae.*

1. *Otiorrhynchus niger* F. Häufig.  
    *B. villosopunctatus* Gyllh. Ebenso.
2. - *morio* F. Häufig.  
    *B. ebeninus* Gyllh. Ebenso.
3. - *ravus* F. Seltener.
4. - *seaber* L. Sehr selten.
5. - *dubius* Sturm. Am Fichtelberg, selten.
6. - *singularis* L. Häufig.
7. - *Marquardti* Fald. Häufig.
8. - *lepidopterus* F. Nicht selten.
9. - *ligustici* L. Ziemlich selten.
10. - *ovatus* L. Ziemlich häufig.
11. *Peritelus hirticornis* Hbst. Nicht selten.
12. *Phyllobius glaucus* Scop. Häufig.  
    *B. alneti* F. Weit seltener.
13. - *psittacinus* Germ. Sehr häufig.
14. - *viridicollis* Germ. Gemein.
15. - *piri* L. Nicht häufig.
16. - *viridiaereis* Laich. Nicht selten.
17. *Polydrusus cervinus* L. Häufig.
18. *Strophosoma coryli* F. Nicht selten.
19. - *obesus* Marsh. Seltener.
20. *Sitoia flavescens* Marsh. Nicht selten.
21. - *sulcifrons* Thunberg. Häufig.
22. - *erinitus* Oliv. Nicht häufig.
23. - *lineatus* L. Häufig.
24. - *hispidulus* F. Ebenso.
25. *Trachyphloeus laticollis* Boh. Seltener.
26. *Liophloeus tesselatus* Bonsdorff. Ziemlich selten.
27. *Barynotus murinus* Bonsdorff. Seltener.
28. - *moerens* F. Seltener.
29. *Dactylorrhinus plagiatus* Schall. Seltener.
30. *Tropiphorus elevatus* Hbst. Sehr selten.

*Rhynchaenitae.*

31. *Alophus triguttatus* F. Seltener.
32. *Hypera oxalidis* Herbst. Sehr selten.
33. - *punctata* F. Nicht selten.
34. - *polygoni* F. Sehr selten.
35. - *suspiciosa* Herbst. Ebenso.
36. - *nigrirostris* F. Ziemlich häufig.
37. *Liparus germanus* L. Häufig.

38. *Liparus carinaerostris* Kst. Am Fichtelberg, ziemlich selten.  
 39. *Hylobius abietis* L. Häufig.  
 40. *Pissodes pini* L. Seltener.  
 41. *Eriophinus acridulus* L. Seltener.  
 42. *Dorytomus costirostris* Gyll. Häufig.  
 43. *Anoplus plantaris* Naezen. Nicht häufig.  
 44. *Magdalisa duplicata* Germ. Sehr selten.  
 45. - *nitida* Gyll. Seltener.  
 46. - *pruni* L. Nicht selten.  
 47. *Balaninus nucum* L. Seltener.  
 48. *Balanobius crux* F. Nicht selten.  
 49. - *brassicae* F. Ebenso.  
 50. *Anthonomus rubi* Herbst. Ziemlich häufig.  
 51. - *brassicae* F. Ebenso.  
 52. *Elleschus bipunctatus* L. Seltener.  
 53. *Mecinus piraster* Hbst. Einmal bei Wiesenbad unter Rinde gefunden.  
 54. *Gymnetron labile* Hbst. Sehr selten.  
 55. - *pilosum* Gyllh. Seltener.  
 56. *Cionus scrophulariae* L. Nicht selten.  
 57. *Orchestes populi* F. Sehr häufig.  
 58. - *salicis* L. Häufig.  
 59. - *stigma* Germ. Ziemlich selten.  
 60. - *foliorum* Müller. Häufig.  
 61. *Rhamphus flavicornis* Clairv. Häufig.  
 62. *Coeliodes rubicundus* Payk. Seltener.  
 63. *Cidnorrhinus 4-maculatus* L. Seltener.  
 64. *Orobites cyaneus* L. Sehr selten.  
 65. *Ceuthorrhynchidius troglodytes* F. Ziemlich selten.  
 66. - *floralis* Payk. Ebenso.  
 67. *Ceuthorrhynchus syrites* Germ. Ziemlich häufig.  
 68. - *marginatus* Payk. Ziemlich selten.  
 69. - *assimilis* Payk. Nicht häufig.  
 70. - *cochleariae* Gyllh. Seltener.  
 71. - *quadridens* Panz. Seltener.  
 72. - *sulcicollis* Payk. Nicht häufig.  
 73. *Calandra granaria* L. Einmal in Menge im Gerichtsgebäude.  
 74. *Cossonus linearis* F. Seltener.  
 75. *Stereocorynes truncorum* Germ. Seltener.  
 76. *Rhyncolus cylindricus* Boh. Seltener.

## Apionidae.

1. *Apion pubescens* Kirby. Seltener.
2. - *apricans* Herbst. Häufig.
3. - *assimile* Kirby. Häufig.
4. - *flavipes* F. Ebenso.

5. *Apion virens* Herbst. Nicht häufig.
6. - *punctigerum* Thunbg. Seltener.
7. - *columbinum* Germ. Nicht selten.
8. - *frumentarium* L. Seltener.
9. - *sedi* Germ. Ziemlich selten.

## Rhynchitidae.

1. *Rhynchites cupreus* L. Nicht selten.
2. - *planirostris* F. Sehr häufig.
3. - *betulae* L. Ziemlich häufig.
4. *Rhinomacer populi* L. Häufig.

## Anthribidae.

1. *Anthribus varius* F. Häufig.

## Hylesinidae.

1. *Hylastes cunicularius* Er. Häufig.
2. - *palliatus* Gyllh. Häufig.
3. *Mycelophilus piniperda* L. Ziemlich selten.
4. *Hylesinus fraxini* F. Seltener.

## Scolytidae.

1. *Scolytus pruni* Ratzeb. Seltener.

## Tomicidae.

1. *Crypturgus pusillus* Gyllh. Häufig.
2. *Tomicus laricis* F. Nicht häufig.
3. - *curvidens* Germ. Seltener.
4. *Dryocoetes autographus* Ratzeb. Häufig.
5. *Trypodendron lineatum* Ol. Häufig.
6. - *domesticum* L. Sehr selten.

## Cerambicydae.

### Anaulacnemitae.

1. *Stenocorus bifasciatus* F. Sehr selten.
2. " *inquisitor* L. Seltener.
3. *Oxymirus cursor* L. Seltener.
4. *Brachyta clathrata* F. Im Mitteleidathal, darunter auch die  
V. *nigrescens* Gredl.
5. *Pachyta quadrimaculata* L. Ziemlich selten.
6. *Gaurotes virginea* L. Seltener.
7. *Acmaeops collaris* L. Ziemlich häufig.
8. *Leptura livida* F. Sehr häufig.
9. - *rubra* L. Nicht häufig.
10. - *cerambyciformis* Schrank. Häufig.
11. - *chrysomeloides* Schrank. Ziemlich selten.
12. - *aethiops* Poda. Ebenso.
13. - *melanura* L. Häufig.

12. Molorchus minor L. Nicht häufig.
13. - minimus Scop. Sehr selten.
14. Obrium brunneum F. Häufig.
15. Tetroptium luridum L. Häufig.  
    *B. aulicum* F.  
    *B. fuleratum* F. Diese Form am häufigsten.
16. - fuscum F. Selten.
17. Callidium violaceum L. Nicht selten.
18. Hylotrupes bajulus L. Bei Wolfenstein selten.
19. Aromia moschata L. Sehr selten; seit Jahren nicht mehr beobachtet.

*Metaulacnemitae.*

20. Ponochaerus fasciculatus Degeer. Sehr selten.
21. Lamia textor L. Sehr selten.
22. Saperda populnea L. Nicht häufig.
23. - carcharias L. Ziemlich selten.
24. Tetrops praeusta L. Selten.
25. Oberea oculata L. Ziemlich selten.

**Chrysomelidae.***Eupoda.*

1. Orsodacna cerasi L. Sehr selten bei Wiesenbad.
2. Donacia simplex F. Selten.
3. - thalassina Germ. Selten.
4. Plateumaris sericea L. Selten.
5. - consimilis Schrank. Häufig.
6. Zeugophora subspinosa F. Sehr selten.
7. - flavicollis Marsh. Häufig.
8. Lema lichenis Voet. Nicht häufig.
9. - melanopa L. Selten.
10. Crioceris merdigera L. Selten.

*Camptosomata.*

11. Clytra 4-punctata L. Ziemlich selten.
12. Cryptocephalus 8-punctatus Scop. Selten
13. - sexpunctatus L. Sehr selten.
14. - bipunctatus L. Ziemlich selten.
15. - aureolus Suffr. Nicht häufig
16. - hypocoeridis L. Ebenso.
17. - nitidulus F. Selten.
18. - nitidus L. Selten.
19. - parvulus Müll. Sehr selten.
20. - marginatus F. Einmal gefunden.
21. - pini L. Sehr selten.
22. - flavipes F. Häufig.
23. - chrysopus Gmel. Selten.

24. *Cryptocephalus labiatus* L. Ziernlich häufig; darunter oft die *V.*  
*exilis* Steph.  
25. - *Moraei* L. Häufig.

*Cyclica.*

26. *Adoxus obscurus* L. Nicht häufig.  
27. *Gastroidea polygoni* L. Ebenso.  
28. *Timarcha metallica* Laich. Ziernlich selten.  
29. *Chrysomela rufa* Duft. Seltener  
30. - *haemoptera* L. Häufig.  
31. - *staphylea* L. Häufig.  
32. - *limbata* F. Seltener.  
33. - *goettingensis* L. Sehr selten.  
34. - *analis* Panz. *V. lomata* Hbst. Nicht häufig.  
35. - *oricaleia* Müller. Sehr selten.  
36. - *geminata* Payk. Nicht selten.  
37. - *cerealis* L. Ebenso.  
38. - *varians* Schaller. Ziernlich häufig.  
39. - *fastuosa* L. Ebenso.  
40. - *graminis* L. Ziernlich selten.  
41. - *polita* L. Seltener.  
42. *Orina alpestris* Schumm. *V. polymorpha* Kr. Am Haßberg.  
43. - *cacalia* Schrank. *V. senecionis* Schumm. Häufig.  
44. - *speciosissima* Scop. Häufig; darunter ziernlich selten *V. Letzneri* Weise.  
45. *Phytodecta viminalis* L. Häufig.  
46. - *5-punctata* F. Häufig; vorwiegend ist die *V. flavi-collis* Duft.  
47. *Phyllodecta vulgarissima* L. Nicht häufig.  
48. - *laticollis* Suffr. Häufig.  
49. - *vitellinae* L. Ebenso.  
50. *Hydrothassa aucta* F. Nicht häufig.  
51. - *marginella* L. Ziernlich selten.  
52. *Prasocuris phellandrii* L. Seltener.  
53. *Phaedon cochleariae* F. Nicht selten  
54. *Plagiodesma versicolora* Laich. Ziernlich selten.  
55. *Melasoma aenea* L. Nicht häufig; in mehreren Färbungen.  
56. - *populi* L. Ziernlich häufig.  
57. - *tremulae* F. Ebenso.  
58. *Lochmaea capreae* L. Nicht selten.  
59. *Trirhabda viburni* Payk. Ebenso.  
60. *Galerucella lineola* F. Häufig.  
61. *Galeruca tanaceti* L. Gemein.  
62. - *pomonae* Scop. Seltener.  
63. *Crepidodera femorata* Gyll. Sehr selten.

64. Crepidodera nitidula L. Nicht häufig.  
 65. - Modeeri L. Sehr selten.  
 66. - ferruginea Scop. Häufig.  
 67. Mantura rustica L. Sehr selten.  
 68. Chaetocnema concinna Marsh. Häufig.  
 69. - aridula Gyll. Seltens.  
 70. - hortensis Fourer. Häufig.  
 71. Psylliodes chrysoccephala L. Nicht häufig.  
 72. - affinis Payk. Seltens.  
 73. - cucullata Ill. Nicht selten.  
 74. Haltica oleracea L. Häufig.  
 75. Batophila rubi Payk. Häufig.  
 76. Phyllotreta flexuosa Ill. Seltens.  
 77. - nemorum L. Häufig.  
 78. - vittula Redt. Häufig.  
 79. - aterrima Schrank. Seltens.  
 80. - nigripes F. Häufig.  
 81. Aphthona cyparissiae Koch. Seltens.  
 82. Longitarsus anchusae Payk. Seltens.  
 83. - apicalis Beck. Sehr häufig.  
 84. - brunneus Duft. Häufig.  
 85. - tabidus F. Seltens.  
 86. - atricillus L. Ebenso.  
 87. - melanocephalus Deg. Ebenso.  
 88. - pusillus Gyll. Häufig.  
 89. - laevis Duft. Nicht selten.  
 90. Apteropeda orbiculata Marsh. Seltens.  
 91. Sphaeroderma cardui Gyll. Seltens.  
 92. Hispa atra L. Sehr selten.  
 93. Cassida vibex L. Seltens.  
 94. - nebulosa L. Seltens.  
 95. - viridis L. Seltens.

## Coccinellidae.

1. Hippodamia tredecimpunctata L. Sehr selten.
2. - septemmaculata Deg. Ebenso.
3. Adonia variegata Goeze. Sehr selten.
4. Adalia obliterata L. Nicht selten.
5. - bothnica Payk. Seltens.
6. - bipunctata L. Gemein; sehr oft auch die B. 6-punctata L. (4-pustulata Scop.).
7. Coccinella 7-punctata L. Gemein.
8. - 5-punctata L. Ziemlich selten.
9. - 10-punctata L. Häufig.
10. - 14-pustulata L. Nicht häufig.

— 99 —

11. *Mysia oblongoguttata* L. Nicht häufig.
  12. *Halyzia ocellata* L. Häufig.
  13. - *10-guttata* L. Selten.
  14. - *18-guttata* L. Ziemlich selten.
  15. - *14-guttata* L. Selten.
  16. - *conglobata* L. Ill. Häufig.
  17. *Subcoccinella 24-punctata* L. Häufig.
  18. *Coccidula scutellata* Herbst. Selten.
  19. *Chilocorus similis* Rossi. Ziemlich selten.
  20. - *bipustulatus* L. Häufig.
  21. *Scymnus ferrugatus* Moll. Selten.
  22. - *suturalis* Thunbg. Häufig.
  23. - *abietis* Payk. Nicht selten.
- 

Nach vorstehendem Verzeichnisse sind in dem Annaberger Gebiete bis jetzt 819 Arten von Käfern aufgefunden worden, die zu 59 verschiedenen Familien gehören.

---



Seemann aus einer fliegenden Schaar Enten allein niedergeschossen worden, zu einer Zeit, wo nach langem Froste durch das eingefallene Thauwetter sich bercits im Eise stellenweise offenes Wasser zeigte und die hier überwinternten, verschiedenen nordischen Enten zum Theil ihre Abreise begannen und andere durchzogen.

Mein Ex. stimmt sonst ganz mit dem bei Kjärbölling abgebildeten alten Männchen, nur dass die schön dunkelgrüne Farbe des Oberkopfes sich bei diesem gleichfarbig von der Schnabelwurzel über denselben bis zum Hinterkopf erstreckt, während sie bei dem meinigen durch einen weissen Streifen unterbrochen wird, der zwischen Schnabelwurzel und Auge einen halben Centimeter breit beginnend, nach oben etwas breiter werdend, quer zwischen Stirne und Scheitel über den Kopf zur entgegengesetzten Seite geht, so dass dadurch die grüne Haube in 2 Theile getrennt wird.

Franz Schmidt.

---

Berichtigungen.

---



Seite 81 Z. 3 nach limbatus F. fehlt: Häufig.

- 88 Z. 10 v. u. anstatt distinctus Er. lies carbonarius Illig.
  - 96 Z. 12 v. o. anstatt Ponochaerus lies Pogonochaerus.
-

# ZOBODAT -

## **www.zobodat.at**

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical  
Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Bericht des Annaberg-Buchholzer  
Vereins für Naturkunde](#)

Jahr/Year: 1886

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Lange C.

Artikel/Article: [Verzeichniss der in der Umgebung  
Annabergs beobachteten Käfer 76-99](#)

