

Adenophora liliifolia Bess. Oels: Klein-Mühlatschütz; erster Fundort auf dem rechten Oderufer.

Lithospermum officinale L. Trachenberg: Laubwald vor Kendzie; auf der rechten Oderseite sehr selten.

Orobanche rubens Wallr. Winzig: Gross-Strenz; in Niederschlesien rechts der Oder selten; *O. Kochii* F. Schultz Myslowitz: Imielin; zweiter Standort.

Rumex alpinus L. Waldenburg: bei Freudenburg; neu für das Waldenburger Gebirge, ob aber wild?; *R. crispus* × *sanguineus* (*R. Sagorskii* Hausskn.) Liegnitz: Lindenbusch; *Polygonum minus* × *Persicaria* Liegnitz: Lindenbusch; zwischen Pohnitz und Liebenau.

Salix Caprea × *silesiaca* Eulengebirge: Hoher Hahn bei Leutmannsdorf.

Orchis mascula L. im Gesenke (östlich vom Haidebrünnel) bis gegen 1300 m steigend; *Listera cordata* R. Br. Bunzlau: Greulicher Bruch; erster Standort in der Ebene; *Malaxis paludosa* Sw. Bunzlau: Greulicher Bruch; zweiter Standort.

Allium Victorialis L. Barania; zweiter Standort in den Schlesischen Karpathen.

Juncus glaucus Ehrh. var. *pallidus* Sonder Wohlau: Tschöplau; Breslau: Protsch gegen Oswitz.

Carex pauciflora Ligthf. Bunzlau: Greulicher Torfbruch; zweiter Standort in der niederschlesischen Ebene; *C. ericetorum* Poll. Strehlen: Lemberg bei Geppersdorf; in Mittel- und Oberschlesien links der Oder selten; *C. flava* × *Hornschuchiana* (*C. xanthocarpa* Degl.) Langenbielau: Herrleberg; Oppeln: Königl. Neudorf, Lenkau bei Leschnitz; *C. rostrata* × *vesicaria* (*C. Friesii* Blytt) Breslau: Heidewilxen.

VI. Obersächsisches Gebiet.

Berichterstatter: A. Naumann.

Quellen:

a) Litteratur:

1. O. Wünsche, Beiträge zur Flora von Sachsen (Jahresbericht des Vereins für Naturkunde zu Zwickau 1891, S. 13—21). 2. E. Fiek und T. Schube, Schles. Phanerog. 1891 (69. Ber. d. schles. Ges. s. Allg. 7). 3. Schlimpert, Die Flora von Meissen in Sachsen (Deutsche bot. Monatsschrift IX., S. 161—164, 186—188; X.,

S. 24—28, 90—93). **4. P. Ascherson**, Ueber Anemone-Formen (Verh. d. Bot. Ver., der Prov. Brandenburg XXXIII, S. XVIII—XXII). **5. K. Reiche** in Isis, Sitzungsberichte 1889, S. 26. **6 a. C. L. König**, *Pinus montana* Mill. in der sächsisch-böhmischen Oberlausitz nicht spontan (Isis. Abhandlungen 1891, S. 106—109). **6 b. V. von Borbás**, in Koch-Wohlfarth, Synopsis, 3. Auflage s. Allg. ggg). **6 c. P. Ascherson**, *Veronica camp.* (Oest. Bot. Zeitschr. XLIII, s. Allg. e).

Zu berichtigen: Im vorjährigen Bericht muss es im Litteraturnachtrag aus 1886—1889 sub 3 c heissen: **M. Rostock**, Phanerogamenflora von Bautzen und Umgegend (a. a. O, 1889, S. 3—25).

b) Unveröffentlichte Beobachtungen von:

6 d. Prof. **P. Ascherson** in Berlin. **7 a.** Lehrer **E. Barber** in Görlitz. **7 b.** Amtsvorsteher **E. Fiek** in Cunnersdorf. **8.** **Felix Fritsche** in Kötzschenbroda. **9 a.** Bürger-schullehrer **A. Naumann** in Zwickau. **9 b.** Prof. **J. Schmalhausen** in Kiew. **10.** dem **Berichterstatter**.

Vgl. auch Allg. No. 38.

Abkürzungen:

A = Anhalt; L = Preussische Oberlausitz; PS = Provinz Sachsen.

Neu für das Gebiet:

Hypericum Elodes L. L Hoyerswerda: zwischen Kühnicht und der Seidewinkler Heide, in einem Graben fluthend [2], auch südlich und nördlich von Kühnicht an mehreren Stellen [7].

Rosa Jundzilli Bess. Meissen: Bosel und Ziegenbusch bei Oberau [8].

Cirsium eriophorum Scop. Erzgebirge: bei Elterlein [5].

Veronica Dillenii Crtz. (vgl. 6 c = *V. verna* var. *V. succulenta* All. Rchb. Fl. germ. exc. p. 366), (Dresden) PS Bitterfeld: Pouch [9 b]; A Dessau [7 b]; L Niesky [6 d]; Hoyerswerda [7 b].

Mentha aquatica × *silvestris* (*M. nepetoides* Lej.) Königsbrück: Reichenbach an der Pulsnitz [1].

Orchis incarnata × *latifolia* (*O. Aschersoniana* Hausskn.) L Gör-litzer Heide: Tschirnewiesen [2].

Carex rigida Good. auf dem Fichtelberg im Erzgebirge [1].

Zu berichtigen: *Dianthus alpinus* f. *Lipsiensis* O. Kuntze vom Spitzberg bei Wurzen gehört vermuthlich zu *D. Carthusianorum* L. [6 b].

Neu eingeschleppt bzw. verwildert:

Sisymbrium Columnae Jacq. Dresden: Neustädter Elbufer [1].

Silene gallica L. var. *S. anglica* L. Löbau: am Fusse des Strohm-berges bei Weissenberg [1].

Vicia melanops S. S. und *V. pannonica* Cr. var. *V. striata* M. B. Dresden: auf einem Kartoffelfelde der Hoflössnitz [8].

Centaurea nigra L. Bautzen: b. Rachlau [1].

Hordeum jubatum L. Dresden: Berliner Bahnhof seit 1888 [1].

Wichtigere neue Fundorte:

Thalictrum flavum L. Meissen: auf den Folgewiesen vor d. Auer [3]; L Ruhland [1]; *Anemone nemorosa* × *ranunculoides* (*Anemone intermedia* Winkler) A. Lug zw. Gohrau und Koswig [4]; † *Helleborus niger* L. Meissen: im Pfarrgarten in Kölln [3]; † *H. foetidus* L. Lommatzsch: in der Umgebung von Reissigs Park [3].

† *Papaver hybridum* L. Meissen: bei Sebschütz und Piskowitz (neu für den Dresdener Kreis) [3].

Barbarea stricta Andr. L Hoyerswerda [2].

Drosera anglica Huds. Radeburg: Torfwiesen bei Zschoma [1]; Karlsfeld auf dem Kranichseemoor [10].

Geranium sanguineum L. Löbau: an den Kottmarhäusern [1].

† *Ulex europaeus* L. Löbau: Maltitz [1]; *Cytisus nigricans* L. L Niesky: Radischer Dubrau; Station Mücka [2]; *Vicia villosa* Roth † Dresden: Berliner Bahnhof; Kamenz: bei Wohla [1].

† *Rosa lutea* Mill. Dresden: Niederlössnitz, als Reste früherer Anpflanzungen; † *R. pomifera* Herrm.; *R. canina* L. var. *lutetiana* Lem. Dresden: i. d. Lössnitz verbreitet; var. *dumalis* Bechst. Dresden: i. d. Lössnitz verbreitet [8]; Löbauer Berg [1]; *R. glauca* Vill. Dresden: i. d. Lössnitz verbreitet; Löbauer Berg [1]; *R. graveolens* Gren. Meissen: a. d. Bosel, Dresden: Niederlössnitz [8]; *Rubus thyrsoideus* Wimm. L Niesky: zw. Hartha und Diehsaer Oberwald in und bei Thräna [2]; *R. Idaeus* L. var. *denudatus* Spenn. L Hoyerswerda zw. Neuwiese u. d. Fasanengarten; Tiefenfurt [2]; *Potentilla arenaria* Bork. Lommatzsch [1]. † *Spiraea opulifolia* L. L Görlitz: Neisseufer oberhalb der Tischbrücke [2]; *Pirus torminalis* Ehrh. Gottleuba: bei Hellendorf [1].

Hippuris vulgaris L. Meissen; im Graben am Steinbacher Teich [3].

Sedum purpureum Schult. Pirna: bei Hellendorf [1].

Helosciadium inundatum Koch L Hoyerswerda: in den Abflussgräben des Diskalteiches bei Kühnicht, des Burger und Seidewinkler Amtsteiches, auch f. *fluitans* Fr. (*homophylla* Rchb.) [2].

† *Galium saccharatum* All. Dresden: Berliner Bahnhof [1].

Valeriana sambucifolia Mik. Radeberg: Röderufer; Pirna: bei Markersbach [1].

† *Achillea nobilis* L. Zwickau: Bahndamm bei Crossen [9]; † *Matricaria discoidea* DC. L Görlitz: Bahnhofsterrain und Sattigstrasse völlig eingebürgert; Dorfstrasse in Leschwitz [2]; † *Doronicum Pardalianches* L. Meerane: Park zu Hainichen [1]; *Lactuca quercina* L. das Vorkommen am Birkwitzer See b. Pirna ist fraglich [1].

Vaccinium Myrtillus × *Vitis idaea* (*V. intermedium* Ruthe) Sayda im Erzgebirge: Voigtsdorf [1]; neu für das Kgr. Sachsen.

Solanum nigrum L. var. *S. alatum* Mnch. L Hoyerswerda: Dorfstrasse in Bergen (neu für L) [2].

Linaria spuria Mill. Dresden: bei Grossröhrsdorf unweit Kreischa [1].

Mentha gentilis L. var. *M. sativa* L. L Hoyerswerda: Graben i. d. Pinka [2]; *Salvia verticillata* L. und *S. silvestris* L. † Zwickau: Bahndamm bei Crossen [9]; *Thymus Serpyllum* L. var. *T. pannonicus* All. Pirna: bei Markersbach; Hellendorf; Berggiesshübel [1].

Utricularia neglecta Lehm. L Hoyerswerda: in Gräben bei der Abdeckerei, am Seidewinkler Amtsteich u. s. w. [2].

† *Rumex scutatus* L. Meissen: Steinbruch bei Sörnwitz [3]; † *Polygonum cuspidatum* Sieb. et Zucc. Königstein: bei Schweizermühle im Coniferengarten [1].

† *Urtica pilulifera* L. war um Meissen verschwunden, ist aber ins Gebiet durch Aussaat wieder eingeführt [3].

Salix viminalis × *purpurea* (*S. rubra* Huds.) Meissen: an den Elb-ufem zerstreut [3]; *S. cinerea* × *repens* Wimm. L Hoyerswerda: Spremberger Chausee gegenüber dem Amtsteich [2].

Goodyera repens R. Br. L Hoyerswerda: Kiefernwald am Mönnteiche [2]; *Cypripedium Calceolus* L. zwischen Berggiesshübel u. Gross-Cotta [1].

Leucium aestivum L. zwischen Ostritz und Blumenberg noch zu finden [1].

Juncus Tenageia Ehrh. L Hoyerswerda: am Abfluss des Diskalteiches bei Kühnicht [2].

Carex Buxbaumii Wahlenb. Zittau: zwischen Reichenau u. Wald, am Kahlenberge bei Markersdorf [1].

Glyceria plicata Fr. Meissen: im Zschendorfer Graben [3]; *Bromus erectus* Huds. Meissen: Schlossberg in Scharfenberg; Weinbergmauern von Crasso [3]; *Lolium remotum* Schrk. Meissen: unter Flachs [3].

Pinus montana Mill. an allen aus der sächsisch-böhmischen Oberlausitz bekannten Standorten nicht spontan [6].

VII. Hercynisches Gebiet.

Berichterstatter: K. Haussknecht.

Quellen:

a) Litteratur:

1. O. Appel, Krit. Pflanzen v. Coburg (Mitth. Thür. Bot. Ver. N. F. ¹) Heft I, siehe Allg. c). 2. P. Ascherson in Verh. Bot. Ver. Brandenb. XXXIII, S. XLVII, XLVIII. 3 a. P. Ascherson, Veronica camp. (Oest. Bot. Zeitschr. LXIII, s.

1) Weiterhin BVT abgekürzt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1892

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Naumann Alexander

Artikel/Article: [Obersächsisches Gebiet 1078-1081](#)