

Mentha gentilis L. var. *M. sativa* L. L Hoyerswerda: Graben i. d. Pinka [2]; *Salvia verticillata* L. und *S. silvestris* L. † Zwickau: Bahndamm bei Crossen [9]; *Thymus Serpyllum* L. var. *T. pannonicus* All. Pirna: bei Markersbach; Hellendorf; Berggiesshübel [1].

Utricularia neglecta Lehm. L Hoyerswerda: in Gräben bei der Abdeckerei, am Seidewinkler Amtsteich u. s. w. [2].

† *Rumex scutatus* L. Meissen: Steinbruch bei Sörnwitz [3]; † *Polygonum cuspidatum* Sieb. et Zucc. Königstein: bei Schweizermühle im Coniferengarten [1].

† *Urtica pilulifera* L. war um Meissen verschwunden, ist aber ins Gebiet durch Aussaat wieder eingeführt [3].

Salix viminalis × *purpurea* (*S. rubra* Huds.) Meissen: an den Elb-ufem zerstreut [3]; *S. cinerea* × *repens* Wimm. L Hoyerswerda: Spremberger Chausee gegenüber dem Amtsteich [2].

Goodyera repens R. Br. L Hoyerswerda: Kiefernwald am Mönnteiche [2]; *Cypripedium Calceolus* L. zwischen Berggiesshübel u. Gross-Cotta [1].

Leucium aestivum L. zwischen Ostritz und Blumenberg noch zu finden [1].

Juncus Tenageia Ehrh. L Hoyerswerda: am Abfluss des Diskalteiches bei Kühnicht [2].

Carex Buxbaumii Wahlenb. Zittau: zwischen Reichenau u. Wald, am Kahlenberge bei Markersdorf [1].

Glyceria plicata Fr. Meissen: im Zschendorfer Graben [3]; *Bromus erectus* Huds. Meissen: Schlossberg in Scharfenberg; Weinbergmauern von Crasso [3]; *Lolium remotum* Schrk. Meissen: unter Flachs [3].

Pinus montana Mill. an allen aus der sächsisch-böhmischen Oberlausitz bekannten Standorten nicht spontan [6].

VII. Hercynisches Gebiet.

Berichterstatter: K. Haussknecht.

Quellen:

a) Litteratur:

1. O. Appel, Krit. Pflanzen v. Coburg (Mitth. Thür. Bot. Ver. N. F. ¹) Heft I, siehe Allg. c). 2. P. Ascherson in Verh. Bot. Ver. Brandenb. XXXIII, S. XLVII, XLVIII. 3 a. P. Ascherson, Veronica camp. (Oest. Bot. Zeitschr. LXIII, s.

1) Weiterhin BVT abgekürzt.

Allg. e). 3 b. P. Ascherson und P. Magnus, Hellfr. Vaccinien (Zool. Bot. Ges. Wien XLI, s. Allg. f). 4. Th. Beling, Sechster Beitrag zur Pflanzenkunde des Harzes (Deutsche Bot. Monatschr. IX¹), S. 189). 5. K. Haussknecht in BVT I, S. 18. 6. K. Haussknecht, Pflanzengesch. u. s. w. Besprechungen und Beitr. (BVT II (1892) s. Allg. y). 7. Lübben a. a. O., S. 15. 8. Osswald a. a. O., S. 14, 15. 9. Petry a. a. O. S. 15, 16. 10. Reinecke a. a. O. (s. Allg. ss). 11. Rottenbach a. a. O. S. 7, 10. 12. Rudolf a. a. O. S. 15. 13a. E. Sagorski, Potentilla-Bastarde (DBM s. Allg. uu). 13 b. E. Sagorski, Floristisches u. s. w. (a. a. O. s. Allg. vv). 14. M. Schulze, Jena's Orchideen (BVT I, s. Allg. bbb); 15. M. Schulze, in BVT II, S. 8 bis 10. 16. E. Torges a. a. O. S. 13. 14. 17. E. Torges (s. Herc. Gebiet 1890, No. 14.). 18. H. Zabel in BVT II, S. 16.

Anhang.

19. Dr. L. Bliedner, Flora von Eisenach. Für Schulen und zum Selbstunterricht. Eisenach bei H. Kahle, 1892. 20. G. Lutze, Flora von Nordthüringen. Mit Bestimmungstabellen zum Gebrauche auf Excursionen, in Schulen und beim Selbstunterricht. Sondershausen bei Fr. A. Eupel. 1892. (Beide Werke blieben hier unberücksichtigt, da bemerkenswerthe Funde bereits früher mitgetheilt worden sind).

b) Unveröffentlichte Mittheilungen von:

21. Seminarlehrer F. Alpers in Hannover. 22. Apotheker K. Beckmann in Hannover. 23. Rittmeister a. D. O. v. Seemen in Berlin (sämtlich durch Prof. P. Ascherson).

Vgl. auch Allg. No. 1, 2, 7, 8, 15, 21, 26, 29, 31, 34, 38, 44—46, 51, 56, 59, 61, 66, 70—72, 86, sowie Schw (*Carex Vimariensis* Hausskn.).

Neu für das Gebiet:

Veronica Dillenii Crtz. Harz: Bodethal; Frankfurt a. M. [3 a].

Sparganium neglectum Beeby Kassel: Schönfeld [23].

Carex remota × *canescens* (*C. Arthuriana* Beckm.) Hannover: Eilenriede zw. List und Pferdethurm 1846 leg. PREUSS [22].

Calamagrostis varia Lk. f. *holciformis* Torg. Walkenried am Harz [17]; Steinberg bei Keilhau [16].

Neu eingeschleppt oder verwildert:

Sinapis dissecta Lag. [s. Ber. über 1888 S. (129)] Bett der Apfelstedt b. Tambach [6]; *Draba nemorosa* L. Hannover: Döhrener Wollwäscherei [21].

Potentilla intermedia L. var. *P. Heidenreichii* Zimm. Bahndämme bei Nordhausen [8]; *P. Nestleriana* Tratt. Erfurt: Löberfeld [10].

Solanum triflorum Nutt.²) Hannover: Döhrener Wollwäscherei [21].

Alnus viridis DC. Schmalwassergrund bei Dietharz [6].

1) Weiterhin DBM abgekürzt.

2) Dieselbe Art ist auch SH bei Hamburg, s. S. (86) und OR im Hafengebiet von Mannheim 1892 (BÄHR)! beobachtet worden. P. ASCHERSON.

Wichtigere neue Fundorte:

Batrachium hederaceum Dumort. Salzungen: Bach in Allendorf [6];
B. aquatile Dum. a) *truncatum* Koch und b) *quinquelobum* Koch Jena:
Fröhliche Wiederkunft [15]; *Aconitum Napellus* L. an der Oechse
bei Völkershausen [11].

† *Brassica elongata* Ehrh. und † *B. lanceolata* Lange Bahndamm
bei Schmalkalden [6].

Polygala depressa Wend. Jena: Fröhliche Wiederkunft [15].

Dianthus caesius Sm. Schmalkalden: Porphyrfelsen bei Asbach [6];
Vaccaria parviflora Mnch. † var. *V. grandiflora* Jaub. et Sp. Bett der
Apfelstedt bei Tambach [6]; † *Silene dichotoma* Ehrh. Witzenhausen:
Kleefelder bei Elbingerode [18].

Linum tenuifolium L. Nordhausen: am Kohnstein; Rabenthal bei
Seega [9].

† *Ulex europaeus* L. Koburg: Hohenstein [1]; *Ervum monanthos* L.
Sandfelder zwischen Salzungen und Allendorf [6]; *Lathyrus Nissolia* L.
Kassel: Hirschstein bei Elgershausen [18].

Prunus avium × *Cerasus* Weimar; Sulza; Kösen; Naumburg; Oster-
feld; Preilipper Kuppe bei Rudolstadt [6]; *Rubus caesius* × *tomentosus*
Koburg: Löbleinstein; *R. caesius* × *Idaeus* Koburg: Seidmannsdorf
[1]; *R. macrophyllus* W. et N. Göttersitz bei Kösen [13b]; † *Potentilla*
pilosa Willd. Neustadt a. d. Heide [1]; *P. alba* × *sterilis* (*P. hybrida*
Wallr.) Aschersleben; Selkethal; Derenburg und sonst am Oberharz;
Allstedt; Eisleben; Mühlhausen [13a].

Epilobium Lamyi F. Schultz Lutter am Barenberge [4]; Koburg:
Fuchsberg bei Neida [1]; *E. parviflorum* × *montanum* (*E. limosum*
Schur) Stirn bei Hildburghausen [1]; *E. montana* × *palustre* (*E. mon-*
taniforme Kn.) Jena: St. Gangloffter Wald [15]; *Trapa natans* L.
† Koburg: Schlossteich bei Ketschendorf [1].

Lonicera Periclymenum L. Die in Thüringen angegebenen Stand-
orte beziehen sich auf die daselbst einheimische [? P. ASCHERSON]
L. Caprifolium L. [5].

Petasites albus Gaertn. Koburg: zwischen Lauterburg und Herren-
berg [1]; † *Telekia speciosa* Baumg. Meiningen [11]; Schlossteich bei
Fröhliche Wiederkunft [15]; *Achillea nobilis* L. Erfurt [9]; *Carduus*
defloratus × *nutans* (*C. Brunneri* A. Br.) Jena: Fürstenbrunnen [15];
† *Centaurea Jacea* × *nigrescens* Erfurt; Kleefelder [10]; *Taraxacum*
corniculatum × *officinale* Jena: Remderoda [15]; *T. officinale* × *pa-*
lustre Gembdethal [15]; *Hieracium pratense* Tausch Koburg: Bauerfeld;
Gestungshausen [1].

Campanula Cervicaria L. Weissenberg bei Winterstein [7].

Vaccinium Myrtillus L. var. *leucocarpum* Dumort. Halle; Bibra;
Eckartsberga; Wiehe; in der Schmücke; Kyffhäuser; Ruhla; Büdingen;

Reinhardswald; Solling; Braunschweig: Beyenrode; Hannover: Misburg [3 b]; *Pirola media* Sw. Koburg: Bausenberge; Scherneck-Hohenstein; Wohlbach [1]; *Chimophila umbellata* Nutt. Koburg: zwischen Ahorn und Wüstenahorn [1].

Pulmonaria azurea × *obscura* Erfurt: Wanderslebener Holz [10].

Scrofularia umbrosa Dumort. var. *S. Neesii* Wtg. bei Koburg häufig [1]; *Linaria arvensis* Desf. Sandhügel bei Salzungen [6]; † *L. striata* DC. Nordhausen: Ufer der Zorge [8]; *Alectorolophus angustifolius* Heynh. (vgl. jedoch Allg. No. 43) Schmalkalden: Wiesen bei Asbach [6].

Mentha rotundifolia L. Sophienhütte an der Tölle bei Staufenburg [4] bezieht sich wohl auf *M. nemorosa* Willd.; *M. nepetoides* Lej. am Nettebache bei Bilderlahe und Gr. Rhüden [4]; *Chaeturus Marrubiastrum* Rchb. Halle: Neu-Ragoczy bei Brachwitz [6]; *Brunella alba* Pall. Allerthal zw. Walbeck und Weferlingen [2]; *Ajuga pyramidalis* L. Stirn bei Hildburghausen [1]; *A. genevensis* × *reptans* (*A. hybrida* Kern. und *A. breviproles* Borb.) Koburg: Oberlauter, Gestungshausen [1].

Lysimachia vulgaris L. a. *villosa* G. F. Koch häufig bei Jena; b. *glandulosa* ej. bei Mörsdorf [15].!

Viscum album L. var. *hyposphaerospermum* Keller f. *latifolia* (s. Allg. Nr. 63) Koburg: auf Weisstannen, ebenso bei Ebersdorf [1].

Alnus glutinosa × *incana* Koburg: Neuhof; Festungsberg [1].

Salix daphnoides Vill. Koburg: Hohenstein: *S. aurita* × *cinerea* Koburg: Wildbahn; Tremersdorf; *S. Caprea* × *aurita* (*S. Capreola* Kern.) Neunkirchen; zw. Kolberg und Heldburg; *S. Caprea* × *cinerea* (*S. Reichardtii* Kern.) bei Koburg nicht selten; *S. repens* L. mit *S. aurita* × *repens* (*S. ambigua* Ehrh. n. *S. cinerea* × *repens* (*S. subsericea* Döll.) bei Gefell; *S. purpurea* × *viminalis* f. *elaeagnifolia* Tausch Koburg: Wohlbach [sämmtlich 1].

Orchis coriophora L. b. *Polliniana* Rchb. Jena: Isserstedt [14]; *Gymnadenia conopea* R. Br. b. *sibirica* Rchb. Jena: Schillerthal; Eule; Leutrathal [14]; *Ophrys apifera* Huds. b. *Muteliae* Mutel Jena: Leutrathal [14]; *Epipogon aphyllus* Sw bei Schloss Altenstein [11]; *Coralliorrhiza innata* RBr. zw. Buchfahrt und Blankenhain [16]; *Cypripedium Calceolus* L. Rückerode und zwischen Neu-Seesen und Werleshausen [18].

Muscari racemosum DC Aecker bei Rückerode [18].

Juncus filiformis L. Koburg: Heideregion von Neustadt-Wildenhaid *J. alpinus* Vill. Koburg: Thierach [1].

Carex ornithopoda W. Koburg: Plestener Berg [1], zwischen Hundelshausen und Rückerode [18].

Oryza clandestina ABr. Koburg: Neuhof [1]; *Calamagrostis lanceolata* Rth. Weimar: Waldsumpf bei Nohra [16]; *Melica nebrodensis* Parl. Koburg: Gestungshausen [1]; *M. picta* C. Koch Erfurt:

im Steiger [10]; *Poa Chairi* Vill. Finne: bei Marienroda; *Festuca arundinacea* Schreb. an trockenen Stellen Naumburg: Wethau und Reisberg bei Berka a. I. [16]; *Bromus erectus* Huds. b. *villosus* Kth. häufig bei Jena [15].

VIII. Schleswig-Holstein.

Berichterstatter: P. Prahl.

Quellen:

a) Litteratur:

1. A. Junge, Die Ruderal- und Baggerflora hiesiger Gegend (Bd. VII der Verhandlungen des Vereins für naturwissenschaftliche Unterhaltung zu Hamburg)¹⁾.

b) Unveröffentlichte Mittheilungen von:

2. Arnold, Lehrer in Lübeck. 3. C. Bock, Landmann in Mühlenbrück, Kr. Flensburg. 4. Dr. Bockwoldt, Gymnasiallehrer in Neustadt, Westpr. 5. F. Erichsen, Lehrer in Langenhorn bei Hamburg. 6. Eschenberg, Lehrer in Holm bei Uetersen. 7. Dr. P. A. Friedrich, Oberlehrer am Catharineum zu Lübeck. 8. Herbst, Pharmaceut in Altona. 9a. O. Jaap, 9b. A. Junge, 10a. K. Kausch und 10b. F. C. Laban, Lehrer in Hamburg. 11. H. Petersen, Oberlehrer in Sonderburg. 12. Sack, Oberlehrer in Lübeck. 13. J. Schmidt, Lehrer in Hamburg. 14. Schmitt, Pharmaceut in Christiansfeld. 15. C. T. Timm, em. Lehrer in Hamburg. 16. W. Timm, Lehrer in Wandsbeck. 17. Dr. F. Westphal, Lehrer in Apenrade. 18. W. Zimpel, Kaufmann in Hamburg. 19. Holst, 20. Junge, 21. Rooke, 22. Rheder, 23. Stülken, Gymnasiasten in Lübeck, 24. dem Berichterstatter.

Vgl. auch Allg. No. 54; sowie Schw (*Euphorbia humifusa* Willd.).

Abkürzungen:

H = Hamburg und Umgebung; L = Lübeck und Umgebung; Hst = Holstein excl. H und L; S = Schleswig.

Neu für das Gebiet:

Anemone ranunculoides L. f. *subintegra* Wiesb. Hst Segeberg: in den Gründen bei Pronstorf [13]!

1) Eine grössere Anzahl von Angaben dieses Verzeichnisses ist hier unberücksichtigt geblieben, weil sie sich entweder nur auf Gartenflüchtlinge beziehen, die kein Interesse haben oder noch der Bestätigung bedürfen bezw. nur ganz vereinzelt und vorübergehend gefunden wurden.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1892

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Haussknecht Heinrich Carl [Karl]

Artikel/Article: [Hercynisches Gebiet. 1081-1085](#)