© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

XIV. Bayern.

Berichterstatter: J. E. Weiss.

Quellen:

a) Litteratur:

1. O. Appel, Bemerk. üb. Carex (Ber. Bayer. Bot. Ges. I. s. Allg *b*). **2. Borbás V.,** Acer (Term. Füz. s. Allg. *l*). **3. C. O. Harz,** Fl. v. Marienbad u. s. w. (Bot. Centrabl. XLV s. Allg. *u*). **4. P. Joseph Maierhofer,** Nachtrag zur Flora Weltenburgs von 1884—90. (Zwölfter Bericht des Bot. Vereines in Landshut, S. 211—217.)[1] **5. Botanischer Verein in Nürnberg.** Beiträge zur Flora des Regnitzgebietes (Deutsche bot. Monatsschr. IX, S. 32—35). **6. Dr. J. Singer,** Flora Ratisbonensis. Verzeichniss der um Regensburg wildwachsenden und häufig cultivirten Gefässpflanzen. 2. Aufl. Regensburg (8) und 115 S. (Ohne Fundortsangaben). **7. J. E. Weiss,** Bericht über die botanische Durchforschung des diesrheinischen Bayern im Jahre 1890. Nach Beiträgen zahlreicher Botaniker Bayerns zusammengestellt (Ber. Bayer. Bot. Gesellschaft I, S. 1—61). **8. E. Widmer,** Primula (siehe Allg. *eee*). **10.** Zwölfter Bericht des **botanischen Vereines in Landshut** über die Vereinsjahre 1890/91. Landshut 1891: Neu aufgefundene Pflanzen des Isargebietes resp. neue Standorte, Seite XXIII—XXV.

b) Unveröffentlichte Mittheilungen von:

10. Prof. **P. Ascherson** in Berlin. **11.** Stabsveterinär **A. Schwarz** in Nürnberg. **12.** Prof. **J. Singer** in Regensburg (beide durch Prof. **Ascherson**).

Vgl. auch Allg. Nr. 2, 10, 20, 23, 38, 78—80, 83, 84.

Abkürzungen für die Regierungsbezirke:

Mf = Mittelfranken; **Nb** – Niederbayern; **Ob** = Oberbayern; **Of** = Oberfranken; **Op** = Oberpfalz und Regensburg; **S** = Schwaben und Neuburg; **Uf** = Unterfranken.

Neu für das Gebiet:

Caltha palustris L. var. *radicans* Forster (vgl. jedoch Allg. 2) Of Lichtenfels: zw. Ebersdorf und Seehof;

Papaver dubium L. var. *Lecoqii* Lam. Of Lichtenfels;

Cardamine pratensis × *amara* Of am Main bei Lichtenfels;

Viola collina × *odorata* (*V. Merkensteinensis* Wiesb.) Of Gräfenberg, sämmtlich [7].

1) Diese Arbeit enthält eine so grosse Zahl völlig unmöglicher Angaben (*Thlaspi alpinum, Capsella procumbens, Dianthus „arenaria“, Cytisus „bi- et triflorus“* [sic], *elongatus, Carex atrata, extensa, Campanula „uniflora* Vill.“, *Hypericum elegans*), dass auch an sich weniger unwahrscheinliche Angaben wie *Potentilla procumbens* Sibth. (ist in der That 1892 für Bay Mf Schwabach: Heidenberg [11] aufgefunden worden) keinen Glauben verdienen. Nur die oben mitgetheilte Notiz über *Erysimum repandum* erschien allenfalls unverfänglich. P. Ascherson.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Acer campestre L. var. *A. molle* Opiz Ob München [2].

Fragaria vesca × *moschata* (*F. drymophila* Jord.) Of zw. Schney und Michelau; *Potentilla reptans* × *silvestris* (*P. italica* Lehm., *P. Gremlii* Zimm.) Of Lichtenfels: zw. Ebersdorf und Schney und bei Schney [7].

Lappa nemorosa Körn. Of Truppachthal bei Eggloffstein [5]; *Centaurea Jacea* L. var. *cuculligera* Rchb. Of Lichtenfels: Schney [7].

Veronica Anagallis L. var. *V. aquatica* Bernh. (vgl. var. „*anagalloides*" PRANTL Excursfl. f. Bayern S. 424) Of zw. Michelau und Neuensee [7]; *V. Dillenii* Crtz. (s. Allg. No. 41) Mf Erlangen [10]; Nürnberg [11]; Op od. NO Regensburg; Ob München [10].

Primula officinalis L. var. *pannonica* Kern. Ob München: Garchinger Heide; *P. Auricula* L. var. **monacensis** Widm. Ob München: Erdinger und Dachauer Moos [8].

Viscum album L. var. **platyspermum** Kell., var. **hyposphaerospermum** Kell. f. *angustifolia* Wiesb. und f. *latifolia* Wiesb. (vgl. Allg. No. 63) Of; *Loranthus europaeus* Jacq. Nb? Wegscheid angeblich [7].

Orchis latifolia × *incarnata* (*O. Aschersoniana* Hausskn.) Of Lichtenfels: Seehof [7].

Carex disticha Huds. var. *floribunda* Petermann Of Michelau; *C. Leersii* F. Schultz München: Isarwiesen bei Rothacker [1]; Nymphenburger Park [7]; *C. curvata* Knaf Of Lichtenfels: Asslitz, Seehof; *C. brizoides* × *remota* f. **super-remota** Appel Of zwischen Ebersdorf und Schney; *C. subalpina* Brügger (Mittelform zw. *C. limosa* L. und *C. irrigua* Sm.) Op Rachel; *C. rostrata* With. var. *latifolia* Aschers. Of zw. Ebersdorf und Seehof, sämmtlich [1].

Wichtigere neue Fundorte:

Ranunculus polyanthemos L. Of Schney [7].

Erysimum repandum L. † Nb Kelheim: Bahnhofsrestauration [4].

Trifolium striatum L. Of Michelau [7]; *Vicia villosa* Rth. typica Mf Lauf: Neunkirchen [5, 7].

Geum rivale × *urbanum* (*G. intermedium* Ehrh.) Of Michelau am Main; [7]; *Potentilla thuringiaca* Bernh. Mf zw. Ickelheim und Oberzenn, zweiter Fundort [5, 7].

† *Galinsoga parviflora* Cav. Op Regensburg [6]; seit 1869 an mehreren Fundorten östlich von der Stadt, besonders zahlreich aber westlich zwischen Prüfening und Vogelsang [11]; *Cirsium lanceolatum* × *oleraceum* (*C. bipontinum* Schultz Bip.) Of Eggloffstein [5, 7]; *Hieracium substoloniflorum* N. et P. Seekar bei Lenggries (dritter bekannter Standort) [7].

Jasione montana L. S Memmingen [7].

Pirola media Sw. Of Buch am Forst [7]; *Chimophila umbellata* Nutt. Mf Fürth [5, 7].

Solanum nigrum L. var. *chlorocarpum* Spenn. München: Sendling.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Alectorolophus aristatus Gremli (vgl. jedoch Allg. No. 43) Of Schirschnitz und Lichtenfels, sämmtlich [7].

Euphrasia Rostkoviana Hayne Ob Gaitau [2].

Brunella alba Pall. Mf Scheinfeld: Altmannshausen [5, 7]; Schönbrunn; Burgwindheim [7]; *Teucrium Scorodonia* L. Ob Freising;

Oxyria digyna Campd. und

Salix herbacea L. Ob Schliersee: Rothe Wand;

Nigritella angustifolia × *Gymnadenia conopea* (*N. suaveolens* Koch) Aschenthal bei den Aschenthaler-Alphütten; am Geigelstein;

Juncus sphaerocarpus N. ab E. Uf Hoheim bei Kitzingen, sämmtlich [7].

Carex praecox Schreb. Of Frohnlach [1].

Stipa pennata L. Mf bei Windsheim [5, 7]; Nb Mammingerschwaige im Isarthal unterhalb Landshut [9].

Pinus Mughus Scop. Uf Hammelburg: Ameisenthal durch Samenverwechslung eingeschleppt [7].

Zu berichtigen: *Salsola Soda* Mf bei Nürnberg (Bericht über 1889 S. [142] ist *S. Kali* L. [10].

XV. Böhmen.

(1891 und 1892).

Berichterstatter: L. Čelakovský.

Litteratur:

1. R. v. Wettstein, Gentiana (Endotricha Fröl.) Oest. Bot. Zeitschr. XLI und XLII s. Allg. *ddd*). **2. L. Čelakovský,** Rumex acetoselloides und R. angiocarpus Murb. Sitzungsbericht böhm. Ges. d. Wiss. 1892, s. Allg. *n*.) **3. L. Čelakovský,** Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens in den Jahren 1891 und 1892. Sitzungsbericht der K. böhm. Ges. d. Wiss. 10. März 1893[1]). Vgl. auch die Berichte in der Oest. Bot. Zeitsch. XLI und XLIII 1893 s. Allg. *o* und *p*). **4. Anton Schott,** Verzeichniss der im Böhmerwalde beobachteten Pflanzenarten (Lotos 1893 XLI (1), S. 1—42[2]) **5. P. Ascherson,** Veronica campestris (Oest. Bot. Zeitschr. XLIII s. Allg. *e*).

Vgl. auch Allg. No. 4, 10, 20, 23, 38, 42, 44, 48, 65, 81.

---

1) Die Angaben, bei denen keine Nummer citirt ist, sind dieser Nummer 3 entlehnt.

2) Enthält so viele offenbar unrichtige Angaben, dass vor der Benutzung des Verzeichnisses gewarnt werden muss und dasselbe auch hier unberücksichtigt geblieben ist.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft

Jahr/Year: 1892

Band/Volume: 10

Autor(en)/Author(s): Weiss J. E.

Artikel/Article: Bayern. 1093-1095