© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

stein bei Friedrichshof und im Walde zwischen Altendorf und der Alfredhütte bei Römerstadt sämmtlich [6]; *Cephalanthera grandiflora* Babingt. vereinzelt am Schönhengst bei Zwittau [5]; *Cypripedilum Calceolus* L. zwischen Greifendorf und Brüsau [5] am Záhoří bei Prossnitz [6].

Iris sibirica L. Wiesen bei Kosteletz;

Allium rotundum L. Getreidefelder bei Auspitz;

Juncus alpinus Vill. bei Zwittau und M. Trübau; *J. squarrosus* L. Wiesen oberhalb Neufang bei Römerstadt;

Eriophorum alpinum L. Häufig auf Torfwiesen bei Ždár; *E. vaginatum* L. Torfwiesen zwischen „Sklený und Brožova skála" bei Dačko; *Scirpus Tabernaemontani* Gmel. zwischen Lundenburg und Altenmarkt an der Thaja; *S. Holoschoenus* L. Lundenbnrg, Mutenitz; *S. radicans* Schkuhr b. Wietrschkowitz; sämmtlich [6]; *Carex dioeca* L. Torfwiesen b. Zwittau [4]; *C. Davalliana* Sm. Umgebung von Ždár [6]; *C. pilulifera* L. [6], Glasdorfer Wälder bei Zwittau [4].

Melica ciliata L. v. *transsilvanica* Schur Umgebung von Ždár [6]; *Poa Chaixi* Vill. var. *remota* Koch Radhost, Rožnauer Seite [4].

Taxus baccata L. „Skameněly zámek" bei Milkov [6].

XVII. Nieder-Oesterreich.

Berichterstatter: G. Ritter Beck von Mannagetta.

Quellen:

a) Litteratur:

1—10. Oesterr. botan. Zeitschr. XLI. **1. E. v. Halácsy,** Neue Brombeerformen aus Oesterreich (S. 12, 13). **2. L. Wiedermann** und **3. L. Keller,** Notizen (S. 76). **4. L. Wiedermann,** Notizen (S. 149, 150). **5. V. v. Borbás,** Notizen (S. 150). **6. E. v. Halácsy,** Namensänderungen (S. 207, 208). **7. H. Braun,** Bericht über die botanische Erforschung Nieder-Oesterreichs I (S. 255—257, 283—286). **8. M. Kronfeld,** Notiz (S. 291). **9. K. Rechinger,** Beiträge zur Flora von Oesterreich (S. 338—340). **10. M. Rassmann,** Mittheilung (S. 359). **11. K. Rechinger,** Rumex (a. a. O. LXI u. LXII, s. Allg. *rr*). **12. R. v. Wettstein,** Gentiana (Endotricha Fröl.) (a. a. O. XLI und XLII, s. Allg. *ddd*). **13. P. Ascherson,** Veronica campestris (a. a. O. XLIII s. Allg. *e*). 14—16. Sitzungsberichte Zool. Bot. Ges. Wien XLI. **14. K. Richter,** Mittheilung (s. Allg. *tt*). **15. G. Sennholz,** Zwei Orchideenbastarde (S. 40, 41). **16. R. v. Wettstein,** Mittheilung (S. 45, 46). 17—19. Abhandlungen Zool.-bot. Ges. Wien XLI. **17. E. v. Halácsy,** Oesterr. Brombeeren (s. Allg. *t*). **18. G. v. Beck,** Mittheilungen aus der Flora von Nieder-Oesterreich II (S. 640—643). **19. G. v. Beck,**

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Mittheil. u. s. w. III (S. 793—798). **20. Sv. Murbeck,** Beiträge zur Flora von Südbosnien (Lunds Univ. Årssk. XXVII, s. Allg. *mm*). **21. G. v. Beck,** Flora von Südbosnien VI (Annal. des naturhist. Hofmus. Wien VI, s. Allg. *h*).

Vgl. auch Allg. 2, 6, 8, 10, 14, 16, 28, 38, 42, 55, 58, 61, 62.

b) Unveröffentlichte Aufzeichnungen:

22. Des Berichterstatters.

Neu für das Gebiet:

Nasturtium silvestre × *palustre* = (*Roripa brachystyla* Wallr.) an der Wien bei Weidlingau [9]; **Draba lasiocarpa** Rochel am Jennyberge bei Mödling [18].

Viola Riviniana × *canina*[1]) (*V. neglecta* Schmidt) hier und da im Wiener Walde; (**V. intersita** G. Beck = *V. intermedia* (*sylvatica* × *lucorum*) Kirschl. non alior.) am Himmel bei Sievering; *V. arenaria* × *Riviniana* (*V. Burnati* Gremli) zw. dem Waschberge bei Spillern und dem goldenen Brunnen [18].

Alsine setacea M. et K. f. **banatica** Bluff et Fing. Staatzer Schlossberg [21].

Ononis austriaca G. Beck auf fruchtbaren feuchten Thalwiesen im Wiener Walde; bei Vöslau; um Gloggnitz; von Ternitz bis Buchberg; bei Unterwald [19]; *Onobrychis arenaria* Ser. auf dem Bisamberge [19].

Prunus Cerasus × **Chamaecerasus** auf dem Bisamberge [19] (vgl. Haussknecht Allg. No. 21. P. Ascherson); *Rosa lasiostylis* Borb. bei Mödling; *R. heterotricha* Borb. bei Gloggnitz; *R. intromissa* Crép. (– **R. stenomalla** Borb.) [5]; *Rubus senticosus* Koehl. am Muglerberg bei Rossatz; *R. rhombifolius* Weihe bei Pitten; **R. quadicus** Sabr. im Rehgraben bei Gloggnitz; *R. epipsilos* Focke zwischen Steinbach und Weidlingau; **R. ceticus** Hal. (= *R. epipsilos* Hal. et Braun nicht Focke); **R. pseudomelanoxylon** Hal. (= *R. melanoxylon* Hal. et Braun nicht Focke); **R. vestitifolius** Fritsch auf dem Eichberge bei Gloggnitz; **R. amplus** Fritsch (= *R. rudis* Hal. et Braun); *R. Koehleri* Weihe et Nees bei Gemünd; *R. apricus* Wimm. im Fugnitzthale bei Hardegg [17]; **R. foliolatus** Hal. [6] (= *R. foliolosus* Hal. [17] nec Don); *R. rivularis* P. J. Müll. bei Neuwaldegg, Gloggnitz; **R. tectiflorus** Hal. [6] (= *R. pauciflorus* [1] nec Wall.); *R. polyacanthus* Gremli bei Kirchberg am Wechsel; *R. erythrostachys* Sabr. (= *R. vinodorus* Sabr. s. Ber. über 1890 S. [98]); bei Gloggnitz; Neuwaldegg; an der böhmischen Grenze [17]; **R. subsessilis** Hal. auf dem Kahlenberge [1]; **R. Halácsyi** × **caesius** bei Klamm [17]; *R. vindobonensis* Sabr. Br. var. **trichogynis** Borb. und var. **subdiclinus** Borb. bei Neuwaldegg; **R. lamprophyllus** × **tomentosus** (**R. lamproleucus** Borb. et Sabr.) Eichberg bei Gloggnitz [7]; *Agrimonia odorata* Mill. an Aurändern bei Marchegg [19].

---

1) K. Richter's *V. caninaeformis* (vgl. Bericht über 1888 S. [117]) ist nach den Exemplaren seines Herbars = *V. Riviniana*.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Epilobium nutans Schm. bei Karlstift; auf dem Wechsel [19]; *E. adnatum* × *Lamyi* (*E. semiadnatum* Borb. in Auen bei Jedlesee; *E. parviflorum* × *adnatum* (*E. Weissenburgense* Schltz.) an der Wien bei Hütteldorf [9]; *E. alsinifolium* × *anagallidifolium* (*E. Boissieri* Hausskn. = **E. Darreri** K. Richt. s. Allg. Nr. 85) auf der Raxalpe [14].

Pimpinella magna × *saxifraga* (*P. intermedia* Fig.) in Gärten von Währing [18]; **Seselinia austriaca** G. Beck bei Mödling: Rauhenstein; im Atlitzgraben; im unteren Krummbachgraben [19].

Galium silvaticum L. var. **alpestre** Schur niederösterr. Alpen [20].

Carduus crispus × *nutans* (*C. polyanthemus* Schleich.) im Wiener Prater [9]; *Hieracium bitense* Schltz. am Semmering [5].

Gentiana stiriaca Wettst. Seebachthal bei Lunz; Erlafsee; **G. carpatica** Wettst. Thajathal bei Hardegg; Sallingstadt; **G. praeflorens** Wettst. Raxalpe; Gahnswiese an Schneeberg; Dürrenstein; Grünschacher; Oetscher [12].

Onosma arenarium W. K. var. ? **O. austriacum** G. Beck beim Förthofe nächst Krems [18]; *Myosotis suaveolens* W. K. Melk: Gurhofgraben [16].

Verbascum phlomoides × *nigrum* (*V. Brockmülleri* Ruhm.) bei Dörfl nächst Reichenau [9]; *V. austriacum* Schott filamentis albo-pilosis in der Prein; bei Baden [9]; *Veronica aquatica* Bernh. um Wien [20]; *V. campestris* Schmalh. (Nach [13] = *V. Dillenii* Crtz. [?22]) Wien: Türkenschanze [13]; Bruck a. d. Leitha; Wiener Neustadt; Krems: Egelsee; Mautern: Hohe Wand; Rossatz [13]; Langenlois; Finsternau nächst Brand [22].

Galeopsis speciosa × *Tetrahit* (*G. Murriana* Borb. et Wettst. s. Bericht über 1891 S. [155], vielleicht auch *G. intermedia* Sternb. et Hoppe) bei Knappendörfl nächst Reichenau [19].

Rumex biformis Menyh. im südlichen Wiener Becken; bei Dürnkrut; Marchegg; Seefeld bei Laa; **R. Patientia × biformis** (**R. pannonicus** Reching.) bei Moosbrunn; **R. silvester × Patientia** (**R. erubescens** Simonk.) Wien; *R. conglomeratus* × *crispus* (*R. Schulzei* Hausskn.) Florisdorf; Kottingbrunn; *R. conglomeratus* × *obtusifolius* (*R. abortivus* Ruhm.) Wien; *R. silvester* × *crispus* (*R. Bihariensis* Simonk. 1877 = *R. confinis* Hausskn. 1884) Hütteldorf; *R. obtusifolius* × *sanguineus* (*R. Dufftii* Hausskn.) Vöslau [11]; *R. angiocarpus* Murb. bei Weidlingau [20]; *R. thyrsiflorus* Fingerh. Wien: Prater; Wiener Neustadt: Steinfeld [11].

Thesium intermedium × ramosum (**T. hybridum** G. Beck) auf dem Diernberge bei Falkenstein [18].

Potamogeton mucronatus Schrad. im Heustadlwasser des Wiener Praters; bei Moosbrunn [18].

Orchis maculata × sambucina (**O. influenza** Sennh.) a. Semmering [15].

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Neu eingeschleppt bezw. verwildert:

Ornithopus sativus Brot. am Todtenberge bei Rossatz [18].

Anchusa Barrelieri DC. zwischen Wiener Neustadt und Steinabrückl [16].

Scrophularia canina L. am Südbahndamme in Wien [9].

Poa Chaixi Vill. im Parke von Rappoltenkirchen [19]; *Triticum villosum* M. B. und *Aegilops cylindrica* Host auf wüsten Plätzen beim Arsenal [9].

Wichtigere neue Fundorte:

Ranunculus Lingua L. zwischen Tulln und Neu-Aigen [2].

Nasturtium anceps DC. bei Lanzendorf; *N. armoracioides* Tausch bei Seefeld [9].

Alyssum desertorum Stapf (=*A. minimum* Willd. nicht L.) auf den Schanzen bei „Jedlesee Transito"; zwischen Wagram und Gänserndorf [18]; *Lepidium perfoliatum* L. bei Laa an der Thaja [18]; *Myagrum perfoliatum* L. bei Florisdorf [18]; im Prater [9].

Viola ambigua W. K. bei Matzen; Münichsthal; am Waschberge bei Stockerau [18].

Sagina apetala L. β *S. ciliata* Fr. auf Aeckern bei Rappoltenkirchen [4].

Hypericum elegans Steph. in der Walchen bei Rappoltenkirchen [4].

Geranium molle L. bei Tulln [2].

† *Ornithopus perpusillus* L. im Arsenalhofe von Wien [9]; früher nur von KRAMER 1756 einmal im Sande der Donau bei Wien gefunden [22].

Epilobium hirsutum × *parviflorum* (*E. hybridum* Schur) an der Wien bei Hütteldorf [9].

Bupleurum longifolium L. am Oetscher; bei Hessendorf im Fugnitzthale [18].

Cirsium palustre × *rivulare* (*C. subalpinum* Gaud.) bei Edlach [9]; *C. Erisithales* × *oleraceum* (*C. Candolleanum* Naeg.) Kampalpe [9]; bei Rappoltenkirchen [4]; *C. Erisithales* × *palustre* (*C. Huteri* Hausm.) Griesleiten und im Gr. Höllenthale; *C. oleraceum* × *palustre* (*C. hybridum* Koch) in der Prein; *C. canum* × *palustre* (*C. silesiacum* Schultz) bei Hadersdorf; *C. oleraceum* × *rivulare* (*C. erucagineum* DC.) bei Edlach; Sparbach; *Carduus Personata* × *defloratus* (*C. Naegelii* Brügg, blosser Name, vergl. BECK, Fl. Hernst. S. A. 261—263) am Fusse der Kampalpe; *C. acanthoides* × *defloratus* (*C. Schulzeanus* Ruhm.) in der Prein; *C. crispus* × *acanthoides* (*C. Aschersonianus* Ruhm.) bei Baden [9]; *Lappa officinalis* × *tomentosa* (*L. ambigua* Čel.) bei Gloggnitz [3].

Gentiana Sturmiana A. et J. Kern. Waidhofen a. d. Ybbs; Seitenstetten; Rappoltenkirchen; Kritzendorf [12].

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Verbascum Thapsus × *austriacum* (*V. Juratzkae* Dichtl), *V. phlomoides* × *austriacum* (*V. danubiale* Simk.), *V. Thapsus* × *phlomoides* (*V. Kerneri* Fritsch) alle in der Prein; *V. phlomoides* × *Lychnitis* (*V. denudatum* Pfund), *V. austriacum* × *Lychnitis* (*V. Hausmanni* Čelak.) beide in Wien [9]; *Linaria arvensis* Desf. bei Meissau [10].

Orobanche caesia Rchb. var. *Peisonis* G. Beck in einer Schottergrube bei Wien. Neustadt; *O. Salviae* Schltz. am Polzberge bei Gaming; *O. flava* Mart. im Lechnergraben des Dürrensteins; beim Lassingfalle [18].

Phlomis tuberosa L. Bisamberg [17]; *Brunella vulgaris* × *alba* (*B. intermedia* auct.) und *B. vulgaris* × *grandiflora* (*B. spuria* Stapf) bei Rappoltenkirchen [4].

Plantago arenaria W. K. auf dem Exercirplatze von Mautern [18].

Thesium montanum Ehrh. bei Mannersdorf [18].

Viscum album L. auf *Robinia* Hohe Warte [8].

Salix purpurea × *incana* (*S. bifida* Wulf.) bei Rappoltenkirchen [4].

† *Elodea canadensis* Rich. bei Inzersdorf; um Wiener Neustadt [9].

Potamogeton alpinus Balb. im kleinen Kamp zwischen Pernthon und Pehendorf [18] und *P. obtusifolius* M. et K. in der alten Donau bei Wien [9].

Sparganium minimum Fr. Saura bei Waldhof nächst Krems, bei Mollands nächst Langenlois; bei Arbesbach [18].

Orchis sambucina × *Platanthera viridis* (*P. Erdingeri* A. Kern.) am Semmering [15].

Juncus atratus Krock. beim Waldhofe nächst Krems; bei Mollands [18]; *J. Gerardi* Loisl. zwischen Kronstein und Dornberg; *J. sphaerocarpus* Nees bei Rappoltenkirchen [4]; *Luzula flavescens* Gaud. am kleinen Oetscher [18].

Diplachne serotina Link am Pfaffenberge bei Förthof oberhalb Stein [18].

XVIII. Ober-Oesterreich.

Berichterstatter: Fr. Vierhapper.

Quellen:

---

a) Litteratur:

1. **J. B. Wiesbaur** und **M. Haselberger**, Beiträge zur Rosenflora von Ober-Oesterreich, Salzburg und Böhmen (herausgegeben vom Museum Francisco-Carolinum in Linz 1891). 2. **R. v. Wettstein**, Gentiana (Endotricha Fröl.) (Oest. Botan. Zeitschr. XLI und XLII, s. Allg. *ddd*).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft

Jahr/Year: 1892

Band/Volume: 10

Autor(en)/Author(s): Beck Günther [Gunthero] Ritter von Mannagetta

Artikel/Article: Nieder-Oesterreich 1102-1106