

## XII. Nieder-Oesterreich.<sup>1)</sup>

Referent: G. Beck.

### Literatur.

1882.

1. J. B. Keller, *Rosa Braunii* n. sp. in österr. botan. Zeitschrift 1882, S. 39.
2. J. B. Keller, Correspondenzen. Ebendaselbst, S. 68, 103, 376.
3. A. Heimerl, *Rubus brachystemon* n. sp. Ebendaselbst, Seite 109.
4. A. Heimerl, Zur Flora von Wien. Ebendaselbst, S. 116.
5. J. Wiesbaur, Zur Praterflora. Ebendaselbst, S. 254.
6. V. von Borbás, Zur Flora des Wechsels. Ebendaselbst, S. 285.
7. J. B. Keller, Berichtigungen zu den „Nachträgen zur Flora von Niederösterreich von Dr. E. von Halácsy und Braun. Ebendaselbst, S. 302.
8. J. B. Keller, Zur Flora von Niederösterreich. Ebendaselbst, S. 320.
9. V. von Borbás, *Delphinium orientale* Gay. Ebendaselbst, S. 387.
10. M. Kronfeld, Beiträge zur Flora von Kritzendorf. Ebendaselbst, S. 393.
11. G. Beck, Neue Pflanzen Oesterreichs 1—5; Verhandlungen der k. k. zool. bot. Gesellsch. 1882, S. 179, Taf. XIV.
12. G. Beck, Ueber das massenhafte Auftreten von *Orobanche major* L. Sitzungsber. derselben Gesellsch. 1882, S. 32.
13. J. Wiesbaur, Anmerkungen im General-Doubletten-Verzeichniss des schlesischen botanischen Tauschvereines. 1882.
14. H. Kempf, Die Flora des Schneebergs, herausgegeben vom österr. Touristen-Club. Wien 1882.

1883.

15. M. Kronfeld, Beiträge zur Flora von Niederösterreich. Mit-

1) Um an die zuletzt erschienenen „Nachträge zur Flora von Nieder-Oesterreich von H. Braun und E. v. Halácsy Anschluss zu gewinnen, sind die Funde der Jahre 1882 und 1883 mit berücksichtigt.

theilungen des naturwiss. Vereines an der Universität Wien. 1882—1883. S. 39.

16. M. Müllner, Drei für Niederösterreich neue Bastarde. Sitzungsberichte der k. k. zool. bot. Gesellsch. 1883, S. 27.
17. G. Beck, Neue Pflanzen Oesterreichs. No. 6. Verhandlungen derselben Gesellschaft 1883, S. 225.
18. V. v. Borbás, Kurze Bemerkungen zu Halácsy und Braun's „Nachträge zur Flora von Nieder-Oesterreich“. (Oesterr. bot. Zeitschrift 1883, S. 24.
19. J. B. Keller, Rhodographische Beiträge. Ebendaselbst, S. 40.
20. A. Degen, Einige Mittheilungen aus meinen Exkursionen. Ebendaselbst, S. 293.
21. L. Čelakovský, Ueber einige Stipen. Ebendaselbst, S. 313.
22. H. Sabransky, Ueber *Urtica radicans* Bolla, eine neue Pflanze der Flora Niederösterreichs. Ebendaselbst, S. 319.
23. J. B. Keller, Correspondenzen. Ebendaselbst, S. 337, 377.
24. O. Stapf, Correspondenz. Ebendaselbst, S. 376.
25. M. Kronfeld, Beiträge zur Flora von Niederösterreich. Ebendaselbst, S. 401.
26. A. Dichtl, Ergänzungen zu den „Nachträgen zur Flora von Nieder-Oesterreich“. Deutsche botanische Monatsschrift 1883, S. 97 ff.
27. J. Wiesbaur, Correspondenz. Ebendaselbst, S. 124.
28. A. Kerner, Schedae ad floram exsiccatam austro-hungaricam. II. (Erschien im Mai 1883, nicht 1882.) Vindobonae.
29. T. F. Hanausek, Ueber eine neue Form der *Rosa collina* Jacq. Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. Berlin. I. Bd. S. 170.

#### 1884.

30. A. Heimerl, Monographia sectionis „Ptarmica“ Achilleae generis; die Arten, Unterarten, Varietäten und Hybriden der Section Ptarmica des Genus Achillea mit 3 Tafeln. Denkschriften der Kaiserl. Akademie d. Wissensch. Wien. XLVIII. Band. 1884.
31. L. Wiedermann, Aus der Flora von Rappoltenkirchen und Umgebung V.O.W.W. Oesterr. botan. Zeitschrift 1884. S. 88, 125.
32. M. Kronfeld, Pflanzennamen aus der Wiener Umgegend. Ebendaselbst, S. 216.
33. L. Čelakovský, Nachträgliches über *Stipa Tirsa* Steven. Ebendaselbst, S. 318.
34. M. Kronfeld, Bemerkungen zu F. Höfers „Wörterbuch der nieder-österr. Pflanzennamen“. Ebendaselbst, S. 372.

35. L. Wiedermann, Volksnamen von Pflanzen aus der Gegend von Rappoltenkirchen. V.O.W.W. Ebendaselbst, S. 396.
36. J. Wiesbaur, Kleine Notiz über die mitteleuropäischen Misteln. Deutsche bot. Monatsschrift 1884. S. 60.
37. C. Haussknecht, Monographie der Gattung *Epilobium*.
38. G. Beck, Flora von Hernstein in Niederösterreich und der weiteren Umgebung in M. A. Becker, „Hernstein in Nieder-Oesterreich“ II. Theil, 1. Halbband. Prachtausgabe 4°, 467 Seiten, 11 Tafeln, 2 Karten. (Die Sonderabdrücke derselben erschienen in 8° mit 288 Seiten und denselben Beilagen, Anfangs 1885.) Wien, A. Hölder.
39. A. Kerner, Schedae ad floram exsiccatam austro-hungaricam. III. Vindobonae.
40. A. Dichtl, Ergänzungen zu den „Nachträgen zur Flora von Nieder-Oesterreich“. Deutsche botanische Monatsschrift 1884. S. 57 ff.
41. A. Heimerl, Floristische Beiträge. Verhandl. der k. k. zool. bot. Gesellsch. 1884. S. 95, Taf. IV.

### Für das Gebiet neue Arten und Formen:

*Thalictrum medium* Jacq. Buchbergerfeld, Pfennigwiese [38]; *Pulsatilla patula* (Pritzel) um Kalksburg; *P. grandis* Wend. f. **polypetala** u. **oligopetala** Wiesb. verbreitet; *Batrachium Drouetii* F. Schultz in der Liesing [40]; *Ranunculus carinthiacus* Hoppe. Schneeberg; *Aconitum Lycocotonum* L. f. *Cynoctionum* Rchb. Schneeberg; f. *Tragoctonum* Rchb. Pottenstein; *A. Napellus* L. f. *laxum* Rchb. Voralpen [38].

*Nasturtium officinale* R. Br. var. *microphyllum* Rchb. Siegenfeld; *Arabis auriculata* Lmk.  $\beta$ . *puberula* Koch. Kalksburg, Mödling [40]; *A. hispida* Mygind (*A. petraea* Koch nec Lmk.) var. *psammophila* Beck. Hernsteiner Gebiet [38]; *Draba aizoides* L. var. *affinis* (Host.) (= *D. Beckeri* A. Kerner [39]); Voralpen des Schneeberggebiets [38]; *Thlaspi goesingense* Halácsy var. *cochleatum* Borb. Bernstein [18].

*Viola austriaca* Kerner.  $\alpha$ . *nemorum*,  $\beta$ . *pinetorum* Wiesb. [40]; *V. collina*  $\times$  *ambigua* Bisamberg [27].

*Dianthus Carthusianorum* L. f. *D. atrorubens* Kerner nec All. um Buchberg; *Cerastium macrocarpum* Schur. Schneeberg [38].

*Lotus corniculatus* L. v. *alpinus* (Schur). Schneeberg [38].

*Rubus rorulentus* Halácsy. Gloggnitz; *R. decorus* Halácsy. Klamm; *R. laxiflorus* Halácsy. Payerbach (leg. auctor); *Potentilla vindobonensis* Zimmet. Wien (Richter) [39]; *P. glandulosa* Krašan. Höllenthal, Gutenstein (Kerner); *Rosa alpestris* Kapin. Schneeberg (Halácsy) [38]; *R. diversisepala* H. Braun. Rohr i. G. (38 Taf. XI); *R. canina* L. f. *horridula* Désegl. Hirtenberg (Braun); *R. Halácsyi* H. Braun. Schnee-

berggebiet (Braun) [38]; *R. collina* Jacq. f. **Oberbergensis** Hanausek. Oberbergern [29]; *Sorbus aucuparia* × *Aria* (*S. pinnatifida* Engl. bot.). Stücksenstein; *S. Mougeoti* Soy. Will. et Godr. Schneeberggebiet; *S. Chamaemespilus* × *Aria* (*S. ambigua* Michal.). Schneeberg [38].

*Epilobium obscurum* Schreb. Harmnansdorf, Karlsstift [41]; *E. hirsutum* × *parviflorum* (*E. intermedium* Rchb.). Penzinger Au (Neilreich); *E. parviflorum* × *roseum* (*E. persicinum* Rchb.). Langenlois (Kalbrunner); *E. montanum* × *parviflorum* (*E. limosum* Schur). Sophienalpe (Heimerl); *E. montanum* × *trigonum* (*E. pallidum* Tausch). Gr. Scheibwald (Sonklar), Schneeberggebiet (Neilreich); *E. collinum* × *montanum* (*E. confine* Hausskn.). Vöslau (Wiesbaur); *E. Lamyi* × *montanum* (*E. Haussknechtianum* Borb.). Sophienalpe (Heimerl); *E. palustre* × *parviflorum* (*E. rivulare* Wahlenb.). Heil. Kreuz (Portenschlag), St. Veit, Lainz (Neilr.); *E. alsinefolium* × *anagallidifolium* (*E. Boissieri* Hausskn.). Waxriegel des Schneebergs (Ascherson); *E. alsinefolium* × *montanum* (*E. salicifolium* Facchini). Obersberg i. d. Schwarza (Brandmayr) [37].

*Ribes Grossularia* L. v. *duplotecta* Beck. Pottenstein, Starhemberg [38].

*Saxifraga ascendens* L. v. *Scopolii* Vill. Schneeberg [38].

*Peucedanum arenarium* W. K. Zwischen Theben und Neudorf, hart an der Grenze [40].

*Viscum austriacum* Wiesb. α. *Pini*, β. *Abietis* = *V. laxum* Wiesb. nec Boiss. Mödling bis Piesting [36, 40].

*Asperula Neilreichii* Beck. Nordabhänge des Schneebergs [11, Taf. XIV]; *Galium Cruciata* Scop. var. **subalpinum** Beck. Schneeberg; *G. lucidum* All. var. **meliodomum** Beck. Schneeberg, Raxalpe [38].

*Valeriana officinalis* f. **subalpina** (= *V. sambucifolia* Neilr.); *V. montana* × *tripteris* (*ciliata* Clairv.)? Mariahilferberg bei Gutenstein (A. Kerner) [38]; *Valerianella dentata* Poll. var. *dasyarpa* Gaisberg [26].

*Knautia dipsacifolia* (Host) var. *glandulifera* Beck und f. *involucrata* Schneeberg [38].

*Bellis perennis* L. v. *hirsuta* Beck. Bei Fahrafeld a. T.; *Erigeron uniflorus* L. Schneeberg [38]; *Achillea Clusiana* Tausch. b. **Beckiana** Heimerl. Raxalpe (Beck); *A. Clavenae* L. b. **intercedens** Heimerl = *A. Clavenae* auctor. Austr. inf. [30]; *A. alpicola* Heimerl. Schneeberg [38]; *A. stricta* Schleicher = *A. tanacetifolia* Neilr. [38 et 39]; *Chrysanthemum subcorymbosum* Schur. Schneeberg, Unterberg, Dürre Wand [38]; *Senecio viscosus* × *silvaticus* (*S. viscidulus* Scheele = *S. Wiesbaurii* Halász et Br.) [26]; *Cirsium oleraceum* Scop. v. *amarantinum* Lang. Breitenfurt [26]; **C. pannonicum** × *rivulare* (*C. Kornhuberi* Heimerl). Achau [41, Taf. IV]; *Carduus defloratus* × *Personata* (*C. digeneus* Beck) und *C. Personata* × *defloratus* (*C. Michaletii* Beck). Schneeberg [38]; *C. crispus* × *defloratus* (*C. Moritzii* Brügger) Lunz [16]; *Lappa vulgaris* var. *rosulans* Kronfeld

[10]; *Carlina longifolia* Rchb. bei Gloggnitz (Richter) [14], im Höllenthal [38]; *Serratula austriaca* und *S. germanica* Wiesb. = *S. tinctoria* Neilr. [13]; *Centaurea Scabiosa* L. var. *praeralpina* Beck. Schneeberg [38]; *Hieracium Pilosella* L. subsp. *macranthum* (Ten.) var. *microcephalum* Uechtr. Gaisberg bis Lindkogl [26]; *H. Pilosella* × *Bauhini* v. (*H. kalksburgense* Wiesb.). Kalksburg bis Mödling; *H. cymosum* v. *Anningeri* Wiesb. Anninger; *H. badense* Wiesb. Um Baden; **H. Helenium** Dichtl et Wiesb. Baden; *H. vindobonense* Wiesb. Bei Vöslau; *H. gadense* Wiesb. Bei Gaden, Baden; **H. apricorum** Wiesb. Mödling, Brühl, Kaltenleutgeben; *H. Dollineri* Schultz. Bip. v. *austriacum* (Uechtr.) [*H. laevigatum* Gris. v. *austriacum* Uechtr. in Baenitz Herb. europ. No. 2543 (1875) cum notula diagn. in prospectu. *H. austriacum* Brittinger in herb., Kerner, vergl. Deutsche Botan. Monatsschrift 1884, S. 19, R. v. Uechtritz]. Rodaun bis Merkenstein, Sebenstein [40]; Eisernes Thor, Gösing, Trauch [38]. \**H. glaucum* × *villosum* (*H. trichoneurum* Prantl). Schneeberg – 1600 m, Raxalpe, Dürrenstein [38, Taf. V.]; *H. valdepilosum* Vill. Schneeberg, Raxalpe, Oetscher (= *H. prenanthoides* × *villosum* Juratzka ex p.) [38]; **H. Neilreichii** Beck. Schneeberg, Raxalpe, Hochkar [38, Taf. IV]; **H. Neilreichii** × *valdepilosum* (*H. interjectum* Beck). Schneeberg [38, Taf. VIII]; **H. glaucoides** M. Müllner. Schneeberg [38, Taf. VII]; **H. Breyninum** Beck = *H. prenanthoides* auct. Austr. inf. ex p. Schneeberg [38, Taf. V]; **H. orthophyllum** Beck. Schneeberg [38, Taf. VI]; **H. orthophyllum** × *valdepilosum* (*digeneum* Beck). Schneeberg [38, Taf. IV]; *H. carnosum* Wiesb. Liechtenstein [26]; *H. caesium* Fr. Kalksburg und Kaltenleutgeben bis Baden [40]; *H. subcaesium* Fr. Kalksburg [40]; überall in den Voralpen [38]; **H. oligocephalum** (Neilr.) Wiesb. [vix Arv.-Touv. R. v. Uechtritz]. Eisernes Thor, Alitzgraben; *H. bifidum* Kit. Kalksburg, Mödling mit v. *indivisum* Uechtr.; *H. medelingense* Wiesb. Mödling, Kaltenleutgeben; *H. liechtensteinense* Wiesb. Liechtenstein; *H. murorum* L. var. *papyrus*-*raceum* Uechtr., var. *sagittatum* Dichtl, [an Lindeb.? R. v. Uechtritz], var. *ovalifolium* Jord.; *H. fastigiatum* Fries. Schönbrunn bis Vöslau, *H. sciophilum* (Uechtr.) [*H. vulgatum* var. *sciophilum* Uechtr. in litt. = *H. v. b. latifolium* W. Grab. vgl. Fiek, Flora von Schlesien. S. 276. R. v. Uechtritz]. Kalksburg; *H. norvegicum* Fr. Sebenstein; *H. Dichtlianum* Wiesb. Brühl, Sebenstein; *H. Sommerfelti* Lindeb.? Gumpoldskirchen; *H. Wiesbaurianum* Uechtr. Rodaun bis Gumpoldskirchen; *H. virescens* Sond. var. *angustifolium* Uechtr. Wiener Sandstein-Formation, Leithagebirge; *H. umbellatum* L. f. *integrum* Wiesb. Brühl bei Baden, f. *stenophyllum* W. Gr. Rosaliengebirge (Wiesbaur und Dichtl) [40].

**Phyteuma austriacum** Beck. Schneeberg, Rax, Dürnstein [11, Taf. XIV]. **Campanula lanceolata** Lapeyr.? Gutenstein, Scheuchenstein [38].

**Gentiana Sturmiana** A. et J. Kerner b. Mautern (J. Kerner) [28]; **G. austriaca** A. et J. Kerner = *G. germanica* Neilr. [28]; *Pulmonaria*

*angustifolia* × *officinalis* (*P. hybrida* A. Kerner). Speising (Wiesbaur) [40].

*Verbascum nigrum* × *austriacum* Rchb. (*V. subnigrum* Beck). Fahrfeld a. T. [38]; *V. Juratzkae* Dichtl (*superaustriacum* × *Thapsus*) Giesshübel [40]; *V. Thapsus* × *nigrum* (*V. collinum* Schrad.). Aspang [16]; *Veronica serpyllifolia* L. f. *V. nummularioides* Lec., Schneeberg [38]. *Melampyrum angustissimum* Beck. Eisernes Thor bis Schneeberg [11, Taf. XIV; 17, 38]; *M. grandiflorum* A. Kerner, Semmering [28]; Schneeberggebiet [17, 38]; *M. stenotaton* Wiesb. um Vöslau (Wiesb.) [40]. *Euphrasia montana* Jord. (= *E. versicolor* Halácsy et Braun nec Kerner), f. *humilis* Beck. Schneeberg [17]. *E. salisburgensis* Funck var. *alpicola* Beck. Voralpen – 1800 m [17]; *E. nivalis* Beck. Schneeberg, Raxalpe [17, 38, Taf. III]. *E. micrantha* Rchb. Gmünd [41].

*Mentha silvestris* L. f. *Brittingeri* Opiz. Baden, Kottingbrunn (Braun); *M. alpigena* A. Kerner. Buchberg, Hirschwang, *M. paludosa* Schreb. Hölles (Neilreich), Gainfahrn, Payerbach (Braun); *M. paludosa* × *candicans* (*M. Braunii* Oborny). Saubachgraben bei Gloggnitz (Becke) [38]; *M. Wierzbickii* Op. Liesing [40]; *Origanum vulgare* L. f. *glabrescens* Beck. Schneeberg [38]; *Thymus senilis* Dichtl. Mödling; *Th. raripilus* Dichtl. Gumpoldskirchen; *Th. pusio* Dichtl. Gaisberg [40]. *Brunella bicolor* Beck (*laciniata* × *grandiflora*); *B. variabilis* Beck (*grandiflora* × *laciniata*). Kalkberge [11, Taf. XIV].

*Primula brevistyla* DC. f. *exscapa*, *utraque*, *triplex* Wiesb. [40]. \**P. media* Peterm. f. *sordida* Beck (*officinalis* × *anglica*). Muckendorf [38].

*Urtica dioeca* L. v. *monoeca* Gr. Höllenthal [38]; *U. radicans* Bolla bei Baumgarten a. d. March [22].

*Quercus pendulina* Kit. Laxenburger Park (Wiesbaur). *Q. pubescens* f. *crispa* Vukot., *brachyphyllodes* Wiesb., *pinnatifida* und *susedana* Vukot. [26].

*Salix purpurea* L. f. *diandra* Wiesb., *eriantha*, *furcata*, *gracilis* *stylera* Wim., *pedicellata* Dichtl.; *S. cinerea* f. *polygama* Schultz bei Giesshübel [26].

*Zannichellia aculeata* Schur bei Moosbrunn [26].

*Platanthera bifolia* Rchb. v. *nudicaulis* Beck. Schneeberg, Raxalpe [38]. *Ophrys austriaca* Wiesb. Um Kalksburg (Wiesbaur) [26].

*Juncus Leersii* Marsson. In den Niederungen, Vöslau [38].

*Avena distichophylla* Vill. v. *mutica* Beck. Schneeberg; *Dactylis glomerata* L. f. *hirta* Beck. Schneeberg [38]. *Festuca capillata* Lam. Rekawinkel [41]. *Poa nemoralis* L. var. *firmula* Gaudin. Schneeberg [38].

*Pinus silvestris* L. v. *parvifolia* (ob Heer?). Geier b. Pottenstein [38].

**Verschleppt:**

**Delphinium orientale** Gay. Achau [9].

*A. crithmifolia* W. K. Zufällig bei der Militär-Schiessstätte und nächst der Sophienbrücke im Prater [4].

**Wichtigere neue Fundorte:**

*Thalictrum minus* L. Schneeberg — 1500 m [38]; *Ranunculus carinatus* Freyn bei Petersdorf [40]; *R. anemonoides* Zahlbr. Pernitz, Boding bei Rohr; *R. Breyninus* Crantz. Schneeberg; *R. acer* L. da-selbst — 1850 m; *R. lanuginosus* L. — 1800 m; *R. repens* L. Raxalpe — 1800 m [38]; *R. Frieseanus* Jord. Um Kalksburg, Laxenburg; *R. Steveni* Andrz. Kalksburg [40]. *Helleborus dumetorum* W. K. Mutmannsdorf, Ebelthal [38]; *H. viridis* L. Laab, Kalksburg [40]. *Aconitum Anthora* L. Buchberg [38]. *Frohnbachgraben* [14].

*Berberis vulgaris* L. Schneeberg — 1120 m [38].

*Papaver Argemone* L. Liesing [40]. *Corydallis bulbosa* Pers. (*cava* Schweigg. et K.). Schneeberg — 1450 m [38]; *C. pumila* Rchb. Gloggnitz [14], Wolfsthral [40]. *Fumaria Schleicheri* Soy. Will. Kalksburg bis Vöslau; *F. rostellata* Knauf. Schlosshof [40].

*Arabis (pauciflora* Gke.) *brassicaeformis* Wallr. Emmerberg; *Nasturtium officinale* R. Br. Pottenstein [38]; *N. austriacum* × *silvestre* (Neilr.). Wolfpassing [25]. *Arabis ciliata* R. Br. Grünbach, Handlesberg; *A. Jacquinii* Beck (= *A. bellidifolia* Jacq. nec Crantz). Furt, in d. Boding; *Cardamine hirsuta* L. Steinapiesting; *C. amara* L. var. *hirsuta* fl. dan. Steinapiesting; *Sisymbrium Columnae* Jacq. Schneeberg — 1400 m. *Erysimum Cheiranthus* Pers. Daselbst — 1580 m [38]. +*Erucastrum Pollichii* Schimp. et Spenn. Berg [40]. *Lunaria rediviva* L. Türkenluke bei Furt; *Cochlearia officinalis* L. Steinapiesting, Schwarzau; *Capsella bursa pastoris* Mnch. Schneeberg bis 1435 m [38]; *Bunias Erucago* L. Rappoltenkirchen [31]; *Raphanus Raphanistrum* L. Schneeberg — 1435 m [38].

*Helianthemum canum* Dunal. Hohe Wand — 950 m. *H. alpestre* Dunal. Obersberg [38].

*V. alba* Besser. Um Waldegg; *V. collina* Besser. Schwarzau; *V. biflora* L. auf allen Voralpengipfeln [38].

*Gypsophila muralis* L. Tulln bis Judenau [8]; *Tunica prolifera* Scop. Reichenau [14]; *Dianthus alpinus* L. Mamauwiese 800 m [38]; *D. superbus* L. Rappoltenkirchen [31], Kritzendorf, Zeiselmauer [10, 25]; *Sagina nodosa* Meyer. Hohenberg, Rohrer Sattel (Wettstein) [15], Längapiesting; *Alsine laricifolia* Jacq. Längapiesting, Buchberg, Trauch [38], Hohenberg (Wettstein) [15]; *A. setacea* M. K. Hohe Wand 700 m; *Arenaria serpyllifolia* L. Schneeberg — 1450 m; *Stellaria nemorum* L. — 1750 m; *St. media* Vill. Schneeberg — 1450 m; *St. graminea* L. Schneeberg — 1435 m [38].

*Linum catharticum* L. Schneeberg — 1600 m [38].

*Tilia platyphyllos* Scop. Schneeberg — 1550 m [38].

*Acer Pseudoplatanus* L. Schneeberg — 1600 m [38].

*Geranium Robertianum* L. Schneeberg — 1600 m [38].

*Oxalis Acetosella* L. Schneeberg — 1700 m [38].

*Erythronium latifolius* Scop. Oehler, Hohe Wand [38].

*Genista pilosa* L. Schneeberg bis 1820 m; *Ononis procurrens* Wallr. Scheuchenstein; *Anthyllis montana* L. Hohe Wand; *Medicago falcata* L., *lupulina* L. und *Melilotus officinalis* Desr. Schneeberg — 1450 m. *Trifolium ochroleucum* Huds. Merkenstein; *T. repens* L. Schneeberg — 1700 m; *Coronilla vaginalis* Lmk. Daselbst — 1650 m; *C. varia* L. — 1350 m; *Vicia oroboides* Wulf. Obers- und Handlesberg [38]; *V. pannonica* Crantz. Rappoltenkirchen [31], Vöslau [38]; *Eruvum pisiforme* Peterm. Gösing [38].

*Dryas octopetala* L. Mamauwiese 850 m; *Potentilla sterilis* Gcke. Mamauwiese 850 m; *Rosa cordifolia* Host. Vöslau bis Merkenstein (Braun); *R. haplodonta* (Borb.) Baden (Braun); *R. pumila* Jacq. Grossau, Pottenstein (Braun); *R. cinnamomea* f. *foecundissima* Koch. Schwarzau; *R. montana* Chaix. Schneeberg; *R. oblonga* Désegl. et Ripart. Baden, Fischau (Keller), Furt (Wołoszcz.); *R. Schottiana* Seringe. Eisernes Thor (Heimerl); *R. dumetorum* f. *capitata* Christ. Vöslau (Braun); f. *subglabra* Borb. Baden bis Merkenstein (Braun); *R. trachyphylla* Rau. Merkenstein (Braun); *R. Gizellae* Borb. Hohe Wand bis Buchberg; *R. graveolens* Gren. Reichenau (Halácsy); *R. micrantha* Sm. Merkenstein, Hirtenberg (Braun); *R. rubiginosa* L. f. *isacantha* Borb. Baden bis Triestingthal (Braun); *R. Gremlii* Christ. Höllenthal (Heimerl) [38]; *R. albolutescens* Rip. und *R. Carioti* Chab. Baden; *R. Dollineriana* Keller bei Judenau [23]; *Rosa eriostyla* Ripart. Sievering (Braun) [39]. *Mespilus Oxyacantha* Gaertn. Hohe Wand 950 m; *Amelanchier vulgaris* Mönch. Schneeberg — 1600 m. *Sorbus aucuparia* L. — 1700 m. *S. Aria* L. Schneeberg — 1600 m; *S. Aria* × *torminalis* (*S. latifolia* Pers.). Griesthal bei Rohr, Merkenstein [38].

*Epilobium angustifolium* L. Schneeberg — 1880 m; *E. montanum* L. — 1500 m [38]; *E. Lamyi* Schultz. Um Kalksburg (Wiesbaur), Kaltenleutgeben (Janka), Anninger, Neuwaldegg, St. Veit, Hacking (Neilr.) [37]; *E. trigonum* Schrank. Schneeberg — 1600 m; *Circaealpina* L. Unterberg [38].

*Callitricha verna* L. Auf der Schneearpe — 1750 m [38].

*Saxifraga ascendens* L. Schober, Bodingschneid [38].

*Carum Carvi* L. Schneeberg — 1639 m; *Bupleurum falcatum* L. Daselbst — 1500 m; *Athamanta cretensis* L. bei Furt, Unterberg, Gösing, Hohe Wand [38]. *Peucedanum Chabreai* Rchb. und *palustre* Mönch. Zwischen Tulln und Judenau [8]. *Heracleum austriacum* L. Obersberg, Dürre Wand, in der Boding bei 800 m [38]; *Losserpicium*

*prutenicum* L. Rappoltenkirchen [31]; *Orlaya grandiflora* Hoffm. Bei Liesing, Gumpoldskirchen [15], Gaisberg [40]; *Caucalis muricata* Bisch. Kaltenleutgeben, Gaisberg [40]; *Pleurospernum austriacum* Hoffmann. Obersberg [38].

*Loranthus europaeus* Jacq. Rappoltenkirchen [31].

*Sambucus nigra* L. Schneeberg — 1450 m [38].

*Galium retrosum* DC. Bei Hainburg [20]; *G. tricorne* With. Buchberg; *G. rotundifolium* L. Placklesberg [38]; *G. Wirtgeni* Schultz. Laab bis Baden [40]; *G. Mollugo* L. Schneeberg — 1400 m [38]; *G. silvaticum* L. Schneeberg — 1500 m [38].

*Valeriana elongata* L. Nördl. Abstürze d. Schneebergs [38].

*Cephalaria transsilvanica* Schrad. bei Wördern [8]; *Knautia arvensis* Coult. Schneeberg — 1000 m; *K. dipsacifolia* (Host). Oehler, dürre Wand; *Scabiosa lucida* Vill. Schneeberg — 1950 m [38].

*Homogyne discolor* Cass. Fuss des Handlesberges 750 m; *Tussilago Farfara* L. Schneeberg — 1440 m [38]; *Petasites albus* Gärtn., *officinalis* Mönch. Schneeberg — 1300 m; *P. niveus* Baumg. daselbst — 1780 m Dürre Wand 1150 m, Ortgraben bei Waidmannsfeld 750 m; *Bellis perennis* L. Schneeberg — 1500 m; *Solidago Virga aurea* L. Schneeberg — 1600 m [38]; †*Solidago lanceolata* L. bei Laxenburg, Liesing, Kalksburg, Moosbrunn, verwildernd [26]; *Micropus erectus* L. Neuwaldegg (Wettst.) [15]; †*Stenactis bellidiflora* A Br. bei Rappoltenkirchen [31], Zugberg bei Kalksburg (Wiesbaur) [26], bei Baden [38], bei Greifenstein, Kreuzenstein [10, 25]; \**Inula Neilreichii* Beck. Baden, Vöslau [38]; *Pulicaria vulgaris* Gärtn. Zeiselmauer [25]; †*Xanthium spinosum* L. Zeiselmauer, Neu-Aigen [25]; †*Galinsoga parviflora* Cav. Rodaun, Eisernes Thor [26], Rappoltenkirchen [31], in Wien (Burgerstein) [15]; *Rudbeckia laciniata* L. Au bei Kritzendorf [25]; †*Gnaphalium luteo-album* L. bei Rodaun, Kalksburg, Laab [26]; *Achillea Clavenae* × *Clusiana* (*A. Reichardtiana* Beck). Auf dem Dürrenstein (Ganglbauer), Saugraben des Schneebergs (Beck) [30, Taf. II]; †*A. Neilreichii* A. Kern. Militär-Schiessstätte im Prater [4]; *A. asplenifolia* Vent. Au bei Spillern [25]; *Matricaria Chamomilla* L. Rappoltenkirchen [31]; *Doronicum austriacum* Jacq. Schneeberg — 1670 m, Obersberg [38]; *Arnica montana* L. Um Rappoltenkirchen [31]; *Senecio campester* DC. bei Pottenstein, Weissenbach a. T.; *S. aurantiacus* DC. dürre Wand; *S. vulgaris* L. Schneeberg — 1435 m; *S. abrotanifolius* L. Obers- und Handlesberg, Oehler, Hohe und Dürre Wand; *S. nebrodensis* L. Schneeberg — 1600 m; *S. cordifolius* Gouan. Kuhschneeberg; *S. subalpinus* Koch. Obersberg [38]; *Centaurea Jacea* L. var. *pectinata* Neirl. Prater (Wiesbaur) [26]; *C. pseudophrygia* C.A. Meyer b. Epping [31]; *C. Cyanus* L. Schneeberg — 1435 m [38]; *C. Calcitrapa* L. b. Rodaun (Wiesbaur) [26]; *Cirsium heterophyllum* All. bei Karlstift [41]; *C. Erisithales* Scop. bei Rappoltenkirchen [31]; \**C. tataricum* Wimm. Kalksburg, Laab, Breitenfurt, Giesshübel [26]; \**C.*

*erucagineum* DC. in der Schwarzau, bei Scheuchenstein; *C. palustre* × *Erisithales* Klausbiegl im Nasswald; *C. Erisithales* × *rivulare* Reich. (*C. praealpinum* Beck). Schirmesthal; *Leontodon autumnalis* L. Schneeberg – 1850 m; *L. hastilis* L. var. *alpinus* Jacq. Alpelleiten, Grafensteig (des Schneeberges), v. *hyoseroides* Welw. Krumbachgraben; *Scorzonera hispanica* L., Pfennigwiese; *Willemetia apargioides* Cass. Schwarzau bei Rohr i. G., Handlesberg [38]; *Lactuca stricta* W. K. bei Hainburg [26]; *Crepis praemorsa* Tausch. i. d. Vois, Unterberg; *C. alpestris* Tausch. Sooser Lindkogl; *C. mollis* Aschs. Handlesberg [38]; *Carduus Personata* Jacq. Harmaunsschlag [41]; *C. viridis* A. Kern. Schneeberg [38]; *C. acanthoides* × *glaucus* (*C. Schulzeanus* Ruhmer?). Gaisberg (Kornhuber); bei Kaltenleutgeben [26]; *Hieracium Pilosella* L. Schneeberg – 1560 m [38]; *H. Schultesii* F. Schultz. Kalksburg [26]; \**H. brachiatum* Bert. und *H. florentinum* All. bei Baden; *H. praealtum* Vill. in d. Trauch, Vois, Schneeberg; *H. cymosum* L. f. *poliotrichum* Wimm. Gösing, Handlesberg [38], Mödling bis Baden (Wiesbaur) [40]; *H. villosum* L. Dürre Wand, bei der Kirche von Schwarzau 600 m; *H. humile* Jacq. bei Buchberg, auf dem Schober, Oehler, Dürre Wand [38]; *H. strictissimum* Fröl. Lackaboden, Alpeleck, Emmysteig d. Schneebergs [38, Taf. VII]; *H. boreale* v. *chlorocephalum* Uechtr. Kalksburg; *H. sessiliflorum* Friv. = *H. barbatum* Tausch. Rodaun bis Kaltenleutgeben [40]; *H. tridentatum* Fr. Nebelstein [41].

*Jasione montana* L. Rappoltenkirchen [31]; *Campanula pulla* L. Schwarzau, Trauch; *C. Scheuchzeri* Vill. Dürre Wand, Mamauwiese 900 m; *C. rapunculoides* L. Schneeberg – 1500 m; *C. Trachelium* L. daselbst – 1550 m [38]; *C. Cervicaria* L. Epping [31].

*Arctostaphylos Uva ursi* Spreng. Obersberg [38]; *A. alpina* Spr. Handlesberg; *Rhododendron hirsutum* L. Schneeberg – 1980 m, auf den meisten Voralpengipfeln, bei Pernitz, Rohr etc.; *Pirola uniflora* L. Schneeberg – 1945 m [38].

*Ilex Aquifolium* L. Unterberg [38].

*Ligustrum vulgare* L. Hohe Wand 1000 m; *Fraxinus excelsior* L. Schneeberg – 1120 m [38].

*Menyanthes trifoliata* L. Schwarzau, Rohr im G., Zellenbach; *Swertia perennis* L. Furt, in der Boding, Trauch; *Gentiana asclepiadea* L. Mandling (Stöger) [38]; *G. Pneumonanthe* L. Rappoltenkirchen [31]; *G. Clusii* Perr. et Song. In den Voralpen [38]; *Erythraea pulchella* Fr. Fahrafeld a. T. [38].

†*Polemonium coeruleum* L. Bei Rohr, verwildert [38].

†*Anchusa italicica* Retz. Militär-Schiessstätte im Prater [4]; *Sympodium tuberosum* L. Schneeberg – 1500 m; *Myosotis hispida* Schlecht. daselbst – 1550 m [38].

*Solanum miniatum* Bernh. Prater [25]; Petersdorf, Laab, Velm [40].

*Verbascum phlamooides* × *austriacum* (*V. danubiale* Simk.). Liesingthal (Wiesb.) [40]; †*Antirrhinum majus* L. Lusthausberg bei Vöslau; *Digitalis ambigua* Murr. Schneeberg — 1550 m [38]; *Veronica Anagallis* L. Schneeberg bis 1175 m (A. Kerner) [38]; *V. Chamaedrys* L. Daselbst — 1550 m [38]; *V. officinalis* L. Daselbst — 1660 m; *Tozzia alpina* L. Obersberg; *Melampyrum nemorosum* L. Gahns; *M. pratense* L. Schneeberg — 1600 m; *Pedicularis verticillata* L. Handlesberg; *Alectorolophus angustifolius* Heynh. Mamauwiese; *A. alpinus* Gcke. Placklesberg, Falkenstein [38].

*Orobanche gracilis* Sm. Hocheck — 900 m; *O. caryophyllacea* Sm. Schwarzau bis Rohr; *O. platystigma* Reich. Gahns; *O. Teucrii* Holandre und *O. Salviae* Schultz. Ueberall im Schneeberggebiet [38]; *O. coerulescens* Steph.? Rappoltenkirchen [31].

*Mentha sativa* L. Baden bis Kottingbrunn (Braun); *M. austriaca* Jacq. Baden bis Vöslau (Braun); *M. arvensis* L. f. *pumila*, *pulchella*, [38], *simplex* (Host). Vöslauer Umgegend (Braun); *M. rubra* Sm. Längapiesting; f. *Wirtgeniana* Schultz. Vöslau (Braun), Gloggnitz (Heimerl) [38]; *Salvia silvestris* L. (= *S. elata* Host, *nemorosa* × *pratensis*) Neustadt (J. Kerner) [39], an vielen Stellen [40]; *Thymus humifusus* Bernh. Schneeberg bis 1900 m [38]; †*Melissa officinalis* L. verwildert: Merkenstein, Grossau [38, 40]; †*Nepeta Cataria* L. Rappoltenkirchen verwildert [31]; *Melitis Melissophyllum* L. Bodingschnied 950 m; *Lamium maculatum* L. Schneeberg — 1260; *Galeobdolon luteum* Huds. daselbst bis 1500 m; *Galeopsis speciosa* Mill. — 1320 m; *G. Tetrahit* L. — 1435 m; *Stachys germanica* L. Merkenstein, Weissenbach a. T. [38]; Wolfsthaler Galgenberg [40]; *Scutellaria hastifolia* L. Tulln bis Judenau [8]; *Ajuga genevensis* L. Schneeberg [38].

*Utricularia minor* L. Prater [7].

*Centunculus minimus* L. Zwischen Tulln und Judenau [8]; *Androsace lactea* L. Obers- und Handlesberg [38]; *A. Chamaejasme* Host. In Buchbergerthal (herabgeschwemmt?) (F. Leeder) [14]; *Primula elatior* Jacq. Schneeberg — 1900 m [38]; *P. Clusiana* Tausch. Hohenberg (Wettstein) [15], Boding bei Rohr 750 m Obersberg; \**P. Portenschlagii* Beck (= *intermedia* Portenschl. nec Sims) [38, Taf. VIII]; *Cortusa Matthioli* L. Obersberg; *Cyclamen europaeum* L. Schneeberg — 1500 m [38].

*Globularia cordifolia* L. auf dem Schneeberge — 1550 m [38].

*Plantago major* L. Schneeberg — 1450 m; *P. media* L. daselbst — 1440 m [38]; *P. maritima* L. Himmel bei Grinzing (Wettstein) [15], in der Neuen Welt [38].

*Rumex maritimus* × *pratensis* Heimerl. Maria Lanzendorf [41]; *R. silvester* Wallr. Schneeberg — 1450 m; *Polygonum Bistorta* L. Alpengipfel 1800 m; *P. viviparum* L. in der Mamauwiese b. 850 m [38].

*Daphne Laureola* L. Miesleiten 700 m [38].

*Thesium montanum* Ehr. Oehler, Dürre Wand, bei Buchberg [38]; *T. humile* Vahl. Hainburg, Wolfsthal [26].

*Euphorbia amygdaloides* L. Schneeberg — 1490 m (A. Kerner) [38].  
*Ulmus montana* Sm. Schneeberg — 1000 m. *Urtica urens* L.  
 Baumgartnerhaus am Schneeberg 1435 m; *Parietaria officinalis* L.  
 Waichthal des Schneebergs 1200 m [38].

*Fagus silvatica* L. Schneeberg — 1450 m. *Quercus sessiliflora* Sm.  
 Auf dem Oehler, strauchig bei 950 m [38].

*Betula alba* L. Steigt am Schneeberg — 1300 m; *Alnus glutinosa*  
 Gärtn. — 900 m; *A. viridis* DC. Auf dem Schneeberge — 1817 m; *Corylus Avellana* L. und *Carpinus Betulus* L. Steigen daselbst — 1000 m.  
 [38].

\**Salix austriaca* Host. Haltberghof bei Buchberg [38]; *S. daphnoides* Vill. Kaltenleutgeben; \**S. mauretensis* Kern. Bei Kalksburg;  
 \**S. sordida* A. Kern. bei Giesshübel [26]. *S. grandifolia* Seringe. Auf  
 dem Schneeberge — 1850 m [38]; *S. repens* L. In der Walch und bei  
 Bonnadörfl [31], bei Fahrafeld und Pernitz [38]; *S. myrsinifolia* L. Auf  
 dem Obersberge bei 1400 m [38].

*Populus tremula* L. Auf d. Bodingschneid 950 m [38].

*Potamogeton pectinatus* L. In d. Sierning bei Stücksenstein; *P. densus* L. Bei Gainfahrn [38]; *Zannichellia palustris* L. Bei Höflein [15, 25], an der Erlaf b. Pöchlarn (Wettstein) [15].

*Arum maculatum* L. Von der Triesting bis auf's Hocheck 800 m [38]. *Acorus Calamus* L. Zwischen Epping und Kraging [31].

*Orchis ustulata* × *variegata* (*O. Dietrichiana* Bogenh.). Braunsberg [26]; *O. ustulata* L. Bodingschneid, Brunnthalerhöhe — 900 m [38]. *O. coriophora* L. Laab [26]; *O. globosa* L. Rappoltenkirchen, Bonnadörfl [31]; *O. pallens* L. Reingupf, Hocheck 1000 m [38]; *O. speciosa* Host. Laab auf dem Hölenstein [31]; *O. sambucina* L. Handlesberg; *Nigritella angustifolia* Rich. Mandling, Hohe Wand (Stöger) [38]. *Ophrys aranifera* × *muscifera* (*O. hybrida* Pokorný). Gahns [14]; *O. arachnites* Murr. Pottenstein, Fahrafeld a. T. [38]; *Herminium Monorchis* R. Br. Bei Hirschwang [14]. *Anacamptis pyramidalis* Rich. Schwarzau i. G., Oehler [38]; *Limodorum abortivum* Sw. Eisern. Thor (Wettst.) [15]. *Epipactis palustris* Crantz. Scheuchenstein [38], Kienberg (Wettstein) [15]; *Listera cordata* R. Br. Höllenthal (Fruwirth) [14]; *Corallorrhiza innata* R. Br. Weissenbach i. d. Brühl [26]; *Microstylis monophyllos* Sw. Miesleiten und Krummbachgraben [38]; *Cypripedium Calceolus* L. Rappoltenkirchen [31], Obersberg 1250 m [38].

*Iris sibirica* L. Walchen b. Rappoltenkirchen [31].

*Gagea lutea* Schult. Schneeberg — 1250 m [38]; *Lilium bulbiferum* L. Hagerkogl bei Kienberg (Wettst.) [15]; †*Ornithogalum nutans* L. Zw. Marchegg und Schlosshof (Wiesb.) [26]; *Allium rotundum* L. Braunsberg [26]; *A. sphaerocephalum* L. Königswarte bei Berg [26], Buchberg [14]; *Muscaria tenuiflorum* Tausch. Kritzendorf [25].

*Colchicum autumnale* f. *vernus* Schrank. Siegenfeld (Wettstein) [15], Kaltenleutgeben (Wiesb.) [26].

*Luzula albida* v. *rubella* Hoppe. In den höheren Voralpen [38].

*Schoenus ferrugineus* L. Bei Furt, Scheuchenstein; *Carex stenophylla* Wahlenb. Kalksburg [26], Rappoltenkirchen [31]; *C. panniculata* L. Schneeberg – 1250 m [38]; *C. brizoides* L. Einöd bei Rappoltenkirchen [31]; *C. stricta* Good. Am Burbache bei Pottenstein [38]; *C. ericetorum* Poll. Bei St. Egyd im Neuwalde [41]; *C. umbrosa* Host, *pilulifera* L. Rappoltenkirchen [31]; *C. humilis* Leyss. Emmerberg, vord. Wand, bei Reichenau; *C. nitida* Host. v. *conglobata* Kit. Vöslau; *C. capillaris* L. Mamauwiese 900 m [38]; *C. Michelii* Host. Wolfsthal, Hainburg [26]; *C. Hornschuchiana* Hoppe. Schwarzau i. G.; *C. firma* Host. Unter-, Obers-, Handlesberg; in der Boding 800 m; *C. tenuis* Host. Obersberg [38].

*Milium effusum* L. Am Schneeberg bis 1550 m; *Aira caespitosa* L. *genuina*. Im Schirmesthal bei Ottershof 700 m; *A. flexuosa* L. v. *contracta* Neirl. Auf dem Schneeberge bis 1670 m; *Avena flavescens* Gaud. v. *alpestris* Neirl. Im Griesthale bei Rohr 650 m [38]; *A. caryophyllea* Web. Aspang (Braun) [39]; *Poa minor* Gaud. Schneeberg herab – 1500 m; *P. pratensis* L. Schneeberg – 1850 m; *Festuca rupicaprina* Hackel. Schneeberg herab – 600 m [38]; *F. Uechtritziana* Wiesb. Von Liesing bis Kaltenleutgeben und Laxenburg (Wiesbaur) [26]; *F. varia* Haenke v. *pallidula* Hackel bei Schwarzau i. G., auf dem Schober, Oehler [38]; *F. silvatica* Vill. Auf dem Nebelstein bei Hirschenwies [41]; *Triticum caninum* L. Bei Fahrafeld a. d. T. [38]; *Nardus stricta* L. Rappoltenkirchen [31].

*Taxus baccata* L. Purbachgraben, Hohe Wand – 900 m; *Juniperus communis* L. Schneeberg – 1500 m; *Pinus silvestris* L. Schneeberg – 1350 m; *P. nigra* Arnold = *P. nigricans* Host. Im Saugraben des Schneebergs bei 1412,8 m; *P. Muglus* Scop. Am Obersberg bei Schwarzau 1450 m; am Schneeberge – 2004,3 m; *Abies alba* Mill. Strauchartig daselbst – 1434 m; *Picea excelsa* Link daselbst – 1853 m; *Larix decidua* Mill. daselbst – 1817 m ansteigend [38].

---

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Beck Günther [Gunthero] Ritter von Mannagetta

Artikel/Article: [Nieder-Oesterreich CIL-CLXI](#)