VII. Niedersächsisches Gebiet.

(Nordwestdeutsche Tiefebene, von der Elbe bis zur Niederländischen Grenze, vom Fusse der Wesergebirge bis zur Nordsee, also mit Ausschluss der Floren von Osnabrück, Hannover, Braunschweig und der Altmark.)

Referent: Fr. Buchenau.

Literatur.

1. Ad. Andrée, *Vaccinium macrocarpum* (Cranberry) am Steinhuder Meere, im Tageblatt der Vers. deutscher Naturforscher und Aerzte in Magdeburg S. 163 und 33. Jahresber. Nat. Ges. Hannover, S. 80.
2. W. O. Focke, Zur Flora von Bremen, in Abhandl. Nat. Ver. Bremen, VIII, S. 498 und 543, 544.
3. Fr. Buchenau, *Juncus balticus* Willd. auf Borkum, daselbst. S. 537, 538.¹⁾
4. Fr. Buchenau, Zur Flora von Rehburg, daselbst, S. 589, 590.
5. W. O. Focke, Zur Flora von Bremen, daselbst, S. 591, 592.
6. W. O. Focke, *Viola Riviniana*, daselbst, IX, S. 64.
7. W. O. Focke, Ein bemerkenswerther Primel-Mischling, das., S. 77, 78.
8. Fr. Buchenau, *Carex punctata* in Deutschland, daselbst, Seite 139, 140.
9. H. Steinvorth, Botanische Anmerkungen zur Flora von Lüneburg, in Jahreshfte Nat. Ver. Lüneburg, 1884, IX, S. 132 bis 134.
10. C. Haussknecht, Beitrag zur Kenntniss der einheimischen Rumices, in Mitth. Geogr. Ges. Thür. III. S. 56—79.

Neu für das Gebiet:

Rubus rosaceus Whe et Nees. Erve bei Bremen [5], erster deutscher Standort ausserhalb der Rheinprovinz.

†*Vaccinium macrocarpum* Ait. Im Moore bei Hagenburg, unweit Rehburg von Schmalhausen entdeckt (vergl. Ber. d. deutsch. bot. Ges.

1) Daselbst, S. 535, 536 giebt Buchenau Nachrichten über das Central-Herbarium der nordwestdeutschen Flora im Besitz der städtischen Sammlungen für Naturgeschichte und Ethnographie in Bremen.

1883). — Der Standort wurde von Ad. Andrée nach Publikation obiger Notiz [1] besucht und dabei mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit festgestellt, dass die Pflanze von einem Liebhaber der Botanik, Dr. med. Struve, welcher in den dreissiger Jahren in Hagenburg lebte und auch in Amerika gewesen war, dort angepflanzt wurde. [Briefl. Mittheilung.]

Ein interessanter Bastard von wilder *Primula acaulis*, befruchtet durch Pollen einer Gartenprimel, bei Upjever unfern von Jever [7].

Rumex maritimus × *crispus* (*R. fallacinus* Hausskn.). Bremen: Weserufer bei Gröpelingen [10].

Juncus balticus Willd. An einer sehr beschränkten, von der Verwehung durch Dünensand bedrohten Stelle des Nordstandes der Insel Borkum gefunden [3]. Erster sicherer Standort in dem Gebiet (die Angabe: „Insel Neuwerk“ von G. F. W. Meyer in der Flora Hannov. excurs. ist sicher falsch).

Carex punctata Good. Insel Langeoog auf dem oberen Theile der Binnenwiese [8], neu für das Deutsche Reich.

Elatine triandra Schk. und *Callitriche auctumnalis* L. sind für die Gegend des Steinhuder Meeres zu streichen [4].

Wichtigere neue Fundorte u. a:

Viola Riviniana Rehb. bildet mit echter *V. silvatica* Fr. Kreuzungsformen, welche nur wenige normale Pollenkörner besitzen; die Pflanze ist daher besonders zu studiren [6].

Sedum reflexum L. Seit 30 bis 40 Jahren von den Elbufern bemerklich westwärts gewandert [9].

Saxifraga granulata L. breitet sich im Lüneburgischen, von den Eisenbahnen ausgehend, mehr und mehr aus [9].

Senecio vernalis W. et K. Erbstorf-Göhrde, seit 1883 [9]; seit 1882 auch in der Gegend von Bassum, auch in der seltenen Form ohne Strahlblüthen.

Lobelia Dortmanna L. Haidetümpel unweit Farge [2].

Vaccinium Myrtillus L., mit weissen Früchten, bei Soltau [9];

Rumex domesticus Hartm. Bremen: Weserufer bei Gröpelingen [10];
R. Hydrolapathum × *aquaticus* (*R. maximus* Schreb.). Eystrup [10].

Tithymalus Cyparissias Scop. Im Föhrenwalde bei Olm in Menge aufgetreten [9], früher im Lüneburgischen ganz fehlend.

Listera cordata R. Br. Soltau (C. Nöldeke u. Fr. Buchenau) [9];

Heleocharis multicaulis Sm. Haidetümpel unweit Farge [2].

Hierochloa odorata Whlbnbg. Wiesen zwischen Brietlingen und Lüdershausen [9].

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Buchenau Franz Georg Philipp

Artikel/Article: [Niedersächsisches Gebiet CXVI-CXVII](#)