

IV. Schlesien.

(Preussisch- und Oesterreichisch-Schlesien, excl. Ober-Lausitz.)

Referent: R. v. Uechtritz.

Quellen:

a) Literatur.

1. R. von Uechtritz, Resultate der Durchforschung der schlesischen Phanerogamenflora im Jahre 1885 (Jahresb. der schles. Gesellsch. 1886).¹⁾
2. A. Oborny, Flora von Mähren und Oesterr.-Schlesien, Th. II und III. Brünn 1885 und 1885.
3. E. Formánek, Beitrag zur Flora des böhmisch-mährischen und des Glatzer Schneegebirges (Oesterr. Botan. Zeitschr. 1885 und 1886. Vgl. Mähren, No. 5).
4. G. Schneider, Mittheilungen über die *Hieracia* des Riesengebirges (Oest. Botan. Zeitschr. 1886, S. 21—25).
5. G. Schneider, *Hieracium diaphanum* Fries. (Deutsche Botan. Monatsschrift IV. 1886. S. 14.)
6. A. Schultz, Correspondenz-Artikel (Deutsche Botan. Monatsschrift III. 1885, S. 142).
7. Dr. Eustach Wołoszczak, Neue Pflanzen-Standorte (Oest. Botan. Zeit. 1886, S. 117).

b) Schriftliche Mittheilungen.

8. Andreas Kotula, k. k. Notar in Teschen, Notizen über die Flora des Teschener Ländchens.

Neu für das Gebiet:

Viola arenaria × *canina* Uechtr. (Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. IX, 1867) = *V. Allionii* × *canina* Lasch! (Botan. Ztg. 1857). Lüben: Brauchitschdorfer Forst (C. Scholz!).

Geranium palustre L. f. *albiflora*. Dittmannsdorf zwischen Oderberg und Freistadt [8].

1) Nur citirt, wenn die Angaben zugleich in andern Arbeiten erwähnt oder denselben entlehnt sind.

Rosa graveolens Gren. Grünberg: Heiders Berg (Hellwig!); var. *calcareo* Christ (= var. *thuringiaca* ej.). Landeshut: Reussendorf (Pax!), Friedland: an der Steine bei Heinzendorf (Fiek!); *R. sepium* Thuill. var. *pubescens* Rap. f. *intricata* Uechtr. Cudowa (Grabowski!); Nimptsch: Tartarenschanze bei Priestram! (Fiek 1884, Uechtr. 1885); *Geum montanum* L. f. *polyantha* Uechtr. Riesengebirge: Langer Grund (J. Bornmüller!).

Epilobium alsinefolium × *obscurum* (*E. rivulicolum* Hausskn.). Riesengebirge: Zwischen den Schüsselbauden und Spindelmühl (Fiek!).

Carlina vulgaris L. var. *intermedia* Schur! (sp.). Breslau: Hügel im Park von Lissa!!; Oelsner Berge über Gr. Silsterwitz!!; var. *nigrescens* Form. Lähn: Eichberg (Nagel!); Breslau: Oberrnigk!!; Gesenke: Schoberbusch bei Freudenthal (Form.); Beskiden: Jablunkapass!! Vergl. Bericht d. Comm. für die Flora von Deutschl. 1884, S. CXLIV.

— *Cirsium lanceolatum* × *canum* (*C. Preiseri* Uechtr.). Breslau: Wiesen-dämme bei Schönellgut (Preiser!); *Crepis paludosa* (L.) Mch. var. *brachyotus* Čel. (!) Breslau: Wiesen der Weideniederung bei Weide!! *Hieracium montanum* G. Schneid. (nec Näg. Pet.) = *H. polymorphum* ej. nunc (in litt.) = *H. Fritzei* F. Schz. (amplif.) var. *spathulifolium* G. Schnd.! Riesengebirge nicht selten und var. *pseudopersonatum* ej. Riesengebirge: Gehänge, um die Riesenbaude, Kl. Teich, über den Teichen, Melzergrube, Kl. Sturmhaube (G. Schneid.!) [4, 1]; *H. Uechtritzianum* G. Schneid. (nec alior.). Riesengebirge, selten: Aupagrund, Gr. Teich (hier auch eine f. *stylosa*), Fuss des Brunnenberges, Krkonoš (G. Schneid.!) [4, 1]; *H. diaphanum* Fr. (!) Riesengebirge: Gr. Schnee-grube (G. Schneider!) [5, 1] nach Christener auch in der Schweiz, von Gremli nur unter den zweifelhaften Arten aufgezählt.

Solanum villosum Lam. (nach meiner Auffassung var. von *S. nigrum* L.). Liegnitz: Alte Kirchhofmauer, Gasanstalt, Leubus (Gerhardt!); Breslau: hinter der Schulgasse, an der Oder bei Marienau und sonst!!; Proskau: akademischer Garten (Stein! 1867).

Melampyrum nemorosum L. var. *subsimplex* Uechtr. Nimptsch: sehr zahlreich an den Stehbergen bei Kittelau; seltener am Fusse des Geiersberges im Zobtengebirge bei Kl. Silsterwitz und weiterhin am Wege nach Tampadel, stets mit *M. nemorosum typicum* und *M. commutatum* Tsch. (*M. pratense* auct. pl.)!!

Stachys silvatica L. f. *albiflora*. Liegnitz: Lindenbusch sparsam (Gerhardt und Figert).

Rumex conglomeratus × *maritimus* (*R. Knafii* Čel., *R. maritimus* forma (hybrida) *Warrenii* Trimen et *R. conglomeratus* × *maritimus* f. *Warrenii* ejusd.). Breslau: ein kräftiger Stock unter den Eltern bei Mahlen!!

Salix Caprea × *daphnoides* (*S. Erdingeri* Kern.). Teschen: an der Bahn unterhalb des Teschener Schlossberges! [7, 8].

Gladiolus imbricatus L. var. *parviflorus* (Berdau spec.). Beskiden: sparsam im Głuchowa-Thale bei Nydek! [8].

Carex Buekii Wimm. var. *melanostachya* Uechtr. Breslau: buschige Dämme der Ohle-Niederung vor Althof-Nass ohne den Typus zahlreich!!
C. silvatica Huds. var. *Tommasinii* Rchb. Woischnik: Grojetzberg (Fiek! und Wetschky).

Calamagrostis litorea (Schrad.) DC. Teschen: an der Weichsel bei Ustron! [18].

Eingeschleppte oder verwilderte Arten:

Bifora radians M. B. Gleiwitz: an der Eisenbahn bei der Kgl. Hütte seit mehreren Jahren (Jungck!).

Lonicera Caprifolium L. Weidenau in Oest.-Schlesien [2].

Lagurus ovatus L. Jauer: Wegränder bei Moisdorf (F. W. Scholz!).

Wichtigere neue Fundorte u. a.:

†*Clematis Vitalba* L. Liegnitz: Barschdorf (Figert); *Thalictrum silvaticum* Koch. Liegnitz: zwischen Vorderhaide und Neurode (Gerhardt); *Pulsatilla alpina* (L.) Delarb. f. *sulphurea* (L.). Kl. Schneeegrube ein Exemplar (F. W. Scholz); *Adonis aestivalis* L. var. *citrina* (Hoffm.) Woischnik: Kalkäcker östlich vom Zogelberge (Fiek! und Wetschky); *Ranunculus triphyllos* Wallr. Hirschberg: Bach oberhalb der Polnischen Mühle, auch mit gefüllten wohlriechenden Blüten (Fiek!); Breslau: Wiesengräben zwischen Gr. Grüneiche und der Schwoitscher Chaussee, eine f. *obtusiloba* mit zugleich etwas steifhaarigen Früchtchen!!; *R. cassubicus* L. Breslau: Mahlener Wald selten (Preiser!); *R. acer* L. var. *alpestris* W. et Gr. Hampelbaude (G. Schneider); †*R. Steveni* Andr. Breslau: Grasplätze der Promenade am Zwinger (Bodmann!); *Aconitum variegatum* L. Woischnik: Grojetzberg (Fiek und Wetschky).

Berberis vulgaris L. Schönau: Goldberger Hegewald bei Neukirch (Figert).

Fumaria Vaillantii Lois. Woischnik: Zogelberg und östlich von diesem (Fiek und Wetschky!).

Cardamine hirsuta L. Gesenke: Reiwiesen (E. Richter!); *C. pratensis* L. f. *acaulis* Berg. Breslau: Ohlawiesen hinter der Hase'schen Brauerei mit Uebergängen zum Typus!!; *Dentaria glandulosa* W. et K. Rybnik: im Goi bei Pohlom! (Migula); Beskiden: am Stózek im oberen Radwanówthale und am Grossen Ostry (Schube!); †*Diplotaxis muralis* (L.) DC. Freistadt: Olszaufer ziemlich häufig [8]; †*Rapistrum rugosum* (L.) Bergeret. Grünberg: Klopsch's Ziegelei! (Hellwig).

Viola epipsila Lod. Oppeln: an einem zweiten Standort, wahrscheinlich zwischen Dembio und der Silberquelle (Schmidt); nach A. Peter auch im Riesengebirge (O. B.-Z. 1886 S. 42); *V. collina*

Bess. Woischnik: Grojetzberg (Fiek und Wetschky); *V. pumila* Chaix. Strehlen: Ruppersdorf (Kruber); *V. tricolor* L. var. *saxatilis* (Schmidt). Rosenberg: Sausenberg an Teichdämmen (Bodmann!).

Drosera anglica Huds. Abhänge des Elbgrundes zwischen Elb- und Pantschefall 1120 m (Paul, Fiek!), neu für die alpine Region der Sudeten, ebendort auch *D. obovata* M. et K. (Fiek); *Aldrovandia vesiculosa* L. Rybnik: Pohlom! (Migula).

Polygala amara L. var. *austriaca* Cr. Reinerz: Hutberg (C. Scholz!) und zwar die f. *cyanella* W. et Gr.; neu für die Grafschaft Glatz!

Dianthus Armeria × *deltoides* (*D. Hellwigii* Borb.). Teschen: Babiagórka bei Wendrin, neu für Oesterr.-Schlesien [8]; *Dianthus superbus* L. var. *alpestris* J. Kablik. Gesenke: Gr. und Kl. Seeberg [3]; *Vaccaria parviflora* Mnch. Teschen: Błogocice (Dr. B. Kotula) [8]; † *Silene dichotoma* Ehrh. Friedland: zwischen Langwaltersdorf und Schmitzdorf (Figert!) *Sagina subulata* (Sw.) T. et Gr. Rosenberg: Bischdorf (in Mus. bot. Berol. mis. F. Meyerholz); *Stellaria Frieseana* Ser. Woischnik: Wald zwischen Bahnhof Stahlhammer und Sosnitza (Fiek und Wetschky!); *Cerastium triviale* Lk. var. *nemorale* Uechtr. Lüben: torfige Gebüsch bei Krummlinde (Gerhardt); var. *alpestre* Lindb. (*C. macrocarpum* Schur.). Dürre Koppe des Schneegebirges und im Gesenke: Gr. und Kl. Seeberg, Heiligenhübel [3].

† *Malva crispa* L. Hirschberg: auf dem Sande, Cunnersdorf, Herischdorf (Fiek); Jauer: Brenberg (Figert); *M. neglecta* × *rotundifolia* (*M. adulterina* Wallr.). Jauer: Mertschütz (Gerhardt!); Breslau: in Protsch a. Weide!!; † *Lavatera trimestris* L. Breslau: vor Marienau mit *Hibiscus Trionum* L.!! (Schube).

Geranium divaricatum Ehrh. Trebnitz: Gebüsch an Wegrändern bei Striese (Preiser!).

Impatiens Noli tangere L. mit kleistogamen Blüten. Heinrichau: Morschwitzer Buchenwald (Dr. Schneider); Nimptsch: Schlucht der Tartarenschanze bei Priestram nur diese!

Euonymus verrucosa Scop. Woischnik: Grojetzberg (Fiek und Wetschky!)

† *Ulex europaeus* L. Ustron: Fuss der Skalica! [8]; *Ononis spinosa* L. Woischnik: Wachholderberg, Weg nach Mühlchen (F. u. W.); *Trifolium ochroleucum* L. Woischnik: Weg nach Mühlchen, Grojetzberg (F. u. W.); *Onobrychis viciaefolia* Scop. Spontan vielfach um Woischnik (F. u. W.); *Lathyrus niger* (L.) Wimm. var. *heterophyllus* Uechtr. Trebnitz: Machnitzer Wald (Preiser!); Fuss des Zobtenberges zwischen Bankwitz und Kl. Silstewitz nicht selten!!

Rubus Idaeus L. var. *denudatus* Schimp. et Sp. Lüben: Gr. Kriechen, mit normal entwickelten (Figert!); ein Strauch der Normalform mit durchweg 3zähligen Blättern bei der Brauchitschdorfer Ziegelei (ders.);

CLVI Bericht der Commission für die Flora von Deutschland 1885.

R. caesioides × *Idaeus* G. Mey. Liegnitz: Krummlinde (Fig.), zwischen Gassendorf und Rothkirch, Lindenbusch (Fig. u. Gerh.); Goldberg: Wolfsberg (Fig.); *Potentilla mixta* Nolte. Lublinitz: westlich von Zawodzie (Fiek!); Tarnowitz: gegen Hugohütte (Wetschky); *P. alba* L. foliis omnibus ternatis. Breslau: 1 Exemplar zwischen Rathen und Leuthen!!; *Rosa inodora* Fr. Zobten: Weinberg (Wimmer und Wichura!); *R. gallica* L. Teschen: mehrfach, auch nahe der Stadt, neu für das östliche Oesterr.-Schlesien [8]; *R. canina* × *gallica*. Breslau: Althof-Nass!; *Pirus torminalis* (L.) Ehrh. Striegau: Kreuzberg (Pax!).

† *Philadelphus coronarius* L. Nimptsch: Tartarenschanze bei Priestram (Schube!).

Epilobium obscurum × *roseum* (*E. brachiatum* Čel.). Liegnitz: Siegendorf (Gerh. u. Fig.); *E. palustre* × *parviflorum* (*E. rivulare* Whlbnbg). Gr. Glogau: Schönau (Fig.); Liegnitz: Siegeshöhe (ders.); *E. parviflorum* × *roseum* (*E. persicinum* Rchb.). Lüben: Malmitz (Fig.).

Rhodiola rosea L. Gesenke: Saukamm [3]; *Sempervivum soboliferum* Sims. Trachenberg: sandiges Kiefergehölz bei Korsenz (Schwarz).

Saxifraga aizoon Jacq. Gesenke: Falkensteine bei Gabel [2].

† *Ammi majus* L. Teschen: unter Kartoffeln bei Bobrek! [8]; *Pimpinella Saxifraga* L. f. *rosea*. Sparsam am Fusse des Geiersberges zwischen Kl. Silsterwitz und Tampadel!!; *Meum athamanticum* Jacq. Isergebirge: zwischen Querbach und dem kalten Berge und bei Schwarzbach (Fiek); *Heracleum Sphondylium* L. var. *conforme* Mnch. Gesenke: Gr. Kessel [2]; *Laserpitium Archangelica* Wulf. Gesenke: Kl. Kessel [2]; *Scandix Pecten Veneris* L. Woischnik: Kalkäcker des Zogelberges, Quartberges und anderer Hügel zahlreich (Fiek und Wetschky!) neu für Oberschlesien.

Asperula glauca (L.) Bess. Jägerndorf (Spatzier) [2]; *Galium silvestre* Poll. Liegnitz: an der Bahn nördlich Vorderhaide mit var. *scabrum* (Jacq.) (Gerh.); *G. tricornis* With. Woischnik: verbreitet auf Aeckern der Kalkhügel (Fiek und Wetschky!); † Liegnitz: Töpferberg (Gerhardt!); *G. verum* L. Riesengebirge: Schreiberhan 580 m (G. Schneider); Dorf Rehhorn 955 m (Fiek); Kupferberg: Bleiberge 600 m mit *G. ochroleucum* Wolf (ders.).

Valeriana dioica L. Ausnahmsweise im Gebirge: Gr. Kessel [2].

Scabiosa lucida Vill. Gesenke: Fuhrmannstein, Sonntagsberg, Hohe Haide, Heilighübel, am See bei Franzensjagdhaus [3].

Homogyne alpina (L.) Cass. f. *albiflora*. Riesengebirge: Brunnberg (Fiek); f. *multiflora* Grab. Schwarze Koppe, Grenzbauden, Teufelsgärtchen stets einzeln (Schube!); † *Aster parviflorus* N. v. E. Sagan: Boberufer (Everken!, als *A. salicifolius* Scholl.); † *Solidago lanceolata* L. Falkenberg: in und um Lippen (E. Eitner!); *Inula salicina* L. var. *subhirta* C. A. Mey. Nimptsch: Stehberge bei Kittelau!!; *I. Conyza* DC. (*I. vulgaris* Lam.). Oppeln: Haue um die Wolfsschlucht bei Guttein häufig

(Schmidt!); rechts der Oder sehr selten; *Filago canescens* Jord. Neisse (M. Winkler); neu für Pr.-Oberschlesien; *Tanacetum corymbosum* (L.) Schultz Bip. Oppeln: sehr selten nördlich von Gogolin (Schmidt); *Doronicum austriacum* Jacq. Beskiden: Trawny (Heczko) [2], Gr. Połom [8]; *Senecio erucifolius* L. var. *tenuifolius* (Jacq.). Jauer: zwischen Mertschütz und Gr. Wandris (Hiller!); *Cirsium eriophorum* Scop. Beskiden: Cameral-Ellgot (L. Heczko); oberes Malinkathal bei O. Weichsel; Jablunkau: auf der Kiczera, im Łommathale gegen Sałajka, aber nicht mehr auf der Jablunkauer Schanze [8]; *C. acaule* × *oleraceum* (*C. rigens* Wallr.). Lüben: Altstadt selten (Figert); Breslau: zwtschen Kapsdorf und Riesenthal sehr selten (Preiser!); *C. acaule* × *canum* (*C. Siegerti* Schultz Rip.). Lüben: Altstadt in mehreren Formen (Figert); Breslau: mit vorigen sehr selten (Preiser!); *C. heterophyllum* × *palustre* (*C. Wankelii* Reichardt). Riesengebirge: zwischen der Bismarckhöhe und dem Kochelfall! (Kionka); *Carduus Personata* Jaeg. f. *albiflora*. Gesenke: Falkensteine bei Gabel [2]; *Onopordon Acanthium* L. Noch bei Carlsbrunn 750 – 850 m (v. Niessl) [2]; *Cichorium Intubus* L. var. *subspicatum* Uechtr. Trachenberg: Grenzvorkerk (Schwarz); *Achyrophorus uniflorus* (Vill.) Bl. et Fingerh. Glatzer Schneeberg gegen Stubenseifen [2]; *Chondrilla juncea* L. var. *latifolia* (M. B.). Grünberg: Saaborer Gruft (Hellwig!); *Crepis rhoeadifolia* M. B. Oppeln: Tarnau am Waldrande gegen Gr. Stein in verlassenen Kalkgruben fast überall häufig (Schmidt); zweiter Standort; *Hieracium floribundum* W. et Gr. var. *pseudopratense* Uechtr. Breslau: Wolfskretscham (Bodmann!); *H. Auricula* × *Pilosella*. Liegnitz: vor Schönborn (Figert!); Jauer: zwischen Brechelshof und Tribelwitz (ders.!); *H. stoloniflorum* (*flagellare*) × *Pilosella*. Liegnitz: an der Bahn südlich Neudorf (Fig.!); *H. aurantiacum* × *Auricula* (*H. pyrhanthes* Näg. et Pet. ex p.) Riesengebirge: Grenzbauden in einer von der von 1883 abweichenden Form ein Exemplar, ein weiteres um die Schlingelbande (G. Schneider!); *H. Bauhini* × *Pilosella*. Nimptsch: Stehberge bei Kittelau!!; *H. cymigerum* × *Pilosella* (*H. canum* Näg. et Pet. ex p.) Jauer: zwischen Brechelshof und Tribelwitz (Fig.!); *H. aurantiacum* × *Pilosella*. Grenzbauden, ein Exemplar (G. Schneider!); *H. stoloniflorum* (*flagellare*) × *pratense* (*H. prussicum* Näg. et Pet. ex p.); *H. eximium* Backh. Dürre Koppe im Schneegebirge [3]; *H. chlorocephalum* Wimm. Gesenke: sehr selten unter dem Fuhrmannstein [2]; *H. Schmidtii* Tausch var. *persicifolium* Fr. Schneekoppe bei 1550 m (G. Schueider!); *H. vulgatum* Fr. var. *latifolium* W. et Gr. Reinerz: Friedrichshöhe (C. Scholz!); *H. prenanthoides* Vill. Schneegebirge: Dürre und Mähr. Schwarze Koppe, dort var. *angustifolium* Tsch., hier auch var. *a. bupleurifolium* W. et Gr. [3]; *H. striatum* Tsch. (*H. Tauschianum* Uechtr.) *b pachycephalum* Uechtr. Gesenke: Fuhrmannstein, Kaiserbaude, Schwarze Grabenlehne [3]; *H. barbatum*

CLVIII Bericht der Commission für die Flora von Deutschland 1885.

Tausch. Heinrichau: Moschwitzer Buchenwald (Dr. W. G. Schneider); bisher nur von zwei Stellen des Eulengebirges bekannt.

Gentiana punctata L. Gesenke: Enzianwiesen am Fuhrmannstein, Leiterberg, Weg vom Gr. Kessel zum Ochsenstall [2]; *G. verna* L. Gesenke: Altvater gegen die Schäferei (Bubela), Langgraben, Schlössel [3].

Nonnea pulla (L.) DC. Woischnik: Zogel- und Floriansberg!, seltner am Wachholderge (Fiek und Wetschky); *Pulmonaria officinalis* L. fl. suec. var. *maculosa* Hayne. Heinrichau: Geppersdorf und O. Kunzendorf bei Münsterberg (Kionka!); die typische (*P. obscura* Dum.) mit gefleckten Blättern sehr vereinzelt in der Strachate bei Breslau unter gewöhnlichen Exemplaren mit ungeflechten!; *Lithospermum arvense* L. f. *coerulea*. Steinau an der Oder (Fietz); *L. officinale* L. Weidenau [2]; *Myosotis sparsiflora* Mik. Teschen: in der Stadt und dereu Vorstädten, für das östliche Oesterr.-Schlesien neu [8].

Verbascum Thapsus × *nigrum*. Liegnitz: an der Bahn bei Fauljoppe nur ein Exemplar (Figert); *V. Lychnitis* L. var. *album* (Mill. spec.) Liegnitz: Kirchhof (Fig.); † *Linaria Cymbalaria* (L.) Mill. Gr. Glogau: schattige Mauern in Schönau häufig (Fig.); *L. spuria* (L.) Mill. Oppeln: zwischen Kempa und Wichulla (Schmidt), zweiter Standort für Oberschlesien; † *Mimulus luteus* L. Rux bei Kapsdorf (Schneeweiss!); neu für die Breslauer Flora; † *Digitalis lutea* L. Schmiedeberg: Ruhberg häufig und völlig eingebürgert (Fiek); *Veronica officinalis* L. var. *alpestris* Čelak. Riesengebirge: Gehänge, Riesengrund (G. Schneider); *V. alpina* L. Gr. Schnee-grube (Wimm. u. Grab. Fl. Siles.), später von Wimmer nicht wieder erwähnt, aber 1885 von Fiek! wieder aufgefunden; *Bartschia alpina* L. Gesenke: Hirschkamm [2]; *Euphrasia officinalis* (L.) var. *picta* Wimm. Schneegebirge: Dürre und Mähr. Schwarze Koppe; Gesenke: Gr. Seeberg, Schlössel [3].

Orobanche rubens Wallr. Woischnik: Quartberg und benachbarte Hügel, einzeln auch am Floriansberge (Fiek u. Wetschky!); *O. elatior* Sutt. Weidenau [2].

Mentha silvestris L. f. *albiflora*. Trebnitz: einzeln in Kl. Schwundnig (Preiser!); var. *nemorosa* (W. sp.) f. foliis omnibus evidentior petiolatis. Liegnitz: Mühlgraben (Fig.); *M. silvestris* × *aquatica* f. *M. pubescens* W. (*candicans* × *aquatica a capitata*). Lüben: Malmitz (Fig.); *Thymus Serpyllum* L. var. *angustifolius* Pers. in wahrscheinlich hybriden Uebergangsformen zu *Th. montanus* Kit. um Breslau hinter dem Sauberge bei Ransern!!; *Salvia verticillata* L. Woischnik: auf den Kalkbergen verbreitet (Fiek u. Wetschky!); *Lamium amplexicaule* L. f. *albiflora*. Liegnitz: auf Ackerland ein Exemplar (Fig.); *Galeopsis pubescens* Bess. f. *albiflora* Döll. Gleiwitz: an der Ostroppa bei Richtersdorf (Jungck!).

Androsaces septentrionale L. Raudten: sandiger Waldsaum unweit

des Bahnhofs (Dr. Schröter!); *Anagallis coerulea* Schreb. Bahnhof Slahlhammer, Kr. Lublinitz (Fiek!); Weidenau: Butterberg [2].

† *Salsola Kali* L. Grünberg: auf Schutt bei Klopsch's Ziegelei mehrfach (Hellwig!); zweiter Fundort; *Chenopodium ficifolium* Sm. Schweidnitz: Ziegeleiteiche zahlreich (Schöpke); *Atriplex nitens* Schk. Gleiwitz: Klodnitzwiesen hinter der Hütte mehrfach (Jungck!), hier wohl nur eingeschleppt, weil in Ober-Schlesien rechts der Oder fehlend.

Rumex arifolius All. Lissahora [2], neu für die schlesischen Beskiden.

Thesium pratense Ehrh. Landeshut: oberhalb Wüsteröhrsdorf und im oberen Theile von Rothenzechau (Fiek).

† *Tithymalus virgatus* Kl. et Gcke. Gleiwitz: Labander Wald vereinzelt (Jungck!); *T. strictus* Kl. et Gcke. Deutsch-Wartenberg: Cukawe (Hellwig!).

Urtica dioeca L. var. *angustifolia* Led. Liegnitz: Obergraben vor Barschdorf (Fig.); Riesengebirge: Agnetendorf am Bachrand (Fig.).

† *Alnus serrulata* W. Breslau: nasser Haufen im südwestlichen Theile des Mahlener Waldes zahlreich!!; Schweidnitz: Hügel zwischen Pilzen und Schwengfeld (Schöpke); *A. glutinosa* × *incana*. Liegnitz: Krummlinde (Fig.); Breslau: baumartig in einer *A. incana* näheren Form bei Riesenthal an Wiesengraben!!; Nimptsch: Priestram am Eingange in die Schlucht der Tartarenschanze!!; *Betula verrucosa* Ehrh. var. *microphylla* Wimm. (*B. oycoviensis* Besser) Kynast (Fiek).

Salix hastata L. Gesenke: Brünnelheide [2]; Fuhrmannstein [3]; *S. purpurea* × *viminalis* Wimm. var. *Forbyana* Sm. ♂ (*S. semihelix* Lasch!). Teschen: an der Bahn unterhalb des Schlossberges [7]; var. *angustifolia* (Tsch.). Teschen: Olszaufer am 3. Wehre ♀! [8]; *S. incana* × *purpurea* Wimm. Teschen: Schibitzer Olsza-Auen gegenüber dem 1. Wehre, ein ♀ neuerlich eingegangener Baum! rechts der Olsza noch ein ♀ Strauch! [8]; *S. purpurea* × *repens* Wimm. (*S. Doniana* Sm.). Liegnitz: Seifersdorf; Lüben: Petschkendorf (Fig.); *S. cinerea* × *purpurea* Wimm. α. *glaucescens* Wimm. (*S. Pontederana* W.). Lüben: Gr. Kriechen (Fig.!) Teschen: erzherzogl. Ziegelei bei Mosty! [8]; β. *cinerascens* Wimm. (*S. sordida* Kern.). Ustron: Weichselauen an der Fähre von Hermanitz nach Lipowec! [8]; *S. aurita* × *purpurea* Wimm. α. *glaucescens* Wimm. (*S. dichroa* Döll). Breslau: Rothkretscham ♂!!, eine Uebergangsform zur var. β. *cinerascens* Wimm. (*S. auritoides* Kerner) um Teschen: Lonkauer Teiche [7, 8!]; *S. caprea* × *viminalis* Wimm. var. *angustifolia* Wimm. Teschen: Mönchhof am Zimne Doly ♀! [8]; *S. cinerea* × *viminalis* Wimm. Goldberg: Neukirch an der Katzbach (Fig.); *S. aurita* × *viminalis* Wimm. Teschen: Am 3. Olszawehe! [8]; *S. Caprea* × *incana* Wimm. Teschen: Hochwald an der Landstrasse bei Kocobendz! ♀ [8], nach diesem auch in Hermanik bei Ustron von Dr. B. Kotula gefunden; *S. Caprea* × *cinerea* Wimm. Liegnitz: Bahnausstiche bei Arnsdorf! (Gerh. und Fig.); Teschen:

Lonkauer Teiche! [8]; *S. Caprea* × *aurita* Wimm. Liegnitz: mit voriger! (Gerh. und Fig.); *S. cinerea* × *repens* Wimm. Lüben: Krummlinde ein kräftiger ♂ Strauch, bisher nur aus Schlesien ♀ bekannt; *S. silesiaca* × *bicolor*. Riesengebirge: Aupengrund, nunmehr auch blühend (♀) nachgewiesen (Pax).

† *Elodea canadensis* Casp. Schweidnitz: Längs der Peile in Tümpeln zwischen Pilzen und Schwengfeld spärlich, unterhalb O. und N. Grunau (Schöpke).

Sagittaria sagittifolia L. *vallisneriifolia* Coss. et Germ. Breslau: In der Weide bei Weida!! und Krzyzanowitz (Preiser!); Trachenberg: Nesigoder Bartsch!!

Potamogeton fluitans Roth. Woischnik: Urbanka-Weide in einem Tümpel (Fiek!); zweiter gesicherter Standort; *P. alpinus* Balh. Ustron: Hammerwerk unter der Czantory! [8]; neu für Ober-Schlesien.

Orchis globosa L. Gesenke: Hockschar [3]; *O. mascula* L. Breslau: buschige grasige Dämme bei Althof-Nass sehr vereinzelt!!, neu für die Breslauer Flora, überhaupt in der schlesischen Tiefebene sehr selten; *O. maculata* L. f. *candidissima* (Krock. sp.) Tul bei Ustron Schube!); *Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br. var. *densiflora* (Whlenb.). Schmiedeberg: Wolfshau (G. Schneid.); *Platanthera viridis* (L.) Lindl. Woischnik: Grojetzberg (Fiek und Wetschky!); erster Standort rechts der Oder in Pr. Schl.; *P. montana* Rchb. fil. Nimptsch: Tartarenschanze bei Priestram locker- und armlüthig!!, Teschen: Ustron am Fusse der Czantory; W.-Abhang des kl. Ostry gegen Wendrin [8]; dicht- und vielblüthig, mit fast weissem Perigon (Schube!).

Galanthus nivalis L. Glatz: Königshainer Spitzberg bei 751 m (Fiek).

Lilium Martagon L. Ostgipfel des Geiersberges ein Exemplar mit trüb dunkelrothen völlig einfarbigen oder (seltener) nur am Grunde schwach punktirt Perigonblättern, an var. *Cattaniae* (Vis. sp.) erinnernd!!; *L. bulbiferum* L. Reinerz: grasige Waldstellen um die Einsiedelei nur steril (C. Scholz!), ob wild?; *Allium Scorodoprasum* L. Teschen: Berglehne hinter Boguschowitz! im Thiergarten [8]; für Oe.-Schles. gesichert; *Scilla bifolia* L. Ratibor: N. W. Rand der Obora sparsam (Migula!); *Polygonatum verticillatum* (L.) All. Woischnik: Grojetzberg (Fiek und Wetschky!).

Tofieldia calyculata (L.) Whlenb. Sagan: am Dachsberge (Everken!); Gogolin: Torfwiesen vor Oberwitz (Wetschky!).

Juncus tenuis W. Friedeberg a. Queis: verbreitet in Hernsdorf und gegen Egelsdorf, an der Bahn in Neu-Kemnitz (Fiek); *Luzula flavescens* (Host) Gaud. Teschen: auch an der N.W. Seite der kleinen Czantory gegen den Tul (Schube!); *L. sudetica* (Willd.) Presl. var. *pallescens* (Bess.) Riesengebirge: Aupagrund (C. Scholz!), Melzergrund (G. Schneider!).

Carex pauciflora Ligthf. Bielitz: Moore um Braunau, Landek, Elgot, namentlich im Moore Golysz! [8]; neu für die rechte Oderseite; *C. virens* Lam. Woischnik: Grojetzberg. (Fiek und Wetschky!); *C. remota* × *paniculata* (*C. Boenninghauseni*ana Whe). Lüben: Klaptau (Figert!); Gr. Glogau: „Böse Gurke“ bei Annaberg (ders.); *C. Buekii* Wimm. Breslau: auch an der Weide-Niederung bei Friedewalde (Siegert!); *C. limosa* L. Bielitz: Braunauer Moore, zumal im-Golysz! neu für das Teschner Ländchen [8]; *C. vaginata* Tausch. Gesenke: Leiterberg unweit der Schweizerei (Wetschky!); *C. tomentosa* L. Woischnik: gegen Mühlchen, Zogelberg (Fiek und Wetschky!); *C. umbrosa* Host. (*C. polyrrhiza* Wallr.) Breslau: Mahlener Wald (Preiser!); *C. Hornschuchiana* Hoppe. Reichenbach: südl. vom Herrleinsberge (Fiek); Woischnik: Solarnia (Fiek!), zweiter sicherer Standort für Ob.-Schlesien; *C. Pseudocyperus* L. var. *minor* Hampe. Liegnitz: Tzschocke (Gerhardt!); *C. filiformis* L. Teschen: Lonkauer Teiche! Braunauer Torfmoore, namentlich im Ratusz, neu für das Teschner Gebiet [8].

† *Panicum capillare* L. Liegnitz: Barschdorf seit Jahren als Gartenunkraut (Fig.); *Alopecurus pratensis* × *geniculatus* (*A. hybridus* Wimm.). Liegnitz: mehrfach (Gerh. und Figert!); *Koeleria glauca* (Schk.) Pers. Glatz: felsige Abhänge in Königshain, eine schlaffe Form mit e. Th. unterbrochener Rispe und grünlich weissen Aehrchen (Fiek!); *Poa caesia* Sm. Uhustein im Hochgesenke [3]; *P. nemoralis* L. var. *montana* Wimm. Gesenke: Schweizerei, an der Oppa unter der Schäferei [3]; *Glyceria plicata* Fr. var. *depauperata* Crép.! Breslau: Rosenthaler Teiche!! (Friedrich); *G. nemoralis* Uechtritz et Körn. Breslau: Mahlener Wald, Ostseite (Preiser!), S.W. Rand!!; *Festuca distans* (L.) Kth. f. *tenuis* Uechtr. Breslau: vor Marienau!!; *F. sciuroides* Rth. Liegnitz: Gassendorf (Gerh.); *F. ovina* L. var. *capillata* (Lam. sp.) Liegnitz: Wiesen an der Baumgarten-Allee (Gerh.); Breslau: Rennplatz und sandige Wiesen der Anlagen vor Gr. Grüneiche!!; d. *glauca* Lam. var. *psammophila* Hack. Grünberg: Heinersdorf (Hellwig!); *F. heterophylla* Lam. Jauer: Hessberge (Gerh.); Schweidnitz: Rodeland bei Königszelt (Schöpke!); Breslau: Mahlener Wald! (Preiser). *F. gigantea* (L.) Vill. var. *triflora* Godr. Heinrichau: Moschwitzer Buchenwald mit *Elymus europaeus* L. und *Melica uniflora* Retz. (Dr. W. G. Schneider!).

Juniperus nana W. Riesengebirge: um den Veigelstein etwa 50 Schritt diesseits der Grenze einige z. Th. abgestorbene Sträucher [6]; *Taxus baccata* L. Teschen: Babiagórka bei Wendrin [8].

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1886

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Uechtritz Rudolf Karl Friedrich

Artikel/Article: [Schlesien CLII-CLXI](#)