

V. Obersächsisches Gebiet.

(Königreich Sachsen, einschliesslich der östlich von der Weissen Elster und Weida gelegenen Preussischen, Altenburgischen, Weimarischen und Reussischen Gebiete.)

Referent: O. Wünsche.

(Preussische Ober-Lausitz (L.) und Provinz Sachsen (P. S.) (nebst Anhalt) südlich der Elbe und Schwarzen Elster, östlich der Wasserscheide zwischen Saale und Mulde.)

Referent: P. Ascherson.

Literatur.

1. A. Rehder, Beiträge zur Flora des Muldenthals. (Jahresber. d. Ver. f. Naturkunde zu Zwickau. 1885.)
 2. F. Ludwig, Ida-Waldhaus bei Greiz. (Mitth. d. Botan. Ver. für Gesamt-Thüringen. Geograph. Gesellschaft f. Thüringen in Jena. IV., S. 10—16, und briefl. Mitth. d. Verf.)
 3. W. O. Focke, Vgl. Märk.-Pos. Gebiet, No. 14.
 4. R. v. Uechtritz, Resultate etc. Vgl. Schlesien, No. 1.
 5. P. Taubert, Beiträge zur Flora der Nieder-Lausitz. II. Vgl. Märk.-Pos. Gebiet, No. 9.
 6. H. Hebst, Zusätze und Berichtigungen zur 15. Auflage von Garcke's Flora von Deutschland. 3. Aus der Flora von Eilenburg (Prov. Sachsen). (Deutsche Bot. Monatsschr. III. (1885) S. 141.)
 7. G. Oertel, Ein neuer Bürger der Halle'schen Flora. (Ztschr. f. Naturw. LVIII. Bd. S. 374, 375).
-

Neu für das Gebiet:

Cardamine pratensis var. **stenopetala** Ludwig. Am Eisenberg bei Jocketa (G. Ludwig).

Rubus bifrons Vest. Bautzen; *R. rudis* W. et N. Chemnitz; *R. serpens* Weihe. Oberlausitz [3].

Avena tenuis Mnch. Zwischen Taltitz und Rosenberg im sächs. Vogtlande (L. Fickert); *Sclerochloa dura* (L.) P. B. Dresden: Auf der Vogelwiese bei Antons (C. Schiller).

Unrichtige bez. zweifelhafte Angaben: *Rubus affinis* vgl. vorjähriger Bericht, S. CIII und *R. thyrsiflorus* a. a. O., S. CI; nach R. v. Uechtritz schwerlich die richtigen westdeutschen Arten; auch das Vorkommen der *Rosa tomentosa* f. *cristata* (a. a. O., S. CI) wird von R. v. Uechtritz bezweifelt [4].

Buphthalmum salicifolium L. Wiesa bei Greiffenberg (Müller nach Barber, vergl. vorjähr. Bericht, Obersachsen, No. 6). Dürfte nach R. v. Uechtritz wohl † *Rudbeckia hirta* L. oder eine ähnliche Art gewesen sein [4].

Parietaria ramiflora Mnch. P. S. Eilenburg nicht mehr zu finden [6].

Wichtigere neue Fundorte;

Arabis Halleri L. P. S. Im Muldethal häufig, stellenweise gemein; bedeckt mit *Thlaspi alpestre* L. bei Eilenburg weite Strecken des Ueberschwemmungsgebiets, tritt aber ausserhalb desselben sehr vereinzelt auf [6]; *Cardamine amara* × *pratensis*. Krümmthal bei Greiz (F. Ludwig); *Lepidium Draba* L. † Waldenburg im Hofgarten [1].

Drosera intermedia Hayne. Greiz: Krümmthal [2].

† *Dianthus barbatus* L. Waldenburg: Glauchauer Vorstadt [1]; *D. superbus* L. Plauen: Jessnitz (Schmidt); † *Silene Armeria* L. L. Schleife (bei Spremberg): Schimko's Busch (Hantscho) [5].

† *Malva moschata* L. Zwickau: An der Falkensteiner Eisenbahn (Schmidt).

Rubus nitidus W. et N. L. Görlitz [3], neu für L.; *R. scaber* W. et N. Görlitz (Barber) [14], neu für L.; *Rosa graveolens* Gren. L. Görlitz: Landskrone (A. Schultz) [4], neu für L.

Trapa natans L. Waldenburg: Elisenteich bei Grüefeld [1].

Sedum villosum L. L. Schleife (Hantscho und Ascherson) [5].

Imperatoria Ostruthium L. † L. Schleife, Graspärten (Hantscho) [5]; *Myrrhis odorata* (L.) Scop. † L. Schleife, Graspärten (Hantscho) [5].

† *Aster salicifolius* Scholl. An der Mulde bei Kertzsch und bei Waldenburg [1]; † *Solidago canadensis* L. am Bahnkörper zwischen Leipzig und Taucha; P. S. Eilenburg im Thalwitzer Lauchholze [6];

† *Rudbeckia laciniata* L. L. Schleife (Hantscho) [5]; *Matricaria discoidea* DC. Zwickau: An der Brauerei Mosel (Naumann!); *Senecio aquaticus* Huds. L. Hoyerswerda: Elsterwiesen (Schmidt) [4], neu für L.

Atropa Belladonna L. Waldenburg: Am Brauseloch bei Rochsburg [1]; Greiz: Waldhaus u. sonst [2].

Verbena officinalis L. Waldenburg: In Callenberg [1].

Utricularia intermedia Hayne. L. Schleife: Wolschinawiese (Taibert) [5].

CLXIV Bericht der Commission für die Flora von Deutschland 1885.

Lysimachia thyrsiflora L. Waldenburg: In Grünfeld [1].

Sagittaria sagittifolia L. Waldenburg: Elisenteich bei Grünfeld [1].

Potamogeton obtusifolius M. et K. Greiz: Teich an der Lehmgrube (F. Ludwig).

Typha angustifolia L. Greiz: Ida-Waldhaus [2].

Cephalanthera grandiflora (Scop.) Bab. Greiz: Gasparinenberg (F. Ludwig); *C. Xiphophyllum* (L. fil.) Rchb. fil. Zwickau: Weissenborner Wald!!

Leucoium vernum L. Waldenburg: Bei Schlagwitz [1].

Colchicum auctumnale L. L. Gr. Düben (bei Spremberg) (Röder) [5].

†*Panicum capillare* L. Waldenburg: Hofgarten [1].

Zweifelhafte Angaben: *Tordylium maximum* L., neuerdings bei Eilenburg vergeblich gesucht [6]; *Hieracium aurantiacum* L. und *Carex pauciflora* Lightf. P.S. Auf einer Wiese bei Schierau zwischen Dessau und Bitterfeld [7].

VI. Hercynisches Gebiet.

(Thüringen, Flora von Halle a. S., Harz, Braunschweig, Hannöversches Bergland, Kur- und Oberhessen.)

Referent: C. Haussknecht.

Literatur.

1. M. Schulze in Mittheilungen d. botan. Vereins für Gesamt-Thüringen (Geogr. Ges. Jena IV. 1885, S. 2).
 2. C. Haussknecht, Nachträge zur Monographie der Gattung *Epilobium* a. a. O., S. 69—74. (Inhalt grösstentheils schon im vorjähr. Bericht berücksichtigt.)
 3. Buddensieg, System. Verzeichniss etc. von Tennstädt im Korrespondenzblatt des Vereins Irmischia zu Sondershausen. 1885.
 4. C. Beling in Deutsche botan. Monatsschr. 1885, S. 109.
 5. W. O. Focke, siehe Märk.-Pos. Gebiet, No. 14.
 6. G. Oertel, siehe Obersächs. Gebiet, No. 7.
-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1886

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Wünsche Otto Friedrich, Ascherson Paul Friedrich August

Artikel/Article: [Obersächsisches Gebiet CLXII-CLXIV](#)