

Haan; *Peucedanum (Thysselinum) palustre* Hilden: Chaussee nach Haan und Düsseldorf: Unterbach; *Senecio aquaticus* vom Ruhrufer bis Düsseldorf; *Crepis nicaeensis* Rheinischer Bahnhof Sonnborn (die Pflanze ist dort wieder verschwunden).

XI. Oberrheinisches Gebiet.

(1884 und 1885.)

(Lothringen (L.), Elsass (E.), Baden (B.), Bayrische Pfalz (P.), Grossherzogthum Hessen (incl. Kr. Frankfurt südlich vom Main) (H.).

Referent: C. Mez.

Quellen:

a) Literatur.

1. C. Haussknecht im amtl. Bericht über die 56. Versammlung deutscher Naturf. und Aerzte. Freiburg 1884.
2. C. Haussknecht, Beitrag etc. Vgl. Niederrheinisches Gebiet, No. 6 und Sitzungsber. bot. Ver. für Ges.-Thüringen in Mitth. der Geogr. Ges. (f. Thür.) II. Bd. Jena 1884. S. 217, 224.
3. C. Haussknecht, Monographie der Gattung *Epilobium*. Jena 1884.
4. Mittheilungen des botan. Vereins f. d. Kreis Freiburg und das Land Baden. 1884 und 1885. Mit Abhandlungen verschiedener Autoren wie Standortsangaben.
5. H. Waldner, Jahresbericht des naturwiss. Vereins f. Elsass-Lothringen 1884, 1885.
6. E. Hallier, *Gentiana acaulis* in den Vogesen. (Deutsche bot. Monatsschrift 1885, S. 95, 123.)
7. E. Frueth, Zusätze und Bemerkungen zur 15. Auflage von Garcke's Flora von Deutschland aus der Flora von Metz. (a. a. O., S. 147—152.)
8. Seubert-Prantl, Exkursionsflora für das Grossherzogthum Baden. Stuttgart 1885.
9. H. Waldner, Referat für die Deutsche Botanische Gesellsch. (veränderter Abdruck aus Jahresbericht d. naturwiss. Ver. etc.)

b) Schriftliche Mittheilung (an Herrn C. Haussknecht).

10. M. Dürer in Frankfurt a. M. (Vgl. Hercynisches Gebiet 1884, No. 8.)

CLXXXIV Bericht der Commission für die Flora von Deutschland 1885.

Bemerkung. Die Bearbeitung der Gattungen *Rosa*, *Rubus*, *Hieracium* im Gebiete ist noch keine einheitliche, und wurde deshalb von Anführung neuer Formen und Fundorte abgesehen.

Neu für das Gebiet:

Coronilla vaginalis Lam. B. Theerbuche im Donauthal [8]; *Epilobium nutans* Schmidt. E. Hohneck (Vogesen). B. Feldberg (Schwarzwald) [3].

Epilobium montanum × *obscurum* (*E. aggregatum* Čel.). B. Freiburg; *E. montanum* × *roseum* (*E. heterocaule* Borb.). B. Baden, Lichtenthal; *E. montanum* × *trigonum* (*E. pallidum* Tausch). E. Hohneck; *E. collinum* × *montanum* (*E. confine* Hausskn.). B. Baden, Höllen- und Zastlerthal bei Freiburg [3]; *E. collinum* × *obscurum* (*E. decipiens* F. Schultz). B. Freiburg: Höllenthal; **E. Duriaei** × *montanum* (*E. intersitum* Hausskn.). E. Hohneck; **E. adnatum** × *Lamyi* (*E. semiadnatum* Borb.). B. Heidelberg; *E. adnatum* × *palustre* (*E. Laschianum* Hausskn.). E. Weissenburg; *E. adnatum* × *roseum* (*E. Borbasianum* Hausskn.). B. Freiburg, Theningen; **E. Lamyi** × *lanceolatum* (*E. ambigens* Hausskn., *E. lanceolatum* × *tetragonum* F. Schultz). P. Klingenmünster; *E. obscurum* × *roseum* (*E. brachiatum* Čel.). B. Freiburg: Höllenthal; *E. palustre* × *parviflorum* (*E. rivulare* Wahlenb.) B. Pföhren; **E. palustre** × *trigonum* (*E. vogesiacum* Hausskn.). E. Hohneck; *E. anagallidifolium* × *nutans* (*E. Čelakovskyanum* Hausskn.). Desgl.; *E. alsinifolium* × *palustre* (*E. Haynaldianum* Hausskn.). B. Seebach am Feldberg [3].

Gentiana acaulis L. E. „Hohneck (Vogesen)“ zu streichen [6]. B. Altglashütte (Schwarzwald) (Wolf) [4, 8].

Rhinanthus aristatus Čelak. E. Hohneck (Vogesen). B. Feldberg (Schwarzwald) [2].

Rumex alpinus × *obtusifolius* (= *R. Mezei* Hausskn.). B. Feldberg [2]; *R. Acetosa* b. *thyrsiflorus* (Bluff et Fingerh.) Gcke. E. Kolmar, Türkheim [2]; B. Freiolsheim, Mannheim, Berghausen b. Karlsruhe [8].

Orchis incarnata L. b. *Traunsteineri* (Saut.) und **O. incarnata** × *Traunsteineri* (*O. Dufftii* Hausskn.). Hengster b. Offenbach [2]; *O. latifolia* × *incarnata* (= *O. Aschersoniana* Hausskn.). Hengster [2].

Juncus tenuis Willd. H. Virnheimer Wald [10].

Carex ligerica Gay. B. Achern (Winter) [4].

Alnus glutinosa × *viridis*. B. (Feldberg) [1] zu streichen.

Eingeschleppt und verwildert:

Die Fundorte der hier aufgeführten Arten sind bis auf eine Art, bei der es speziell angegeben ist, theils die Getreide-Ausladeplätze bei Sablon unweit Metz (Beobachter E. Frueth und Schrader in 5, 7, 9), theils die Mühlau bei Mannheim (Beobachter Lutz in 4). Die hier

gegebenen Berichtigungen wurden nach den an Herrn P. Ascherson eingesandten Exemplaren dem Ref. mitgetheilt.

Clematis Flammula L. [7, 9].

Glaucium flavum Crtz.; *G. corniculatum* (L.) Curt. [4].

Sisymbrium Columnae Jacq. [4, 5]; *Eruca sativa* Lam. [4]; *Erysimum canescens* Rth. und *E. repandum* L. [4] (als *crepidifolium*) [9]; *Lepidium perfoliatum* L. und *L. virginicum* L. [4].

Silene dichotoma Ehrh. [4].

Melilotus coeruleus (L.) Desr. [4, 9]; *M. parviflorus* Desf. [4]; *Trifolium diffusum* Ehrh. (als *lappaceum*) [4]; *Oxytropis pilosa* (L.) DC. [4].

Vicia villosa Rth. [4].

Eryngium planum L. [4].

Ambrosia artemisiifolia L. (als *maritima* L.) [4]; *Rudbeckia hirta* L. B. Rheindamm bei Altenheim (Winter) [4]; *Artemisia austriaca* Jacq. [4 (als *pontica*), 5]; *Achillea tomentosa* L. [9]; *Senecio vernalis* W. K. (als *vulgaris radiatus*) [4]; *Centaurea orientalis* L. (als *cheirantifolia*) [5]; in der Schweiz bei Orbe von Vetter und Barbey (Bull. Soc. Murithienne du Valais Année 1882 et 1883 fasc. XI. mit anderen Adventivpflanzen gefunden. Red.; *Centaurea diffusa* Lam. [4 (als *cristata* Bartl.), 5].

Amsinckia angustifolia Lehm. (als *Lithospermum apulum*) [4].

Verbascum phoeniceum L. [4, 9]; *Linaria genistifolia* (L.) Mill. [9]; *Veronica austriaca* L. [4].

Salvia Aethiopis L. [5]; *Nepeta nuda* L. [4]; *Sideritis montana* L. [9]; B. Mannheim (Lutz).

Amarantus albus L. (als *deflexus* L.) [4].

Tithymalus virgatus (W. K.) Kl. et Gcke. B. Am Rhein bei Rheinweiler (Sterk) [4].

Wichtigere neue Fundorte:

Thalictrum Jacquinianum Koch. B. Auggen [8]; *T. simplex* L. B. Müllheim [8]; † *Eranthis hiemalis* (L.) Salisb. B. Thiengen (Welz) [4].

Nasturtium amphibium × *silvestre* (= *N. anceps* Rchb.). B. Konstanz, Sasbach, Achern [8]; *Barbarea stricta* Andrzej. B. Bei Stein, Wiesloch; *Arabis pauciflora* (Grimm) Garcke. B. Werrenwag [8]; *Sisymbrium Loeselii* L. † L. Sablon bei Metz [5, 9]; B. Mannheim [4]; *S. Sinapistrum* Crtz. † L. Metz [9]; B. Mannheim (z. Th. als *S. austriacum*) [4]; *Erucastrum obtusangulum* (Schleich.) Rchb. B. Um den Bodensee [8].

Viola Riviniuna Rchb. B. Gemein in den Vorbergen des Schwarzwaldes (Winter) [4, 8].

Drosera intermedia Hayne. B. Villaringen [8].

Spergula vernalis Willd. B. Mannheim, Sanddorf [8].

Althaea hirsuta L. (als *A. pallida*). B. Mannheim: Mühlau (Lutz) [4].

CLXXXVI Bericht der Commission für die Flora von Deutschland 1885.

† *Impatiens parviflora* DC. Thiengen: Waldsaum bei Nöggenschwiel einzeln (Welz) [4].

Medicago hispida Gaertn. (Urb.) L. Metz [7]; *Trifolium scabrum* L. E. Wasselnheim [5]; B. Neuenburg [8]; *Astragalus danicus* Retz. H. Ockenheimer Spitze [10].

Prunus Chamaecerasus Jacq. B. Müllheim, Bruchsal [8]; † *Potentilla canescens* Bess. † L. Metz [5]; *P. collina* Wib. (= *P. Güntheri* Pohl). B. Neuenburg [8]; *P. micrantha* Ram. B. Neuenburg [8]; *Fragaria vesca* × *collina* (*F. Hagenbachiana* F. Schultz). B. Ebringen bei Freiburg (Götz) [4]; *Pirus Aria* × *Chamaemespilus*. B. Feldberg, mit Sicherheit nachgewiesen [1].

Epilobium Lamyi F. Schultz. B. Feldberg, Freiburg [8].

Crassula rubens L. B. Rheinebene bei Griesheim (Götz) [4]; *Sedum Fabaria* Koch. B. Belchen [4]; † *S. dasyphyllum* L. B. Achern (Winter) [4].

Anthriscus nitida (Wahlenb.) Gcke. B. Freiburg: Mündung des Bruggabachs in die Dreisam, im Höllen- und Zastlerthal (Schlatterer) [4]; neu für B.

Galium verum L. var. *Wirtgenii* F. Sch. B. Müllheim, Breisach [8].

Artemisia pontica L. H. Ingelheim [10]; *Centaurea maculosa* Lam. (= *C. rhenana* Bor.) B. † Mannheim: Mühlau (Lutz) [4]; *Chondrilla juncea* L. var. *latifolia* (M. B.) H. Sandhügel bei Arheiligen [10]; *Hieracium Pilosella* L. var. *Peleterianum* (Mér.). B. Käferthal [8].

Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb. B. Mooswald bei Freiburg (Bartenstein und Eisele) [4, 8].

Ledum palustre L. Standort „Wilder Hornsee“ Schwarzwald, neuerdings constatirt (Müller) [4].

Cuscuta Cesatiana Bert. B. Wertheim [8].

Lappula Myosotis Mnch. L. † Metz [9]; *Anchusa italica* Retz. L. † Metz [5]; *Onosma arenarium* W. K. † L. Metz [9].

Scrophularia alata Gilib. var. *Neesii* Wirtg. B. Markdorf, St. Ilgen, Bruchsal [7]; *Linaria vulgaris* × *striata*. E. Nordheim [5]; † *Veronica peregrina* L. B. Mannheim (Lutz), Rheinsümpfe b. Mernprechtshofen unw. Achern (Winter) [4].

† *Salvia Sclarea* L. L. Metz [9]; † *S. silvestris* L. L. Metz [5]; B. Mannheim [4]; *Nepeta Cataria* L. var. *citriodora* Becker. B. Wertheim (Hansen) [4].

Utricularia neglecta Lehm. E. Steinburg [5].

Trientalis europaea L. B. Kaltenbronn (Döll) [4].

Amarantus silvester Desf. B. Grenzach, Karlsruhe [8].

Atriplex hastata L. var. *salina*. B. Rappenu, Hünenberg [8].

Daphne Laureola L. B. Bei Gutmadingen [8].

Thesium alpinum L. B. Belchen, Rheinufer bei Griesheim [8].

† *Elodea canadensis* Rich. et Mich. Neckar bei Neckargemünd, um Ladenburg, Rhein bei Neckarau (Lutz) [4].

Alisma parnassifolium L. H. Virnheimer Torfmoor [10].

Typha minima Funck var. *autumnalis* Lem. B. Ichenhausen [8].

Orchis globosa L. B. Fürstenberg [8]; Thiengen (Welz) [4]; *Liparis Loeselii* (L.) Rich. H. Pfungstädter Moor [10].

Iris spuria L. H. Rheinwiesen bei Oppenheim [10].

Gagea saxatilis Koch. B. Wolfsberg bei Pforzheim (Zachmann) [4, 8]; *Allium rotundum* L. L. Metz: Sablon [7].

Scirpus mucronatus L. B. Neuenburg [8]; *Eriophorum gracile* Koch. B. Rheinebene bei Sinzheim, Würmersheim, Waghäusel, Mannheim [8]; *Carex pauciflora* Lightf. Rheinebene: B. Waghäusel, Hochdorf [8]; *C. cyperoides* L. L. Metz: Woippy [7]; *C. caespitosa* L. B. Feldseemoor (Schlatterer) [4]; *C. ericetorum* Poll. B. Gaylinger Berg [8].

Setaria ambigua Guss. B. Breisach, Achkarren (Goll) [4, 8]; *Aira caespitosa* L. var. *setifolia* Bisch. B. Karlsruhe, Schwetzingen, Mannheim [8]; *Glyceria plicata* Fr. Oberbaden [8]; *Bromus asper* Murr. var. *serotinus* Beneken. B. Pfingzgegenden [8].

XII. Bayern.

(Rechts des Rheins.)

Referent: K. Prantl.

Quellen:

a) Literatur.

1. F. Fischer, Flora Mettenensis. II. und III. Beilage zum Jahresbericht der Studienanstalt Metten. 1884 und 1885.¹⁾
2. G. Woerlein, Bemerkungen über neue oder kritische Pflanzen der Münchener Flora. (Deutsche bot. Monatsschr. III. 1885. S. 9—10, 36—38, 49—51, 85—87, 159—161).
3. Landauer, Fundbericht aus der Flora von Würzburg. (a. a. O., S. 95.)
4. C. Haussknecht, Beitrag zur Kenntniss der einheimischen *Rumices*. (Bot. Verein für Ges.-Thüringen in Mitth. d. geogr. Gesellsch. für Thür. III. 1884. S. 56—79.)

1) Eine Anzahl zweifellos irriger Angaben dieser Schrift sind in vorliegendes Referat nicht aufgenommen worden.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1886

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Mez Carl Christian

Artikel/Article: [Oberrheinisches Gebiet. CLXXXIII-CLXXXVII](#)