

XIII. Böhmen.

Referent: L. Čelakovský.

Literatur.

1. L. Čelakovský, Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1885.¹⁾
2. J. Hanuš, Soustavný přehled a stanoviska rostlin cévnatých v okolí Plzně samorostlých a obecně pěstovaných. Část I. Rostliny tajuosuubné, nahosemenné, jednoděložné, z dvouděložných až včetně lilkovité. (Systematische Uebersicht und Standorte der um Pilsen wildwachsenden und allgemein kultivirten Gefäßpflanzen. I. Theil. Kryptogamen, Gymnospermen, Monokotylen bis incl. Solanaceae).

Neu für das Gebiet:

Genista pilosa L. Theresienthal bei Gratzen auf einem Heideabhang in Menge (ein früher publicirter Standort in Nordostböhmen bei Böhm. Skalic hat sich nach wiederholter Untersuchung desselben nicht bestätigt).

Doronicum caucasicum M. B. (*D. eriorrhizon* Guss., *D. orientale* Hoffm., *D. Nendtwichii* Sadler). Lichte Laubhölzer im Theresienthale bei Gratzen nahe der niederösterreichischen Grenze, in Menge, zweifelsohne wild; *Lappa tomentosa* × *minor* bei Chudenic; *Lampsana communis* L. b. *hirsuta* Peterm. (*L. pubescens* Bernh.?). Potenstein, vielleicht auch Franzensbad; *Scorzonera hispanica* L. β. *asphodeloides* Wallr. Suttomer Berg bei Lobositz; *Hieracium cymosum* b. *pubescens* W. Gr. (*H. glomeratum* Fr.). Erzgebirge: zwischen Weipert und Neugeschrei; Schatzlar (nach Näg. et Pet.); Karlstein (Tausch); *H. graniticum* Schultz Bip. var. *quarciticum* (*H. quarciticum* Freyn ined.). Felsen der Generalka bei Prag; *H. murorum* L. b. *cinerascens* Jord. sp. Basaltfelsen bei Waltsch, bei Podersam.

Verbascum thapsiforme × *nigrum*. Felsen der Moldau oberhalb Klingenberg mit den Eltern.

Rumex maritimus (*aureus*) × *crispus* (*R. fallacinus* Hausskn.). Am Bache bei Klösterle.

1) Ueberall dort als Quelle gemeint, wo keine Ziffer citirt ist.

Alisma arcuatum Michalet (= *A. lanceolatum* Wither.?)¹⁾. Chudenic: am Šepadler Teiche, Schwarzer Teich bei Schlackenwerth, Postelberger Teich, Stadtteich bei Čáslau; *β. graminifolium* Casp. (*A. Plantago β. graminifolium* Auct., *A. graminifolium* Ehrh.?, *A. longifolium* Presl, *A. angustifolium* Presl). In Teichen untergetaucht und mit Schwimmblättern. Teich bei Schlackenwerth, Hirschberger Teich, Schlüsselburg nächst Blatna.

Potamogeton praelongus Wulf. *β. brevifolius* Čel. Im Adlerflusse bei Malšovic nächst Königgrätz.

Scirpus lacustris L. *β. fluitans* Coss. et Germ. Graben mit fließendem Wasser bei Lissa.

Calamagrostis litorea (Schrad.) DC. (= *C. pseudophragmites* Aschers., *Arundo glauca* M. Bieb.) An der Elbe bei Elbe-Kostelec und an der Adler bei Adler-Kostelec; *Festuca gigantea* (L.) Vill. var. *breviaristata* Čel. (forsan forma var. *triflorae* Koch (= *Bromus triflorus* L.). Hoher Reinstein bei Waltsch; *Festuca elatior* × *Lolium perenne* (*Fest. loliacea* Curt.). Bei Schlackenwerth und Duppau, unter den Stammarten.

Eingeschleppt:

Silphium perfoliatum L. Feld bei Hoch-Weseli.

Wichtigere neue Fundorte:

Pulsatilla vernalis (L.) Mill. Pilsen: „na Borech“; Lomnic a. L.; *Batrachium confusum* (Godr.) Gcke.? (= *Ranunculus Petiveri* Koch.). Podhráz bei Holic; Louňovicer Teich bei Říčán; Dobrá bei Kladno; † *R. Steveni* Andrz. Teplitzer Schlossgarten.

Nuphar pumilum (Timm) Sm. Neuhaus: im Stadtteich und im Bache zwischen Blauenschlag und Heinrichschlag.

Glaucium corniculatum (L.) Curt. Kralup, Saaz, spärlich.

Cardamine pratensis L. b. *dentata* Schult. (= *C. paludosa* Knaf). Torf bei Lissa, Bach bei Kuttenberg.

Viola mirabilis × *Riviniana*. Berg Bába bei Kosmanos.

Silene nutans L. b. *glabra* Schk. (= *S. infracta* W. K.). Häufig bei Jechnitz, Waltsch, Duppau, Schlackenwerth, Warta und Klösterle.

Elatine hexandra (Lap.) DC. Pilsen: Grosser Teich bei Bolevec.

Oxalis Acetosella L. b. *rosea* Hartm. Neu-Königgrätzer Wald.

Dictamnus albus L. Berg Chlum bei Jungbunzlau, Eichberg bei Podersam, westlichstes Vorkommen.

Cytisus austriacus L. Hochlieben, dritter Standort in Böhmen; *Lotus corniculatus* L. b. *tenuifolius* L. Wiesen bei Welwarn, mit *Triglochin maritima* L.; *Lathyrus heterophyllus* L. Eichberg bei Podersam

1) Siehe Oesterr. Bot. Ztschr. 1885, S. 377 und 414 ff.

CXCVI Bericht der Commission für die Flora von Deutschland 1885.

Berg Krušina bei Rudig, Oberbrenntenberg bei Pomeisl; westlichste Standorte.

† *Amygdalus communis* L. Unter dem Lobosch bei Lobositz viele starke, fruchttragende Bäume; *Rubus tomentosus* Borkh. Schreckenstein bei Aussig, Berge um Waltsch; † *Sanguisorba minor* Scop. c. *polygama* (W. K.) (= *Poterium muricatum* Spach). Auf Eisenbahndämmen und in Feldkulturen immer häufiger, so neuerdings bei Böhm. Skalic, Kostomlat a. Elbe, bei Prag: Hlubočep, Schwarz-Kostelec, am Radobyl bei Leitmeritz, bei Waltsch, Rudig und Klösterle; *Rosa trachyphylla* Rau b. *Jundzilliana* (Bess. sp.) Moldauufer bei Podolsko unterhalb Klingenberg.

† *Oenothera muricata* L. Am Egerflusse bei Saaz in Menge; zweiter Standort in Böhmen; *O. muricata* × *biennis* (*O. Braunii* Döll), ebendasselbst.

Sedum purpureum Link. Eichwald im Erzgebirge, Warta bei Schlackenwerth.

Bupleurum longifolium L. Menthou bei Leitmeritz; bei Waltsch und Pomeisl, westlichstes Vorkommen; *Libanotis montana* Crantz. Chrudim; *Pastinaca opaca* Bernh. Oberbrenntenberg und Chlumberg bei Pomeisl, zahlreich, Ziegenberg bei Petersburg.

Loranthus europaeus Jacq. „Woly“ bei Češov unweit Jičín; Jungbunzlau; Mühlhausen a. d. Moldau.

Bidens radiatus × *tripartitus* (*B. Polákii* Velenovský). Am Šepadler Teich bei Chudenic, mit den Eltern; † *Matricaria discoidea* DC. Tuschkau bei Pilsen, verwildert [2]; † *Chrysanthemum segetum* L. Bei Pardubic einzeln auf Wiese und Feld; *Doronicum austriacum* Jacq. Bergwälder bei Puchers an der niederösterreichischen Grenze; *Senecio silvaticus* × *viscosus*, nicht selten bei Waltsch, Kriegern, Pomeisl, Petersburg; *Senecio fluviatilis* Wallr. (= *S. sarracenicus* der meisten Floristen, nicht L.). Elbufer bei Melnik; *Cirsium lanceolatum* × *eriphorum* (*C. intermedium* Döll). Wrutic bei Melnik; bei Welchau gegen Schlackenwerth; *C. lanceolatum* × *acaule* (f. *superacaule*) zwischen Schlackenwerth und Neudau; *C. oleraceum* × *heterophyllum* (*C. affine* Tausch). Erzgebirge: zwischen Weipert und Stahlberg, Wiesen beiderseits der Grenze; *Cirsium palustre* × *heterophyllum*. Erzgebirge: bei Weipert und Eichwald bei Teplitz; Böhmerwald: bei Böhm. Eisenstein und Böhm. Röhren; *Carduus acanthoides* × *nutans*. Jechnitz, Saaz; Vrcovice bei Písek; *Lappa officinalis* × *tomentosa* (*L. ambigua* Čel.). Kl.-Holetitz bei Saaz; *Scorzonera parviflora* Jacq. Wiesen bei Welwarn, mit *Triglochin maritima* L.

Campanula latifolia L. Bad St. Margareth bei Prachatitz; erster Standort in Südböhmen.¹⁾

1) Das vorliegende Exemplar bemerkenswerth wegen der 2-blüthigen unteren Traubenzweige und der an deren Basis inserirten Vorblättchen!

Erythraea linariifolia Pers. Oupor und Skuhrow bei Melnik; auch zwischen Wolesschko und Hrobec bei Raudnitz.

Lappula Myosotis Mnch. Kuněticer Berg bei Pardubic, bei Welwarn häufig; Pilsen [2]; *L. deflexa* (Wahlenb.) Gcke. Berg Wostray bei Mileschau.

Verbascum Thapsus × *Lychnitis* (*V. spurium* Koch). Chrudim; Pisek: Wotawa bei Vrcovice; *Veronica aquatica* Bernh. Waltsch: zwischen dem Grossen und Reuter Teiche bei Neudorf.

Orobanche pallidiflora Wimm. (*O. Cirsii* Fr.). Nemošicer Kalklehne und Pěčicer Fasanerie bei Dobravic bei Jungbunzlau; *O. Kochii* F. Sch. Thal von Bilichau, Chotěschauer Fasanerie bei Budin; Schreckenstein bei Aussig.

Nepeta nuda L. (*N. pannonica* Jacq.). Topol bei Chrudim; *Teucrium Scorodonia* L. Erzgebirge bei Teplitz: Soldatenhöhe bei Eichwald, im Buchwalde.

Amarantus silvestris Desf. Prag: Strahover Garten am Laurenzi-berg.

Rumex obtusifolius × *crispus* (*R. pratensis* M. et K.). Unhošt, Chotěschau bei Petersburg, Chudenicer Gegend häufig.

Thesium montanum Ehrh. Fuss des Egerberges bei Klösterle; *Th. pratense* Ehrh. Pilsen; Buchwald im Böhmerwalde; *Th. rostratum* M. et Koch. Waldwiese im zweiten Parallelthal bei Bilichau nächst Jungfer-Teinitz; zweiter Standort in Böhmen.

Tithymalus amygdaloides (L.) Kl. et Gcke. Pardubic: Nemošicer Lehne und Feldrain bei Wostřešan; Kochanowicer Thiergarten bei Chrudim.

† *Elodea canadensis* Rich. em. Im Podoler Hafen bei Prag bereits so lästig geworden, dass eine behördliche Commission zur Abhilfe abgehalten wurde; Elbe: bei Melnik, Salesl, Schönriesen, Tichlowitz bei Aussig.

Najas major All. (= *N. marina* L.). Elbe zwischen Pistian und Černosek; *N. minor* All., wie vorige, aber seltener.

Sparganium affine Schnizlein. Schwarzer See bei Eisenstein im Böhmerwalde; zweiter Standort dieses Gebirges und Böhmens überhaupt.¹⁾

Platanthera chlorantha Curt. (*Pl. montana* Rchb. fil., aber nicht *Orchis montana* F. W. Schmidt, die zu *Pl. bifolia* Rchb. gehört). Chotěboř in Ostböhmen, Čivice bei Pardubic; *Ophrys muscifera* Huds. Krnčí-Thal bei Kladno.

Gladiolus imbricatus L. Haine bei Hoch-Weseli.

1) Von Dr. A. Peter (Oesterr. Botan. Zeitschrift, No. 1 und 2) irrig ebendort als *S. simplex* f. *fluitans* angegeben. Dieselbe Pflanze nach demselben auch im Kleinen Arber See.

CXCVIII Bericht der Commission für die Flora von Deutschland 1885.

Muscari racemosum (L.) Med. Bei Jungbunzlau; *M. botryoides* (L.) DC. Jungbunzlau.

Tofieldia calyculata (L.) Wahl. Wrutic bei Melník; Bilichauer Thäler, sehr häufig.

Juncus effusus × *glaucus* (= *J. diffusus* Hoppe). Bei Waltsch, Duppau, Schlackenwerth, Chudenic, Schwihau, meist reichlich; neu für das westliche Böhmen, vordem nur einmal an der böhm.-mähr. Grenze (Pokorny) angegeben.

Schoenus nigricans L. Waldwiese bei Bilichau, mit *Thesium rostratum* in Menge (zweiter, vom Elbthal entfernter sicherer Standort in Böhmen); *Carex divulsa* Good. (vera, excl. *C. Pairaei* F. Schultz). Waltsch, und Jechnitz im westlichen Böhmen (bisher sehr selten in Böhmen beobachtet, dagegen *C. Pairaei* verbreitet); *C. Buekii* Wimm. Elbe bei Kostelec; *C. umbrosa* Host. (= *C. polyrrhiza* Wallr.). Dobřichowic bei Prag; Kladno; Pfarrwald bei Gratzen; *C. limosa* L. Sumpf am Teufelssee bei Eisenstein (zweiter Standort im Böhmerwalde); *C. nutans* Host. Sumpfwiese bei Hnidous nächst Kladno.

Hierochloa australis (Schrader) R. et Sch. Kladno; Lochotín bei Pilsen [2]; *Coleanthus subtilis* Seidl. Mittelböhmen: am mittleren Louňovičér Teiche zwischen Řičan und Schwarz-Kostelec, mit *Batrachium confusum* spärlich; *Stipa Tirsa* Stev. Radobyl bei Leitmeritz; *S. Grafiána* Stev. Daselbst; *Koeleria glauca* (Schkuhr) DC. Zaječicer Fasanerie bei Chrudim (östlichster Standort); *Avena praecox* (L.) P. B. Ehemaliger Teichboden: Velká Čeperka bei Pardubic; *Melica picta* K. Koch. Gross-Kostomlat a. d. Elbe; Abhänge der Seitenthäler der Moldau bei Dawle; *M. uniflora* Retz. Nemošicer Lehne bei Pardubic; auffälliger Standort der östlichen Elbniederung, ungewöhnlich niedrig; *Poa annua* L. β. *varia* Gaud., Koch (= *P. supina* Schrader). Erzgebirge: bei Abertham in Menge; (bisher nur aus dem Riesengebirge bekannt gewesen); *P. sudetica* Haenke β. *remota* (Fries). Im Isergebirge oberhalb Haindorf (erster Standort dieses Gebirges); Zbirover Wälder (nach dem Podhorn bei Marienbad, der zweite Standort im inneren Lande).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1886

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Celakovsky Ladislav Josef

Artikel/Article: [Böhmen CXCIV-CXCVIII](#)