

Braunau; unter dem Čerchow bei den „hinteren Hütten“; erster Standort im Böhmerwalde und Südböhmen.

Calamagrostis litorea DC. Elbufer bei Altbunzlau; *C. varia* DC. (*C. montana* Link). Bilichauer Waldthal (anscheinend Uebergangsform zur *C. arundinacea* Roth); *Stipa Tirsia* Stev. Thonabhang „auf der Hack“ bei Trnowan nächst Saaz; *Avena praecox* P. B. Melnik; *Festuca capillata* Lam. Lomnic a. Lužn.: beim Teiche Naděje; *Elymus europaeus* L. Hora bei Němčic nächst Neugedein; erster Standort Vorgebirge des Böhmerwaldes [sämtlich 6].

XV. Mähren.

Referent: AD. OBORNY.

Literatur.

1. J. BUBELA (vgl. Schlesien No. 3).
 2. E. FORMÁNEK, Beiträge zur Flora des böhm.-mähr. und des Glatzer Schneegebirges (Oest. Bot. Zeitschrift 1886 S. 25—30).
 3. E. FORMÁNEK, Mährische Rosen (a. a. O. S. 75—79, 112—117).
 4. E. FORMÁNEK, (vgl. Schlesien No. 2).
 5. E. FORMÁNEK, Beitrag zur Flora des mittl. und südl. Mährens (Prag 1886, Selbstverlag, 115 Seiten).
 6. E. FORMÁNEK, Correspondenzen (Ö. B. Zeitschrift S. 36, 37, 70, 102, 103, 139, 140, 174, 175, 212, 213, 248, 286, 321, 357, 358, 393, 438).
 7. J. B. KELLER, Mährische Rosen (a. a. O. S. 195, 196).
 8. M. KRONFELD, Standorts-Notizen zur Flora von Olmütz (a. a. O. S. 120).
 9. AD. OBORNY, Flora von Mähren und österr. Schlesien IV. Brünn 1886. Vgl. oben S. LXXX.
 10. ED. PALLA, Zur Flora von Kremsier (Ö. B. Zeitschr. S. 50—55, 85—87, 122—126, 157—159, 197—200).
 11. A. SPITZNER, Correspondenzen (a. a. O. S. 213, 358, 433).
-

Neu für das Gebiet:

Batrachium confusum Gcke. (= *Ranunculus Petiveri* Koch) in der Iglava bei Iglau und in Bächen bei Walterschlag [9]; an letzterem Orte bereits verschwunden!! *Caltha palustris* L. v. *radicans* Forst. Maires bei Zlabings [9]; Torfwiesen um Zlabings und Rudoletz!!

Fumaria officinalis L. b. *tenuiflora* (Fr.) (= *F. Wirtgeni* Koch) Poppitz, Mühlfraun, Pumlitz, Esseklee bei Znaim [9].

Nasturtium silvestre × *palustre* Znaim [9]; *Erucastrum obtusangulum* Rchb. Klobouk und Hoštěhradek [9]; *Lepidium latifolium* L. Klobouk nächst Auspitz [9].

Helianthemum rupifragum Kern. auf Jurakalk des Berges Kotouč bei Stramberg [9]; *H. Fumana* Mill. Heiliger Berg bei Nikolsburg [9]! und auf Rothliegendem der Rokytna-Hänge bei Kromau!!

Viola collina × *odorata* (*V. Merkensteinensis* Wiesb.) Jundorf [5]; *V. sylvatica* × *Riviniana* (*V. dubia* Wiesb.) Mokra-hora [5]; *V. Riviniana* × *mirabilis* (*V. orophila* Wiesb.) Kartaus [5].

Drosera anglica Huds. am Rande des Gr. Kohlteiches bei Zlabings [9]!! *D. rotundifolia* × *anglica* desgl. [9]!!

Dianthus Pontederae A. Kern. (*D. atrorubens* auct. nec. All) Nikolschitz bei Auspitz, Katovna bei Kobylí, Czeitsch und am Floriani-berge bei Bisenz [9]; *Spergula Morisonii* Bor. Gerölle der Hloučela bei Prossnitz [9]; *Arenaria serpyllifolia* L. b. *leptoclados* (Guss.) Nikolschitz bei Auspitz, Bisenz [9]; *Cerastrum brachypetalum* Desp. b. *tauricum* (Spr.) Znaim, Pöltenberg, Esseklee [9].

Malva neglecta × *rotundifolia* Znaim [9].

Cytisus hirsutus L. var.! Adamsthal bei Brünn [9]; *Lathyrus silvester* L. b. *brachyphyllus* (Schur) Julienfeld bei Brünn, Kartaus, Namiest, Banow, Waltersdorf, Krokowitzer Wald bei Piesling [9]; Gr. Ullersdorf!!

Rosa Mayeri H. Braun Kühberge bei Znaim [9], hinter Poppitz bei Znaim!! *R. globularis* Franch. Poppitzer Anhöhe, Konitz, Kromau, Eibenschitz, Wolframitz [9]; *R. montivaga* Déségl. zwischen Baumöhl und Gr. Maispitz, Thajathal bei Znaim, Misskogel bei Wolframitz, zw. Eibenschitz und Střelitz [9]; Schreibwald bei Brünn [3]; *R. sphaerica* Gren. Schweizerthal bei Frain, Liliendorf, Zaisa, Baumöhl, Konitz, Bochtitz und Wedrowitz [9]; *R. aciphylla* Rau Kartaus b. Brünn; *R. canina* L. f. *nitens* Desv. Obřan b. Brünn [3]; f. *fissidens* Borb. Znaim [9]; f. *calophylla* Christ Znaim [9], f. *oxyphylla* Rip. Znaim [9]; *R. lanceolata* Opiz Hadiberg bei Obřan nächst Brünn [3]; *R. biserrata* Mérat f. *erostyla* Rip. et Déségl. (sp.) Znaim, Pöltenberg, Poppitz, Konitz, Edelspitz, Mühlfrau, Bisenz, Kromau etc. [9]; f. *sphaeroidea* Rip. (sp.) Znaim, Edelspitz, Poppitz, Konitz, Kl. Tesswitz, Kromau, Eibenschitz, Brünn, Zöptau, Rautenberg [9]; Bisenz, Hadiberg bei Obřan [3], f. *rubescens* Ripart (sp.) Znaim, Pumlitz [9]; *R. dumalis* Bechst. f. *innocua* Rip. et Crép. Znaim, Konitz, Edelspitz [9] f. *glaucifolia* Opiz Znaim [9] f. *hirtescens* H. Braun Znaim [9]; *R. squarrosa* Rau Kühberge bei Znaim [9]; Hadiberg bei Obřan [3]; f. *adscida* Déségl. (sp.) Berg Czubek bei Metillowitz in den Karpaten [9]; *R. oblonga* Déségl. zerstreut im mittl. und südlichen Florenegebiete [9], f. *cladoleia* Rip. (sp.) Znaim, Konitz, Baumöhl [5]; Obřan [3]; f. *hirtostylis* H. Braun Znaim, Gr. Maispitz, Baumöhl; f. *attenuata* Rip. Znaim, Baumöhl, Zaisa, Frain, Bochtitz, Wedrowitz [9]; Komein [3]; *R. Chaberti* Déségl. Kühberge bei Znaim, Edelspitz, M. Budwitz und Zaisa [9]; *R. Formanekii* Keller M. Budwitz [3]; *R. coriifolia* Fr. f.

subcollina Christ Datschitz, Vöttau, Neu- und Gr. Ullersdorf etc. [9]; f. *pseudovenosa* H. Braun Thajathal bei der Traussnitzmühle bei Znaim, Weinberg bei Zaisa, Eisleiten bei Frain [9], f. *intermedia* W. Kitaib. Znaim, Kühberge gegen Edelspitz bei Znaim [9], f. *lancifolia* Keller Obřan b. Brünn [3]; R. *incana* Kitaib. Wsetin [9]; Neureisch, Saar, M. Budwitz [7]; R. *Kmetiana* Borb. Wsetin [9]; R. *dumetorum* Thuill. f. *silvestris* Rchb. Znaim, Kl. Tesswitz, Esseklee, Mühlraun, Durchlass, Gnadlersdorf, Pöltenberg, Gr. Maispitz, Frain etc. [9]; f. *conglobata* H. Braun zwischen Luggau und Gr. Maispitz [9]; f. *solstitialis* Bess. (sp.) Mont Serrat bei Sitzpras [9]; R. *hirta* H. Braun häufig im mittleren und südl. Florengebiete; ändert ab: f. *ramealis* Pug. (sp.) Bisenz [9]; f. *saxicola* H. Braun Steinbrüche bei Kromau [9]; f. *platyphylloides* Déségl. (sp.), Pumlitz, Kuketaj bei Mühlraun, Zaisa, Brünn, Obřan, Bisenz [9]; Hadiberg bei Obřan [3]; f. *hemitricha* Rip. (sp.) Určic bei Prossnitz, Gr. Ullersdorf, Friedland, Czeladna [9]; f. *lanceolata* Opitz, Znaim, Nennowitz, Brünn [9]; R. *globata* f. *subglabra* Borb. Zlabings, Budkau, Znaim, Poppitz, Wedrowitz, M. Kromau, Bisenz [9], Brünn [3]; *pseudo-sylvularum* H. Braun Eibenschitz [9]; R. *sphaerocarpa* Puget Thajathal bei Znaim [9]; R. *collina* Jacq. Znaim, und zwar auf dem Kühberge, Weg gegen Edelspitz [9], Altbrünn [3], Ziesendorf b. Brünn [9]; R. *corymbifera* Borkh. Weinbergränder am Kosíř bei Prossnitz, Kühberge bei Znaim [9]; R. *Zoisaeana* Oborny et Braun Mühlberg bei Zaisa [9]; R. *livescens* Bess. Geissteig bei Luggau, Weinberg bei Zaisa, Frain, Adamsthal [9]; R. *Schmidtii* H. Braun (vgl. Bericht pro 1885 p. CCV), Fuss des Weinberges von Zaisa, gegenüber von Hardegg; Eisleiten bei Frain, Geisssteig bei Luggau, Adamsthal [9]; galt bisher für: R. *gallica* × *canina*; R. *flexuosa* Rau zwischen Zaisa und dem Brünneberg-Wald [9]; R. *Gizellae* Borb. Gr. Ullersdorf und zwar am Hutberge, auf Karlshöhe [9]; f. *plumosa* H. Braun Thajathal bei Znaim, Kühberge u. zw. am Wege von Znaim nach Konitz [9]; R. *similata* Puget Ondřejník bei Friedland, Ostrawitzathal bei Friedland [9]; f. *Reichenbachiana* H. Braun Thajathal bei Znaim [9]; R. *tomentella* Lém. f. *micropetala* Keller um Hostenic [7]; R. *mentita* Déségl. Gr. Ullersdorf, Wermsdorf, Zöptau, Marschendorf, Nikles [9]; R. *inodora* Fr. Trebitsch, Waldkirchen bei Zlabings, Tapwitz, Pöltenberg, Eibenschitz [9], Buchlau, Ohrozim und auf der Jahodová bei Prossnitz, Gr. Ullersdorf, Friedland [9]; f. *virgultorum* Rip. Znaim, Wedrowitz, Kromau, Gr. Ullersdorf, Friedland [9]; f. *globulariaeformis* H. Braun Kromau und am Misskogel bei Wedrowitz [9]; R. *Lexnitzenensis* Keller (var.) Kromau, zw. Wedrowitz und Marschowitz [9]; R. *micrantha* Sm. f. *permixta* Deségl. Rothe Berg bei Brünn, Znaim [9]; f. *sphaerophora* Rip. Steinbrüche bei Kromau [9]; R. *apricorum* Rip. Znaim, Edmitz, Edelspitz, Poppitz, Pöltenberg [9]; R. *rubiginosa* L. f. *isacantha* Borb. und

f. parviflora Rau, beide auf dem Hadiberge bei Obřan [3]; *R. cinerascens* Du Mort. Sembera bei Obřan, Adamsthal [9]; *R. Sericeana* Du Mort. Franzensthal, Neu- und Gr. Ullersdorf, Marschendorf, Theresienthal, in den Beskiden im Thale der Ostrawitz bei Friedland [9]; *R. vestita* Godet Adamsthal bei Brünn, Bisenz, Goldenstein, Gr. Ullersdorf [9]. Ueberdies werden noch Rosen angeführt, die dem Referenten aus Mähren noch unbekannt waren und zwar: *R. syntrichostyla* Borb. Hadiberg bei Obřan [3]; *R. Malnudriensis* Lej. Hadiberg bei Obřan [3]; *R. Weeberi* Keller et Form. Kromau [7]; *R. pygmaeopsis* Keller et Hanousek M. Budwitz [7] und *R. pilosa* Opiz Teltsch [7]; *Agrimonia odorata* Mill. Niederungen bei Grussbach, Grafendorf, Luhatschowitz [9]; *Potentilla thuringiaca* Bernh. v. *Nestleriana* (Tratt.) Teltsch, Bystritz, Saar, Ingrowitz [2]; *P. cinerea* × *opaca* Schreibwald bei Brünn, Thajathal bei Znaim [9]; *Rubus carpinifolius* Wh. Plumennau, Prossnitz, Brünn, Adamsthal, zwischen Schönwald und Paulitz bei Znaim [9]; *R. discolor* Wh. et N. Trebitsch, Luggau, Eibenschitz, Znaim etc. [9]; *R. bifrons* Vest Althart, weit verbreitet im Ostrawitzathale bei Fulnek und Friedland, bei Trojanowitz [9], bei Bisenz; *R. macrophyllus* Wh. et N. Mottilowitz bei Friedland [9]; *R. Gremlii* Focke Paulitz bei Frain, Baumöhl, Zaisa, Neuhäusel, Luggau, Stollek, Waltersschlag, Zlabings etc. [9]; *R. Radula* Wh. N. auf dem Schilibka nächst Paulitz bei Frain [9]; *R. Koehleri* Wh. N. im Gebiete des Plateaus von Drahan [9]! *R. chlorophyllus* Gremli Štěrlitz, Řečkowitz, Tischowitz, Bojkowitz, Lomnitz, Neustadtl [5]; *R. Schleicheri* Wh. et N. Jahodová im Drahaner Plateau und auf der Spalená bei Prossnitz [9]; *R. Bayeri* Focke Hüttenwald bei Stollek, Bezirk Datschitz, Maires bei Zlabings; bei Prossnitz auf der Spalená [9]; *R. Bellardi* Wh. et N. auf der Javorina an der ung. Grenze [9]; *R. oreogeton* Focke Zlabings und bei Stollek [9].

Scleranthus annuus × *perennis* Lasch Popuwek bei Brünn, Zlabings, Kühberge bei Znaim [9].

Galium scabrum Jacq. f. *valdepilosum* Braun Sebrowitz [6]; *G. commutatum* Jord. Pekarnawald bei Bystritz [6].

Pulmonaria obscura × *mollissima* (*P. intermedia* Palla) Rattayer Wald bei Kremsier [10].

Verbascum nigrum × *Blattaria* (*V. intermedium* Rupr.) Patschowitz bei Kremsier [10]; *Euphrasia ericetorum* Jord. Wsetin [1].

Mentha hortensis Tausch. Lutotina bei Wsetin, häufig [1].

Polygonum P. Persicaria × *mite* A. Br. (*P. condensatum* Sz.) um Kremsier [10].

Orchis maculata L. v. *candidissima* Krock. Wiese zwischen Wesnik und Bobrk bei Wsetin [1].

Carex panniculata × *teretiuscula* C. Beckm. (vgl. oben S. CV) Bahnhof-Wiesen bei Bisenz [1].

Festuca capillata Lam. Wsetin [1]; *F. psammophila* Hack. Bahndämme bei Bisenz [9]; *Melica ciliata* L. v. *transsilvanica* Schur im südl. und mittleren Theile Mährens verbreitet [9]; *Poa compressa* L. var. *Langeana* Rchb. Kunstadt und Oels [9].

Verwildert und eingewandert:

Clematis glauca Willd. Ränder des Leskobaches bei Znaim, Nähe des Viaductes [9]; *Ranunculus Steveni* Andrz. (*R. Frieseanus* Jord.) Augarten bei Brünn, Wiesen bei Wsetin, Parkwiesen bei Wiesenberg [9].

Silene dichotoma Ehrh. am Rothen Berge bei Brünn [9].

Ornithopus sativus Brotero. Lutotina nächst Wsetin, häufig als Ueberrest einer alten Cultur [9].

Rosa alba L. Granitzthal und Kühberge bei Znaim, Liliendorf [9].

Helianthus tuberosus L. bei U. Brod [4].

Wichtige neue Fundorte:

Thalictrum aquilegifolium L. Stefanau b. Olmütz [11]; *Aquilegia vulgaris* L. Klobouk b. Auspitz [4], Rattayer Wald bei Kremsier [10]; *Helleborus viridis* L. Pawlowitz bei Wischau [5].

Glaucium corniculatum Curt. zwischen Czeitsch und Czeikowitz [5]; *Fumaria Schleicheri* Soy. Willem. Zwittawa- und Schwarzwatal bei Brünn [6].

Hesperis tristis L. Auerschitz [5]; *Erysimum durum* Presl Zwołenow und Strassnitz [4]; †*Diplotaxis tenuifolia* DC. Tieschnowitz bei Kremsier [10].

Viola cyanea Člk. Kl. Uhrau, Gr. Pawlowitz [5]; *V. hirta* × *odorata* Wiesb. (*V. permixta* Jord.) Ochoz, Obřan, Billowitz, Tischowitz, Blansko, Doubravnik, etc. [5].

Polygala major Jacq. Sloup, Kohoutowitz, Morein, Radlowetz bei Butschowitz, an letzterem Orte auch weissblühend [5]; Scheleschowitz und Tieschnowitz bei Kremsier [10]; *P. vulgaris* L. b) *oxyptera* Rchb. Philippsthal, N. Lhota, W. Klobouk etc. [4].

Cucubalus baccifer L. Kremsier [10]; *Alsine Jacquini* Koch Lateiner Berge bei Brünn und bei Milowitz [5].

Linum flavum L. Dražowitz [6], Strassnitz, Radiejau, Kl. Wrbka, Hradek bei Javornik [4], Aujezd, Auspitz, Kobyli, Pawlowitz [5]; *L. hirsutum* L. Serowitz [5], Banow (MAKOWSKY).

Althaea officinalis L. Scharditz, Lundenburg [5]; *Hibiscus Trionum* L. Theresiendorf [5].

Genista procumbens W. K. Malostowitz [5]; *Ononis hircina* Jq. ver einzelt um Kremsier [10]; *Medicago prostrata* Jacq. Floriansberg bei

Kromau [9]; *Melilotus altissimus* Thuill. Kremsier [10]; *Tritolium ochroleucum* Huds. Kremsier [10]; *T. spadiceum* L. Saar, Neustadt, Ingrowitz [2]; *Dorycnium suffruticosum* Vill. Dražowitz [6]; *Astragalus Onobrychis* L. Dražowitz [6]; *Vicia pannonica* Jacq. Komein, Morkuwek [5].

Rubus fossicola Holuby Ptin, Hammer bei Prossnitz [11]; *R. caesius* × *tomentosus* O. Kuntze Schreibwald bei Brünn [5]; *Potentilla Guentheri* Pohl Thajathal bei Znaim, Kopaina bei Gr. Maispitz!! *Rosa laevistylo* Rip. Obřan, Czernowitz, Klajdovka bei Brünn [3]; *R. silvularum* Désegl. Hadiberg bei Brünn [3]; *R. comosa* Rip. Hadiberg bei Brünn [3]; *R. glauca* Vill. Malomieřitz, Medlinko [3]; *R. complicata* Gren. Bohunitz [3]; *R. scabrata* Crép. Brünn [3]; *R. Boreykiana* Bess. Ziesendorf [3]; *R. vinodora* Kern. Ptin, Kl. Hradisko [6]; *R. umbelliflora* Swartz Vicov bei Prossnitz [11]; *R. coriifolia* Fr. Namiescht [11].

Epilobium Lamyi F. Schultz um Prossnitz [11]; *Trapa natans* L. Pistowitz nächst Wischau zahlreich [11], Chropin bei Kremsier [10].

Ribes rubrum L. Kremsier: Waldau [11].

Eryngium planum L. Rohatetz, Strassnitz [4], Lanshut [5]; *Hacquetia Epipactis* DC. Kremsier [10]; Kuželau, Javornik, Philippsthal, U. Brod [4]; *Sium latifolium* L. Kremsier [10], Rohatetz, Strassnitz [4]; *Bupleurum tenuissimum* L. Theresendorf [5].

Galium austriacum Jacq. Stefanau bei Olmütz [11], Křenuvek, Rosendorf [11]; *G. nitidulum* Thuill. Kartaus bei Brünn, Rother Berg bei Brünn, Misskogel bei Wedrowitz [6]; *G. scabriusculum* Braun Ochoz, Ewanowitz, Schreibwald bei Brünn [6]; *G. laeve* Thuill. Gr. Meseritsch [6].

Inula germanica L. Strassnitz [4]; *Artemisia austriaca* Jacq. Dražowitz [6]; Strassnitz, Radiejau [4]; *Senecio sarracenicus* L. [auct.] Kremsier [10]; *Cirsium pannonicum* Gaud. Strassnitz, Kl. Wrbka, Javornik, U. Brod [4]; *C. canum* × *oleraceum* Naeg. Ung. Brod [4], Kremsier [10], Plumenau [11]; *Carlina vulgaris* L. v. *nigrescens* Form. Kl. Wrbka, Javornik, Philippsthal, U. Brod, W. Klobouk [4]; Kl. Hradisko bei Prossnitz [11]; *Crepis succisaefolia* Tausch in den Karpaten [4].

Campanula latifolia L. auf der Gr. Javorina nächst Blumenthal in den Karpaten [4]; *C. bononiensis* L. Plumenau [11].

Vaccinium Oxycoccus L. Moorwiesen am Gr. Kohlteiche bei Zlabings!! Zlachower Wald bei Prossnitz [11]. *Ledum palustre* L. Moorwiesen am Gr. Kohlteiche bei Zlabings!!

Pulmonaria mollissima Kern. Rattayer Wald bei Kremsier [10].

Verbascum thapsiforme Schrad. b) *cuspidatum* (Schrad.) Vrachov bei Prossnitz [11]; *Orobanche elatior* Sutt. Lutotin bei Prossnitz [11].

Mentha plicata Opiz Stefanau bei Olmütz [11]; *M. arvensis* L. c. *silvatica* Host Czernowier [8]; *Nepeta nuda* L. Kl. Wrbka und Javornik [4].

Utricularia neglecta Lehm. Chropin bei Kremsier [10].

Tithymalus procerus Kl. et Gke. Kuželau, Javornik [4].

Salix Caprea × *aurita* Wimm. (*S. capreola* A. Kern.) W. Klobock [4].

Potamogeton fluitans Roth Romža bei Prossnitz [11]; *P. compressus* L. Bilau und Kremsier [10]; *Zannichellia palustris* L. Prossnitz [11].

Orchis Rivini Gouan Tischaner Wald und Sternwald bei Kremsier [10]; *O. incarnata* L. Javornik [4]; *Cypripedium Calceolus* L. Tischaner Wald bei Kremsier [10].

Iris variegata L. Banow, Welká, Kl. Wrbka in den Beskiden [4]; Dražowitz, Tischowitz [6].

Carex pendula Huds. U. Brod [4].

Stipa Joannis Člk. Dražowitz und Branowitz [6]; *Melica picta* G. Koch zwischen Chropin und Pleschowitz bei Kremsier [10], Branowitz [6].

Pinus Mughus Scop. b) *uncinata* (Ramond) Torfmoor am Teiche Ždiarsko [1].

XVI. Nieder-Oesterreich.

Referent: G. BECK.

Literatur.

1. H. SABRANSKY, Zur Kenntniss des *Rubus pseudo-radula* Hol. (österr. botan. Zeitschr. 1886, S. 17.)
2. E. WOŁOSZCZAK, *Salix scrobicula* (*cineraria* × *grandifolia*) (a. a. O., S. 74.)
3. E. WOŁOSZCZAK, Neue Pflanzenstandorte (a. a. O., S. 117.)
4. M. KRONFELD, Standortsnotizen zur Wiener Flora (a. a. O., S. 121.)
5. P. CONRATH, Correspondenz (a. a. O., S. 176.)
6. J. WIESBAUR, Einiges über Veilchen (vgl. Böhmen, 1886, No 5a).
7. L. WIEDERMANN, Correspondenz (a. a. O., S. 285).
8. L. WIEDERMANN, Correspondenz (a. a. O., S. 357).
9. L. SIMONKAI, *Tilia Braunii* n. sp. (a. a. O., S. 398).
10. H. SABRANSKY, Correspondenz (a. a. O., S. 429).
11. C. JETTER, Correspondenz (a. a. O., S. 430).
12. A. DICHTL, Ergänzungen zu den „Nachträgen zur Flora von Nied.-Oesterr.“ (Deutsche botan. Monatschr., IV, 1886, S. 130).
13. T. F. HANausek, Neue Rosenformen (a. a. O., S. 145).
14. H. SABRANSKY, Beiträge zur Brombeerenflora der kleinen Karpaten (Abhandl. der zool. bot. Gesellschaft in Wien XXXVI, 1886, S. 89).
15. H. BRAUN, Ueber *Mentha fontana* Weihe, ein Beitrag zur Kenntniss mehrerer Formen aus der Gruppe der *Mentha arvensis* L.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1887

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Oborny Adolf

Artikel/Article: [Mähren CXXVIII-CXXXIV](#)