

*Potamogeton pusillus* L. Zeitz: Dorfbach von Gleina [2].

*Orchis pallens* L. Zeitz: Hainsberger Gehölz [2]; *Gymnadenia conopsea* R. Br. Zeitz: nur im Kittelholz [2]; *Cephalanthera Xiphophyllum* Rchb. fil. Löbau: Rothstein, Langer Berg bei Herrnhut [1]; *Epipogon aphyllus* Sw. Zeitz: bei Ossig [2]; *Goodyera repens* R. Br. Zeitz: im Forst [2]; *Spiranthes auctumnalis* Rich. Zeitz: bei Droyssig [2]; *Cypripedium Calceolus* L. Zeitz: bei Schkeuditz [2].

*Gladiolus imbricatus* L. Löbau: auf einem Berge bei Dehsa, zwischen dem Rittergute Oberottenhain und dem Forsthause [1]; *Iris sibirica* L. Löbau: zwischen Nechen und Eiserode an der Bautzener Strasse [1]; Zeitz: im Forst [2].

*Leucojum vernum* L. L. Muskau: Köbels [5].

*Gagea spathacea* Salish. Löbau: im Heck bei Unwürde [1]; *Anthericum ramosum* L. Zeitz: Kittelholz, Kuhndorfer Gehölz, Mühlberg bei Tauchlitz [2]; *Allium ursinum* L. Zeitz: im Thiergarten [2]; *A. acutangulum* Schrad. Zeitz: bei Predel [4], *A. Scorodoprasum* L. Zeitz: häufig [2]; *Polygonatum officinale* All. Zeitz: am Probsteiholz bei Ossig [2]; *Muscari botryoides* DC. ist in der Lausitz (Heinrichsberg bei Herrnhut, Schönauer Hutberg, L. Landeskronen) einheimische Art, nicht *M. racemosum* Med.; letzteres soll nur angepflanzt und verwildert in der Lausitz vorkommen [3].

Zu berichtigen: *Rubus affinis* Barber 1884 ist *R. thyrsoides* Wimm. *thyrsanthus* Focke; *R. thyrsiflorus* und *R. Bellardi* × *Schleicheri* Barber 1884 gehören zu *R. scaber* W. et N. *R. Bellardi* × *Koehleri* ist *R. hirtus* f. *russatus* [3]. (Vgl. Bericht pro 1884 p. CI, CIII und pro 1885 p. CLXIII.)

## VI. Hercynisches Gebiet.

Referent: C. HAUSKNECHT.

### Literatur.

1. BELING, Dritter Beitrag zur Pflanzenkunde des Harzes (Deutsch. bot. Monatschrift IV. 1886, S. 6—8).
2. C. DÜRER (a. a. O. 1886, S. 190).
3. C. HAUSKNECHT (Mittheil. bot. Verein f. Ges. Thür. V. 1886, S. 60, 68, 69.)
4. ROTTENBACH, Ueber *Campanula latifolia* (Deutsche bot. Mon. IV., S. 154, 155).
5. MEURER (Irmischia VI. No. 3, 4, 1886).
6. C. NOELDEKE *Flora Goettingensis*, Celle 1886.
7. REINECKE (Mitth. bot. Ver. f. Ges. Thür. V. S. 67, 68).
8. ROTTENBACH (a. a. O.,

S. 65, 66. 9. RUDOLPH (a. a. O., S. 68). 10. M. SCHULZE (a. a. O., S. 59). 11. M. SCHULZE, Jenas wilde Rosen (a. a. O., S. 1—57. Nachtrag 73—84). 12. STEITZ, *Hieracium gothicum* Fr. im Taunus. (D. bot. Monatsschr. IV. S. 56, 57). 13. STEITZ (a. a. O., S. 62, 63). 14. STEITZ, Einige Bemerkungen über die Flora von Frankfurt a. M. und Umgebung (a. a. O. S. 138—141). 15. R. WELLHAUSEN, Einige Beiträge zur Flora von Osterode a. Harz (a. a. O., S. 30, 31). 16. P. ASCHERSON (Verh. Bot. Verein Brandenb. XXVII (1886), 18 Anm.) 17. CELAKOVSKY (vgl. Böhmen Nr. 6).

### Neu für das Gebiet:

**Adonis aestivalis** × **flammeus** (*A. abortivus* Hausskn.) Aecker zw. Weimar und Gaberndorf [3].

*Rosa tomentosa* Sm. var. *venusta* Scheutz forma **gallicoides** M. Schulze; *R. rubiginosa* L. var. **Schulzei** Chr.; **R. micrantha** × **rubiginosa**; *R. agrestis* Savi var. *arvatica* Chr. f. *subhispida*; **R. agrestis** × **rubiginosa** (*R. Maassii* M. Sch.); *R. graveolens* Gren. *typica* Chr. forma **hispida**; var. *calcarea* Chr. f. **hispida**; var. **Schulzei** Chr.; var. *angustata* M. Sch., var. *anadena* Chr. et forma **hispida**; **R. graveolens** × **tomentosa** (*R. Maureri* M. Sch.); **R. graveolens** × **rubiginosa**; *R. tomentella* Lém. *typica* Chr. forma **subhispida**; var. *affinis* Chr. forma **hispida**; var. *sclerophylla* Chr. f. **subhispida**; var. *sinuatidens* Chr. f. **subhispida**; *R. trachyphylla* Rau var. **Regelii** M. Sch.; *R. glauca* Vill. var. *myriodonta* Chr. f. **hispida**; var. *subcanina* Chr. f. **hispida**; *R. dumetorum* Thuill. var. *platyphylla* Chr. f. **subhispida**; var. *platyphylla* f. *urbica* Chr. subforma **subhispida**; var. *obtusifolia* Chr. f. **subhispida**; *R. coriifolia* Fr. var. *subcollina* Chr. f. **subhispida**; var. *biserrata* Chr.; **R. gallica** × **trachyphylla** u. a. neue hybride Verbindungen der *R. gallica*; sämtlich von M. SCHULZE in der Flora von Jena aufgefunden und sub 11 beschrieben. Für die Rosen des oberen Wesergebiets vergl. Westfalen Nr. 4.

**Sedum albescens** Haw. Hausberg b. Jena [3].

*Galium elatum* × *glaucum* Hain b. Rudolstadt [3].

**Hieracium pallescens** W. K. Nordhausen: Kohnstein bei Niedersachswerfen [diese von FRIES mit Zweifel angeführte Angabe bestätigt von 17].

*Ophrys muscifera* Huds. b. *bombifera* de Bréb. Sicherer Fundort: Jena [10]. (Vgl. Reichenbach fil. Ic. Fl. germ. XIII, XIV, p. 79.)

*Triticum glaucum* Desf. Artern an Mauern; Weinberge am Süssen See zw. Wormsleben und Seeburg [16].

### Wichtigere neue Fundorte:

*Aconitum variegatum* L. Lehesten [5].

† *Cheiranthus Cheiri* L. Reinhausen [6]; *Arabis Halleri* L. † Frankfurt: Vilbel [14]; *Lunaria rediviva* L. Lehesten, Katzhütte [5]; Hühner-

stollen, Reierhausen [6]; † *Iberis amara* L. Hainberg über Herberhausen [6]; *Lepidium Draba* L. † Zw. Orxhausen u. Bentierode [1].

*Polygala depressa* Wend. Hünenfeld, neue Steinbruch b. Münden, Neuhaus im Solling [6].

*Sagina nodosa* Fenzl Mackenrode, Landolfshausen [6]; *S. salina* Pr. Nörten unter dem Uemmelberge, Förste unter dem Lichtensteine [6].

† *Impatiens parviflora* DC. Göttingen [6].

*Oxalis corniculata* L. † Münden [6].

*Ulex europaeus* L. Vorwerk Rickenrode auf dem Eichsfelde [6]; *Genista anglica* L. Schottsberg b. Dransfeld [6], weit nach Süden vorgeschobener Vorposten; *Lotus tenuifolius* Rehb. Todtenwiese, zw. Göttingen u. Elliehausen [6], *Ornithopus perpusillus* L. Volkmarshausen, Kattenbühl b. Münden [6].

*Rubus festivus* Müll. et Wtg. Granethal b. Juliushütte [1]; *R. hederifolius pubescens* (W.) Focke. Münden am Weserufer [6]; *R. vestitus* Wh. et N. Spickershausen u. Landwehrhagen [6]; *R. Radula* Wh. Münden; *R. rudis* Wh. et N. Hengstberg b. Gross-Lengden, Münden; *R. caesius* × *candicans* b. Münden [6]; *Agrimonia odorata* Mill. verbreitet in den Weserthalwäldungen, Vernewaldshausen, Bühren, Bleiche b. Münden [6]; *Rosa repens* Scop. Forstort Angelberg b. Kreiensen [1].

*Circaea intermedia* Ehrh. Hessendreisch, Adelebsen, Elvese, Moringen, Fredelsloh, Westerhof, Förste [6].

*Myriophyllum spicatum* L. Salzderhelden [6].

*Montia minor* Gmel. im Solling, Steinborn, Adelebsen, Schlarpe, Hardeggen, Westerhof, Osterode, kleine Hagen [6].

*Cicuta virosa* L. Entensumpf zw. Gittelde u. Willershäusen [1]; Teufelsbäder b. Osterode [6]; *Carum Bulbocastanum* Koch † Aecker am Hainberge [6]; *Meum athamanticum* Jacq. Gallenberg b. Wildemann, Eickmühl b. Seesen [1]; *Chaerophyllum hirsutum* L. Frankf.: Vilbel [14].

† *Ebulum humile* Gke. Ostende: Söse [15].

*Galium erectum* Huds. † Wiesen oberh. Kordobanger Graben b. Schwarzburg [3].

*Anthemis arvensis* × *tinctoria* Acker b. Holtensen [6]; *Lappa nemorosa* Körn. Gittelde, zw. Harriehäusen u. Wiershausen [1]; *Centaurea Jacea* L. b) *decipiens* Thuill. † Bahndämme zw. Erfurt u. Gispersleben [9]; *Taraxacum officinale* Web. b) *palustre* (DC.) zw. Göttingen u. Elliehausen, Förste [6]; *Lactuca virosa* L. Leineholz zw. Grossenrode u. Elvese [6]; *L. perennis* L. Bleicherode [6]; *Hieracium gothicum* Fr. Taunus: zw. Königstein und Falkenstein [12].

*Campanula latifolia* L. Meiningen: Gebaberg oberh. Geba [8].

*Pirola uniflora* L. Oberh. Badenhausen [1]; *Chimophila umbellata* Nutt. Brackenb. b. Meensen [6].

*Gentiana Amarella* b) *Amarella* (Willd.) Gke. Meensen [6].

*Cynoglossum germanicum* Jacq. Hutberg u. Neuberg b. Steddingen [8].



*Verbascum phlomoides* L. zw. Münden und Hedemünden, Scharzfels [6]; *V. Thapsus* × *nigrum* Speele, Rothe Stein b. Hilwartshausen [6]; *V. thapsiforme* × *nigrum* Münden am Radwerder [6]; †*Mimulus luteus* L. Osterode: Söse [15]; *Veronica longifolia* L. An der Werra b. Münden [6].

*Mentha silvestris* L. d) *crispata* (Schrad.). Osterode an der Söse unter Gypsfelsen [6]; †*M. piperita* L. Bollensen b. Uslar, Söseufer b. Osterode [6]; *M. aquatica* × *silvestris* (*M. nepetoides* Lej.). Opferteich b. Oberdorf-Moringen; Stegemühle b. Göttingen, Bovenden [6]; *M. gentilis* L. Moringen [6]; *Salvia silvestris* L. †Kl.-Hagen, Deppoldshausen, Rammelsberg b. Nörten [6]; *S. pratensis* × *silvestris* (*S. elata* Host) Schwellenburg b. Erfurt [7]; *S. verticillata* L. †Hainberg, Kl.-Hagen, Deppoldshausen, Nörten [6]; Frankfurt: Seckbacher Berg, Enkheim, Bischhofsheim [13]; †*Hyssopus officinalis* L. Mäuseberg b. Bühle in Menge verw. [6]; *Stachys alpina* L. Rüdersberg b. Stedtingen, Wald von Gleimershausen gen Dreissigacker [8]; *Scutellaria hastifolia* L. Eickmuhl b. Seesen [1].

*Utricularia vulgaris* L. Iberg b. Moringen [6].

*Lysimachia thyrsiflora* L. Schwülmethal b. Adelebsen [6]; *Glauca maritima* L. Nörten unter dem Uemmelberge, Sülbeck, Moringen [6].

*Armeria Halleri* Wallr. Granethal oberh. Juliushütte [1].

*Chenopodium opulifolium* Schrad. Daderstadt [6].

*Rumex maritimus* L. b) *paluster* Sm. Mengershausen [6].

*Thesium pratense* Ehrh. Gittelde [1].

*Salix nigricans* Sm. †Leineufer b. Göttingen u. zw. Weende u. Bovenden [6]; *S. aurita* × *repens* Bramburg b. Adelebsen, Hünenfeld b. Münden [6].

*Triglochin maritima* L. Nörten, Förste, Saline b. Grone [6].

*Potamogeton trichoides* Ch. et Schl. Harste [6]; *Zannichellia pedicellata* Fr. Todtenwiese u. Feuerteich b. Göttingen, in der Grone unter Kl.-Hagen, Münden, Rasemühle, Moringen, zw. Reinhausen u. Bremke [6].

*Orchis purpurea* Huds. Katzenstein b. Osterode, Weenderholz, Hessendreich, zw. Mollentfelde u. Berlepsch [6]. *O. Rivini* Gouan Böllenberg b. Moringen, Holzberg b. Stadt Oldendorf, Leineholz b. Elvese [6]; *Gymnadenia albida* Rich. Bramburg b. Adelebsen [6]; *Platanthera viridis* Lindl. Holzberg b. Stadt Oldendorf, Hohe Hagen, Sesebühl [6]; *Ophrys apifera* Huds. zw. Weende u. Deppoldshausen [6]; *Epipogon aphyllus* Sw. Treppenberg über Mackenrode, zw. Weender Papiermühle u. Deppoldshausen [6]; *Cephalanthera Xiphophyllum* Rchb. fil. Dannhäuser Forst am Wausterberge [1]; *Epipactis rubiginosa* Gaud. Münchehof, Winterberg b. Grund [1]; *Ep. microphylla* Sm. Ahlsburg b. Moringen [6]; *Liparis Loeselii* Rich. Westerhof, Hain b. Allendorf 1845, zw. Brehme u. Ecklingerode [6]; *Cypripedium Calceolus* Bleicherode [6].

† *Narcissus Pseudo-Narcissus* L. Hardegsen, Amtsfreiheit Osterode u. Grasgärten [6] b. Grund [1].

*Gagea spathacea* Salisb. Leineholz b. Nörten [6]; *G. minima* Schult. Rohdethal unter der Eichenburg [6]; *Ornithogalum umbellatum* L. †Grasgärten b. Münden [6]; †*O. nutans* L. Aecker unter Nicolausberg, oberhalb der Lutter [6].

*Juncus effusus* × *glaucus* zw. Bornhausen u. Hahausen [1]; *J. filiformis* L. Bremkerkirche b. Adelebsen [6]; *J. obtusiflorus* Ehrh. Schallerbach zw. Bornhausen u. Hahausen [1]; *J. tenuis* W. Kauffunger Wald b. Nienhagen; Königshof b. Münden [6]; *J. Gerardi* Loisl. Förste, Nörten [6].

*Cyperus fuscus* L. Leineufer b. Eselsstieg, Mengershausen, Moringen, Iberg b. Moringen [6]; *Scirpus Tabernaemontani* Gmel. Denkershausen, Förste, Sülbeck, Osterode, Moringen [6]; *Carex divulsa* Good. Hagenberg b. Moringen, Krukenburg b. Helmarshausen [6]; *C. teretiuscula* Good. Landolfshausen, Seeburg, Osterode, Denkershausen [6]; *C. stricta* Good. Carlslust b. Adelebsen u. Bramburg; Förste [6]; *C. pendula* Huds. zw. Seesen u. Lautenthal [1]; *C. flava* L. c) *Oederi* (Ehrh.) Waake, Adelebsen, Solling [6]; *C. Hornschuchiana* Hppe. Förste [6]; *C. Pseudo-Cyperus* L. Reiershausen, Wellersen, Osterode [6].

*Alopecurus fulvus* Sm. Lichte Meer b. Kehr, Harste, Moringen, Salzderhelden [6]; *Calamagrostis lanceolata* Rth. Teufelsbäder b. Osterode [6]; *C. varia* Lk. Neuhof am Sachsenstein [6]; *Avena strigosa* Schreb. Wüllmersen b. Trendelburg [6]; *Eragrostis minor* Host †Hanauer Bahnhof, Zollhof und „Nizza“ in Frankfurt a. M. (Offenbacher Bahnhof in Sachsenhausen) [2]; *Festuca sciuroides* Rth. Nörten, Moringen, Hardegsen, Lauenberg [6]; *F. glauca* Schrad. Höllenthal, Osterode [6]; *Lolium perenne* × *Festuca elatior* (*F. loliacea* Curt.) auf der Hube b. d. Laschmühle, Karspühle in Göttingen.

## VII. Schleswig-Holstein.

Referent: C. T. TIMM.

### Quellen:

#### a) Literatur:

1. ERNST H L. KRAUSE (Vgl. Balt. Gebiet No. 5 2. W. O. FOCKE, *Rubus cimbricus* n. sp. (Abhandlungen naturw. Verein Bremen, IX. Bd., III. Heft, 1886, S. 334). 3. J. PREHN, Einige Pflanzen Land Oldenburgs (Schriften des naturwissenschaftl. Vereins für Schlesw.-Holst., Bd. VI, II. Heft, Kiel 1886, S. 59—64.)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1887

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Haussknecht Heinrich Carl [Karl]

Artikel/Article: [Hercynisches Gebiet. XCVIII-CII](#)