© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Pinus montana Mill. var. *uncinata* Ram. als aufrechter Baum Zürich: Kappel, woselbst sie „Archli" genannt wird [13].

Druckfehler im Bericht pro 1886.

S. CXLVII Zeile 6 von oben statt Roddinières (Pillier) lies: Rossinières (Pittier).

S. CIL Zeile 16 von oben statt Bucht ob Wanwyl lies: Buchs ob Wauwyl.

XX. Pteridophyta.

Referent: Chr. Luerssen.

---

1. Preussen.

Literatur.

Bericht über d. 26. Versammlung d. Preuss. Botan. Vereins (Vgl. Preussen No. 1).

Aspidium Thelypteris Sw. var. *Rogaetzianum* Bolle am Woltersdorfer See im Kr. Schlochau.

Botrychium matricariaefolium A. Br. Kr. Schwetz bei Falkenhorst und zwischen Lnianno und Wenthin; Kr. Strasburg am Straszyn-See; *B. simplex* Hitchc. Kr. Schwetz zwischen dem Lniannoer See und Falkenhorst; Kr. Strasburg an einem kleinen See nördlich vom Saminer See und auf Wiesen zwischen Boelk und Neuhof; *B. rutaefolium* A. Br. Kr. Strasburg am Straszyn-See, südlich der Försterei im Belaufe Gurczno und bei der Försterei Slupp.

Equisetum Telmateia Ehrh. var. *breve* Milde Kr. Neustadt zwischen Lusin und Gossentin.

Lycopodium complanatum L. β. *Chamaecyparissus* A. Br. Kreis Schlochau im Jagen 57 der Eisenbrücker Forst und zwischem dem Moos- und Gr. Karlinken-See bei Gr. Konarczyn; *Isoëtes lacustris* L. Kr. Schlochau im Ranken- (forma *falcata* und *stricta*) Kraasen-, Linosee und See von Neuhof (forma *falcata*) bei Prechlau, im Linowko-See (forma *patens* und *patentissima*) und Kl. Barschsee bei Gr. Konarczyn.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

2. Baltisches Gebiet.

Literatur.

O. Richter (Vgl. Balt. Geb. No. 3).

Equisetum hiemale L. Demmin: Verchen.

---

3. Märkisch-Posener Gebiet.

Literatur.

C. Trebs (Vgl. Märk.-Pos. Gebiet No. 5).

Pilularia globulifera L. Fürstenwalde: Petersdorfer See.

---

4. Schlesien.

Literatur.

1. E. Fiek (Vgl. Schlesien No. 1); 2. Formánek (Vgl. das. No. 3).

Asplenium germanicum Weis Czerwenkathal bei Odrau; *A. Adiantum nigrum* L. *β. Onopteris* Heufl. var. *silesiaca* Milde wurde am Weinberge bei Zobten wieder aufgefunden [1]; *A. adulterinum* Milde Altvater-Wald [2]; *Aspidium Braunii* Spenn. am Gr. Ostry in den Beskiden [1].

Botrychium matricariaefolium A. Br. Grünberg: Alte Schloiner Strasse seitwärts der Glashütte und Forstrevier Hohenborau [1].

---

5. Obersächsisches Gebiet.

Literatur.

1. E. Fiek (vergl. unter 4); 2. Ludwig, Die Farnpflanzen des reussischen Voigtlandes; Verhandl. d. bot. Ver. f. d. Prov. Brandenburg XXIX (1887) S. 16, 17; 3. Luerssen, Neue Standorte seltener deutscher Farne; Berichte d. deutschen bot. Gesellsch. V. S. 101—103.

Hymenophyllum tunbridgense Sm. wurde vom Ref. 1887 in der sächsischen Schweiz lebend beobachtet.

Asplenium germanicum Weis bei Greiz, Rothenthal, Dölau, Elsterberg, Wünschendorf, Zeulenroda [2]; *Athyrium Filix femina* Roth var. *confluens* Moore bei Greiz am Glohdenhammer, in der Neuen Welt und am Gasparinenberg [2, 3]; neu für das Gesammtgebiet; *Aspidium lobatum* Sw. *genuinum* an Diabasfelsen des Steinichts bei Rentzschmühle [2, 3].

Lycopodium complanatum L. bei Greiz, Klein-Gera etc. [2].

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

6. Hercynisches Gebiet.

Literatur.

1. H. Eisenach, Flora des Kreises Rotenburg a. F.; Bericht der Wetterauischen Gesellschaft für Naturk. zu Hanau 1887; 2. Beling (Vgl. Hercyn. Gebiet No. 1); 3. Wiefel (Vgl. Hercyn. Geb. No. 11).

Blechnum Spicant With. zwischen Schwarzenhasel und Rockensüss, Eulersgrund bei Rotenburg [1]; *Asplenium septentrionale* Hoffm. Atzelstein; *A. germanicum* Weis Kippenberg, Bismarckstein bei Leutenberg [3]; *Aspidium cristatum* Sw. am Heber im Erdfall [2]; *A. lobatum* Sw. Ilmwand [3]; *Phegopteris Robertiana* A. Br. Schlossgartenmauer bei Rotenburg [1].

Lycopodium Selago L. zwischen Asmushausen und Braunhausen; *L. annotinum* L. Allheimer bei Rotenburg, zwischen Ersrode und Beenhausen [1].

---

7. Schleswig-Holstein.

Literatur.

Buchenau (Vgl. Schlesw.-Holst. No. 1).

Polypodium vulgare L. Haide vor der Laurentii-Kirche auf Föhr.

Ophioglossum vulgatum L. im Kressenjakobsthale und dem noch etwas südlicheren Dünenthale auf Hörnum.

Equisetum limosum L. Klappholtthal auf Sylt.

Lycopodium inundatum L. in den feuchten Dünenthälern der Halbinsel List und im Klappholtthale und benachbarten Thälern auf Sylt.

---

8. Westfalen.

Literatur.

N. Loeffler (Vgl. Westfalen 1886, No. 3).

Osmunda regalis L. in Bentlage und im Schotthack häufig.

Botrychium Lunaria Sw. Altenrheine, Eschendorf; *Ophioglossum vulgatum* L. Altenrheine, Eschendorf, Rodde.

Lycopodium complanatum L. β. *Chamaecyparissus* A. Br. Gellendorfer Haide.

---

9. Oberrheinisches Gebiet.

Literatur.

1. Klotz, Einige interessante Standorte des Freiburger Florengebietes; (Mittheil. d. bot. Ver. f. d. Kreis Freiburg 1887, S. 301, 302); 2. Neue Standorte (Vgl. Oberrh. Geb. No. 2); 3. Schrader (Vgl. das. No. 8): 4. M. Dürer (Vgl. das. No. 11).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Blechnum Spicant With. Mooswald bei Thiengen [1]; *Asplenium germanicum* Weis bei Nussbach im Schwarzwald [2]; *Aspidium Thelypteris* Sw. Insmingen im Kr. Chateau-Salins [3].

Equisetum variegatum Schleich. Gr. Gerau [4].

Lycopodium Selago L. im Stockwald bei St. Georgen [2]; *L. inundatum* L. Hochdorf [1]; Stockwald bei St. Georgen [2].

---

10. Württemberg.

Literatur.

Luerssen (Vgl. Obers. Geb. No. 3).

Asplenium Trichomanes L. var. *Harovii* (Godr.) Milde und var. *incisa* Moore an Nagelfluhfelsen bei Unter-Essendorf; *Aspidium cristatum* × *spinulosum* (*A. Boottii* Tuckerm.) Sumpf am Lindenweiher bei Unter-Essendorf.

---

11. Bayern.

Quellen:

a) Literatur.

1. Loher (Vgl. Bayern No. 3); 2. Jahresbericht der naturf. Ges. in Nürnberg 1887, S. 36.

b) Unveröffentlichte Mittheilungen von:

3. Kessler (Vgl. Bayern No. 7); 4. Prechtelsbauer (Vergl. das. No. 9); 5. von Sandberger (Vgl. das. No. 11).

Aspidium Lonchitis Sw. Nj Etzelwang bei Hersbruck [4]; *A. lobatum* Sw. Nj Moritzberg, Sackdilling bei Neuhaus a. Pegnitz [4].

Ophioglossum vulgatum L. Nk Nürnberg mehrfach [3, 4]; *Botrychium matricariaefolium* A. Br. Nk Mögeldorf [2].

Equisetum Telmateia Ehrh. R. von Haselbach nach dem Kreuzberg [5]; *E. hiemale* L. Hu Innauen bei Simbach [1].

Lycopodium complanatum L. Nj Bernricht bei Sulzbach, Fichtenhof bei Neukirchen, zwischen Eschenfelden und Krottensee [4].

---

12. Mähren.

Literatur.

Formánek (Vgl. Schlesien No. 3).

Asplenium Adiantum nigrum L. *β. Serpentini* (Tausch) Felsen im Nikleser Walde; *Aspidium lobatum* Sw. Wermsdorf, Kiesgraben, Kriechwald bei der Ruine Neuhaus, Lautenhübl bei Nikles.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

13. Nieder-Oesterreich.

Literatur.

Kissling (Vgl. Nied.-Oesterr. No. 6).

Aspidium aculeatum Döll (*A. lobatum?* Ref.) a. Gaisbergkogl b. Kilb.

---

14. Ober-Oesterreich.

Quellen.

a) Literatur.

1. Vierhapper (Vgl. Ober-Oesterr. No. 1; s. auch den II. Theil dieser Arbeit. Ried 1886).

b) Unveröffentlichte Mittheilungen von:

2. Duerrnberger (Vgl. das. No. 4); 3. Fr. Vierhapper jun. (Vgl. das. No. 9).

Asplenium fissum Kit. Stoder, Felsen des Benglersberges in der Poppenalm [2]; *Aspidium lobatum* Sw. var. *Plukenetii* Sw. Ried [1].

Equisetum Telmateia Ehrh. var. *serotinum* A. Br. Niederbrunn. Tumeltsham [1]; *E. hiemale* Wildshut [3].

Lycopodium complanatum L. Weilhartforst, Eggelsberg [1].

---

15. Tirol.

Literatur.

Luerssen (Vgl. Obers. Geb. No. 3).

Aspidium Filix mas × *spinulosum* (*A. remotum* A. Br.) an Waldsümpfen in Moosenthale nächst dem Freundsheimer Torfmoore bei Rattenberg.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft

Jahr/Year: 1888

Band/Volume: 6

Autor(en)/Author(s): Luerssen Christian

Artikel/Article: Pteridophyta. CLIV-CLVIII