

VI. Hercynisches Gebiet.

Referent: C. HAUSSKNECHT.

Quellen:

a) Literatur.

1. TH. BELING, Vierter Beitrag zur Pflanzenkunde des Harzes u. s. w. (Deutsche botan. Monatsschrift [= D. b. M.] V. 1887, S. 10–12); 2. M. DÜRER in Mittheilungen botan. Ver. f. Ges. Thüringen (= M. bot. G. Th.) VI. 1888, S. 19; 3. C. HAUSSKNECHT in M. bot. G. Th. VI., 1887–1888, S. 8–10, 20–34; 4. FR. KÖNIG in D. b. M., V. S. 80, 174; 5. REINECKE in M. bot. G. Th. VI., S. 18; 6. H. ROTTENBACH in M. bot. G. Th. V. 3, 1886, S. 65; 7. SAGORSKI, Ergänzungen zu den „Rosen von Thüringen“, (D. b. M. IV. 55, 56, 89–91, 97–100): Einige neue Rubusformen aus Thüringen (a. a. O. V. S. 81–86); 8. M. SCHULZE, (Vgl. Märk.-Pos.-Gebiet No. 6); 9. STEITZ in D. b. M., S. 62, 63; 10. TORGES in M. bot. G. Th. VI.. S. 15, 16; 11. WIEFEL. Zusätze und Berichtigungen zur Flora des Sormitzgebietes in Thüringen, (D. b. M. V. S. 27, 28, 59–60).

b) Unveröffentlichte Mittheilungen von:

12. M. DÜRER in Frankfurt a. M.

Neu für das Gebiet:

Trifolium medium L. var. *eriocalycinum* Hsskn. Frankenhausen gegen das Rathsfeld [3].

Prunus peduncularis Jord. & Fourr. Jena [8]; *Rubus caesius* × *tereticaulis* Schwarzsburger Thal [8]; *R. piliferus* Sag. zw. Ilmenau u. Manebach; *R. Hennebergensis* Sag. Schleusingen; *R. nitens* Sag. Manebach; *R. thrysiflorus* W. N. v. *thuringiaca* Sag. Suhler Neundorf [7].

Epilobium hirsutum × *roseum* (*E. Schmalhausenianum* M. Sch.) Mühlthal b. Jena [8]; *Isnardia palustris* L. Hanau: Gr. Krotzenburg [12].

Asperula cynanchica L. var. *arenicola* Reut. (a. A.) Gipsberge bei Frankenhausen [3].

Carlina vulgaris L. var. *leptophylla* Griesselich Frankenhausen auf Gipsbergen; Rappelsdorfer Kuppe bei Schleusingen; Saalburg [3]; *Tragopagon major* × *orientalis* (*T. neglectus* Hsskn.) Frankenhausen [3]; *Hieracium Pilosella* × *setigerum* (*H. cinereum* Tsch.) Gipsberge bei Frankenhausen [3].

Veronica aquatica Bernh. Jena; Hildburghausen [8].

Mentha aquatica \times *nemorosa* (*M. pubescens* Willd.). Gräben b. der Rottleber Höhle b. Frankenhausen [3].

Utricularia Bremii Heer Hanau: Gr. Krotzenburg [12].

Typha angustifolia \times *latifolia* (*T. elatior* Bönnig.) Teiche bei Bendeleben [3].

Scirpus lacustris L. var. **capitatus** Hsskn. Breitunger See b. Salzungen [3]; *Sc. Tabernaemontani* Gmel. var. **capitatus** Hsskn. Salzgräben bei Esperstädt b. Frankenhausen [3]; *Carex digitata* \times *ornithopoda* (*O. Dufftii* Hsskn.) Steinberg b. Keilhau [3].

Eingeschleppte bez. verwilderte Arten:

Centaurea nigrescens Willd. Bahndämme bei Weimar [3].

Omphalodes verna Mnch. Im Habichtswald angesiedelt [4].

Allium tataricum L. Weinberg b. Kassel angesiedelt [4].

Wichtigere neue Fundorte:

Helleborus viridis L. Wald b. Sievershausen b. Calefeld [1].

Barbaraea intermedia Bor. Frankfurt a. M. [2]; *Arabis hirsuta* Scop. b) *sagittata* (DC.) Kalk-Laubbälder b. Legefeld; *Lunaria rediviva* L. Rhön: Ressberg, Eierhauk [10].

Viola canina \times *silvatica* Ettersberg, Braunsdorfer Wiesen beim Schwarzburger Thal; Monraburg b. Beichlingen; Stollberg a. H.; *V. canina* \times *Riviniana* Ettersberg; *V. collina* \times *hirta* (*V. hybrida* Val de Liévre) Frankenhausen; *V. collina* \times *odorata* Frankenhausen [3].

Drosera anglica Huds. und *R. rotundifolia* \times *anglica* (*D. obovata* M. et K.). Hanau: Gr. Krotzenburg [12].

Hypericum quadrangularum \times *tetrapterum* Trockhausen b. Jena [8].

Onobrychis viciaefolia Scop. var. *decumbens* Wallr. (a. A.) einheimisch auf Gypshügeln b. Frankenhausen [3]; † *Vicia villosa* Rth. Weimar: Hetschburg [10]; Frankfurt a. M. [9]; *Lathyrus heterophyllus* L. var. *unijugus* K. Weimar: mit der Art im Hengstbachthal b. Legefled; Troistedter Forst [10].

Rubus hercynicus G. Br. Ilmwand bei Leutenberg; *R. Radula* Whe. Tannenberg b. Leutenberg [11]; *Potentilla cinerea* \times *verna* (= *P. arenaria* \times *opaca* = *P. subopaca* Kern.) Sachsenburg; Frankenhausen; Kohnstein b. Nordhausen; Steinklippe; Allstädt; Sulza; Jena; Klein Brembach; *P. opaca* \times *verna* Ettersberg; Oettern; Sulza; Hochdorf; Schernberg b. Sondershausen [3]; *P. mixta* Nolte Waldecker Forst!! Rosa spec. (Vgl. SAGORSKI [11], auf welche hier aus Raummangel nicht zu referirende Abhandlung nachträglich verwiesen wird.

Ceratophyllum platyacanthum Ch. Schl. Frankfurt a. M., Mainkur [2].

Viscum austriacum Wiesb. β *latifolium* auf Weisstannen im oberen Saalthale b. Fishersdorf und Bucha!!

Inula hirta \times *salicina* (*I. rigida* Döll) Troistedter Forst [10]; *Achillea Millefolium* L. var. *collina* (Beck.) Gipsberge bei Frankenhausen [3]; *Cirsium heterophyllum* All. Lehesten, Tannenberg b. Leutenberg [11]; *C. canum* \times *oleraceum* Wiesen b. Heldburg [6]; \dagger *Centaurea transalpina* Sch. Eisenbahndamm bei Erfurt [5]; *C. montana* L. Buntsandstein b. Gersfeld [10]; *Taraxacum officinale* Web. var. *lividum* K. Eichelborn [10]; *Sonchus asper* \times *oleraceus* (*S. oxyspermus* Wallr.). Frankenhausen; *Hieracium setigerum* Tausch f. *tubiflora* Gipsberge b. Frankenhausen [3]; *H. Auricula* \times *Pilosella* Obergraustedt b. Weimar [10]; Jena [8].

Chimophila umbellata Nutt. Unterhütte b. Leutenberg [11].

Erythraea linariifolia Pers. Gipsberge bei Frankenhausen [3].

Linaria striata \times *vulgaris* Papiermühle bei Jena [8].

Salvia pratensis \times *silvestris* (*S. elata* Host) Vilbel in Oberhessen [2]; *Stachys alpina* L. Nauerberg zw. Lutter am Barenberge und Bodenstein [1].

\dagger *Rumex Patientia* L. Hainleite oberhalb Seehausen [3].

Alisma Plantago L. b) *lanceolatum* With. (a. A.) Gräben bei Frankenhausen [3], Jena [8].

Orchis latifolia \times *Traunsteineri* Jena [8]; *Anacamptis pyramidalis* Rich. Weimar: Troistedter Forst [10].

Juncus bufonius L. var. *ranarius* P. S. (a. A.) Weimar; Salzboden b. Frankenhausen [3].

Scirpus setaceus L. var. *pseudo-clathratus* Schr. Nasse Aecker am Ettersberg [3]; *Carex brizoides* \times *leporina* Wallperhain bei Osterfeld [3]; *C. contigua* \times *virens* Saalburg; *C. leporina* \times *virens* Kölner Feld am Deister, Salzungen; *C. montana* \times *umbrosa* Ettersberg; *C. rostrata* \times *vesicaria* (*C. Pannewitziana* Fig.) Mühlhausen in Thür.; Naumburg a. S.; Neustädter Kreis: Dittersdorf; Knau; Finkenmühle [3].

Melica picta C. Koch. Abhänge des oberen Saalethales zw. Burgk und Saalburg; Finne bei Marienthal; *Festuca ovina* L. var. *valesiaca* Heckl. zw. Sachsenburg u. Oldisleben auf Buntsandstein; auf Gips bei Frankenhausen; *Triticum glaucum* Desf. (*T. truncatum* Wall.) Hainleite oberh. Seehausen; *Lolium italicum* \times *perenne* (*L. hybridum* Hskn.) Frankenhausen [3].

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1888

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Haussknecht Heinrich Carl [Karl]

Artikel/Article: [Hercynisches Gebiet. CXIX-CXXI](#)