

## VI. Hercynisches Gebiet.

Referent: C. HAUSSKNECHT.

### Quellen:

#### a) Literatur.

1. TH. BELING, Vierter Beitrag zur Pflanzenkunde des Harzes u. s. w. (Deutsche botan. Monatsschrift [= D. b. M.] V. 1887, S. 10—12); 2. M. DÜRER in Mittheilungen botan. Ver. f. Ges. Thüringen (= M. bot. G. Th.) VI. 1888, S. 19; 3. C. HAUSSKNECHT in M. bot. G. Th. VI., 1887—1888, S. 8—10, 20—34; 4. FR. KÖNIG in D. b. M., V. S. 80, 174; 5. REINECKE in M. bot. G. Th. VI., S. 18; 6. H. ROTTENBACH in M. bot. G. Th. V. 3, 1886, S. 65; 7. SAGORSKI, Ergänzungen zu den „Rosen von Thüringen“, (D. b. M. IV. 55, 56, 89—91, 97—100): Einige neue Rubusformen aus Thüringen (a. a. O. V. S. 81—86); 8. M. SCHULZE, (Vgl. Märk.-Pos.-Gebiet No. 6); 9. STEITZ in D. b. M., S. 62, 63; 10. TORGES in M. bot. G. Th. VI. S. 15, 16; 11. WIEFEL, Zusätze und Berichtigungen zur Flora des Sormitzgebietes in Thüringen, (D. b. M. V. S. 27, 28, 59—60).

#### b) Unveröffentlichte Mittheilungen von:

12. M. DÜRER in Frankfurt a. M.

#### Neu für das Gebiet:

*Trifolium medium* L. var. *ericalycinum* Hsskn. Frankenhausen gegen das Rathsfeld [3].

*Prunus peduncularis* Jord. & Fourr. Jena [8]; *Rubus caesius* × *tereticaulis* Schwarzburger Thal [8]; *R. piliferus* Sag. zw. Ilmenau u. Manebach; *R. Hennebergensis* Sag. Schleusingen; *R. nitens* Sag. Manebach; *R. thyrsiflorus* W. N. v. *thuringiaca* Sag. Suhler Neundorf [7].

*Epilobium hirsutum* × *roseum* (*E. Schmalhausenseianum* M. Sch.) Mühlthal b. Jena [8]; *Isnardia palustris* L. Harau: Gr. Krotzenburg [12].

*Asperula cynanchica* L. var. *arenicola* Reut. (a. A.) Gipsberge bei Frankenhausen [3].

*Carlina vulgaris* L. var. *leptophylla* Griesselich Frankenhausen auf Gipsbergen; Rappelsdorfer Kuppe bei Schleusingen; Saalburg [3];

*Tragopogon major* × *orientalis* (*T. neglectus* Hsskn.) Frankenhausen [3]; *Hieracium Pilosella* × *setigerum* (*H. cinereum* Tsch.) Gipsberge bei Frankenhausen [3].

*Veronica aquatica* Bernh. Jena; Hildburghausen [8].

*Mentha aquatica* × *nemorosa* (*M. pubescens* Willd.). Gräben b. der Rottleber Höhle b. Frankenhausen [3].

*Utricularia Bremii* Heer Hanau: Gr. Krotzenburg [12].

*Typha angustifolia* × *latifolia* (*T. elatior* Bönningh.) Teiche bei Bendeleben [3].

*Scirpus lacustris* L. var. **capitatus** Hsskn. Breitunger See b. Salzungen [3]; *Sc. Tabernaemontani* Gmel. var. **capitatus** Hsskn. Salzgräben bei Esperstädt b. Frankenhausen [3]; *Carex digitata* × *ornithopoda* (*O. Dufftii* Hsskn.) Steinberg b. Keilhau [3].

---

### Eingeschleppte bez. verwilderte Arten:

*Centaurea nigrescens* Willd. Bahndämme bei Weimar [3].

*Omphalodes verna* Mnch. Im Habichtswald angesiedelt [4].

*Allium tataricum* L. Weinberg b. Kassel angesiedelt [4].

---

### Wichtigere neue Fundorte:

*Helleborus viridis* L. Wald b. Sievershausen b. Calefeld [1].

*Barbarea intermedia* Bor. Frankfurt a. M. [2]; *Arabis hirsuta* Scop. b) *sagittata* (DC.) Kalk-Laubwälder b. Legefeld; *Lunaria rediviva* L. Rhön: Rössberg, Eierhauk [10].

*Viola canina* × *silvatica* Ettersberg, Braunsdorfer Wiesen beim Schwarzburger Thal; Monraburg b. Beichlingen; Stollberg a. H.; *V. canina* × *Riviniiana* Ettersberg; *V. collina* × *hirta* (*V. hybrida* Val de Lièvre) Frankenhausen; *V. collina* × *odorata* Frankenhausen [3].

*Drosera anglica* Huds. und *R. rotundifolia* × *anglica* (*D. obovata* M. et K.). Hanau: Gr. Krotzenburg [12].

*Hypericum quadrangulum* × *tetrapterum* Trockhausen b. Jena [8].

*Onobrychis viciaefolia* Scop. var. *decumbens* Wallr. (a. A.) einheimisch auf Gypshügeln b. Frankenhausen [3]; † *Vicia villosa* Rth. Weimar: Hetschburg [10]; Frankfurt a. M. [9]; *Lathyrus heterophyllus* L. var. *unijugus* K. Weimar: mit der Art im Hengstbachthal b. Legefeld; Troistedter Forst [10].

*Rubus hercynicus* G. Br. Ilmwand bei Leutenberg; *R. Radula* Whe. Tannenbergl. Leutenberg [11]; *Potentilla cinerea* × *verna* (= *P. arenaria* × *opaca* = *P. subopaca* Kern.) Sachsenburg; Frankenhausen; Kohnstein b. Nordhausen; Steinklippe; Allstädt; Sulza; Jena; Klein Brembach; *P. opaca* × *verna* Ettersberg; Oettern; Sulza; Hochdorf; Schernberg b. Sondershausen [3]; *P. mixta* Nolte Waldecker Forst!! *Rosa spec.* (Vgl. SAGORSKI [11], auf welche hier aus Raummangel nicht zu referierende Abhandlung nachträglich verwiesen wird.

*Ceratophyllum platyacanthum* Ch. Schl. Frankfurt a. M., Mainkur [2].

*Viscum austriacum* Wiesb.  $\beta$  *latifolium* auf Weisstannen im oberen Saalthale b. Fischersdorf und Bucha!!

*Inula hirta*  $\times$  *salicina* (*I. rigida* Döll) Troistedter Forst [10]; *Achillea Millefolium* L. var. *collina* (Beck.) Gipsberge bei Frankenhausen [3]; *Cirsium heterophyllum* All. Lehesten, Tannenbergl. b. Leutenbergl. [11]; *C. canum*  $\times$  *oleraceum* Wiesen b. Heldburg [6]; †*Centaurea transalpina* Sch. Eisenbahndamm bei Erfurt [5]; *C. montana* L. Buntsandstein b. Gersfeld [10]; *Taraxacum officinale* Web. var. *lividum* K. Eichelborn [10]; *Sonchus asper*  $\times$  *oleraceus* (*S. oxyspermus* Wallr.). Frankenhausen; *Hieracium setigerum* Tausch f. *tubiflora* Gipsberge b. Frankenhausen [3]; *H. Auricula*  $\times$  *Pilosella* Obergraustedt b. Weimar [10]; Jena [8].

*Chimophila umbellata* Nutt. Unterhütte b. Leutenbergl. [11].

*Erythraea linariifolia* Pers. Gipsberge bei Frankenhausen [3].

*Linaria striata*  $\times$  *vulgaris* Papiermühle bei Jena [8].

*Salvia pratensis*  $\times$  *silvestris* (*S. elata* Host) Vilbel in Oberhessen [2]; *Stachys alpina* L. Nauerbergl. zw. Lutter am Barenbergl. und Bodenstein [1].

†*Rumex Patientia* L. Hainleite oberhalb Seehausen [3].

*Alisma Plantago* L. b) *lanceolatum* With. (a. A.) Gräben bei Frankenhausen [3], Jena [8].

*Orchis latifolia*  $\times$  *Traunsteineri* Jena [8]; *Anacamptis pyramidalis* Rich. Weimar: Troistedter Forst [10].

*Juncus bufonius* L. var. *ranarius* P. S. (a. A.) Weimar; Salzboden b. Frankenhausen [3].

*Scirpus setaceus* L. var. *pseudo-clathratus* Schr. Nasse Aecker am Ettersbergl. [3]; *Carex brizoides*  $\times$  *leporina* Wallperhain bei Osterfeld [3]; *C. contigua*  $\times$  *virens* Saalburg; *C. leporina*  $\times$  *virens* Kölner Feld am Deister, Salzungen; *C. montana*  $\times$  *umbrosa* Ettersbergl.; *C. rostrata*  $\times$  *vesicaria* (*C. Pannewitziana* Fig.) Mühlhausen in Thür.; Naumburg a. S.; Neustädter Kreis: Dittersdorf; Knau; Finkenmühle [3].

*Melica picta* C. Koch. Abhänge des oberen Saalethales zw. Burgk und Saalburg; Finne bei Marienthal; *Festuca ovina* L. var. *valesiaca* Hecl. zw. Sachsenburg u. Oldisleben auf Buntsandstein; auf Gips bei Frankenhausen; *Triticum glaucum* Desf. (*T. truncatum* Wall.) Hainleite oberh. Seehausen; *Lolium italicum*  $\times$  *perenne* (*L. hybridum* Hskn.) Frankenhausen [3].

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1888

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Haussknecht Heinrich Carl [Karl]

Artikel/Article: [Hercynisches Gebiet. CXIX-CXXI](#)