

XIV. Nieder-Oesterreich.

Referent: G. Ritter BECK VON MANNAGETTA.

Literatur.

1. J. WIESBAUR, Verbreitung der *Veronica agrestis* in Oesterreich (Deutsche botan. Monatsschr. 1887, S. 137—146, 166—176); 2. H. SABRANSKY, Zur Batographie Nieder-Oesterreichs (Oesterr. bot. Zeitschr. 1887, S. 81—84); 3. M. KRONFELD, Correspondenz (a. a. O., S. 255); 4. A. DICHTL, Correspondenz (a. a. O., S. 295—296); 5. M. RASSMANN, Correspondenz (a. a. O., S. 403); 6. B. KISSLING, Correspondenz (a. a. O., S. 405, 406); 7. L. WIEDERMANN, Zur Flora von Rappoltenkirchen (a. a. O., S. 420—423); 8. B. KISSLING, Notizen zur Pflanzengeographie Nied.-Oesterr. (a. a. O., S. 426, 427); 9. C. WILHELM, Ueber die Hängefichte (Sitzungsber. d. K. K. zool. bot. Gesellsch. 1887, S. 8, 9); 10. R. VON WETTSTEIN, Zwei für Nied.-Oesterr. neue Pflanzen (a. a. O., S. 48, 49); 11. M. RASSMANN, Ueber die Flora der Türkenchanze (a. a. O., S. 57—60); 12. G. VON BECK, Die Föhren d. Torfmoore Nied.-Oesterr. (a. a. O., S. 64, 65); 13. E. VON HALÁCSY, *Cirsium Vindobonense* (a. a. O., S. 73, 74); 14. J. HARING, Floristische Funde aus der Umgebung von Stockerau (Abhandlungen der K. K. zool. bot. Gesellsch., 1887, S. 51—68); 15. C. RICHTER, Notizen zur Flora Nied.-Oesterr. (a. a. O., S. 189—200); 16. A. KORHUBER, Ueber das in der Wiener Flora eingebürgerte *Carum bulbocastanum* Koch (a. a. O., S. 689, 690).

Neu für das Gebiet:

Aconitum rostratum Reich. im Höllenthale und *A. cernuum* Wulf. bei Reichenau [15].

Viola hirta × *spectabilis* (V. Gloggnitzensis C. Richt.) bei Mödling, Gloggnitz; *V. Wettsteinii* C. Richt. bei Gloggnitz [15].

Trifolium rubellum Jord. bei Gloggnitz [15].

Rubus brachyandrus Greml. Hartholz bei Gloggnitz; *R. calyculatus* Kaltenb. in der Prein [15]; *R. carpaticus* Borb. et Sabr. Rehgraben b. Gloggnitz [2]; *R. eurythrsos* Sabr. et H. Braun Exelberg bei Neuwaldegg, Sophienalpe; *R. Guentheri* Weihe u. Nees und var. *chlorosericeus* Sabr. Sophienalpe; *R. oreogeton* Focke Rehgraben bei Gloggnitz [2]; *Potentilla incrassata* Zimmet. auf dem Kauf- und Zugberge; *P. serotina* Vill. zwischen Kalksburg und Mauer [4]; *P. albescens* Opiz im Gloggnitzer Schlosspark [15]; *Rosa canina* L. var. *ramosissima* Rau Ober-Rohrbach bei Stockerau [14]; *R. fallens* desgl.; *R. Forsteri* Sm.; *R. juncta* Pug. Kirchberg am Wechsel; *R. Klukii* Bess. um Gloggnitz; *R. pendulina* L. am Semmering [15]; *R. rubiginosa* var. *leioclona* H. Braun und *R. sepium* Thuill. var. *mentita* Dés. auf dem Michlsberg [14]; *R. subatrichostylis* Borb. Eichberg bei Gloggnitz,

Kranichberg [15]; *R. uncinella* Bess. var. *juncta* (Puget). Kahlengebirge, Bisam- und Waschberg [14].

Sedum micranthum Bast. im Gurhofgraben bei Aggsbach [10].

Galium erectum Huds. um Rappoltenkirchen; *G. erectum* × *verum* (*G. eminens* G. G.) bei Walchen; *G. insubricum* Gaudin Kreut, bei Sieghartskirchen; *G. nitidulum* Thuill. Kogel, Johannesberg, dessen var. *scabriusculum* H. Braun, ebendasselbst, bei Röhrenbach; *G. verum* L. ♂ *Wirtgeni* Schultz Weinberg — sämtlich um Rappoltenkirchen [7].

Cirsium Erisithales × *oleraceum* × *rivulare* (*C. Vindobonense* Halácsy) Steinbach im Wiener Walde [13]; *Carlina intermedia* Schur Dornbach, Berge von Mödling bis Vöslau [15].

Myosotis variabilis Angel. im Wechselgraben [10].

Euphrasia minima Jacq. Raxalpe [15].

Mentha arvensis L. var. *densiflora* (Opiz) bei Walchen; *M. austriaca* Jacq. var. *Slichovensis* Opiz Tannenschachen, Kreut, Kragging bei Rappoltenkirchen; *M. calamintaefolia* (Host) H. Br. im Wiener Walde [7]; *Thymus Loewyanus* Opiz und dessen var. *elongatus*, *stenophyllus*, *bracteatus* (Opiz) um Siegbartskirchen, Rappoltenkirchen etc.; *Th. pilosus* Opiz an letzterem Orte; *Th. ovatus* Mill. var. *pallens* (Opiz). Bonahöhe, hohe Warte gegen Elsbach; var. *concolor* Opiz Bonahöhe, Abstetten [7].

Primula pannonica × *elatior* (*P. fallax* C. Richt.) bei Gloggnitz, Guttenstein [15].

Corylus glandulosa Shuttl. bei Pitten [15].

Salix amygdalina × *alba* (*S. lanceolata* Sm.) um Stockerau [14].

Epipactis orbicularis C. Richt. Semmering bis in die Atlitzgräben [15].

Pinus uliginosa Neum. Torfmoor bei Kösslersdorf: *P. pseudo-pumilio* (Willk.) bei Erdweis [12]; *Picea excelsa* Link var. *viminalis* Casp. im Lilienfelder Stiftspark [9].

Zu berichten: *Veronica agrestis* der Autoren Nied.-Oesterr. ist *V. polita* Fr. [1].

Verschleppt bez. verwildert:

Silene italica Pers. var. *nemoralis* (W. K.) an Wiesenrainen bei Wartenstein [15].

Carum Bulbocastanum Koch in Wiesen des Föhrenkogls b. Petersdorf [4, 16].

Carthamus tinctorius L. bei St. Gotthardt [8].

Die Auführung der sehr zahlreichen neuen Fundorte musste leider unterbleiben, da das Referat sonst seine zulässige Ausdehnung weit überschritten hätte.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1888

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Beck Günther [Gunthero] Ritter von Mannagetta

Artikel/Article: [Nieder-Oesterreich. CXL-CXLI](#)