

VIII. Niedersächsisches Gebiet.

Referent: Fr. BUCHENAU.

Literatur.

1. W. O. FOCKE, Zur Flora von Bremen (Abh. d. Bot. Ver. Bremen. S. 407 bis 410); 2. W. O. FOCKE, *Capsella rubella* Reuter (a. a. O. S. 446); 3. C. HAUSKNECHT, Kleinere botanische Mittheilungen (Mittheil. des botan. Ver. für Gesammt. Thüringen, 1888, VI, S. 31); 4. C. HAUSKNECHT, Botanische Notizen (daselbst S. 33 u. 34).

Neu für das Gebiet:

Rubus hemistemon P. S. Mueller Bremen; Settenbeck [1]; *Rosa coriifolia* Fr.¹⁾ Landstriche nördlich von Bremerhaven.

Scirpus lacustris L. var. **capitatus** Hausskn. (Form mit lauter ungestielten Aehren) am Weserufer bei Lesumbrook [3]; **Carex paniculata** × **paradoxa** Oyter-Moor bei Bremen; *C. paradoxa* × *teretiuscula* Bremen; *C. echinata* × *canescens* Vegesack; *C. Hornschuchiana* × *Oederi* Bremen; *C. rostrata* × *vesicaria* (*C. Pannewitziana* Fig.) Axstedter Wald bei Bremen [4].

Wichtigere neue Fundorte:

Capsella rubella Reuter des deutschen Nordwestens ist von *C. Bursa pastoris* L. weniger sicher verschieden als die südeuropäische Pflanze [2].

Teucrium Scordium L., seit 30 Jahren bei Mittelsbüren unweit Bremens vergebens gesucht, jetzt wieder aufgefunden (einziger Standort) [1].

Carex paniculata × *teretiuscula* Oberneuland und Sagehorn bei Bremen [4].

1) FOCKE (1) giebt eine genauere Darlegung der Rosen des Gebietes: *R. canina* L., *rubiginosa* L., *coriifolia* Fr., *tomentosa* Sm., *venusta* Scheutz, *pomifera* Herrm. (*R. pinpinellifolia* L. auf den ostfriesischen Inseln).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1888

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Buchenau Franz Georg Philipp

Artikel/Article: [Niedersächsisches Gebiet CXXV](#)