

IX. Niederrheinisches Gebiet.

Referent: L. GEISENHEYNER.

Quellen.

a) Literatur.

1. C. HAUSSKNECHT, Kleinere botanische Mittheilungen (Mittheil. des Bot. Ver. Gesamt-Thüringen, VI, 1888, S. 7—10); 2. L. GEISENHEYNER, Eine neue Kolonie von Ausländern in der Nähe von Kreuznach (Deutsche botan. Monatsschrift 1887, S. 73—75).

b) briefliche Mittheilungen von

3. Dr. UTSCH in Freudenberg bei Siegen; 4. Dr. ZIMMERMANN in Limburg an der Lahn; 5. Fr. HEINEMANN in Eupen; 6. Dr. BUDEBERG in Nassau a. Lahn; 7. M. DÜRER in Frankfurt a. M.; 8. O. KOBBE in Bingerbrück-Bingen.

c) eigene, noch nicht veröffentlichte Beobachtungen des Referenten!!

Neu für das Gebiet:

Ficaria ambigua Bor.? Weinberge des Nahethals bei Langenlonsheim; ob aus Frankreich eingeschleppt? [1].

Eingeschleppt oder verwildert:

Erysimum repandum L. Naheufer bei Kr. und bei Bingerbrück [2];
Alyssum campestre L. ebenda [2, 8]; *Lepidium virginicum* L. Acker unterhalb Kreuznach [2]; *Soria syriaca* Desv. Bingerbrück [8].

Melilotus ruthenicus M. B. Schuttstelle am rechten Naheufer bei Kr.!! Bingerbrück [8].

Xanthium italicum Mor. Bingerbrück [8].

Eragrostis minor Host Bingerbrück [2, 8].

Wichtigere neue Fundorte:

Trollius europaeus L. Gebirgswiesen bei Dornholzhausen bei Homburg [7].

† *Glaucium corniculatum* Curt. Eupen [5]; *Corydalis intermedia* P. M. E. Falkenstein im Taunus [7].

Arabis pauciflora Gke. Felsen der Bäderley in Ems [6]; *Biscutella laevigata* L. Eingang ins Welmichthal a. Rh. [7]; *Neslea paniculata* Desv. † Aecker unterhalb Kreuznach [5].

Viola canina × *Riviniana* Fichtenkopf bei Langenlonsheim [1].

Reseda lutea L. selten bei Nassau [6].

Gypsophila muralis L. Lahnkies bei Nassau [6]; *Vaccaria parviflora* Mnch. einmal bei Nassau [6]; *Silene Armeria* L. Felsen zwischen Welmich und Kestert a. Rh. [7]; *Moenchia erecta* Fl. d. Wett. Excerzierplatz in Oranienstein [4].

† *Malva mauritiana* L. Weinberge bei Freilaubersheim bei Kreuznach!!

Hypericum perforatum L. var. *veronense* Schrk. Waldhausen bei Eupen [5].

Geranium molle L. Dietz und Limburg a. Lahn [4].

Trifolium alpestre L. var. *bicolor* Rchb. Wisperthal-Mündung bei Lorch a. Rh. [7]; Kreuznach: Gans!! *T. ochroleucum* L. Fuss des Schafsberges bei Limburg [4]; Waldwiese bei Nassau [6]; *T. striatum* L. mit *T. alpestre* L. [7]; † *Galega officinalis* L. Wiesenhecke bei Waldhausen [5].

Geum urbanum × *rivale* (*G. intermedium* Ehrh.) Gebüsche an der Göhl [5]; *Potentilla cinerea* × *verna* Gans, Rothenfels bei Kreuznach [1]; *Rosa pomifera* Herrm. Berge bei Nassau [6].

† *Inula Helenium* L. Dorf Steeg bei Altenkirchen [3]; *I. Britannica* L. und *Pulicaria vulgaris* Gaertn. Emsufer bei Nassau [6]; † *Centaurea solstitialis* L. zwischen Kestert und Kloster Bornhofen a. Rh. [7]; *Crepis foetida* L. Wegränder bei Nassau [6]; *C. pulchra* L. Wisperthal-Ausgang a. Rh. [7].

† *Collomia grandiflora* Dougl. Lahnufer bei Wetzlar [3].

Pulmonaria tuberosa Schrk. Wiesbaden [1].

Physalis Alkekengi L. zwischen Nassau und Arnstein [6].

Verbascum Lychnitis × *nigrum* (*V. Schiedeanum* Koch) Wildenburg an den Ruinen [3]; *V. phoeniceum* L. Bingerbrück: Ausladestelle [2, 8]; *Limosella aquatica* L. Bingerbrück viel [8]; *Orobanche Rapum* Thuill. Sauerthal bei Lorch [7].

† *Salvia verticillata* L. Wetzlar [3]; † *Sideritis montana* L. Bingerbrück [2, 8]; *Marrubium vulgare* L. Mittelbollenbach a. d. Nahe [7]; *Prunella alba* Pall. Wisperthal bei Lorch [7]; *Ajuga genevensis* L. Nassau [6].

Anagallis arvensis × *coerulea* Weinberge bei Kreuznach!!

† *Salsola Kali* L. Naheufer auf Schutt eingebürgert [2, 8]; † *Blitum virgatum* L. Naheufer auf Schutt!!

Orchis coriophora L. Dorf Steeg bei Altenkirchen [3].

CXXVIII Bericht der Commission für die Flora von Deutschland 1887.

Narcissus Pseudo-Narcissus L. Wiese bei Wildenburg [3]; *Leucolum vernum* L. Wiesen im Dörsbachthal [6].

Allium rotundum L. Wisperthal bei Lorch [7]; *A. Scorodoprasum* L. Sauerthal bei Lorch [7].

Scirpus setaceus L. f. *monostachys* Mühlbachthal bei Nassau [6].

Phleum arenarium L. an der Fähre bei Siegburg a. d. Sieg [3]; *Bromus patulus* M. u. K. Wetzlar [3].

Berichtigung. Im vorjährigen Berichte S. CX, Zeile 15 v. oben lies Dietkirchen statt Dielkirchen.

X. Oberrheinisches Gebiet.

Referent: K. MEZ.

Quellen.

a) Literatur.

1. KNEUCKER, Ausflug in die Land- und Sumpfflora von Walldorf und Waghäusel (Mitth. d. bot. Ver. Kreis Freib. und Land Baden 1887, S. 295—299); 2. Neue Standorte, mitgetheilt von ECKSTEIN, KÜBLER, STEHLE (a. a. O. S. 303); 3. BRENZINGER, Seltenerer Pflanzen bei Buchen (a. a. O. S. 320—322); 4. L. BONNET, Beiträge zur Karlsruher Flora (a. a. O. S. 323—335); 5. A. KNEUCKER, Weitere Beiträge zur Flora von Karlsruhe (a. a. O. S. 339—343); 6. SCHATZ, *Salix pentandra* × *alba* (a. a. O. S. 344—347); 7. ZIMMERMANN, *Anagallis tenella* (a. a. O. S. 355); 8. C. SCHRADER, *Rosa gallica* × *repens* Christ in der Flora von Insmingen in Lothringen (Deutsche Botan. Monatsschrift V, 1887, S. 88, 89 und Beilage); 9. C. HAUSKNECHT, (Vgl. Niedersächsisches Geb. No. 4); 10. M. DÜRER, (Vgl. Hercyn. Geb. No. 2).

b) Unveröffentlichte Mittheilungen von

11. M. DÜRER in Frankfurt a. M.; 12. FR. LUTZ in Mannheim.

B. = Baden, H. = Hessen, L. = Lothringen, P. = Bayer. Pfalz.

Neu für das Gebiet:

Erysimum repandum L. B. Buchen (im Unterland, N.W. von Osterburken): bei Schweinberg [3].

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1888

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Geisenheyner Ludwig

Artikel/Article: [Niederrheinisches Gebiet. CXXVI-CXXVIII](#)