

CXXVIII Bericht der Commission für die Flora von Deutschland 1887.

Narcissus Pseudo-Narcissus L. Wiese bei Wildenburg [3]; *Leuco-jum vernum* L. Wiesen im Dörsbachthal [6].

Allium rotundum L. Wisperthal bei Lorch [7]; *A. Scorodoprasum* L. Sauerthal bei Lorch [7].

Scirpus setaceus L. f. *monostachys* Mühlbachthal bei Nassau [6].

Phleum arenarium L. an der Fähre bei Siegburg a. d. Sieg [3]; *Bromus patulus* M. u. K. Wetzlar [3].

Berichtigung. Im vorjährigen Berichte S. CX, Zeile 15 v. oben lies Dietkirchen statt Dielkirchen.

X. Oberrheinisches Gebiet.

Referent: K. MEZ.

Quellen.

a) Literatur.

1. KNEUCKER, Ausflug in die Land- und Sumpfflora von Walldorf und Waghäusel (Mitth. d. bot. Ver. Kreis Freib. und Land Baden 1887, S. 295—299); 2. Neue Standorte, mitgetheilt von ECKSTEIN, KÜBLER, STEHLE (a. a. O. S. 303; 3. BRENZINGER, Seitenere Pflanzen bei Buchen (a. a. O. S. 320—322); 4. L. BONNET, Beiträge zur Karlsruher Flora (a. a. O. S. 323—335); 5. A. KNEUCKER, Weitere Beiträge zur Flora von Karlsruhe (a. a. O. S. 339—343); 6. SCHATZ, *Salix pentandra* × *alba* (a. a. O. S. 344—347); 7. ZIMMERMANN, *Anagallis tenella* (a. a. O. S. 355); 8. C. SCHRADER, *Rosa gallica* × *repens* Christ in der Flora von Insmingen in Lothringen (Deutsche Botan. Monatsschrift V, 1887, S. 88, 89 und Beilage); 9. C. HAUSSENKECHT, (Vgl. Niedersächsisches Geb. No. 4); 10. M. DÜRER, (Vgl. Hercyn. Geb. No. 2).

b) Unveröffentlichte Mittheilungen von

11. M. DÜRER in Frankfurt a. M.; 12. FR. LUTZ in Mannheim.

B. = Baden, H. = Hessen, L. = Lothringen, P. = Bayer. Pfalz.

Neu für das Gebiet:

Erysimum repandum L. B. Buchen (im Unterland, N.W. von Osterburken): bei Schweinberg [3].

Rumex maritimus \times *conglomeratus* (*R. Knaflii* Čel.) H. Dienheim bei Oppenheim [11].

Salix Caprea \times *aurita* (*S. capreola* A. Kern.) B. Eggenstein [5].
Carex rostrata \times *vesicaria* (*C. Pannewitziana* Fig.) H. Hengster [9].

Eingeschleppt und verwildert:

Vicia pannonica Jacq. var. *purpurascens* Koch H. Mühlthal b. Eberstadt [10].

Centaurea ustulata DC. B. Karlsruhe: Rheindamm bei Dachslanden [5].

Nonnea lutea Rchb. B. Kiesgrube bei Heidelberg 1884 [12].

Wichtigere neue Fundorte:

Fumaria parviflora Lam. B. Karlsruhe: Flehingen und Gochsheim [4].

Spergula pentandra L. H. Kelsterbach [10]; zw. Raunheim und Bischofsheim bei Mainz [11].

Rosa glauca Vill., *tomentella* Lém. und *repens* \times *gallica* L. Inslingen (Kr. Château-Salins) [8].

Galium verum L. b) *Wirtgeni* (F. Schultz) B. Walldorf und Waghäusel [1].

Valerianella eriocarpa Desv. B. Durlach, Weingarten und Stupferich (bei Karlsruhe) [5].

† *Centaurea solstitialis* L. B. Zwingenberg: Bödigheim [3]; *Podospermum laciniatum* DC. Schweinberg bei Buchen [3].

Wahlenbergia hederacea Rchb. H. Kelsterbach [11].

Solanum villosum Lam. Frankfurt: Sachsenhausen [10]; † *Nicandra physaloides* Gaertn. B. Karlsruhe [4].

Verbascum thapsiforme \times *Lychnitis* (*V. ramigerum* Schrad.) B. Dachslanden [5]; † *Veronica peregrina* L. H. Stockstadt a. Rh.: Insel „alter Kirchhof“ [10, 11].

Anagallis tenella L. B. Waghäusel [1, 7].

Amaranthus silvester Desf. Karlsruhe, neu angelegter Theil des Schlossgartens (ein Exemplar) [4]; bei Karlsruhe schon vor etwa 50 Jahren von A. BRAUN gefunden. Vgl. DÖLL, Rhein. Flora S. 285.

† *Tithymalus procerus* Kl. et Gke. Durlach [5]; † *T. virgatus* Kl. et Gke. Freiburg [2].

Salix cinerea \times *aurita* (*S. multinervis* Döll) B. Dachslanden [5]; *S. cinerea* \times *purpurea* (*S. Pontederana* Schleich.) B. Eggenstein [5]; *S. Caprea* \times *viminalis* (*S. Smithiana* Willd.) B. Dachslanden [5]; *S. pentandra* \times *alba* (*S. Ehrhartiana* Sm.) B. Zollhaus Geisingen [6].

Typha minima Funck B. Bödigheim, Walldürn [3].

CXXX Bericht der Commission für die Flora von Deutschland 1887.

Juncus effusus × *glaucus* (*J. diffusus* Hoppe) H. Viehweide bei Oerlshausen am Hengster; *J. tenuis* Willd. Frankfurt: Forsthaus; H. Gr. Gerau [11].

Carex caespitosa L. B. Buchen [3].

Lolium linicolum ABr. P. Zw. Jockgrimm und Leimersheim [5].

XI. Bayern.

Referent: K. PRANTL.

Quellen.

a) Literatur.

1. J. S. KAULFUSS, Flora von Lichtenfels in Oberfranken (Deutsche botanische Monatsschrift V. 1887. S. 114—119); 2. LACHAMER, Verzeichniss von Phanerogamen etc. in der Umgebung von Haiming (10. Ber. d. botan. Ver. in Landshut. S. 38—41); 3. A. LOHER, Aufzählung der um Simbach am Inn wildwachsenden Phanerogamen und Gefäßkryptogamen (10. Ber. des botan. Ver. in Landshut S. 1 bis 37); 4. G. WÖRLEIN, Neue und kritische Pflanzen der Flora von München (Deutsche botan. Monatsschr. V. 1887. S. 15—16); 5. Jahresbericht der Naturhist. Gesellschaft zu Nürnberg 1887. S. 35—37; 5a. C. HAUSSKNECHT, (Vgl. Märk.-Pos. Geb. No. 6a).

b) Schriftliche Mittheilungen von

6. M. DÜRER, in Frankfurt a. M.; 7. CH. KESSLER, Lehrer in Nürnberg; 8. R. LANDAUER, Apotheker in Würzburg; 9. O. PRECHTELSBAUER, Lehrer in Nürnberg; 10. B. RODLER, Apotheker in Nürnberg; 11. FR. VON SANDBERGER, Professor in Würzburg; 12. A. SCHWARZ, Veterinairarzt in Nürnberg; 13. A. VILL, Thierarzt in Hammelburg; 14. H. WEGELE, stud. jur. in Würzburg.
-

Neu für das Gebiet:

Erysimum Cheiranthus Pers. Ho Salzachinsel zwischen Haiming und Ueberackern [2].

Viola alba Pers. Nk oder Nj Gräfenberg [5].

Onobrychis viciifolia Scop. var. *decumbens* (Wallr.) R Ostheim [5a].

Potentilla thuringiaca Bernh. Nk Windsheim gegen Obertief [9, 12!!].

Bidens radiatus Thuill. Nk Dechsendorf bei Erlangen [5]; *Carlina vulgaris* L. var. *leptophylla* Griess. Nm od. Nb Bodenlaube b. Kissingen [5a].

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1888

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Mez Carl Christian

Artikel/Article: [Oberrheinisches Gebiet. CXXVIII-CXXX](#)