

*Gentiana Pneumonanthe* L. rosa blühend, Nauen: Bredower Forst [16]!

† *Heliotropium europaeum* L. Berlin: Torfstrasse [22]!

*Solanum villosum* Lam. † Berlin: Torfstrasse [22]!

*Orobanche rubens* Wallr. P. Getau an d. Weichsel [8]!

† *Chenopodium Botrys* L. Berlin: Torfstrasse [22]; (Bahnhof Charlottenburg 1889 [14]!)

*Asarum europaeum* L. Freienwalde: Schlibbenthal bei Zäckerick [4]!

*Salix purpurea* × *repens* (*S. Doniana* Sm.) P. In. Koscielice [8].

† *Elodea canadensis* Rich. et Mich. In den Gewässern bei Schönfliess, Lippehne und Berlinchen [4].

*Potamogeton mucronatus* Schrad. Lippehne: Klopp-See [4]! *P. trichoides* Cham. et Schl. P. In.: Kanal bei Czyste; *P. marinus* L. P. In.: Dłuczyna-See [9].

*Anacamptis pyramidalis* Rich. P. In.: am Parchanie-Bruche, früher [9]; *Cephalanthera Xiphophyllum* Rchb. fil. Strausberg: Blumenthal [12]!

† *Muscari racemosum* DC. Stendal: Hölzchen; Elbufer b. Storkow [10].

*Schoenus ferrugineus* L. P. In.: Bergbruch [9]; *Cladium Mariscus* R. Br. P. In.: Bachorze-Bruch, früher [9]; *Carex Buxbaumii* Wahlenb. In.: an mehreren Stellen; *C. Hornschuchiana* Hoppe P. In.: Bergbruch [9].

Zu streichen: *Salix purpurea* × *cinerea*. P. Kr. Schubin (vergl. Bericht pro 1887, S. CXIII).

---

## V. Schlesien.

Referent: E. FIEK.

---

### Literatur:

1. E. FIEK und F. PAX (vergl. Verbr. Phan. Nr. 4), nur citirt, wo sonst ein Irrthum entstehen könnte; 2. E. FORMÁNEK, Beitrag zur Flora des nördlichen Mährens und des Hochgesenkes (Oester. Botan. Zeitschr. XXXVIII, S. 21—23, 55—58, 92—95); 3. P. ASCHERSON (vergl. Märk.-Pos. Geb. Nr. 7). Vergl. auch Verbr. Phan.

---

### Neu für das Gebiet:

*Pimpinella magna* L. var. *laciniata* Wallr. Altes Bergwerk im Riesengrunde.

*Hieracium vulgatum* Fr. var. **czantoriense** Fiek Bergwiesen der grossen Czantory.

*Primula officinalis* Jacq. var. *pannonica* (Kerner) Lähn: Umgebung von Lähnhaus; langer Berg bei Donnerau im Waldenburger Gebirge; *P. elatior* × *officinalis* spontan entstanden im botanischen Garten zu Breslau.

*Polygonum Persicaria* × *minus* Liegnitz: vor Rüstern, in Neuhof.

*Euphorbia Esula* × *Cyparissias* Lüben: Feldraine bei Gross-Krichen.

*Alnus glutinosa* × *serrulata* (A. **silesiaca** Fiek) Löwenberg: Neuländer Harthe; Krummhübel im Riesengebirge.

*Salix acutifolia* × *cinerea* Liegnitz: Eisenbahn-Ausstich am Töpferberge.

Zu berichtigen: *Fagus silvatica* L. var. *puberula* Fiek ist eine abnorme Form (Spättriebe nach Frostbeschädigung, vergl. NATHORST in Verh. Bot. Ver. Brandenburg, XXI. (1880) Sitzber., S. 99, 100).

*Carex Siegertiana* Uechtr. wird *C. aristata* R. Br. var. *Siegertiana* Aschers. [3].

---

### Neu eingeschleppt bezw. verwildert:

*Isopyrum fumarioides* L. Schmiedeberg: Gebüsch vor Buchwald am Fusswege dahin.

*Linum perenne* L. Grünberg: bei Klopsch's Ziegelei.

*Phacelia tanacetifolia* Benth. Liegnitz: Zäune am Töpferberge.

*Mimulus moschatus* Douglas Oberlangenbielau am Ufer der Biele.

---

### Wichtigere neue Fundorte:

*Ranunculus cassubicus* L. Münsterberg: Stadtwald.

*Fumaria officinalis* L. var. *Wirtgeni* Koch (als Art). Proskau: Seminargarten am Turnplatz.

*Cardamine amara* L. subsp. *Opicii* Presl (als Art) var. *glabra* Uechtr. Saalwiesen bei Landeck; *C. trifolia* L. Glatzer Schneeberg im Walde oberhalb Klessengrund.

*Tunica prolifera* Scop. Glatz: Schäferberg; in Mittel- und Oberschlesien selten; *Dianthus superbus* L. var. *Wimmeri* Wichura (als Art). Riesengebirge: Krkonosch, und Höllenkränze am Brunnenberge [1], Gesenke: Saugraben, Bärnuttergraben, Schlössel, Franzen's Jagdhaus [2]; † *Silene dichotoma* Ehrh. Jauer: Chausseegraben bei Peterwitz; *Holosteum umbellatum* L. var. *Heuffelii* Wierzb. Waldenburg: Dittmannsdorf, höchster Standort bei 425 m; *Cerastium triviale* Lk. c) *alpestre* Lindb. Gesenke: Bärenkamm, Dämmbaude, Saugraben, Horizontalweg von der Schäferei nach Franzens Jagdhaus [2].

*Lavatera thuringiaca* L. Breslau: Simsdorf gegen Schebitz; auf dem rechten Oderufer sehr selten.

*Geranium pratense* L. Gross-Strehlitz: am Bache oberhalb Schimischow viel, Gogolin; rechts der Oder selten.

*Ononis procurrens* Wallr. Oderwald bei Grünberg; † *Colutea arborescens* L. Striegau: verwildert an der Strasse nach Pilgramsbain.

*Prunus Padus* L. var. *petraea* Tausch (als Art). Riesengebirge: Schneegraben; *Rubus Idaeus* L. var. *denudatus* Schimp. et Spenn. Hainau: Modlau, Reischt, Neuhammer; Kotzenau; *R. Chamaemorus* L. Riesengebirge: zwischen der Scharfenbaude und dem Mittagstein; *Potentilla norvegica* L. Teschen: Lonkauer Teiche, neu für das Teschener Ländchen; *Rosa pomifera* Hermann Grünberg: alter Fussweg nach Schloin.

*Epilobium trigonum* Schrk. Saalwiesen bei Landeck; *E. anagallidifolium* Lam. Elbfallbaude; Quellen um die Fuchsbauden; *E. obscurum* × *palustre* (*E. Schmidianum* Rostk.) Agnetendorf im Riesengebirge; *E. obscurum* × *alsinifolium* (*E. rivulicolum* Hausskn.), Riesengebirge: zwischen den Bohnwies- und den Töpferbauden bei 1080 m.

*Myricaria germanica* Desv. Friedeck: bei Dobrau am Ufer der Morawka.

*Seseli Libanotis* Koch. Glatz: rother Berg.

*Galium Cruciata* Scop. Gipfel der kleinen Czantory bei 925 m, höchster Standort; *G. boreale* L. var. *latifolium* W. Gr. Neusalz: Kgl. Aufenthalt bei der Kanalbrücke.

*Petasites officinalis* Mnch. var. *fallax* Uechtr. Waldenburger Gebirge: Görbersdorf; *Anthemis ruthenica* M. B. Neusalz: Tschiefer; Glogau: beim Schiesshause; Trachenberg: Gross-Bargen zahlreich; *Carduus nutans* × *acanthoides* Lüben: im Dorfe Krummlinde; *Lappa officinalis* × *tomentosa* (*L. ambigua* Člk.), Liegnitz: in Langenwaldau; † *Centaurea nigra* L. Liegnitz: Bahndamm bei Vorderheide; *Tragopogon major* Jacq. Glatz: Schäferberg; *Hieracium succicum* Fr. Waldenburg: Dittmannsdorf; *H. Auricula* × *Pilosella* (*H. auriculiforme* Fr.), Wolfshau im Riesengebirge; *H. pseudoalbinum* Uechtr. Riesengebirge: Höllenkränze am Brunnenberge mit *H. glanduloso-dentatum* Uechtr., *riphaeum* Uechtr. und *caesium* Fr. var. *alpestre* Lindeb.; *H. subcaesium* Fr. Lehnen am kleinen Teiche im Riesengebirge, selten; *H. bifidum* Kit. Schönau: grosser Mühlberg bei Kauffung.

*Gentiana ciliata* L. weissblühend, bei Neukirch unweit Schönau; *G. germanica* Willd., Dittersbach bei Schmiedeberg bis 730 m, höchster Standort; *G. obtusifolia* Willd. Kupferberg: Sauwiese bei Wüsteröhrsdorf (nicht *G. campestris* × *germanica*), Schmiedeberg: Waldwiesen oberhalb Bärndorf (zu streichen der Standort: Költschenberg bei Schweidnitz).

† *Omphalodes verna* Mnch. Liegnitz: beim Wasserhebewerk; *Ce-*

*rinthe minor* L. Breslau: bei Simsdorf gegen Schebitz, in Nieder-Schlesien auf dem rechten Oderufer sehr selten; *Lithospermum officinale* L. Breslau: Simsdorf, für die rechte Oderseite gesichert.

*Physalis Alkekengi* L. Teschen: Konskauer Wald, zweiter Standort.

† *Digitalis purpurea* L. Flinsberg: in einer Schonung unweit des Hasensteins; *Veronica Anagallis* L. b) *aquatica* (Bernh.) f. *dasy-poda* Uechtr. Landskron im Kreise Freistadt; *Orobanche pallidiflora* W. Gr. Schönau: grosser Mühlberg bei Kauffung.

*Galeopsis Tetrahit* × *pubescens* Liegnitz: Lindenbusch; *Ajuga reptans* L. Riesengebirge: Höllenkränze am Brunnenberge bei 1250 m, höchster Standort.

*Polycnemum arvense* L. var. *Heuffelii* Láng (als Art). Grünberg: Dammerau.

*Rumex crispus* × *obtusifolius* Liegnitz: Schmochwitz.

*Mercurialis annua* L. Glatz: auf Gartenland.

*Salix repens* L. var. *liocarpa* G. Mey. Lüben: Gross-Krichen; *S. cinerea* × *repens* Liegnitz: zwischen Rüstern und Kuchelberg.

*Potamogeton decipiens* Nolte Schlawa: Poln. Tarnauer See, zweiter Standort.

*Platanthera viridis* Lindl. Auf der Schneekoppe bei 1598 m, höchster Standort; *Epipactis latifolia* All. c) *violacea* Dur. Duq. Teschen: Golleschauer Berg, neu für Oestr.-Schlesien; *Cypripedium Calceolus* L. Jauer: Moisdorfer Grund.

*Allium fallax* Don. Jauer: Tschechenberg bei Gierlachs-dorf.

*Colchicum auctumnale* L. Liegnitz: Kuchelberger Wiesen; Schmiedeb-berg: beim Kalkofen am Dittersbacher Passe, 725 m, höchster Standort in Schlesien.

*Luzula flavescens* Gaud. Teschen: grosse Czantory am Gipfel.

*Scirpus Tabernaemontani* Gmel. Breslau: Hedwigsbrunnen bei Kapsdorf, auf der rechten Oderseite selten; *Carex ligerica* Gay Grünberg: Pirnig bei den Mühlen, zweiter Standort; *C. paniculata* × *remota* (*C. Bönninghausiana* Weihe) Hainau: Forsthaus bei der Silberquelle; *C. sparsiflora* Steudel Riesengebirge: Elbgrund; *C. Hornschuchiana* Hoppe Oppeln: Kgl. Neudorf, in Oberschlesien sehr selten.

*Phleum alpinum* L. Grenzhau an der Hohen Eule; *P. Boehmeri* Wib. var. *interruptum* Zabel Grünberg: Schlossberg bei Bobernig; Giersdorf, Kreis Goldberg; *Glyceria nemoralis* Uechtr. et Körn. Hirschberg: zwischen Grunau und Flachenseiffen; Teschen: Dzingelau gegen den Tul; *Triticum caninum* L. Kesselkoppe im Riesengebirge bei 1250 m, höchster Standort.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Fiek Emil

Artikel/Article: [Schlesien 1085-1088](#)