© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

VI. Obersächsisches Gebiet.

Referent: P. ASCHERSON.

Quellen:

a) Literatur:

1. a) F. Ludwig, Eine neue Wanderpflanze und ihre Beziehungen zu den Schützenfesten (Mitth. Verband. Voigtländ. Gebirgsver. V. Nr. 3); b) F. Ludwig, Verbreitung von Pflanzen durch Schützenbuden (Huth, Monatl. Mitth. Ges. Naturw. Frankf. a. O. VI. S. 148, 149); 2. E. Fiek und F. Pax (vergl. Verbr. Phan. Nr. 4); 3. C. Beckmann, Ein von Herrn G. Oertel angeblich bei Dessau beobachteter *Carex*-Bastard (Verh. Bot. Ver. Brandenb. XXX. S. 76—78); 4. G. Oertel, Erwiderung auf die unmotivirten Angriffe des Herrn Beckmann und Genossen. Halle, 18. April 1888 (Fliegendes Blatt). Vergl. auch Verbr. Phan.

b) Unveröffentlichte Mittheilungen von:

5. Prof. Dr. F. Ludwig in Greiz.

L. = Preussische Ober-Lausitz.

Neu für das Gebiet:

Primula officinalis Jacq. var. *pannonica* (Kern.) L. Görlitz: Landskrone [2].

Carex chordorrhiza Ehrh. L. Görlitzer Heide: Schaukelmoor am Wohlen [2].

Calamagrostis neglecta Fr. L. Görlitzer Heide: Kohlfurt, Schaukelmoor am Wohlen, Neuhammer [2].

Zu streichen: *Carex teretiuscula* × *panniculata* Dessau (vergl. Bericht pro 1886, S. XCV); die Unterschiebung hannöverischer Exemplare chemisch nachgewiesen [3]! Die neue Angabe zwischen Bitterfeld und Delitzsch [4] schwerlich glaubwürdiger.

Neu eingeschleppt:

Tithymalus strictus Kl. et Gke. Berga a. Elst.: Schützenplatz [5].

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Wichtigere neue Fundorte:

Nymphaea alba L. b) *oocarpa* Casp. L. Görlitzer Heide: Torfstiche und Teiche bei Kohlfurt; Tschirne bei Neuhammer [2]; neu für L.

Silene nutans L. b) *glabra* Schk. L. Görlitz: Tschaschel-Teich bei Kohlfurt [2].

Montia rivularis Gmel. L. Görlitzer Heide: Revier Rothwasser [2].

† *Matricaria discoidea* DC. Schützenplätze in Greiz und Pohlitz [1a, b] Dorfstrasse von Albertsdorf, Kl.-Rüssdorf etc. [5]; L. Görlitz: Torfscheunen bei Kohlfurt; *Hieracium stoloniflorum* (W. K.?) Wimm. (*H. flagellare* Willd), L. Görlitz: zw. Tauchritz und Schönau an der Eigen; vielleicht wild; *H. Pilosella* × *floribundum* (*H. nigriceps* Näg. et Pet. nec Lindeb. [1882] monente UECHTRITZ ms.) L. Görlitz: Bahndamm bei Moys; *H. Pilosella* × *pratense* (*H. prussicum* Näg. et Pet. ex p.), L. Görlitz: Damm der Berliner Bahn [2].

Juncus tenuis Willd. L. Görlitzer Heide: Kammerwaldlinie und Ausstich bei der Oberförsterei Kohlfurt [2].

Poa compressa L. var. *Langiana* Rchb. und *Festuca distans* Kth. L. Görlitz: Eisbahn in der Ponte [2].

Zu berichtigen: *Cardamine amara* × *pratensis* Greiz (Bericht pro 1885, S. CLXIII). Nach Untersuchung eingesandter Exemplare [5]! scheint dem Ref. die in Mittheil. Bot. Ver. Ges.-Thür. VI (1888), S. 3 gewählte Bezeichnung *C. amara flor. violaceis* die richtige.

VII. Hercynisches Gebiet.

Referent: C. HAUSSKNECHT.

Quellen:

a) Literatur:

1. P. ASCHERSON in Mitth. botan. Vereins f. Gesammt-Thüringen VII. 1888/89, S. 2; 2a. M. DÜRER (D. bot. Monatsschr. VI. S. 77); 2b. M. DÜRER (Mitth. bot. Ver. Ges.-Thür. VII. S. 13); 3. GRUBE-EINWALD (a. a. O. S. 2); 4. HAUSSKNECHT (a. a. O. S. 2); 5. REINECKE (a. a. O. S. 11, 12); 6. RUDOLPH (a. a. O. S. 11); 7. SAGORSKI, Plantae criticae Thuringiae (Deutsche botan. Monatsschr. VI. S. 145, 146);

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: 7

Autor(en)/Author(s): Ascherson Paul Friedrich August

Artikel/Article: Obersächsisches Gebiet 1089-1090