

von Gertimholte links vom „hohen Wege“ nach Münster in einem Bache zahlreich [1].

*Ophrys muscifera* Huds. Albersloh: an mehreren Stellen bis zu 50 Expl.; *Herminium Monorchis* R. Br. Walstedde auf dem „Amker Berg“; Westkirchen auf den „Fiukenberg“ [1]; *Spiranthes auctumnalis* Rich. Westkirchen auf dem „Finkenberg“ [1].

*Leucoium vernum* L. Osterwick [1].

*Allium ursinum* L. Seppenrade in einem Walde am Abhange des Berges sehr zahlreich [1]; Altenberge, Nordwalde!! *A. vineale* L. Albersloh [1].

*Juncus filiformis* L. Albersloh links von der Chaussee nach Rinkrode; Moorwiese beim Hause Sunger [1]; *J. tenuis* Willd. Münster: Mauritz-Haide; Weg von der Station nach Handorf; an den unweit Stapelskotten links von der Chaussee abgehenden Fahrgeleisen; massenhaft hinter Latterbeck nach Gremmendorf hin in einem Fahrwege [1].

*Scirpus pauciflorus* Lightf. Münster in der Gegend des Jägerhäuschens [1]; *S. fluitans* L. Albersloh: Hiltrup [1]; *Eriophorum gracile* Koch Albersloh: Zierpertenhaide mit *Helosciadium inundatum* und *Atisma ranunculoides*; *Carex pulicaris* L. Münster nach Angelmodde hin in der grossen Wiese hinter Gremmendorf [1]; Wiese am Emmerbach kurz vor Dickeweib!! *C. distans* L. Liesborn: Albersloh [1]; *C. filiformis* L. zw. Handorf und Telgte mit *C. rostrata* [1].

*Calamagrostis lanceolata* Rth. Albersloh [1]; *Koeleria cristata* Pers. Albersloh an der Chaussee nach Wolbeck [1]; *Festuca myuros* Ehrh. Albersloh [1]; *Bromus arvensis* L. Walstedde: Aecker am „Kwicker Berg“: Kinderhaus unweit der Station am Wege nach Greven [1]; *B. tectorum* L. Hövel bei Hamm an der Eisenbahnstation zahlreich.

---

## XI. Niederrheinisches Gebiet.

Referent: L. GEISENHEYNER.

---

### Quellen:

#### a) Literatur:

1. L. DOSCH und J. SCRIBA, Excursionsflora der Blüten- und höheren Sporenpflanzen des Grossherzogthums Hessen, 3. Aufl., Giessen 1888, Anhang, S. 613—616;
2. L. GEISENHEYNER, Bemerkungen und Zusätze aus dritter Auflage der Excursions-

flora von DOSCH und SCRIBA (Deutsche Bot. Monatsschrift VI. S. 175—184); 3. M. DÜRER (vergl. Hercyn. Geb., Nr. 2b); Vergl. auch Verbr. Phan.:

### b) Unveröffentlichte Aufzeichnungen von:

4. Dr. H. ZIMMERMANN in Limburg an der Lahn; 5. FR. HEINEMANN in Eupen; 6. O. KOBBE in Bingerbrück; 7. M. DÜRER in Frankfurt a. M.: 8. Dr. P. PRAHL in Stettin; 9. dem Referenten.

---

### Neu für das Gebiet:

*Anthemis tinctoria* × *Matricaria inodora*. Rheinufer bei Bingerbrück [6, 9].

*Brunella vulgaris* × *grandiflora* (*B. spuria* Stapf) Ober-Ursel im Taunus [3].

*Gagea minima* Schultes. Schloss Falkenstein im Taunus [1].

---

### Verwildert:

*Lycium rhombifolium* Dippel [vergl. 1]. Kreuznach: Hecke am Oranienhof [9].

---

### Wichtigere neue Fundorte:

† *Hesperis matronalis* L. Felsen zw. Eupen und Baden [5].

*Silene conica* L. München-Gladbach [5].

† *Erodium moschatum* L'Hérit. an Wegen zw. Eupen und Membach [5].

*Trifolium alpestre* L. var. *bicolor* Rchb. Nahethal: Norheim gegenüber, unter *Saxifraga sponhemica* Gmel. [9].

*Agrimonia odorata* Mill. Dornholzhausen b. Homburg [1]; *Mespilus germanica* L. † Hecken bei Eupen [5].

*Epilobium obscurum* Rchb. Falkenstein im Taunus [7].

*Saxifraga decipiens* Ehrh. var. *sponhemica* (Gmel.) am Schneeberge unweit Aachen [5].

*Galium Cruciatum* Scop. Schloss Langenau a. Lahn [4].

*Inula salicina* L. zw. Zollhaus und Mudershausen a. Lahn [4].

† *Rudbeckia laciniata* L. Farbholzmühle b. Eupen [5].

*Serratula tinctoria* L. weissblühend Falkenstein im Taunus [7].

*Myosotis caespitosa* Sch. zw. Limburg und Oranienstein a. Lahn [4].

*Verbascum thapsiforme* Schrad. var. *cuspidatum* Schrad. weissblühend Eupen [5]; *V. nigrum* L. var. *bracteatum* G. Mey. Feldmauern b. Eupen [5].

† *Salvia verticillata* L. Wetzlar, schon 1860 [8]; *Galeopsis ochroleuca* Ehrh. rosablühend Naheufer b. Kreuznach [9]; Falkenstein im

Taunus [7]; *Stachys annua* L. Diez a. Lahn [4]; † *Sideritis montana* L. Eupen, Ufer d. Vesdre [5].

*Salix incana* Schrk. Eupen (gepflanzt?) [5].

*Gymnadenia albida* Rehb. Falkenstein im Taunus [1].

*Carex brizoides* L. Falkenstein im Taunus [1].

Zu berichtigen: *Potentilla recta* L. u. *Trapa natans* L. Kreuznach [1], sind dem dort angeführten Gewährsmanne POLSTORF von diesen Fundorten nicht bekannt [2].

---

## XII. Oberrheinisches Gebiet.

Referent: K. MEZ.

---

### Quellen:

---

#### a) Literatur:

1. ZAHN, Flora der Baar und der umliegenden Landestheile (in Schriften des Ver. für Gesch. und Naturgesch. der Baar, Bd. VII); 2. A. KNEUCKER (vergl. Verbr. Phan. Nr. 6); 3. NEUBERGER, Notiz (Mitth. Bot. Ver. Kr. Freib. u. Land Baden II. Nr. 54, S. 31); 4. SCHEUERLE, Die Badischen Weidenarten (a. a. O. II. Nr. 51, 52, S. 1—14); 5. SCHATZ, Die Badischen Ampfer-Bastarde (a. a. O. II. Nr. 51, 52, 53, S. 14—16, 17—23); 6a. M. DÜRER, Der Hengster bei Frankfurt a. M. mit seinen botanischen Schätzen (D. bot. Monatsschr. VI. S. 70—72); 6b. M. DÜRER (Vergl. Hercyn. Geb. Nr. 2a); 7. P. ASCHERSON in Verhandl. Bot. Ver. Brandenb. XXX. S. XXXI—XXXIII. Vergl. auch Verbr. Phan.

Bemerkung. DOSCIU und SCRIBA (vergl. Niederrh. Geb. Nr. 1) [8], enthält auch für unser Gebiet eine grosse Anzahl wichtiger Angaben; da der Raum eine Ausziehung derselben (bis auf die unten mitgetheilte Notiz) nicht zulässt, sei hiermit darauf verwiesen [sowie auch auf die Berichtigungen und Zusätze von GEISENHEYNER, vergl. Niederrhein. Gebiet Nr. 2, P. ASCHERSON].

#### b) Unveröffentlichte Mittheilung von:

9. M. DÜRER in Frankfurt a. M.

(B. = Baden, E. = Elsass, H. = Hessen, P. = Bayerische Pfalz.)

---

#### Neu für das Gebiet:

*Lonicera coerulea* L. B. Kriegerthal (ENGGESSER) [1].

*Rumex aquaticus* L. × *obtusifolius* L. (*R. Schmidtii* Hausskn.). B.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Geisenheyner Ludwig

Artikel/Article: [Niederrheinisches Gebiet. 1098-1100](#)